



Länsstyrelsen
Skåne

NATURVÄRDESINVENTERING

av preliminära värdetrakter Osby – Glimåkra 2021



Uppdragsgivare

Länsstyrelsen i Skåne län

Tidpunkt för utförd inventering

April-oktober 2021

Inventeringen utförd av

David Göransson, Emma Andersson,
Elisabeth Arvidsson och Madeleine Norström

Rapporten skriven av

David Göransson

Fotograf

David Göransson, Emma Andersson,
Elisabeth Arvidsson och Madeleine Norström

ISBN: 978-91-7675-291-3

Rapportnummer: 2022:23

Förord

Skåne är det län i Sverige som har högst andel ädellövskogar vilket innebär att vi också har ett stort ansvar för bevarande av dessa skogar och arter. Över 700 rödlistade arter är knutna till ädellövskogar och av dessa har flera sin huvudsakliga utbredning i Skåne. Andra viktiga skogsmiljöer i Skåne som vi ska ta ansvar för är klibbalskogar.

För att kunna bevara värdefull skog och skoglig biologisk mångfald behöver vi bra kunskapsunderlag och aktuella inventeringar av naturvärden och hotade arter. I denna rapport presenteras resultaten från en naturvärdesinventering av preliminära värdetrakter i Osby och Östra Göinge kommuner i nordöstra Skåne. Metoden som användes var Naturvärdesinventering enligt svensk standard (SS 1999000:2014). Inventeringen genomfördes under 2021.

Syftet med denna inventering är att den ska ligga till grund för bättre avgränsning av preliminära värdetrakter inom grön infrastruktur och regional strategi för formellt skydd i nordöstra Skåne.

Rapporten har skrivits av David Göransson på Skogsstyrelsen, som också är ansvarig för genomförandet av inventeringarna.



Cecilia Backe

Chef Naturskyddsenheten

Innehåll

1	Inledning.....	4
1.1	Uppdrag.....	4
1.2	Inventeringsområde.....	4
2	Metodik.....	5
2.1	Naturvärdesinventering enligt svensk standard	5
2.2	Detaljeringsnivå	5
2.3	Utförare och organisation.....	5
2.4	Tidpunkt för flätarbete	6
2.5	Förstudie	6
2.6	Fältinventering	6
2.7	Naturvärdesbedömning	6
2.8	Naturvärdeobjekt.....	7
2.9	Övriga områden	7
2.10	Naturvärdesklasser	7
2.11	Naturtyper	7
2.12	Artobservationer	8
2.13	Värdetrakter	8
3	Resultat.....	8
3.1	Naturvärdesobjekt	8
	Delområde 1	10
	Delområde 2	11
	Delområde 3	12
	Delområde 4	13
3.2	Naturvärdesobjekt från översiktlig inventering	14
3.3	Artfynd.....	14
3.4	Förslag till värdetrakt.....	17
	Beskrivning av föreslagen värdetrakt	17
3.5	Osäkerhetsfaktorer	18
4	Källor och referenser.....	19

1 Inledning


1.1 Uppdrag

Skogsstyrelsen har på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne utfört en naturvärdesinventering enligt svensk standard. I uppdraget ingår dessutom ett tillägg utanför svensk standard som omfattar förslag på avgränsning av värdetrakt för ädellövskog. Observationer av, eller indikationer på, förekomst av hasselmus skulle dessutom noteras.

1.2 Inventeringsområde

Inventeringsområdet ligger i Östra Göinge och Osby kommuner. I öst avgränsas området av Rönnebodaån och i väst sträcker sig området till Visseltofta. I syd avgränsas området av vägen mellan Osby och Glimåkra och sträcker sig norrut till Smålandsgränsen. Hela området omfattar ca 30 000 ha. Se karta 1

Inom detta stora område har Länsstyrelsen avgränsat fyra delområden som är inventerade på fältnivå. Två av dessa områden är utpekade som preliminära trakter i *Strategi för formellt skydd av skog i Skåne län*. Två av områdena är utpekade som utredningsområden. Totalt har 10400 ha inventerats på fältnivå.



Karta 1. Översiktskarta över inventeringsområdet

Syftet med naturvärdesinventeringen är att ta fram underlag för att kunna avgränsa eventuella värdestrakter för ädellövskog i området. Underlaget för det arbetet tas fram genom att

identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet som är av positiv betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa.

2 Metodik

2.1 Naturvärdesinventering enligt svensk standard

Skogsstyrelsens naturvärdesinventering sker enligt en metodik som är fastställd av Swedish Standards Institute (SIS) och som beskrivs i – ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning”, svensk standard SS 199000:2014. ”Teknisk rapport SIS-TR 199001” kompletterar standarden och fungerar som stöd vid genomförande av NVI.

Naturvärdesinventeringen omfattar identifiering av geografiska områden av positiv betydelse för biologisk mångfald, samt bedömning av denna betydelse.

Följande moment ingår i naturvärdesinventering på fältnivå:

- Förstudie med identifiering av potentiella naturvärdesobjekt och beskrivning av inventeringsområdet
- Fältinventering, avgränsning och beskrivning av naturvärdesobjekt
- Bedömning av naturvärdesobjektens naturvärde i olika naturvärdesklasser
- Rapportering

Naturvärdesinventeringen kombinerar en sammanställning av befintliga kunskapsunderlag med inventering i fält. Bedömningen av områdets naturvärden grundar sig därför både på tidigare kända uppgifter och på nya uppgifter från denna fältinventering.

2.2 Detaljeringsnivå

Naturvärdesinventeringen är uppdelad i två olika detaljeringsnivåer. Inventeringen omfattar ett stort område på ca 30 000 ha som innehåller fyra mindre delområden som tillsammans omfattar ca 11 400 ha (karta 1). Inventeringen i delområdena är utförd som fältinventering med detaljeringsgrad medel. Det innebär att minsta obligatoriska karteringsenhet är en yta av 0.1 ha eller mer och att alla potentiella naturvärdesobjekt är besökta i fält. Inventeringen i övriga delar av inventeringsområdet är utförd med detaljeringsgrad översikt. Där minsta obligatoriska karteringsenhet är 1.0 ha eller mer. Det innebär att området inte är inventerat i fält utan endast en analys av befintligt kartmaterial.

Alla geografiska områden av positiv betydelse för biologisk mångfald ner till minsta obligatoriska karteringsenhet redovisas som naturvärdesobjekt.

2.3 Utförare och organisation

Fältinventeringen är utförd av Emma Andersson (EA), Elisabeth Arvidsson (EAr), David Göransson (DG) och Madeleine Norström. David Göransson har gjort rapportsammanställning och redovisning till Länsstyrelsen. Samtliga inventerare är erfarna nyckelbiotopsinventerare och anställda på Skogsstyrelsen.

I avdelningsbeskrivningarna framgår vilken inventerare som besökt objektet.

2.4 Tidpunkt för flätarbete

Fältinventeringen utfördes under fältsäsongen, april-oktober 2021.

2.5 Förstudie

Naturvärdesinventeringen inleddes med kartstudier över inventeringsområdet för att hitta de, ur naturvärdessynpunkt, mest intressanta områdena. Skogsstyrelsen har för sina kartstudier tillgång till ett gediget GIS-baserat material med kartor, flygfoton, satellitbilder, skogsdata och olika typer av inventeringar utförda av Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen samt ideella organisationer. De tidigare kända värden som kontrollerades särskilt var bl.a. följande:

- Nyckelbiotoper och områden med naturvärden
- Våtmarker med naturvärden
- Sumpskogar
- Flora- och faunafynd
- Formellt skyddade områden som naturvårdsavtal, biotopskydd, naturreservat
- Natura 2000-områden

2.6 Fältinventering

Ortofoton och satellitbilder användes som underlag vid fältinventeringen. Samtliga naturvärdesobjekt som identifierades vid förarbetet besöktes i fält. Dessutom eftersöks ytterligare naturvärdesobjekt inom fältinventeringsområdena. Varje del av fältinventeringsområdena besöktes på plats utom områden som lätt kunde överblickas och bedömas på håll eller i aktuella flygbilder och som uppenbart saknade positiv betydelse för biologisk mångfald.

Flertalet naturvärdesobjekt dokumenterades med representativt foto som redovisas i objektsbeskrivningarna

2.7 Naturvärdesbedömning

I samband med fältinventeringen utfördes en naturvärdesbedömning. Den innebär en bedömning av ett geografiskt områdes betydelse för biologisk mångfald. Art och biotop användes som bedömningsgrunder.

Bedömningsgrunden art omfattar naturvårdsarter (skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter och signalarter) och artrikedom. Då används arter som vi har noterat i fält samt uppgifter om tidigare fynd som fortfarande kan finnas kvar. I objektsbeskrivningarna anges endast arter som identifierades i fält.

Bedömningsgrunden biotop omfattar två aspekter; biotopkvalitet samt sällsynthet och hot. Med biotopkvalitet avses allt det som formar en biotop eller en livsmiljö. Viktiga biotopkvaliteter som tillmäts betydelse är naturlighet, processer och störningsregimer, strukturer, element, kontinuitet, naturgivna förutsättningar, läge, storlek och form.

2.8 Naturvärdeobjekt

Naturvärdesobjekten utgörs, i de flesta fall, av en sammanhängande yta med en dominerande naturtyp. Olika biotoper kan finnas inom en naturtyp. Ett naturvärdesobjekt kan, utöver den dominerande naturtypen, innehålla mindre ytor som tillhör andra naturtyper.

Naturvärdesobjektet tilldelas slutligen en naturvärdesklass.

2.9 Övriga områden

Övriga områden är benämningen på de ytor som inte avgränsats som naturvärdesobjekt. De omfattar områden med lågt naturvärde och områden som har positiv betydelse för biologisk mångfald, men som till ytan är för små för att rimligen kunna identifieras.

2.10 Naturvärdesklasser

Naturvärdesbedömningen resulterar antingen i att objektet har lågt naturvärde eller hamnar i någon av naturvärdesklasserna 1, 2, 3 eller 4

Utöver standardens tre ordinarie naturvärdesklasser har även inventering av naturvärdesklass 4 tagits med som tillägg i uppdraget.

- **Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1 Mörkröd i karta**
Störst positiv betydelse för biologisk mångfald. Varje område bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå.
- **Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 Klarröd i karta**
Stor positiv betydelse för biologisk mångfald. Varje område bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå.
- **Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 Orange i karta**
Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald. Ett område av en viss naturtyp med naturvärdesklass 3 behöver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men bedöms vara av särskild betydelse för att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.
- **Visst naturvärde – naturvärdesklass 4 Gul i karta**
Viss positiv betydelse för biologisk mångfald. Ett område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.

2.11 Naturtyper

I uppdraget ingår endast naturtypen Skog och träd.

Vid benämning av skogsbiotoper i objektsbeskrivningar användes i första hand ”Sydsvenska lövskogar och andra lövbärande marker” (Andersson & Löfgren 2000). I andra hand, där denna terminologi var svår att tillämpa, beskrevs dominerande trädskikt mer i klartext.

Dessutom angavs förekomst av eventuell Natura 2000-naturtyp (skogsmark) samt eventuell nyckelbiotopstyp i alla objektsbeskrivningar.

2.12 Artobservationer

Alla artfynd är rapporterade i artportalen i projektet ”NVI (skog och träd) Osby-Glimåkra 2021.

Som naturvårdsarter i inventeringen menas rödlistade arter, signalarter för skyddsvärd skog enligt skogsstyrelsen samt typiska arter för N2000.

2.13 Värdeetrakter


I uppdraget ingick att utifrån inventeringsresultaten avgränsa eventuell värdeetrakt för ädellövsog. Värdeetrakt innebär ett landskapsområde som innehåller högre andel värdekärnor än omgivande landskap. Detta medför att de enskilda värdekärnorna inom en värdeetrakt har förutsättningar att stärka varandra genom att t.ex. arter kan sprida sig mellan dem eller att de tillsammans utgör en tillräckligt stor livsmiljö för olika arter i ett landskapsavsnitt.

3 Resultat

3.1 Naturvärdesobjekt


Vid fältinventeringen inom delinventeringsområdena avgränsades 254 naturvärdesobjekt. Ca 80 av dessa objekt sammanfaller till någon del med tidigare kända värdekärnor. Resten är sedan tidigare obeskrivna områden.

Inom de resterande delarna av inventeringsområdet genomfördes en översiktlig inventering utan fältbesök. Den inventeringen resulterade i ytterligare 47 avgränsade objekt. Den översiktliga inventeringen begränsades till att identifiera naturvärdesobjekt med ädellövsogsvärden. Dessa objekt är inte klassade till naturvärdesklass och har heller inte fått någon objektsbeskrivning.



Karta 2. Hela inventeringsområdet med fyra delinventeringsområden. I delområdena syns naturvärdesobjekten med fyra olika färger beroende på naturvärdesklass. I området utanför delområdena syns naturvärdesobjekten från den översiktliga inventeringen som svarta polygoner.

Delområde 1



Karta 3.

Hela delområdet omfattar ca 2000 ha. Inventeringen resulterade i 46 avgränsade naturvårdsobjekt.


Naturvärdena är huvudsakligen koncentrerade till den östra halvan av området och kan grovt delas in i två huvudtyper.

Hedbokskog: Runt byarna Kylen, Mjöbygget, Torup och Drakeberga finns ett stort område med flera bokskogsobjekt med mycket gammal bokskog som har lång kontinuitet. Här finns många fina naturvårdsarter som visar på ett mycket värdefullt bokskogsområde. Under inventeringen hittades gul pysslinglav som ny art för Skåne. Det är en art som är helt knuten till exklusiva bokskogsmiljöer i södra Sverige. Exempel på andra exklusiva arter i området är, liten ädellav, röd pysslinglav, lunglav, violettgrå porlav, liten lundlav rosa lundlav, savlundlav, ädellav och ädelkronlav.

Barrskog: Utmed stränderna och de små öarna i östra Örsjön samt vid ett område med myrmosaik i Björkerås, finns höga naturvärden kopplade till barrskogsmiljöer. Det är både gammal tall och gran som har höga värden. I området finns arter som tidigare bara är kända med några enstaka fynd i Skåne. Exempel på sådana arter i området är vedtrappmossa, dvärgbägarlav, brunpudrad nållav, kortskäftad ärgspik, gransotdyna och thomsons trägnagare

Beskrivningar till naturvärdesobjekten inom delområde 1 presenteras i bilaga 1.

Delområde 2



Karta 4.

Hela delområdet omfattar ca 3700 ha. Inventeringen resulterade i 49 avgränsade naturvårdsobjekt.


Naturvärdena är fördelade över hela området och kan grovt delas in i två typer.

Gårdsnära ädellövsmiljöer: Genom området sträcker sig smala stråk av grönsten som har gett upphov till en näringsrik morän. På de platserna har marken brukats av människor under mycket lång tid och gårdarna har etablerats här. Det är i anslutning till gårdsmiljöerna som de flesta naturvårdsobjekt är registrerade. Det är ofta marker som har en historia av lövängsbruk eller betesmark. Det finns rikligt med hamlade träd i området. Både träd som aktivt hamlas och hamlade träd som övergavs för länge sedan. Förekomsten av gamla ädellövsträd är helt avgörande för naturvärdena i området. Exempel på naturvårdsarter i området är almlav, lunglav, bårdlav, platt fjädermossa, fällmossa och grynig filtlav.

Barrskog: Söder om Östanböke finns ett stort myrmosaikområde som består av både friska granskogar och blöta tallmyrområden. Stora delar av området är nästan opåverkat av sentida skogsbruksåtgärder och

innehåller granar och tallar som är över 200 år gamla. I området finns arter som tidigare bara är kända med några enstaka fynd i Skåne. Exempel på sådana arter i området är Dropptaggvamp, brunpudrad nållav, kortskaftad ärgspik, grönhjon och thomsons trägnagare.

Beskrivningar till naturvårdsobjekten inom delområde 2 presenteras i bilaga 2.


Delområde 3

Karta 5.

Hela delområdet omfattar ca 2 000 ha. Inventeringen resulterade i 52 avgränsade naturvårdsobjekt.

Precis som i delområde 2 är naturvärdena i området är helt knutna till kulturmarkerna i anslutning till gårdarna. Det är ofta marker som har en historia av lövängsbruk eller betesmark. Det finns rikligt med hamlade träd i området. Både träd som aktivt hamlas och hamlade träd som övergavs för länge sedan. Förekomsten av gamla ädellövträd är helt avgörande för naturvärdena i området. Exempel på naturvårdsarter i området är lunglav, almlav blomskägglav, havstulpanlav, dvärgtufs, fällmossa, trädporella, åderskölding och sydlig sotticka

Beskrivningar till naturvårdesobjekten inom delområde 3 presenteras i bilaga 3.

Delområde 4


Karta 6.

Hela delområdet omfattar ca 2 700 ha. Inventeringen resulterade i 106 avgränsade naturvårdsobjekt. Delområdet är det som innehåller störst andel naturvärdesobjekt.

Naturvärdena i området är precis som i område 2 och 3 huvudsakligen knutna till den historiska inägomarken, som brukats som löväng eller bete. I området är naturen tydligt påverkad av förekomsten av grönsten. Det finns många spår efter "diabasbrott" i trakten. Många av områdets ädellövskogslundar och lövängsrester hyser en välutvecklad lundflora med växter som gulsippa, blåsippa, vårärt, vätters och underviol. På lite magrare marker finns några exempel på gamla hedbokskogar. Ytterligare exempel på naturvårdsarter i området är lunglav, bokvårtlav, cinnoberspindling, brödmärgsticka, fjällsopp, saffransspindling, druvfingersvamp, sotlav, grov baronmossa och grov fjädermossa.

Beskrivningar till naturvärdesobjekten inom delområde 4 presenteras i bilaga 4.

Naturvärdesobjekt från översiktlig inventering



Karta 7.

Naturvärdena som avgränsats i den översiktliga inventeringen utgörs nästan helt av gårdsnära ädellövskogsmiljöer. De flesta objekten är tidigare kända värdekärnor. De objekt som inte är tidigare kända värdekärnor har identifierats utifrån trädslagsblandning, kända artförekomster, topografi och strukturer kring trädskiktet som går att utläsa från ortofoto. Objekten har inte fått individuella beskrivningar eller klassningar. Syftet med den översiktliga inventeringen är att ta fram en helhetsbild av inventeringsområdet.

3.2 Artfynd

Vid naturvärdesinventeringen noterades 123 olika naturvårdsarter som finns med i bedömningarna av de avgränsade naturvårdsobjekten. De arterna redovisas i tabell 1 och i objektsbeskrivningarna. Av dessa är 48 arter rödlistade. Alla artnoteringar är registrerade i artportalen inom projektet "NVI (skog och träd) Osby-Glimåkra 2021". Totalt gjordes 972 artförekomster inom inventeringen. Noteringar av arter som inte är relevanta för

klassificeringen av naturvärdesobjekt eller naturvårdsarter som noterades utanför registrerade objekt finns inte med i tabell 1 men är registrerade i artportalen.

Länsstyrelsen har särskilt efterfrågat eventuella förekomster av hasselmus i området. Det finns rikligt med miljöer som är lämpliga för hasselmus. I tidiga igenväxningssuccessioner av lövrika betesmarker bildas artrika bryn- och buskmiljöer med slånbär, rosor, hagtorn, björnbär och hassel som kan vara lämpliga för arten. Inom inventeringsområdet finns stora arealer av sådan mark. Trots det har inga fynd gjorts som tyder på förekomst av hasselmus.

Tabell 1. Naturvårdsarter som är funna vid inventeringen. Signalart (S) anger arter som indikerar skogsområden med höga naturvärden enligt Skogsstyrelsen. Rödlistade arter är markerade med den kategori de har i aktuell rödlista (NT; VU; EN). Typisk art inom N2000 anges med T. Vidare anges om arten är upptagen i Fågel- eller Habitatdirektivet.

Kärlväxter		Signalart	R-list		N 2000 Typisk art (T)
Backsippa	Pulsatilla vulgaris		VU	T	
Blåsippa	Hepatica nobilis	S		T	
Bäckbräsa	Cardamine amara	S		T	
Darrgräs	Briza media			T	
Gullpudra	Chrysosplenium alternifolium	S		T	
Gulsippa	Anemone ranunculoides	S		T	
Idegran	Taxus baccata	S			
Kallgräs	Scheuchzeria palustris			T	
Klockgentiana	Gentiana pneumonanthe		EN	T	
Knägräs	Danthonia decumbens			T	
Lundstarr	Carex montana			T	
Missne	Calla palustris	S		T	
Murgröna	Hedera helix	S		T	
Safsa	Osmunda regalis	S		T	
Skogsbingel	Mercurialis perennis			T	
Slättergubbe	Arnica montana		VU	T	Habitatdirektivet Bilaga 5
Småvänderot	Valeriana dioica		VU		
Stagg	Nardus stricta			T	
Storrams	Polygonatum multiflorum	S		T	
Svart trolldruva	Actaea spicata	S		T	
Tandrot	Cardamine bulbifera	S		T	
Tibast	Daphne mezereum	S			
Underviol	Viola mirabilis	S		T	
Vispstarr	Carex digitata	Ö			
Vårärt	Lathyrus vernus	S		T	
Vätters	Lathraea squamaria	S		T	
Ängsvädd	Succisa pratensis			T	
Mossor					
Blåmossa	Leucobryum glaucum	S		T	Habitatdirektivet bilaga 5
Bokfjädermossa	Neckera pumila	S		T	
Fällmossa	Antitrichia curtipendula	S		T	
Grov baronmossa	Anomodon viticulosus	S		T	
Grov fjädermossa	Neckera crispa	S		T	
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	S		T	
Hårklommossa	Dichelyma capillaceum			T	Habitatdirektivet bilaga 2
Klippfrullania	Frullania tamarisci	S		T	
Kornknutmossa	Odontoschisma denudatum	S			
Platt fjädermossa	Neckera complanata	S		T	
Skuggmossa	Dicranodontium denudatum	S		T	
Stor revmossa	Bazzania trilobata	S			
Stubbspretmossa	Herzogiella seligeri	S		T	

Terpentinmossa	Geocalyx graveolens	S		T	
Trubbfjädermossa	Homalia trichomanoides	S		T	
Trädporella	Porella platyphylla	S		T	
Vedtrappmossa	Crossocalyx hellerianus	S	NT		
Västlig husmossa	Loeskeobryum brevirostre	S		T	
Lavar					
Almlav	Gyalecta ulmi	S	VU	T	
Barkkornlav	Lopadium disciforme	S		T	
Blek kraterlav	Gyalecta flotowii		VU	T	
Blomskägglav	Usnea florida	S		T	
Bokkantlav	Lecanora glabrata	S	NT	T	
Bokvårtlav	Pyrenula nitida	S	NT	T	
Brunpudrad nållav	Chaenotheca gracillima	S	NT	T	
Bårdlav	Nephroma parile	S		T	
Dvärgbägarlav	Cladonia parasitica	S	NT	T	
Dvärgtufs	Scytinium teretiusculum	S			
Glansfläck	Arthonia spadicea	S		T	
Grynig filtlav	Peltigera collina	S	NT	T	
Grynig lundlav	Bacidia biatorina			T	
Grå skärelav	Dendrographa decolorans	S		T	
Gul pysslinglav	Thelopsis flaveola		VU		
Gulnål	Chaenotheca brachypoda	S		T	
Havstulpanlav	Thelotrema lepadinum	S		T	
Kattfotslav	Felipes leucopellaeus	S		T	
Klosterlav	Biatoridium monasteriense		VU	T	
Kornig nållav	Chaenotheca chlorella	S		T	
Kortskaftad parasitispik	Sphinctrina turbinata		VU		
Kortskaftad ärgspik	Microcalicium ahlneri		NT		
Liten lundlav	Bacidina phacodes		NT		
Liten sönderfallslav	Bactrospora corticola		NT		
Liten ädellav	Megalaria laureri	S	EN	T	
Lunglav	Lobaria pulmonaria	S	NT	T	
Lönnlav	Bacidia rubella	S		T	
Orangepudrad klotterlav	Alyxoria ochrocheila		NT		
Pulverädellav	Megalaria pulvereae		VU		
Rosa lundlav	Bacidia rosella	S	VU	T	
Rostfläck	Arthonia vinosa	S		T	
Röd pysslinglav	Thelopsis rubella		VU		
Savlundlav	Bellicidia incompta		EN		
Skuggorangelav	Caloplaca lucifuga		NT		
Sotlav	Acolium inquinans	S		T	
Stor knopplav	Mycobilimbia pilularis	S		T	
Traslav	Scytinium lichenoides	S			
Violettgrå porlav	Lepra multipuncta		NT		
Ädelkronlav	Gyalecta carneola		VU		
Ädellav	Megalaria grossa	S	EN	T	
Svampar					
Brandticka	Pycnoporellus fulgens	S			
Brödmärgsticka	Perenniporia medulla-panis		NT	T	
Cinnoberspindling	Cortinarius cinnabarinus		NT		
Dropptaggsvamp	Hydnellum ferrugineum	S		T	
Druvfingersvamp	Ramaria botrytis	S	NT		
Ekskinn	Aleurocystidiellum disciforme	S		T	
Falsk rättikhätta	Mycena pelianthina	S			
Fjällsopp	Strobilomyces strobilaceus	S			
Gransotdyna	Camarops tubulina		NT		
Gropticka	Postia guttulata	S	NT	T	

Grovticka	Phaeolus schweinitzii	S		T	
Gulfotshätta	Mycena renati	S			
Kantarellmussling	Plicatura crispa	S			
Korallticka	Grifola frondosa	S	NT		
Lindskål	Holwaya mucida	S			
Lömsk flugsvamp	Amanita phalloides	S			
Oxtungssvamp	Fistulina hepatica	S	NT		
Rostticka	Fuscoporia ferruginosa	S		T	
Rävticka	Inocutis rheades	S			
Saffransspindling	Cortinarius olearioides		NT		
Stor sotdyna	Camarops polysperma		NT		
Svart taggsvamp	Phellodon niger	S	NT	T	
Sydlig sotticka	Ischnoderma resinosum		NT		
Vedtrattskivling	Ossicaulis lignatilis	S			
Västlig rostticka	Fuscoporia ferrea			T	
Åderskölding	Pluteus thomsonii	S			
Insekter					
Blanksvart trämyra	Lasius fuliginosus	S			
Bokborre	Ernoporicus fagi				
Bronshjon	Callidium coriaceum	S		T	
Granbarknagare	Microbregma emarginatum	S		T	
Grönhjon	Callidium aeneum		NT		
Mindre poppelglasvinge	Eusphencia melanocephala		NT		
Myskbock	Aromia moschata	S			
Större träfjäril	Cossus Cossus	S			
Svart askbastborre	Hylesinus crenatus		NT		
Thomsons trägnagare	Cacotemnus thomsoni	S			
Tvåfläckig praktbagge	Agrilus biguttatus	S			
Fåglar					
Tjäder	Tetrao urogallus			T	Fågeldirektivet bilaga 1, 2


3.3 Förslag till värdetrakt

Inventeringen visar att det går att avgränsa en Värdeetrakt för naturvärden knutna till ädellövskog. Värdeetrakt innebär ett landskapsområde som innehåller högre andel värdekärnor än omgivande landskap. Utifrån resultaten som presenteras i karta 2, kan man avgränsa ett sammanhängande område som tydligt har högre andel värdekärnor än omgivande landskap. För att göra det extra tydligt har de fältinventerade objekten förstörats med en buffert på 100m i karta 8. Den Mörkröda linjen i kartan är gränsen till den föreslagna värdeetrakten.

Beskrivning av föreslagen värdeetrakt

Glimåkra - Osby

Utmärkande för trakten är ett småbrutet kulturlandskap med rika ädellövskogslundar och ett stort antal lövängsmiljöer med hamlade träd. Berggrunden i trakten består huvudsakligen av sura bergarter men i nord-sydlig riktning sträcker sig flera stråk av grönsten vilket har gett upphov till en rik lundflora i många av traktens ädellövskogsmiljöer. Trakten ligger inom den boreo-nemoral vegetationszonen, d.v.s. inom det som anses vara granens naturliga utbredningsområde. I Traktens norra delar finns några värdekärnor som utgörs av barrskogsmiljöer med höga naturvärden. I den nordöstra delen är hedbokskogarna utmärkande. Här finns bokskogar med mycket lång kontinuitet och rik kryptogamflora.



Karta 8. Förslag till ny värdeetrakt avgränsas av mörkröd linje. Rosa polygoner är alla fältinventerade naturvärdesobjektet som här har förstörats med en buffert på 100 m. De svarta polygonerna är naturvärdesobjekten från den översiktliga inventeringen. De har ingen buffert i kartan.

3.4 Osäkerhetsfaktorer

Inventeringen är genomförd under en hel fältsäsong. Det innebär att några objekt besöktes endast på våren och andra objekt besöktes endast på hösten. Endast enstaka objekt är besökta vid mer än ett tillfälle. Förutsättningarna för artfynd i objekten är därför olika. Fynd av marksvampar finns inte i objekt som är inventerade på våren och fynd av vårbloommande lundflora är troligt vis något färre i höstinventerade objekt.

4 Bilagor

Bilaga 1: Objektsbeskrivningar till delområde 1

Bilaga 2: Objektsbeskrivningar till delområde 2

Bilaga 3: Objektsbeskrivningar till delområde 3

Bilaga 4: Objektsbeskrivningar till delområde 4

5 Källor och referenser

ArtDatabanken 2013: *Naturvårdsarter*. ArtDatabanken Rapport 14. ArtDatabanken, SLU.

ArtDatabankens Artportal - www.artportalen.se

ArtDatabanken. 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. ArtDatabanken, SLU, Uppsala

Löfroth, M. 1997: *Svenska naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000*.
Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket 2008: *Arter och naturtyper i habitatdirektivet – tillståndet i Sverige 2007*.

Naturvårdsverket 2011: *Svenska tolkningar Natura 2000 naturtyper: Skogar 9010-91F0*.

Nitare, J. (ed.) 2010: *Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer*.
4:e rev uppl. Skogsstyrelsen.


Nitare, J. 2019: *Skyddsvärd skog, Naturvårdsarter och andra kriterier för
naturvärdesbedömning*. Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen 2013: *Handbok för inventering av nyckelbiotoper*. Skogsstyrelsen.

Swedish Standards Institute (SIS), 2014: *Naturvärdesinventering avseende biologisk
mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning*, SS
199000:2014.

Swedish Standards Institute (SIS), 2014: *Teknisk rapport SIS-TR 199001*.

Beskrivningar av objekt i delområde 1.



Karta 1: Översiktsskarta över delområdet



Karta 2. Objektskarta över västra delen.



Karta 3: Objektskarta över västra delen.

101 klass 2 0,9 ha

Gransumpskog

Nbi: Gransumpskog

N2000:



Fuktigt granskogsparti med en central blötare del. Skogen visar få tecken på skogsbruksåtgärder. I området finns rikligt med död ved. Naturvårdsarterna i området är alla knutna till död ved av barrträd vilket troligen har lång kontinuitet i området.

Inventerare: DG

Brandticka	S	
Gransotdyna	NT	
Kornknutmossa	S	
Vedtrappmossa	NT	

Inventerare DG

102 klass 2 1,2 ha

Gransumpskog

Nbi: Gransumpskog

N2000:



Fuktigt granskogsparti med inslag av gamla grova tallar. Skogen visar få tecken på skogsbruksåtgärder. I området finns rikligt med död ved vilket till stor del orsakats av stormfällningar i beståndskanten som gränsar mot en ung granplantering. Men det finns även rikligt med gamla mossöverbuxna lågor i olika dimensioner. Naturvårdsarterna i området är knutna till död ved av barrträd vilket troligen har lång kontinuitet i området.

Kornknutmossa	S	
Vedtrappmossa	NT	

Inventerare DG

103 klass 1 1,9 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Hagmark

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ, 9070

Trädbevuxen betesmark utmed Helge å



Ett par dungar av gamla träd, huvudsakligen ek men även björk och asp. Stora naturvärden är knutna till betesmarksfloran och hävden av de öppna markerna. Klockgentiana växer här med många hundra exemplar. Även flera av träden hyser naturvårdsarter och utgör en viktig miljö för biologisk mångfald. Här växer exempelvis liten sönderfallslav och gråskärelav på ek

Darrgräs	T	
Grå skärelav	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Klockgentiana	EN, T	
Knägräs	T	
Liten sönderfallslav	NT	
Slåttergubbe	VU, T	Habitatdirektivet bilaga 5
Sotlav	S, T	
Stagg	T	
Ängsvädd	T	

Inventerare DG

104 klass 3 2,6 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Hagmark

N2000:



Kantzonen utmed Helge å som är bevuxen med ek, björk och al. På rotbaser av al i strandkanten växer hårklomossa.

Hårklomossa	T	Habitatdirektivet bilaga 2
-------------	---	----------------------------

Inventerare DG

105 klass 4 0,6 ha

Alsumpskog

Nbi:

N2000:



Klibbalskog i fuktig svacka. Inga funna naturvårdsarter men visst biotopvärde i form av död ved, blockighet, och gamla alar.

Inventerare DG

106 klass 2 1,3 ha

Hedbokskog

Nbi: Hedädelövsog

N2000: Bokskog av fryle typ, 9110



Bokskog på mager mark. Skogen är ogallrad i sen tid och innehåller många senvuxna bokar och enstaka ekar. Flera naturvårdsarter som är knutna till naturtypen är funna i området.

Barkkornlav	S, T	
Bokfjädermossa	S, T	
Bokkantilav	NT, S, T	
Bokvårtlav	NT, S, T	
Fällmossa	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Platt fjädermossa	S, T	
Trädporrella	S, T	

Inventerare DG

107 klass 1 0,2 ha

Hedbokskog

Nbi Hedädellövskog

N2000 Bokskog av fryle typ, 9110



Liten bokskogsmiljö som består av ca 10 grova bokar omgivna av yngre granskog. Ett stort antal naturvårdsarter som är knutna till gammal bokskog växer rikligt på de flesta träden.

Barkkornlav	S, T	
Blek kraterlav	VU, T	
Bokfjädermossa	S, T	
Bokkantlav	NT, S, T	
Bokvårtlav	NT, S, T	
Fällmossa	S, T	
Grynig lundlav	T	
Havstulpanlav	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Kortskaftad parasitpik	VU	
Lunglav	NT, S, T	
Platt fjädermossa	S, T	
Savlundlav	EN	
Violettgrå porlav	NT	
Ädelkronlav	VU	

Inventerare DG

108 Klass 4 2,0 ha

Lövsumpskog

Nbi:

N2000:

Sumpskogsområde på sluttande mark där klibbal dominerar men inslaget av gran och björk är stort.

Genom området flödar vattnet bitvis i en liten bäckfåra och bitvis som fuktstråk. Rikligt med klen död ved och sockelbildning på klibbal och björk.

Inga naturvårdsarter noterades i området.

Inventerare DG

109 Klass 2 19,8 ha

Tallskog

Nbi: Barrskog

N2000:



Gammal tallskog på näset som leder ut till Bokö och kantzonen runt hela ön samt de små strandnära öarna. Flera av tallarna är 200-300 år med välutvecklad pansarbark och grova grenar.

Blåmossa	S, T	Habitatdirektivet bilaga 5
Brunpudrad nållav	VT, S, T	
Dropptaggsvamp	S, T	
Grovticka	S, T	
Terpentinmossa	S, T	

Inventerare DG

110 Klass 4 4,5 ha

Tallskog

Nbi:

N2000:



Medelålders tallskog med enstaka gamla träd i strandkanten. Tidigare gallrat bestånd men orört i sen tid, enstaka lågor. Inga naturvårdsarter noterades i objektet.

Inventerare DG

111 klass 2 4,3 ha

Tallsumpskog

Nbi:Tallsumpskog

N2000: Skogbevuxen myr, 91D0



Talldominerad sumpskog i kanten av ett fint, öppet mosseplan, med bland annat kallgräs och sumpstarr. Skogen är till synes helt opåverkad av skogliga åtgärder. Centralt i området bildar tallskogen en ö i myrmarken där det växer några grövre tallar. På en tallåga växer dvärgbägarlav. I de fuktigare partierna av kantskogen finns rikligt med klen död ved

Blåmossa	S, T	Habitatdirektivet bilaga 5
Dvärgbägarlav	NT,S,T	
kallgräs	T	
Terpentinmossa	S, T	

Inventerare DG

112 klass 4 1,6 ha

Tallskog

Nbi:

N2000:

Grova tallar som är lämnade som hänsyn vid slutavverkning. Området har ett visst naturvärde på grund av sitt läge i närheten till andra områden med höga naturvärden kopplade till gammal tall.

Inventerare DG

113 klass 3 1,8 ha

Tallskog

Nbi: Barrskog

N2000:

Kantzons utmed sjön, som är bevuxen med gamla grovgreniga tallar och granar. Miljön är viktig för biologisk mångfald som livsmiljö och spridningsväg för arter knutna till trädmiljöerna i anslutning till Örsjön.

Blåmossa	S, T	Habitatdirektivet bilaga 5
----------	------	----------------------------

Inventerare DG

114 klass 1 3,8 ha

Klibbalskog av översilningstyp

Nbi: Naturlig skogsbäck

N2000: lövsumpskogar av fennoskandisk typ



Sumpskogsmiljö utmed en mindre bäck som på flera ställen delar upp sig i flera fåror och bildar kvillområden. Klibbal är dominerande men inslag av ask, björk och gran är betydande. Även granen i området hyser naturvårdsarter, exempelvis kattfotslav och gransotdyna. I norra delen av området växer ett bestånd med ca tio gamla idegranar. Utmed hela sträckan växer safsa.

Gransotdyna	NT	
Grönhjon	NT	
kattfotslav	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Safsa	S, T	
Småvänderot	VU	
Storrams	S, T	
Tibast	S	
Ängsvädd	T	

Inventerare DG

115 klass 3 3,0 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi Lövängsrest

N2000

Ekdominerade ädellövsmiljöer på den historiska inägomarken. Området har tidigare utgjorts av ängs- och betesmark med spridda träd. Naturvärdena är knutna till de gamla träden som i dag hyser ett fåtal naturvårdsarter.

Fällmossa	S, T	
Guldlockmossa	S, T	
Rostfläck	S, T	

Inventerare DG

116 klass 2 1,3 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: Lövängsrest

N2000:

En åkerholme på den historiska inägomarken som domineras av grova, spärrgreniga ekar, samt några grova bokar. Området har tidigare utgjorts av ängs- och betesmark med spridda träd. Naturvärdena är knutna till de gamla spärrgreniga ekarna som i dag hyser ett flertal naturvårdsarter. Ett välutvecklat bryn finns i kanterna mot den öppna betesmarken

Fällmossa	S, T	
Guldlockmossa	S, T	
klippfrullania	S, T	
Rostfläck	S, T	
Sotlav	S, T	

Inventerare DG

117 klass 2 1 2,0 ha

Igenväxt äng/hagmark av ask-almtyp

Nbi: Lövängsrest

N 2000:



En gårdsnära ädellövsmiljö med flera, tidigare hamlade, askar. Området har inte brukats som ängsmark på mycket länge och har helt övergått till en lövskogslund med stor trädslagsblandning. I beståndet finns rikligt med död ved och naturlig beståndsdynamik ger karaktär åt området.

Dvärgtuffs	S	
Fällmossa	S, T	
Grynig filtlav	NT, S, T	
Guldlockmossa	S, T	
Gullpudra	S, T	
klippfrullania	S, T	
Lönnlav	S, T	
Platt fjädermossa	S, T	

Inventerare DG

118 klass 3 3,0 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: Ädellövskog

N2000



Området utgörs av en öppen skog där bok och ek dominerar med ett stort inslag av lind och avenbok. Flera av träden har grova grenar och flerstamigt växtsätt som avslöjar att de är uppvuxna i en öppen trädmiljö. Många träd har håligheter och stamskador med blottad död ved. Områdets södra del är nyligen gallrad.

Fällmossa	S, T	
Västlig rostticka	T	

Inventerare DG

119 klass2 1,3 ha

Igenväxt äng/hagmark av ask-almtyp

Nbi Lövängsrest

N 2000



En gårdsnära ädellövsmiljö med enstaka hamlade träd. Området har inte brukats som ängsmark på mycket länge och har helt övergått till en lövskogslund med stor trädslagsblandning. Det växer rikligt med hassel i området. Ca 7 träd hyser lunglav, arten växer på bokar, en lönn, och minst en hassel. Området har påverkats starkt av naturvårdshuggning 2021, senvuxna och undertryckta bokar och avenbokar har avverkats, tydliga naturvårdsträd, håligheter har avverkats, även två hasselbuketter med lunglav har avverkats. Flera av naturvårdsarterna växer på en grov alm som är död av almsjuka. I beståndet finns fortfarande medelålders alm som är till synes frisk.

Fällmossa	S, T	
Grov baronmossa	S, T	
Lunglav	NT, S, T	
Trädporella	S, T	

Inventerare DG

120 klass 1 4,5 ha

Hedbokskog

Nbi: Sekundär ädellövnaturskog

N2000 Bokskog av fryle-typ 9110



Gammal bokskog i en blockrik sluttning mot väster. Skogen hyser flera naturvärdesarter som indikerar en artrik bokskog med lång kontinuitet. Skogen innehåller många strukturer som är värdefulla för biologisk mångfald. Exempelvis rikligt med lågor och grova högstubbar, fuktstråk, branter, senvuxna träd, ihåliga träd. Bohål.

Barkkornlav	S, T	
Bokkantlav	NT, S, T	
Bokvårtlav	NT, S, T	
Klippfrullania	S, T	
Liten ädellav	EN, S, T	
Violettgå porlav	NT	
Västlig husmossa	S, T	

Inventerare DG

121 klass 2 0,2 ha

Hedbokskog

Nbi: Sekundär ädellövnaturskog

N2000: Bokskog av fryle-typ 9110



Litet bestånd av mycket gamla avenboka och bokar. Träden är tydligt senvuxna, med håligheter och savflöden. I beståndet finns rikligt med grov död ved och stor diameterspridning på träden.

bokkantlav	NT, S, T	
bokvårtlav	NT, S, T	
Grov fjädermossa	S, T	
klippfrullania	S, T	

Inventerare DG

122 klass 4 12,1 ha

Tallmyr

Nbi-

N2000



Tallbevuxen myr. Centrala delarna av området är bevuxna med låga martallar. Mot kanterna blir träden längre. Runt hela området sträcker sig ett relativt välbevarat laggkärr. Enstaka diken påverkar områdets hydrologi. Trädsiktet är inte påtagligt gammalt

Blåmossa	S, T	Habitatdirektivet bilaga 5
----------	------	----------------------------

Inventerare DG

123 klass 3 17,2 ha

Tallbevuxen myr

Nbi: Tallsumpskog

N2000: Skogsbevuxen myr, 91D0



Stort myrområde i direkt anslutning till fler naturvärdesobjekt som hyser höga naturvärden. Objektet utgörs av ogallrad tallskog som omger de öppnare partierna av myren. Området präglas av orördhet och tallarna är senvuxna och självgallring har lett till rikligt med klen, död ved. Området är viktigt för tjäder som observerades under fältbesöket.

Blåmossa	S, T	Habitatdirektivet bilaga 5
Kallgräs	T	
Tjäder	T	Fågeldirektivet bilaga 1, 2

Inventerare DG

124 klass 4 2,9 ha

Tallmyr

Nbi:

N2000:



Tallskog på myrmark som är del av ett större myrmarkskomplex beståndet är nyligen gallrat men kvarvarande trädskikt är ca tvåhundra år och mycket senvuxet. Området är delvis påverkat av dikning

Missne	S, T	
--------	------	--

Inventerare DG

125 klass 2 2,1 ha

Barrblandskog

Nbi: Barrnaturskog

N2000: Västlig taiga, 9010



Barrblandskogsområde med naturskogskaraktär. I området finns väldigt få tecken på skogliga åtgärder. Gammal tall dominerar men inslaget av gran är stort. Det finns rikligt med gamla träd och grov död ved. På grova tallågor växer dvärgbägarlav och på senvuxna granar finns gnagspår av bronsbjon. Området är en del i ett större myrmarkskomplex.

Bronshjon	S, T	
Dvärgbägarlav	NT, S, T	

Inventerare DG

126 klass 2 1,6 ha

Barrblandskog

Nbi: Barrnaturskog

N2000: Västlig taiga, 9010



Barrblandskogsområde med naturskogskaraktär. I området finns väldigt få tecken på skogliga åtgärder. Beståndet domineras av både tall och gran som är mycket gammal. I objektet finns en rad naturvårdsarter som är ovanliga i Skåne och signalerar värdefulla barrskogsmiljöer. Det finns rikligt med död ved både stående och liggande. På grova tallågor växer vedtrappmossa och dvärgbägarlav och på gamla granar finns gnagspår av thomsons trägnagare. Området är en del i ett större myrmarkskomplex.

Blåmossa	S, T	Habitatdirektivet bilaga 5
Dvärgbägarlav	NT, S, T	
Grönhjon	NT	
kortskaftad ärgspik	NT	
Missne	S, T	
Thomsons trägnagare	S	
Vedtrappmossa	NT, S	

Inventerare DG

127 klass 3 1,5 ha

Blandsumpskog

Nbi: Blandsumpskog

N2000:



Sumpskog som domineras av klibbal, gran och björk. I området finns inga spår av skogliga åtgärder. Rikligt med död ved och klibbalar med sockelbildning. I området finns öppnare partier som är bevuxna med älgört. Här är Klibbalarna solexponerade och vidkroniga.

Blåmossa	S, T	Habitatdirektivet bilaga 5
Skuggmossa	S, T	

Inventare DG

128 klass 1 3,9 ha

Hedbokskog

Nbi: Sekundär ädellövnaturskog

N2000: Bokskog av fryle typ, 9110



En mycket gammal bokskog på med inslag av senvuxen ek. Hela området hyser mycket höga art- och biotopvärden. Ett stort antal naturvårdsarter som är knutna till gammal bokskog växer rikligt på de flesta träden. I objektet växer även exklusiva arter som är knutna till bokskogar med lång kontinuitet. Exempelvis Liten ädellav, ädellav och röd pysslinglav. Halva objektet är registrerat av Skogsstyrelsen som nyckelbiotop. Den södra delen är registrerat som objekt med naturvärden. I den delen har viss avverkning skett. Men de kvarvarande träden hyser så höga värden att hela området är klassat som högsta naturvärde, klass 1.

Barkkornlav	S, T	
Bokkantlav	NT, S, T	
Bokvårtlav	NT, S, T	
Fällmossa	S, T	
Grynig lundlav	T	
Guldlockmossa	S, T	
Havstulpanlav	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Liten lundlav	NT	
Liten ädellav	EN, S, T	
Lunglav	NT, S, T	
Orangepudrad klotterlav	NT	
Platt fjädermossa	S, T	
Röd pysslinglav	VU	
Traslav	S	
Tvåfläckig praktbagge	S	
Ädellav	EN, S, T	

Inventerare DG

129 klass 1 0,5 ha

Hedbokskog

Nbi: Sekundär ädellövnaturskog

N2000: Bokskog av fryle typ, 9110



En gammal bokskog med inslag av senvuxen och högstammig ek. Hela området hyser mycket höga art- och biotopvärden. De naturvårdsarter som är funna i objektet växer huvudsakligen på ett fåtal ekar och bokar. Hela objektet är registrerat av Skogsstyrelsen som nyckelbiotop och hyser i dag så höga biotopvärden i form av dödved, senvuxna träd, grovgreniga träd och blockig terräng att området klassas till högsta naturvärde, klass1.

Barkkornlav	S, T	
Ekskinn	S, T	
Fällmossa	S, T	
Grynig lundlav	T	
Guldlockmossa	S, T	
Havstulpanlav	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Liten lundlav	NT	
Lunglav	NT, S, T	
Platt fjädermossa	S, T	
Stor knopplav	S, T	

Inventerare DG

130 klass 2 0,7 ha

Hedbokskog

Nbi: Sekundär ädellövnaturskog

N2000: Bokskog av fryle typ, 9110



En gammal bokskog i östvärd sluttning som av slutas i en våtmark vilket bidrar till hög luftfuktighet. Flera bokar är flerstammiga och grovgreninga med stammskador och savflöden. Hela området hyser påtagliga art- och biotopvärden.

Barkkornlav	S, T	
bokkantlav	NT, S, T	
bokvårtlav	NT, S, T	
Fällmossa	S, T	
Grynig lundlav	T	
Havstulpanlav	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Orangepudrad klotterlav	NT	

Inventerare DG

131 klass 3 2,1 ha

Hedbokskog

Nbi: Ädellövskog

N2000: Bokskog av fryle typ, 9110



En gammal bokskog som är tydligt påverkad av avverkningar. På flera ställen är beståndet av gamla bokar och så glest att en tät föryngring har etablerats. Många av de gamla bokarna hyser ändå naturvårdsarter och i beståndet finns värdefulla strukturer som grov död ved, grova träd och senvuxna träd. Objektet ligger i direkt anslutning till områden med högt och mycket högt naturvärde och har därför en viktig ekologisk funktion med påtagligt naturvärde, klass 3. Området är registrerat som objekt med naturvärde av Skogsstyrelsen

Barkkornlav	S, T	
Fällmossa	S, T	
Havstulpanlav	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Rostfläck	S, T	

Inventerare DG

132 klass 1 3,0 ha

Hedbokskog

Nbi: Sekundär ädellövnaturskog

N2000: Bokskog av fryle typ, 9110



En mycket gammal bokskog, med lång kontinuitet, med inslag av senvuxen ek. Hela området hyser mycket höga art- och biotopvärden. Ett stort antal naturvårdsarter som är knutna till gammal bokskog växer rikligt på de flesta träden. Vid inventeringstillfället hittades även gul pysslinglav, vilket är första fyndet i Skåne. Gul pysslinglav är en art som i södra Sverige är helt knuten till mycket exklusiva bokskogsmiljöer. På grund av högt artvärde och högt biotopvärde i form av mycket gamla bokar, senvuxenhet, savflöden, hålträd och rikligt med död ved är hela området klassat som högsta naturvärde, klass 1. Objektet är registrerat av Skogsstyrelsen som nyckelbiotop

Barkkornlav	S, T	
Bokfjädermossa	S, T	
Bokkantlav	EN, S, T	
Bokvårtlav	EN, S, T	
Fällmossa	S, T	
Gul pysslinglav	VU	
Guldlockmossa	S, T	
Gulnål	S, T	
Havstulpanlav	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Liten lundlav	NT	
Lunglav	NT, S, T	
Platt fjädermossa	S, T	
Stor knopplav	S, T	
Trädporella	S, T	

Inventerare DG

133 klass 3 2,3 ha

Hedbokskog

Nbi: Sekundär ädellövnaturskog

N2000: Bokskog av fryle typ, 9110



Höjdrygg bevuxen med gles bokskog. Många av bokarna är senvuxna och flerstammiga. Området hyser visst artvärde eftersom havstulpanlav växer på nästan varje stam, även om inte så många andra naturvårdsarter är funna. Det finns inte så mycket död ved men ett visst biotopvärde finns i form av gamla bokar. Området klassas därför som påtagligt naturvärde, klass 3.

Barkkornlav	S, T	
Havstulpanlav	S, T	
Klippfrullania	S, T	

Inventerare DG

134 klass 4 0,4 ha

Gransumpskog

Nbi:

N2000:



Gransumpskog med stor inblandning av klibbal, tall och björk. Området har obetydligt artvärde men visst biotopvärde med senvuxna granar, sockelbildning på klibbal samt rikligt med klen död ved. Området ligger dessutom i direkt anslutning till andra naturvärdesobjekt.

Inventerare DG

135 klass 2 0,4 ha

Hedbokskog

Nbi: Ädellövskog

N2000: Bokskog av fryle typ, 9110



Smalt område med gamla bokar som hyser flera naturvårdsarter. Lunglav växer rikligt på en grov bokhögstubbe, nära vägkanten. Där den inte kan leva vidare på långsikt men en mindre bål hade etablerat sig på en bok längre in i beståndet. Området är tydligt påverkat av avverkningar.

Barkkornlav	S, T	
Havstulpanlav	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Lunglav	NT, S, T	

Inventerare DG

136 klass1 1,3 ha

Hedbokskog / Lövsumpskog

Nbi: Sekundär ädellövnaturskog

N2000: Bokskog av fryle typ, 9110



Bokskog som växer i sluttningen ner mot en sumpskog som breder ut sig utmed en liten bäck. Sumpskogen har en rik trädslagsblandning med ask, tall, asp, bok och ek men domineras av klibbal och gran. I sluttningen på östra sidan växer bokskog med inslag av ek, avenbok och hassel. Flera av bokarna här är klena men mycket senvuxna och gamla. På sådana bokar växer här rikligt med naturvårdsarter som är knutna till bokskog med lång kontinuitet. Området hyser höga biotopvärden i form av senvuxna träd, fuktig miljö, rikligt med död ved, diameterspridning och trädslagsblandning samt höga artvärden. Därför klassas miljön till högsta naturvärde.

Barkkornlav	S, T	
Bokkantlav	NT, S, T	
Bokvårtlav	NT, S, T	
Fällmossa	S, T	
Havstulpanlav	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Platt fjädermossa	S, T	
Savlundlav	EN	
Skuggmossa	S, T	
Stor knopplav	S, T	
Trubbfjädermossa	S, T	

Inventerare DG

137 klass 1 2,7 ha

Blandsumpskog / Barrblandskog

Nbi: Lövrik barrblandskog

N2000

Naturskogsliknande område i kanten av ett större myrmarksområde. Hela området domineras av gran och tall men särskilt i den västra delen är inslaget av ek, asp, björk och rönn stort. Den västra delen utgörs av en nordvänd sluttning med källflöden och stort inslag av död ved. På en senvuxen rönn i ett fuktigt parti växer pulverädellav som dessutom är rikligt fertil, vilket är mycket ovanligt.

Brandticka	S	
Fällmossa	S, T	
Gransotdyna	NT	
Pulverädellav	VU	

Inventerare DG

138 klass 2 1,6 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind- ektyp

Nbi: Lövskogslund

N2000:

Sedan länge övergiven gårdsmiljö med omgivande träd. Området är idag en lövskog som domineras av ek och bok. Det växer några äldre lönnar utmed vägen på vilka flera naturvårdsarter är funna, exempelvis dvärgtufs och bårdlav. På gammal bok växer den hotklassade laven kortskaftad parasitspik.

Bårdlav	S, T	
Dvärgtufs	S	
Grynig filtlav	NT, S, T	
Kortskaftad parasitspik	VU	

Inventerare DG

139 klass 2 0,4 ha

Hedbokskog

Nbi: Sekundär ädellövnaturskog

N2000: Bokskog av fryle typ, 9110

Ett smalt område med gamla bokar i en västvänd sluttning. Naturvärdena i området är helt knutna till de gamla bokarna som hyser flera naturvårdsarter, exempelvis Lunglav. Bokarna i området hotas av igenväxande yngre gran.

Barkkornlav	S, T	
Bokkantlav	NT, S, T	
Bokvårtlav	NT, S, T	
Guldlockmossa	S, T	
Havstulpanlav	S, T	
Liten lundlav	NT	
Lunglav	NT, S, T	
Lönnlav	S, T	
Platt fjädermossa	S, T	

Inventerare DG

140 klass 2 1,8 ha

Hedbokskog

Nbi: Sekundär ädellövnaturskog

N2000: Bokskog av fryle-typ 9110



Gammal bokskog som är påverkad av gallring men innehåller fortfarande många gamla träd. Skogen hyser några naturvärdesarter som indikerar en artrik bokskog med lång kontinuitet. Skogen innehåller många strukturer som är värdefulla för biologisk mångfald. Exempelvis rikligt med lågor och grova högstubbar med tickor, senvuxna träd, ihåliga träd och bohål.

Barkkornlav	S, T	
Bokfjädermossa	S, T	
Fällmossa	S, T	
Havstulpanlav	S, T	
Klippfrullania	S, T	

Inventerare DG

141 klass 3 1,5 ha

Gransumpskog

Nbi: Gransumpskog

N2000:



Barrsumpskog som domineras av gran men med ett stort inslag av tall, al och björk. Området är bitvis mycket fuktigt med sockelbildning på klibbalarna. Granarna och tallarna är till stor del klena men senvuxna. Det finns rikligt med död ved i objektet. Området ligger i kanten på en stor öppen våtmark utmed Simontorpaån. Områdets hydrologi styrs av vattennivåerna i ån och är inte påverkat av dikning.

Blåmossa	S, T	Habitatdirektivet bilaga 5
----------	------	----------------------------

Inventerare DG

142 klass 2 1,5 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: Lövängsrest

N2000:



I norra delen, i kanten mot den öppna åkermarken växer sex mycket grova, kandelaberformade lindar som tidigare har varit hamlade. Södra och centrala delen av området domineras av senvuxen ek och grova bokar. Objektet har inte så lång kontinuitet som skog men har förmodligen mycket lång kontinuitet av trädbevuxen kulturmark.

Barkkornlav	S, T	
Fällmossa	S, T	
Grynig lundlav	T	
Guldlockmossa	S, T	
Havstulpanlav	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Rostfläck	S, T	

Inventerare DG

143 klass 2 3,1 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: Lövängsrest

N2000:



Gårdsnära skogsområde som domineras av ek och bok men med inslag av lind och lönn. Delar av området betas av nötkreatur och har en öppen och varierad struktur. Även i de mer slutna partierna syns spåren efter en tidigare mer öppen miljö i form av flerstammiga grova bokar och tidigare hamlade lindar och lönnar på rösen.

Barkkornlav	S, T	
Blanksvart trädmyra	S	
Bokvårtlav	NT, S, T	
Fällmossa	S, T	
Grynig lundlav	T	
Guldlockmossa	S, T	
Havstulpanlav	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Lönnlav	S, T	
Orangepudrad klotterlav	NT	
Platt fjädermossa	S, T	
Sotlav	S, T	

Inventerare DG

144 klass 3 1,8 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: Lövskogslund

N2000:




Skogsområde som domineras av ek och bok men med stort inslag av högstammiga lindar. Norra delen angränsar till åker och betesmark och innehåller flera grova ekar och bokar med bred krona. I den södra delen är inslaget av gran större och naturvärdena är huvudsakligen knutna till senvuxna ekar. Naturvårdarterna i området växer huvudsakligen på senvuxna ekar och lindar.


Barkkornlav	S, T	
Fällmossa	S, T	
Havstulpanlav	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Lönnlav	S, T	
Rostticka		

Inventerare DG

Beskrivningar av objekt i delområde 2.



Karta 1. Översiktskarta över delområdet.



Karta 2. Objektskarta över norra delen.



Karta 3. Objektskarta över mellersta delen.



Karta 4. Objektskarta över den södra delen.

201 klass 4 3,4 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: Lövängsrest

N2000



Ekdominerade åkerholmar på den historiska inägomarken. Området har tidigare utgjorts av ängs- och betesmark med spridda träd. Naturvärdena är knutna till brynmiljöerna och kontinuitet av lind och ek i öppen kulturmark. I fältskiktet växer bland annat aklejruta. Många av träden är klena men flerstammiga. Området utgörs delvis av ett registrerat objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsen.

Tvåfläckig praktbagge	S	
-----------------------	---	--

Inventare DG

202 klass2 2,8 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Lövängsrest

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ 9070



Trädklädd betesmark med tydliga spår efter tidigare lövängsbruk i form av hamlade lindar. Även grova almar och lönnar finns i området. Det är på dessa träd som de flesta naturvårdsarterna förekommer. Området ligger på inägomark och har troligen mycket lång kontinuitet som trädbevuxen jordbruksmark. Området utgörs av ett registrerat objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsen.

Dvärgtufs	S	
Fällmossa	S, T	
Guldlockmossa	S, T	
Platt fjädermossa	S, T	
Traslav	S	

Inventerare DG

203 klass 4 1,4 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi

N2000

Del av den historiska inägomarken som idag är igenväxt med lövskog. Trädsnittet domineras av ek, lind, lönn och avenbok. I beståndet växer rikligt med hassel. Området har tidigare utgjorts av ängs- och betesmark med spridda träd. I området finns rikligt med odlingsrösen och några äldre ekar och lindar med hamlingsspår. Området utgörs av ett registrerat objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsen.

Inventare DG

204 klass 4 25,7 ha

Tallmyr

Nbi

N2000



Tallbevuxen högmossa. Norr om området finns en pågående torvbrytning som delvis påverkar områdets hydrologi. Trädsnittet är inte så gammalt och mängden död ved är inte så hög. Området präglas ändå av orördhet och har inte påverkats av skogsbruksåtgärder i sen tid.

Inventare DG

205 klass 2 1,7 ha

Barrblandskog

Nbi: Barrnaturskog

N 2000: Västlig Taiga, 9010



Barrskogsmiljö med naturskogskaraktär. Gamla grova, granar och tallar, grova lågor och högstubbar samt senvuxna klena granar ger karaktär åt området. Viss plockhuggning har skett i sen tid för att gynna gamla tallar. Hela objektet är omgivet av tallbevuxen myr vilket bidrar till ett skyddat läge.

Grönhjon	NT	
Kornig nållav	S, T	
Thomsons trägnagare	S	

Inventerare DG

206 klass 4 4,3 ha

Tallmyr

Nbi

N2000



Tallbevuxen högmosse. Träskiktet är inte så gammalt och mängden död ved är inte så hög. Området präglas ändå av orördhet och har inte påverkats av skogsbruksåtgärder i sen tid.

Inventerare DG

207 klass 3 207 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Lövängsrest

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ 9070



Trädklädd betesmark med tydliga spår efter tidigare lövängsbruk i form av hamlade lindar som växer på rösen. Området ligger på inägomark och har troligen mycket lång kontinuitet som trädbevuxen jordbruksmark. Området utgörs av ett registrerat objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsen.

Fällmossa	S, T	
Klippfrullania	S, T	

Inventare DG

208 klass2 1,6 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Lövängsrest

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ 9070



Trädmiljöer som idag utgörs av åkerholmar och åkerkanter med välutvecklade bryn. I området finns spår efter tidigare lövängsbruk i form av hamlade träd. Även grov alm, lönn och bok. finns i området. Det är på dessa träd som de flesta naturvårdsarterna förekommer. Området utgörs av ett registrerat objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsen.

Fällmossa	S, T	
Guldlockmossa	S, T	
Lönnlav	S, T	
Trädporella	S, T	

Inventerare DG

209 klass 3 1,6 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Lövängsrest

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ 9070



Trädklädd betesmark som domineras av ek. Inga naturvårdsarter är funna i objektet men ekarna är delvis senvuxna och gamla. Enstaka avenbokar björkar och hasselbuketter förekommer i beståndet. Området ligger på inägomark och har troligen mycket lång kontinuitet som trädbevuxen jordbruksmark.

Inventerare DG

210 klass 3 1,3 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: Lövängsrest

N2000:



Ekdominerad skog med tydliga spår efter tidigare lövängsbruk i form av hamlade lindar. I området finns rikligt med rösen och åkerterrasser. Området utgörs av ett registrerat objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsen.

Lömsk flugsvamp	S	
Rostfläck	S, T	

Inventerare DG

211 klass 3 0,9 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: Lövängsrest

N2000:



Varierat skogsområde med tydliga spår efter tidigare lövängsbruk i form av hamlade lindar i den norra delen. I området i övrigt är naturvärdena knutna till gammal bok och senvuxen ek. Det finns rikligt med grov bokved. En liten del av området utgörs av ett registrerat objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsen.

barkkornlav	S, T	
klippfrullania	S, T	
trädporella	S, T	

Inventerare DG

212 klass 3 7,1 ha

Blandlövchage av ek-lindtyp

Nbi: Lövängsrest

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ 9070



Trädklädd betesmark med tydliga spår efter tidigare lövängsbruk i form av flera hamlade lindar. Området utgör en stor del av ett mosaikartat betesmarksområde runt byn Lindhult. Mot öppen betesmark finns välutvecklade bryn med gammal hassel, apel, hägg och slån. Spritt i området finns solitära lindar och ekar med grova grenar. Området ligger på inägomark och har troligen mycket lång kontinuitet som trädbevuxen jordbruksmark. Området utgörs av ett registrerat objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsen.

Blomskägglav	S, T	
Fällmossa	S, T	
kantarellmussling	S	
klippfrullania	S, T	
lönnlav	S, T	

Inventerare DG

213 klass 2 0,6 ha

Blandlövshage av ask-almtyp

Nbi: löväng

N 2000: Lövängar av fennoskandisk typ, 6530



Ett område närmast gården med hamlade askar i betesmarken. Askarna är kontinuerligt hamlade och området betas. De hamlade träden är troligen mycket gamla och hyser några typiska naturvårdsarter.

Bårdlav	S, T	
Dvärgtuffs	S	
Fällmossa	S, T	
Grynig filtlav	NT, S, T	
Lönnlav	S, T	

Inventerare DG

214 klass 3 14,4 ha

Ek- hassellund

Nbi: Ädellövskog

N2000:



Ett stort lövskogsområde som domineras av ek men med inslag av lind, lönn, avenbok och bok. I området finns rikligt med rösen och fossil åkermark men skogen är välsluten och har inte karaktär av hagmarksskog. Skogen är gallrad vid flera tillfällen och innehåller inte så mycket död ved eller mycket gamla träd.

Barkkornlav	S, T	
Blåsippa	S, T	
Fällmossa	S, T	
Storrams	S, T	

Inventerare DG

215 klass 4 2,0 ha

Ekhage

Nbi:

N2000

En hagmark som är tätt bevuxen med ekar och enstaka lindar och lönnar. Området saknar naturvårdsarter men strukturer som gamla träd, död ved, grova grenar och välhävdat bete gör att området hyser visst biotopvärde.

Inventerare DG

216 klass 3 5,3 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Lövängsrest

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ 9070



Trädklädd betesmark med tydliga spår efter tidigare lövängsbruk i form av flera hamlade lindar och lönnar. Området utgör ett mosaikartat betesmarksområde med omväxlande tätare dungar som domineras av ek och omväxlande av glesare trädgrupper med solitära träd. Området utgörs av ett registrerat objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsen.

Fällmossa	S, T	
Klippfrullania	S, T	

Inventerare DG

217 klass 4 0,3 ha

Klibbalkärr

Nbi:

N2000:



En liten alsumpskog i längst ned i en svacka. I Beståndet finns en mycket grov, ihålig al med hög sockel. Resten av trädskiktet utgörs av medelålders klibbal. Objektet har obetydligt artvärde men visst biotopvärde.

Inventerare DG

218 klass 3 0,1 ha

Hedbokskog

Nbi: Hedädelövsog

N2000: Bokskog av Fryle typ



En liten grupp gamla bokar med stamskador och rikligt med död ved. Området har tidigare betats av hästar som orsakat stamskadorna. Objektet ingår i ett större objekt med naturvärden där naturvärdena har förstörts på grund av allt för omfattande avverkning.

Fällmossa	S, T	
Rostfläck	S, T	

Inventare DG

219 klass 2 0,3 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: Lövängsrest

N2000:



Liten gårdsnära höjd bevuxen med gammal bok ek och lind. Spår av hamling finns på lind och ett par mycket gamla bokar växer i sluttningen. Vid en ek växer korallticka som indikerar att ek har lång kontinuitet på platsen. Området utgörs av ett registrerat objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsen.

Blåsippa	S, T	
Havstulpanlav	S, T	
Korallticka	NT, S	

Inventerare DG

220 klass 3 4,5 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Lövängsrest

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ 9070



Trädklädd betesmark med tydliga spår efter tidigare lövängsbruk i form av flera hamlade lindar. Området utgör ett mosaikartat betesmarksområde med omväxlande tätare dungar och glesare trädgrupper med solitära träd. Trädsiktet domineras av ek men med ett stort inslag av lind, lönn, bok, fågelbär, björk och al. I objektet växer ett par gamla hagmarksgranar med grova grenar ner till marken. På grenarna finns gnagspår av skalbaggen Grönhjon. Området utgörs av ett registrerat objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsen.

Fällmossa	S, T	
Grönhjon	NT	
Guldlockmossa	S, T	

Inventerare DG

221 klass 2 1,0 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: Lövängsrest

N2000:



Litet skogsparti som domineras av ek och bok. Området har nyligen glesats ut genom naturvårdsgallring där huvudsakligen gran har avverkats. Naturvärdena i objektet är huvudsakligen knutna till senvuxna äldre ekar, på vilka de flesta naturvårdsarterna hittas. Området utgörs av ett registrerat objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsen.

Barkkornlav	S, T	
Fällmossa	S, T	
Grynig lundlav	T	
Guldlockmossa	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Oxtungsvamp	NT, S	
Rostfläck	S, T	
Tvåfläckig praktbagge	S	

Inventerare DG

222 klass 3 0,4 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: Lövängsrest

N2000:



Litet område med några gamla knotiga lindar och ekar med hamlingsspår. Området har glesats ut vid naturvårdshuggning nyligen. Mellan de gamla träden är ett kraftigt uppslag av lövsly. I området ingår ett registrerat objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsen.

Rostfläck	S, T	
-----------	------	--

Inventerare DG

223 klass 3 0,7 ha

Hedekskog

Nbi: Hedädellövsog

N2000: Äldre ekskogar på sura, sandiga marker, 9190



Ekskog på mager mark där många av ekarna är senvuxna och hyser typiska naturvårdsarter. I beståndet växer även gammal asp och kraftig inväxning av ung gran. I beståndet finns död ved som både lågor och högstubbar.

Barkkornlav	S, T	
Grynig lundlav	T	
Havstulpanlav	S, T	
Klippfrullania	S, T	

Inventerare DG

224 klass 3 0,8 ha

Barrblandskog

Nbi: Barrskog



Ett litet barrskogsområde som i öster övergår i sumpskog med stor inblandning av klibbal. Området sträcker sig utmed ett dike som påverkar hydrologin i objektet. I objektet finns rikligt med lågor och gamla träd. Spår av grönhjon finns på grova grangrenar.

Blåmossa	S, T	Habitatdirektivet bilaga 5
Grönhjon	NT	
Stor revmossa	S	

Inventerare DG

225 klass 3 0,5 ha

Ekhage

Nbi: Hagmark

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ, 9070

Liten betesmark med äldre ek. Död ved finns i form av lågor och ett par torrträd av ek.



Barkkornlav	S, T	
Fällmossa	S, T	
Tvåfläckig praktbagge	S	

Inventerare DG

226 klass 3 6,4 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Lövängsrest

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ 9070



Trädklädd betesmark med tydliga spår efter tidigare lövängsbruk i form av flera hamlade lindar. Området utgör ett mosaikartat betesmarksområde i norra delen av byn Östanböke. Stor del av området utgörs av bok- och ekskog som betas av nötkreatur. I södra delen och i beståndskanter finns grova, spärrgreniga ekar och lindar. Odlingsrösen finns i hela området. Objektet är inte så artrikt men utgör i sin helhet en värdefull miljö med lång trädkontinuitet.

Barkkornlav	S, T	
Fällmossa	S, T	
Klippfrullania	S, T	

Inventerare DG

227 klass 3 4,0 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Lövängsrest

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ 9070



Trädklädd betesmark med tydliga spår efter tidigare lövängsbruk i form av flera hamlade lindar och askar. Området utgör ett mosaikartat betesmarksområde i södra delen av byn Östanböke. Området utgörs av omväxlande täta dungar av ek, lönn, ask, bok och lind och omväxlande av fristående träd. Hela området betas av nötkreatur. Objektet är inte så artrikt men utgör i sin helhet en värdefull miljö med lång trädkontinuitet.

Fällmossa	S, T	
Gulfotshätta	S	
Klippfrullania	S, T	

Inventerare DG

228 klass 2 26,7 ha

Barrblandskog /Tallmyr

Nbi: Barrnaturskog /Tallsumpskog

N 2000: Västlig Taiga, 9010 Skogsbevuxen myr 91D0



Stort myrmosaikområde med gammal granskog på frisk mark och senvuxen tall på fuktig mark. I några näringsrikare, fuktiga stråk finns sumpskog med stort inslag av björk och klibbal. Enstaka stubbar efter upparbetade, vindfällda granar finns i området. Annars verkar området vara helt orört i sen tid. Flera granar i området är omkring 200 år. Vid inventeringstillfället observerades flera tjädrar. I objektet finns rikligt med död ved i olika stadier, både stående och liggande.

Brandticka	S	
Brunpudrad nållav	S, T	
Grönhjon	NT	
Kortskaftad ärgspik	NT	
Tjäder	T	Fågeldirektivet bilaga 1, 2

Inventerare DG

229 klass 4 6,2 ha

Barrblandskog

Nbi:

N2000:



En barrblandskog som nyligen har plockhuggits med avverkningsmaskiner. Skogen har stor diameter- och åldersspridning på granarna och har säkerligen brukats genom plockhuggning under mycket lång tid. Inga naturvårdsarter är funna i objektet. Skogens struktur och förmodad skogskontinuitet i anslutning till andra naturvärdesobjekt gör att området har visst biotopvärde.

Inventerare DG

230 klass 2 41,8 ha

Barrblandskog /Tallmyr

Nbi: Barrnaturskog /Tallsumpskog

N 2000: Västlig Taiga, 9010 Skogsbevuxen myr 91D0



Stort myrmosaikområde med gammal gran och tallskog på frisk mark och senvuxen tall på fuktig mark. I några näringsrikare, fuktiga stråk finns sumpskog med stort inslag av björk och klibbal. Området har tydlig naturskogsprägel och verkar vara helt opåverkat av skogsbruksåtgärder i sen tid. Flera granar i området är omkring 200 år. I objektet finns rikligt med död ved i olika stadier, både stående och liggande. Flera naturvårdsarter som är beroende av gammal barrskog finns i området.

Blåmossa	S, T	Habitatdirektivet bilaga 5
Brandticka	S	
Bronshjon	S, T	
Gransotdyna	NT	
Grönhjon	NT	
Stor revmossa	S	
Thomsons trägnagare	S	
Tjäder	T	Fågeldirektivet bilaga 1, 2

Inventerare DG

231 klass 4 1,1 ha

Barrblandskog

Nbi:

N2000:

En barrblandskog som har brukats genom plockhuggning. Skogen har stor diameter- och åldersspridning på granarna och har säkerligen brukats genom plockhuggning under mycket lång tid. Inga naturvårdsarter är funna i objektet. Skogens struktur och förmodad skogskontinuitet i anslutning till andra naturvärdesobjekt gör att området har visst biotopvärde.

232 klass 3 5,0 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Lövängsrest

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ 9070



Trädklädd betesmark med tydliga spår efter tidigare lövängsbruk i form av flera hamlade askar och någon lind. Området utgör ett mosaikartat betesmarksområde Kring gården i Toalycke. Området utgörs av omväxlande täta dungar av ek, lönn, ask, bok och lind och omväxlande av fristående träd. I östra delen finns en grupp mycket gamla hamlade askar. Hela området betas av nötkreatur. Objektet är inte så artrikt men utgör i sin helhet en värdefull miljö med lång trädkontinuitet.

Fällmossa	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Rostfläck	S, T	

Inventerare DG

233 klass 1 8,7 ha

Barrblandskog

Nbi: Barrnaturskog

N 2000: Västlig Taiga, 9010



Stort barrskogsområde med gammal gran och tall. Området varierar från frisk mark till mindre partier med blöt mark och omfattar både högstammig granskog och lågvuxen sumpskog. Området har tydlig naturskogsprägel och verkar vara helt opåverkat av skogsbruksåtgärder i sen tid. Flera granar i området är omkring 200 år. I objektet finns rikligt med död ved i olika stadier, både stående och liggande. Flera naturvårdsarter som är beroende av gammal barrskog finns i området. Några av dem har mycket få förekomster i Skåne

Blåmossa	S, T	Habitatdirektivet bilaga 5
Brandticka	S	
dropptaggsvamp	S, T	
Gropticka	NT, S, T	
Grovticka	S, T	
Grönhjon	NT	
Kornig nållav	S, T	
Missne	S, T	
Stor revmossa	S	
Svart taggsvamp	NT, S, T	

Inventerare DG

234 klass 3 5,9 ha

Tallbevuxen myr

Nbi

N2000

Myrmarksområde i direkt anslutning till naturvärdesobjekt 233 som hyser höga naturvärden. Objektet utgörs av ogallrad tallskog och präglas av orördhet. Tallarna är senvuxna och självgallring har lett till rikligt med klen, död ved.

Blåmossa	S, T	Habitatdirektivet bilaga 5
Brandticka	S	

Inventerare DG

235 klass 4 5,5 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi:

N2000:



Gårdsnära betesmarksmiljöer med ekdominerade dungar och spridda solitärer av ek, lind, lönn, avenbok och ask. Östra delen gränsar till ett klibbalkärr vid sjön.

Grönhjon	NT	
----------	----	--

Inventerare DG

236 klass 3 2,8 ha

Gransumpskog

Nbi: Gransumpskog

N2000



Blandad sumpskog där gran dominerar men med ett stort inslag av tall, björk och klibbal. Biotopen är tydligt avgränsad och följer ett fuktstråk genom granskogen och har flera partier med öppna vattenspeglar. Stora kuddar med blåmossa finns, i övrigt saknas naturvårdsarter.

Blåmossa	S, T	Habitatdirektivet bilaga 5
----------	------	----------------------------

Inventerare DG

237 klass 2 19,3 ha

Blandlövchage av ek-lindtyp, lgenväxt äng/hagmark av ask-almtyp

Nbi: Lövängsrest

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ 9070



Ett stort mosaikartat betesmarksområde i byn Åbrolla. Vissa delar är inte bete i dag men har tydliga strukturer efter tidigare bete eller slåtter. I området finns rikligt med hamlade träd. Både ask, alm och lind. I sydvästra delen finns resterna av en löväng med flera askar som hyser många naturvårdsarter bland annat Lunglav och almlav. Mot öppen betesmark finns välutvecklade bryn med gammal hassel, apel, hägg och slån. Området ligger på byns inägomark och har mycket lång kontinuitet som trädbevuxen gräsmark. En del av området är registrerat som nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsen. Resten utgörs av objekt med naturvärde.

Almlav	VU, S, T	
Barkkornlav	S, T	
Fällmossa	S, T	
Guldlockmossa	S, T	
Kantarellmussling	S	
Klippfrullania	S, T	
Lunglav	NT, S, T	
Lönnlav	S, T	
Platt fjädermossa	S, T	
Tibast	S	
Traslav	S	

Inventerare DG

238 Klass 4 0,3 ha

Nbi

N2000



Aspskog som utgör första generationen asp i en långt gången igenväxningsuccession. Asparna är grova och flera av dem är ihåliga. Förutom asp växer gran i beståndet. Granarna kommer på sikt ta över dominansen om inte asparna gynnas genom avverkningar. Det finns inga naturvårdsarter i objektet men de gamla asparna och den döda veden som är knuten till dem utgör visst biotopvärde.

Inventerare DG

239 klass 4 1,7 ha

Hedbokkog

Nbi:

N2000:



Ett litet bokskogsområde på mager mark som nyligen har gallrats. I objektet finns inga naturvårdsarter. Trots den nyligen genomförda gallringen finns några värdefulla strukturer kvar. Exempelvis senvuxna träd flerstammiga bokar, bokar med håligheter och gamla träd.

Inventerare DG

240 klass 2 2,8 ha

Boskog av lågörttyp

Nbi: Sekundär ädellövnaturskog

N2000: Boskog av örtrik typ, 9130



Boskog med stort inslag av gamla träd och rikligt med död ved. I objektet växer även grov lönn, alm och ask. Objektet utgörs av en gårdsnära miljö med spår av ängs- och åkerbruk i form av hamlade träd och åkerterasser. Stor del av området ligger i en brant sluttning och har troligen lång kontinuitet av bok även om det tidigare har varit en gles trädmiljö.

Bokkantlav	NT, S, T	
Bokvårtlav	NT, S, T	
Fällmossa	S, T	
Orangepudrad klotterlav	NT	
Storrams	S, T	
Traslav	S	

Inventerare DG

241 klass 3 3,4 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Lövängsrest

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ 9070

Trädklädd betesmark med tydliga spår efter tidigare lövängsbruk i form av hamlade lindar. Området utgör ett mosaikartat betesmarksområde med omväxlande tätare dungar som domineras av ek, med inslag av lönn och ask, och omväxlande av glesare trädgrupper med solitära träd. Området utgörs av ett registrerat objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsen.

Fällmossa	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Rostfläck	S, T	

Inventerare DG

242 klass 4 0,6 ha

Sekundär lövskog

Nbi:

N200:

Blandlövskog med ask, lönn, avenbok, asp, ek och hassel. Området utgörs av gårdsnära mark som tidigare varit öppen mark med enstaka äldre träd. I dag är miljön i en värdefull successionsfas där döda askar bidrar med stora mängder död ved. I området växer Strutbräken som troligen har spritt sig från odling på angränsande tomtmark. I övrigt finns här inga naturvårdsarter men mängden död ved och trädslagsblandning gör att området har visst biotopvärde.

Inventerare DG

243 klass 3 2,4 ha

Hedbokskog

Nbi: Hedädellövskog

N2000: Bokskog av Fryle typ



Ett litet bokskogsområde med gamla bokar där flera är flerstammiga och bukettformade. Många av träden har håligheter och det finns rikligt med död ved. I objektet finns mycket få spår efter sentida skogsbruksåtgärder. Objektet har påtagliga biotopvärden men få fynd av naturvårdsarter.

Lönnlav	S, T	
---------	------	--

Inventerare DG

244 klass 2 2,6 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Lövängsrest

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ 9070

Trädklädd betesmark med tydliga spår efter tidigare lövängsbruk i form av hamlade lindar. Området utgör ett mosaikartat betesmarksområde med omväxlande tätare dungar som domineras av ek och omväxlande av glesare trädgrupper med solitära träd. Området utgörs av en nyckelbiotop och ett registrerat objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsen.

Fällmossa	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Lunglav	NT, S, T	

Inventerare DG

245 klass 3 2,2 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Lövängsrest

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ 9070

Trädklädd betesmark med tydliga spår efter tidigare lövängsbruk i form av hamlade lindar. Området utgör ett mosaikartat betesmarksområde med omväxlande tätare dungar, som domineras av ek och björk, samt omväxlande av glesare trädgrupper med solitära träd. Området utgörs av ett registrerat objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsen.

Fällmossa	S, T	
Klippfrullania	S, T	

Inventerare DG

246 klass 2 1,5 ha

Barrblandskog

Nbi: Barrskog

Ett litet barrskogsområde i kanten på ett större tallmyrsområde. Området är i det närmaste opåverkat av sentida skogsbruksåtgärder. I objektet finns rikligt med lågor och gamla träd. Området är registrerat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen

Blåmossa	S, T	Habitatdirektivet bilaga 5
Brunpudrad nållav	S, T	

Inventerare DG

247 klass 3 7,5 ha

Tallmyr


Nbi: Tallsumpskog

N2000: Skogbevuxen myr


Tallbevuxen högmosse som i de centrala delarna har ett öppet mosseplan. Tallarna är senvuxna och gamla även om de inte är särskilt grova. Området präglas av orördhet och har inte påverkats av skogsbruksåtgärder i sen tid. Området korsas av en bilväg som har påverkat mossens hydrologi.

Inventerare DG

Beskrivningar av objekt i delområde 3.



Karta 1.Översiktskarta över delområdet



Karta 2. Objektskarta över norra delen.



Karta 3. Objektskarta över södra delen.

301 klass 4 0,7 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi

N2000

Ridå mellan sjö och öppen mark som utgörs av en blandskog med ek, asp, björk, hassel och apel. Området har troligen ingått i betesmarken och varit en glesare trädmiljö. Idag sitter naturvärdena i äldre, grova aspar och ekar med håligheter och mulm

Inventerare MN

302 Klass 3 5,7 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: Lövskogslund

N2000:

Varierande skogsområde där bok dominerar i öster och ek i väster. Hela området har tidigare brukats som ängs- och betesmark. Lind som växer på odlingsrösen finns i hela området. Död ved finns som lågor, torrträd och grova högstubbar.

Blomskägglav	S, T	
Fällmossa	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Lunglav	NT, S, T	

Inventerare: MN

303 klass 4 0,7 ha

Ekhage

Nbi

N2000

Liten ekhagmark med spärrgreniga grova ekar och inslag av rönn. Död ved finns som några torrträd av ek.

304 klass 3 2,2 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi Lövskogslund

N2000:

Ekdominerad hagmarksskog med inslag av bok, lind, hassel och avenbok. I området finns flera gamla kulturspår i form av odlingsrösen, insprängda småtegar, enstaka tidigare hamlade träd och träd med bukettformigt växtsätt. Flera träd har savflöden, håligheter och mulm. Buskskiktet utgörs främst av hassel och enbuskar.

Fällmossa	S, T	
Havstulpanlav	S, T	

Inventerare: MN

305 klass2 0,6 ha

Bokskog av ristyp

Nbi Hedädellövs-kog

N200: Bokskog av fryle-typ, 9110

Fin bokskogshöjd, med inslag av ek, men även lind, tall, björk och gran. Objektet innehåller Flera grova gamla bokar, flera med håligheter, bohål och mulm.

Bokkantlav	NT, S, T	
Havstulpanlav	S, T	

Inventerare MN

306 klass 2 2,0 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: Lövs-kogslund

N2000:



En varierad ädellövs-kog i nordsluttning med många grova träd av olika trädslag. I området finns flera, tidigare, hamlade lindar som i de flesta fall växer på rösen. I övrigt växer även ek, lönn, avenbok, björk, rönn, gran, tall, sälg, klibbal och hassel i beståndet. Naturvärdena i området är knutna till de gamla träden som i många fall är grova, flerstammiga, ihåliga och med mulm.

Större träkfjäril	S	
-------------------	---	--

Inventerare MN

307 klass3 0,7 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: Lövskogslund

N2000:



Liten gårdsnära skogsmiljö som historiskt har brukats som löväng vilket syns idag på flera gamla hamlade lindar. Idag är området varierat med inslag av bok, ek, lönn, och lind. Naturvärdena i området är knutet till de äldsta träden. Vilka är grova, flerstammiga, ihåliga och i flera fall hamlade.

Guldlockmossa	S, T	
Platt fjädermossa	S, T	

Inventerare MN

308 klass 2 13,4 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp, Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Lövskogslund

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ, 9070



Stort mosaikartat betesmarksområde med tätare skogsmiljöer som varvas med mer öppen betesmark som innehåller många fina hagmarksträd av ek, lind, bok och avenbok. Trädskiktet varierar i området och utgörs av bland annat avenbok, ek, bok, lönn, lind, björk, klibbal och hassel. I området finns rikligt med död ved i form av lågor, högstubbar och stamskador på levande träd. I kanterna mot öppen betesmark har artrika och varierade brynmiljöer bildats. I området finns många gamla, grova hamlade lindar som i flera fall innehåller håligheter, död ved och mulm. Området varierar ganska mycket i sin struktur. I södra delen som inte är betad i dag utgörs området av tätare skogsmiljöer. I södra delen finns även lite fuktigare stråk med klibbal och björk.

Fällmossa	S, T		
-----------	------	--	--

Inventerare MN

309 klass 4 0,3 ha

Hedbokskog

Nbi:

N2000:



Gallrad bokskog med enstaka högstubbar. Skogen består av grova bokar. Några med savflöden och bohål. De naturvårdsarter som finns i beståndet växer på ek och hassel.

Barkkornlav	S, T	
Klippfrullania	S, T	

Inventerare DG

311 Klass 3 0,4 ha

Bokskog av lågörttyp

Nbi: Ädellövskog

N2000: Bokskog av örtrik typ



Liten gårdsnära bokbacke som ingår i betesmarken och har påverkats av hästbete. Träden är gamla och har flera stamskador efter bete vilket orsakat savflöden och död ved och håligheter. En bok har brutits sönder och bildar död ved.

Barkkornlav	S, T	
Bokborre	Ö	

Inventerare DG

312 klass 2 0,6 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp, Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Lövängsrest

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ 9070



Området utgörs av ett långsträckt betesmarksområde som till största delen är välhävdad betesmark som är rikt bevuxen av många hamlade träd och andra värdefulla naturvårdsträd av ek, lind, lönn, ask, och avenbok. Många av de äldsta träden växer i rösen. I området sker både kontinuerlig skötsel av gamla hamlade lindar och nyhamling av yngre träd. Några partier bildar tätare skogsmiljöer där mängden död ved är högre och markfloran är mer lundartad. Området ligger på bördig inägomark och har troligen mycket lång kontinuitet som trädbevuxen äng och betesmark. Området utgörs av ett registrerat objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsen.

Barkkornlav	S, T	
Blåsippa	S, T	
Fällmossa	S, T	
Grynig filtlav	NT, S, T	
Guldlockmossa	S, T	
Klippfrullania	S, T	
korallticka	NT, S	
Lundstarr	T	
Lömskflugsvamp	S	
Lönnlav	S, T	
Rostfläck	S, T	
Vedtrattskivling	S	

Inventerare DG

313 klass 4 0,6 ha

Bokskog av lågörttyp

Nbi: Ädellövskog

N2000:



Liten gårdsnära bokbacke med inslag av ek. Området har gallrats i sen tid men innehåller några naturvårdsträd med håligheter och savflöden. Objektet hyser inga naturvårdsarter men har visst biotopvärde.

Inventerare DG

314 klass 2 2,7 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp, Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Lövängsrest

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ 9070



Gårdsnära lövskog med ek, lönn, lind, sälg och ask. I objektet finns tydliga spår från tidigare markanvändning. Det finns många rösen, tydliga åkerterrasser, flera hamlade lindar och askar. Området i södra delen, närmst vägen utgör fortfarande öppen betesmark med hasselrika bryn medan den norra och västra delen är välsluten lövskog.

Barkkornlav	S, T	
Bårdlav	S, T	
Fällmossa	S, T	
Guldlockmossa	S, T	
Lönnlav	S, T	

Inventare DG

315 klass 2 1,7 ha

Blandsumpskog

Nbi: Blandsumpskog

N2000: Lövsumpskogar av fennoskandisk typ, 9080



Blandsumpskog huvudsakligen bevuxen med klibbal, björk och gran men i norra delen är inslaget av ask, ek, hassel och rönn stort. Området är påverkat av källflöden men inga öppna vattenspeglar. Det finns rikligt med död ved av samtliga trädslag. Omgivande skog utgörs av granföryngring med tät lövslyvegetation. Delar av området är registrerat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.

Gullpudra	S, T	
Missne	S, T	
Småvänderot	VU	
Stor revmossa	S	
Stor sotdyna	NT	
Stubbspretmossa	S, T	

Inventerare DG

316 klass 3 3,1 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp, bokskog av lågörttyp

Nbi Lövängsrest

N2000:



Lövskogsområde som i norra delen har tydliga spår av lövängsbruk med hamlade träd i sluttningar runt åkerterrass. I södra delen övergår området i örtfattig bokskog med inslag av ek. Enstaka grova bokar och bokhögstubbar finns i objektet. Norra delen av området är registrerat som objekt med naturvärde enligt Skogsstyrelsen.

Fällmossa	S, T	
Korallticka	NT, S	
Plattfjädermossa	S, T	
Rostfläck	S, T	
Traslav	S	

Inventerare DG

317 klass 2 0,5 ha

Klibbalkärr

Nbi: Alsumpskog

N2000:



Glest alkärr i botten av terrängsvacka. De flesta alarna är kläna men gamla och senvuxna. Flera av alarna har tydliga socklar. I området växer även senvuxna ekar och kläna granar. Små vattenspeglar bildas tidvis i kärret.

Blåmossa	S, T	Habitatdirektivet bilaga 5
Grynig lundlav	T	
Småvänderot	VU	
Stor revmossa	S	

Inventerare DG

318 klass 1 3,5 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp, bokskog av lågörttyp

Nbi Lövskogslund



Blandad ädellövskog som domineras av bok, avenbok och ek men med stort inslag av lind samt enstaka lönn. Flera mindre tidigare odlingslyckor finns i området. En äldre brukningsväg har sin sträckning genom biotopen. Det finns rikligt med död ved och träd med savflöden och håligheter.

Barkkornlav	S, T	
Bokkantlav	NT, S, T	
bokvårtlav	NT, S, T	
Dvärgbägarlav	NT, S, T	
fällmossa	S, T	
Grynig lundlav	T	
klippfrullania	S, T	
Savlundlav	EN	
Sydlig sotticka	NT	
Tvåfläckig praktbagge	S	

Inventerare DG

319 klass 4 2,3 ha

Boskogs av lågörttyp

Nbi

N2000



Boskogsområde med visst biotopvärde bestående grov död ved, bokhögstubbar, inslag av lindbuketter på rösen, träd med håligheter. Området är till stor del gallrat och har obetydligt artvärde. Liten del av området är registrerat som objekt med naturvärde av Skogsstyrelsen.

Rostfläck	S, T	
-----------	------	--

Inventerare DG

320 klass 4 0,7 ha

Sekundär lövskog

Nbi:

N2000:



Blandlövskog med ask, lönn, lind, bok, avenbok i buketter och enstaka grövre ekar. Området utgörs av gårdsnära mark som tidigare varit öppen mark med enstaka äldre träd, däribland en gammal hamlad lind. I dag är miljön i en värdefull successionsfas där döda askar bidrar med stora mängder död ved. Inga naturvårdsarter är påträffade här men mängden död ved och trädslagsblandning gör att området har visst biotopvärde.

Inventerare DG

321 klass 4 2,4 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi Lövskogslund

N2000:



Blandad ädellövskog som domineras av bok och ek området har nyligen gallrats. Gallringen har inneburit att förutsättningarna för naturvärdena i området försämrats. De naturvårdsarter som är funna i området växte på nyligen döda träd eller på stubbar av nyligen avvercade träd. Genom att titta på stubbarna kan man konstatera att många naturvärdesträd är avvercade. Visst biotopvärde finns kvar i form av senvuxna träd, död ved, träd med savflöden och håligheter. Området är registrerat som objekt med naturvärde av Skogsstyrelsen.

Fällmossa	S, T	
havstulpanlav	S, T	
Klippfrullania	S, T	

Inventerare DG

322 klass 3 0,6 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi Lövängsrest

N2000:



Litet Ädellövskogsområde med hamlade lindar och lönnar på rösen. I beståndet finns några senvuxna ekar. Spåren efter lövängsbruk är tydligt även om det var länge sedan området hävdades.

Fällmossa	S, T	
-----------	------	--

Inventerare DG

323 klass 2 0,3 ha

Igenväxt äng/hagmark av ask-almtyp

Nbi: Lövängsrest

N2000:



En grupp hamlade askar och lönnar vid en övergiven gårdsmiljö. Träden är grova och hamlade sedan mycket lång tid tillbaka. Askarna är drabbade av askskottsjuka och riskerar att dö inom ett par år.

Dvärgtuffs	S	
Fällmossa	S, T	
Grynig filtlav	NT, S, T	
Guldlockmossa	S, T	
Tibast	S	
Traslav	S	

Inventerare DG

324 klass 3 3,5 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: Ädellövskog

N2000:



Lövskogsområde i anslutning till inägomarken med enstaka hamlade lindar och askar. Bukettformiga lindar på rösen finns på flera ställen. I östra delen Dominerar bok med inslag av ek, lind och asp. I den västra delen dominerar ek med stort inslag av lind. I brynen mot åkermark växer senvuxna aspar med gnagspår av den rödlistade fjärilen mindre poppelglasvinge.

Barkkornlav	S, T	
Falsk rättikhätta	S	
Fällmossa	S, T	
Mindre poppelglasvinge	NT	
Rostfläck	S, T	

Inventerare DG

325 klass 2 1,6 ha

Hedbokskog

Nbi: sekundär ädellövnaturskog

Bokskog av fryle-typ



Sluttning med gammal bokskog som helt saknar spår efter skogsbruksåtgärder i sen tid. Området har högt biotopvärde och innehåller mycket död ved och många bokar som är ihåliga, senvuxna, flerstammiga och grovgreniga. Ett flertal naturvårdsarter som är knutna till bokskog växer på stammarna. Området är registrerat som nyckelbiotop och skyddat som Biotopskyddsområde.

Bokfjädermossa	S, T	
Bokkantlav	NT, S, T	
Bokvårtlav	NT, S, T	
Gulnål	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Plattfjädermossa	S, T	
Savlundlav	EN	

Inventerare DG

326 klass 3 1,7 ha

Ek-bok-björkskog

Nbi:

N2000:

Blandskog med ek, bok, björk, asp, gran och tall. En varierad skogsmiljö som troligen har formats genom bete. I beståndet finns gammal asp och björk tillsammans med senvuxna ekar och bokar med stora kronor.

Barkkornlav	S, T	
Fällmossa	S, T	
Havstulpanlav	S, T	

Inventerare DG

327 klass 2 2,8 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: Ädellövskog

N2000:



Igenvuxet betesmarksområde som utgörs av varierande lövskog. Mot öppen mark finns välutvecklade bryn med slån och hassel. Ekar med grova grenar och lågt ansatt krona växer i öppna lägen. Enstaka hamlade lindar och askar finns i området. Delar av området är sedan länge sluten skog som hyser rikligt med död ved.

Barkkornlav	S, T	
Blek kraterlav	VU, T	
Blomskägglav	S, T	
Fällmossa	S, T	
Grönhjon	NT	
Guldlockmossa	S, T	
Kantarellmussling	S	
Svart askbastborre	NT	
Västlig rostticka	T	
Åderskölding	S	

Inventerare DG

328 klass 1 0,8 ha

Blandlövhage av ask-almtyp, Igenväxt äng/hagmark av ask-almtyp

Nbi: Löväng, Lövängsrest

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ



Gårdsnära område med flera hamlade askar som hyser en rik moss- och lavflora. Halva området består av hävdad betesmark med ca tio välhävda hamlade askar som alla visar tecken på angrepp av askskottsjuka. De hamlade träden som står i skuggigare läge i skogskanten verkar vara mer vitala. Objektet utgör en sällsynt biotoptyp som dessutom är mycket artrik.

Almlav	VU, S, T	
Fällmossa	S, T	
Grynig filtlav	NT, S, T	
Guldlockmossa	S, T	
Lönnlav	S, T	
Platt fjädermossa	S, T	
Svart askbastborre	NT	
Traslav	S	
Trädporrella	S, T	

Inventerare DG

329 klass 3 1,2 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Hagmark

N2000:



Dungar i betesmark och åkerholmar med grova, vidkroniga ekar och bokar. I solbelysta kanter växer servuxna aspar med gnagspår efter mindre poppelglasvinge.

Mindre poppelglasvinge	NT	
------------------------	----	--

Inventerare DG

330 klass 3 1,3 ha

Hedbokskog

Nbi: Ädellövskog

N2000:

Kvarstående gamla bokar i ett område med planterad gran. I området finns även yngre bok och inslag av ek och björk

Inventerare EAr

331 klass 2 4,8 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Hagmark

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ, 9070



Varierad betesmark med både öppna gräsytor och mer sluten skog. Området är till största delen välhävdat med bete och har rika brynmiljöer och fristående hagmarksträd av olika trädslag. I trädsiktet finns främst ek, bok, björk, asp, gran, lind och hassel, vilka alla hyser naturvårdsarter.

Barkkornlav	S, T	
Blomskägglav	S, T	
Bokborre	Ö	
Fällmossa	S, T	
Grönhjon	NT	
kantarellmussling	S	
Mindre poppelglasvinge	NT	
Rostfläck	S, T	
Rostticka	S, T	
Rävticka	S	
Sydlig sotticka	NT	

Inventerare DG

332 klass 1 1,0 ha

Hedbokskog

Nbi: Sekundär ädellövnaturskog

N2000: Bokskog av fryle-typ, 9110

Bokskog i brant nordsluttning med lodytor och blockbrant. Skogen innehåller många gamla bokar med flera naturvårdsarter knutna till gammal ädellövskog. Lunglav växer i objektet på både bok och på gamla lönnar.

Bårdlav	S, T	
Fällmossa	S, T	
Havstulpanlav	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Lunglav	NT, S, T	
Trädporcella	S, T	

Inventerare EAr

333 klass 3 0,6 ha

Hedbokskog

Nbi: Hedädellövskog

N2000:

Sluttning, mot fuktstråk, med senvuxen bok. I objektet växer även gamla tallar. Död ved finns som torrträd av tall.

Inventerare EAr

334 klass 4 0,3 ha

Blandsumpskog

Nbi

N2000

Litet sumpskogsparti som domineras av klibbal men med inslag av gran, björk och tall. Klibbalarna växer på tydliga socklar.

Inventerare EAr

335 klass 3 1,1 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Hagmark

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ,9070

Betad lövskog som domineras av ek med stort inslag av avenbok och hassel

Inventerare EAr

336 klass 4 12,1 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi:

N2000:

Ett stort lövskogsområde som ligger på den historiska inägomarken och har strukturer som vittnar om att området har varit ängs- och betesmark. Hela området har gallrats i olika omgångar och har i dag karaktär av produktionsbestånd av bok och ek, med mycket naturhänsyn i form av gamla, grova bokar med grova grenar, Flerstammiga bokar. Lindar med spår av hamling, gamla ekar med grova grenar, träd med savflöden och håligheter.

Inventerare EAr

337 klass 4 1,2 ha

Ekskog

Nbi:

N2000:

Ekskog med inslag av lönn och avenbok. Objektet är skött som ett produktionsbestånd men innehåller naturvårdsträd i form av ekar med hålighet och toppbrott.

Inventerare EAr

338 klass 2 0,7 ha

Blandädellövlund

Nbi: Lövskogslund

N2000:



Lövskogsmiljö på tidigare inägomark som i dag är bevuxen med grov ek, lönn och avenbok. I buskskiktet dominerar hassel. I området finns måttligt med död ved, träd med håligheter.

Grov baronmossa	S, T	
-----------------	------	--

Inventerare EAr

339 klass 4 2,5 ha

Boskog av lågörttyp

Nbi:

N2000:

Boskogs som gallrats för att utveckla produktionsbestånd. Objektet har visst biotopvärde på grund av stort inslag av lind, som främst växer på rösen.

Fällmossa	S, T	
-----------	------	--

Inventerare EAr

340 klass 4 0,2 ha

Klibbalsumpskog

Nbi

N2000

Litet sumpskogsparti som domineras av klibbal men med inslag av gran, björk och tall. Alarna växer på tydliga socklar. Det finns rikligt med död ved i området

Inventerare EAr

341 klass 3 3,6 ha

Blandlövchage av ek-lind typ

Nbi: Lövängsrest

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ, 9070



Trädklädd betesmark med tydliga spår efter tidigare lövängsbruk i form av hamlade lindar. Området utgör en mosaik av slutna och mer öppna miljöer. I trädskiktet växer ek, lind, ask, apel, sälg och rönn. Rester av almar finns som grov död ved. I kanterna mot den öppna marken finns välutvecklade bryn. Området ligger på inägomark och har troligen mycket lång kontinuitet som trädbevuxen jordbruksmark. Området utgörs av ett registrerat objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsen.

Fällmossa	S, T	
Trädporcella	S, T	

Inventerare EAr

342 klass 3 0,2 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: Lövängsrest

N2000:

Liten åkerholme med blandad lövskog som domineras av ek med inslag av lind och avenbok. I området finns spår av hamling på några av lindarna. I brynet ut mot den öppna betesmarken finns ekar med grova grenar. I beståndet finns måttligt med död ved.

Inventerare EAr

343 klass 3 0,1 ha

Kklibbalkärr

Nbi: Alsumpskog

N2000:



Ett litet alkärr med breda socklar och öppna vattenspeglar. Stammarna är klena men senvuxna. Storleken på socklarna indikerar lång kontinuitet på al även om stammarna inte är så gamla.

Bäckbräsa	S	
-----------	---	--

Inventerare EAr

344 klass 3 6,4 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Lövskogslund

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ, 9070

Hagmarksområde med omväxlande täta dungar och fristående hagmarksträd. Ek och lind dominerar trädskiktet. Några av lindarna är grova och hamlade sedan lång tid tillbaka. Blommande buskar bildar välutvecklade bryn mot de öppna partierna. Området har lång kontinuitet som trädbevuxen ängs- och betesmark.

Fällmossa	S, T	
klippfrullania	S, T	

Inventerare EAr

345 klass 3 2,4 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: Lövängsrest, Lövskogslund

N2000:

Lövskog med grov ek, avenbok och lind. Några av de grova träden har håligheter och savflöden. Flera av lindarna har spår av hamling, även nygjord hamling. Västra delen av området är utglesat för bete. Objektet har säkert lång trädkontinuitet men har tidigare utgjorts av en öppnare trädmiljö med bete och slätter.

Fällmossa	S, T	
Klippfrullania	S, T	

Inventerare EAr

347 klass 2 11,3 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp, Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Lövängsrest, Lövskogslund

N2000:



Stort mosaikartat lövskogsområde som innehåller många hamlade lindar och lindar med bukettformigt växtsätt. Många ekar är gamla och grova med lågt ansatt krona. I området finns både tätare partier och delar som är öppen betesmark med solitära träd och brynmiljöer. I objektet finns även rikligt med gammal hassel.

Fällmossa	S, T	
Grå skärelav	S, T	
Klippfrullania	S, T	

Inventerare EAr

348 klass 4 0,8 ha

Klibbalsumpskog

Nbi:

N2000:

Smal alsumpskog som sträcker sig utmed en liten bäck. Flera av alarna står på tydliga socklar och området hyser rikligt med död ved.

Bäckbräsa	S	
-----------	---	--

Inventerare EAr

349 klass 4 0,4 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi:

N2000

Trädklädd betesmark med grov bok, ek, avenbok och ihålig lind.

Rostfläck	S, T	
-----------	------	--

Inventerare EAr

350 klass 4 0,2 ha

Sekundär lövskog

Lövskogsområde med många olika trädslag och domineras av ek, bok, lind och björk. I buskskiktet finns en och grov hassel. Skogen är inte så gammal och växer på tidigare åkermark men strukturer som död ved diameterspridning och flerskiktning gör att det finns visst biotopvärde.

Inventerare EAr

351 klass 3 1,4 ha

Klibbalsumpskog

Nbi: Alsumpskog

N2000:

Långsträckt alsumpskog som sträcker sig utmed en liten bäck. Al dominerar men inslaget av klena, senvuxna granar är stort. Flera av alarna står på tydliga socklar och området hyser rikligt med död ved, både stående och liggande

Missne	S, T	
--------	------	--

Inventerare EAr

352 klass 3 0,8 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: Lövängsrest


N2000:

Lövängsrest med hamlade träd. I objektet finns flera hamlade lindar men även ek, asp, lönn och hassel.


Fällmossa	S, T	
-----------	------	--

Inventerare EAr


Beskrivningar av objekt i delområde 4.



Karta 1.Översiktskarta över delområdet



Karta 2. Objektskarta över nordvästra delen.



Karta 3. Objektskarta över nordöstra delen.



Karta 4. Objektskarta över södra delen.

401 klass 4 0,5 ha

Hedbokskog

Nbi

N2000



Ridå med grova gamla bokar och enstaka ekar, Biotopen utgör en brynmiljö mellan grandominerad skog med inslag av ek och bok och den öppna betesmarken. I objektet är inga naturvårdsarter observerade men visst biotopvärde finns i form av grova gamla bokar och ekar och sparsamt med död ved.

Inventerare DG

402 Klass 3 1,3 ha

Blandädellövlund

Nbi: Lövskogslund

N2000:



Gårdsnära trädmiljö med gammal lönn, bok, ek, avenbok och lind. I området finns resterna av en linbasta.

Blåsippa	S, T	
Fällmossa	S, T	
Guldlockmossa	S, T	

Inventare: DG

403 klass 4 5,0 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi:

N2000:

Stort ädellövskogsområde som till största delen består av bokskog med stort inslag av ek. I den södra delen är inslaget av ask större. Området har till stor del varit öppen betesmark och utgörs i dag av första generationen lövskog. Det finns stor variation i trädslag och ålder bland träden, rikligt med grova träd och måttligt med död ved.

Inventare: DG

404 klass 2 0,5 ha

Igenväxt äng/hagmark av ask-almtyp

Nbi Lövängsrest

N2000:

Lövängsrest som är helt igenvuxen av yngre träd och utgörs i dag av en lövskogslund med många olika trädslag och rikligt med död ved. I området finns ca tio hamlade grova askar som alla är döda eller sjuka.

Almlav	VU, S, T	
Fällmossa	S, T	
Tibast	S, T	

Inventare: DG

405 klass 1 0,6 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi Lövängsrest

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ, 9070



Betesmarksområde med flera hamlade träd. Hamlingsbruket är aktivt, och i området finns flera nyhamlade lindar. Hela området betas och har en öppen struktur med lite tätare trädmiljö närmast gården i norra delen. Förutom gamla lindar finns gamla träd av lönn, ek, avenbok, rönn och asp. På gamla aspar i västra kanten finns gnagspår efter den rödlistade fjärilen mindre poppelglasvinge. Flera hasselbuketter är mycket gamla och innehåller rikligt med död ved.

Blekt kraterlav	VU, T	
Fällmossa	S, T	
Guldlockmossa	S, T	
Kantarellmussling	S	
Lönnlav	S, T	
Mindre poppelglasvinge	NT	
Platt fjädermossa	S, T	
Trädporella	S, T	

Inventare: DG

406 klass 2 2,3 ha

Blandädellövlund

Nbi: Lövskogslund

N2000:



Ädellövs-skog med stor variation i trädslag och topografi. Det finns måttligt med död ved och några träd med bohål. Den västra delen utgörs av fuktig skog som domineras av klibbal och björk men med stort inslag av flera olika ädellövträdslag. Den östra delen utgörs av en sluttning med bokskog som har stort inslag av avenbok, lönn, ask, lind och ek. Objektet har tydlig grönstenspåverkan vilket bekräftas av rikliga förekomster av blåsippa och vårärt. Flera träd har tydliga spår efter hamling.

Blåsippa	S, T	
Fällmossa	S, T	
Guldlockmossa	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Lönnlav	S, T	
Platt fjädermossa	S, T	
Skuggmossa	v	
Traslav	S	
Trubbfjädermossa	S, T	
Trädporrella	S, T	
Vårärt	S, T	
Västlig husmossa	S, T	

Inventerare DG

407 klass 4 0,9 ha

Blandädellövskog

Nbi:

N2000:

Lövskog som utgörs av en rik trädslagsblandning med ek, ask, avenbok, björk, klibbal och rönn. Objektet är ogallrat i sen tid och hyser rikligt med död ved. Naturvårdssarterna är funna på ask.

Klippfrullania	S, T	
Trubbfjädermossa	S, T	

Inventerare DG

408 klass 2 1,9 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp, Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Lövängsrest

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ, 9070



Gårdsnära område med gamla och grova lindar, bokar, ekar och avenbok. Området ligger i direkt anslutning till betesmarken och har tidigare utgjorts av en öppen trädmiljö med hamlade träd. Flera av de äldsta träden är spärrgreniga eller flerstammiga.

Blåsippa	S, T		
Fällmossa	S, T		

Inventerare DG

409 Klass 4 0,6 ha

Blandlövhage av ek - lindtyp

Nbi:

N2000:



Liten gårdsnära betesmark som är bevuxen med grova ekar, bokar och äldre björk. Solbelysta bryn bildas av hassel och enbuskar.

Inventerare DG

410 klass 3 1,1 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp / Blandlövhage av asp-björktyp

Nbi: Lövängsrest

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ 9070



Litet betesmarksområde med dungar av lind, ask och ek. Där finns ett par gamla hamlade lindar i blockiga partier. Delar av området domineras av gammal björk och ek på torr, mager gräsmark. Här växer backsippa i en solexponerad sluttning.

Lönnlav	S, T	
Backsippa	VU, T	
Lindskål	S	

Inventerare DG

412 klass 3 1,7 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: Lövängsrest

N2000:



Gårdsnära lövskog med ek, lönn, lind, avenbok, sälg och ask. I objektet finns tydliga spår från tidigare markanvändning. Det finns många rösen och flera hamlade lindar. I området runt gården finns flera grova naturvärdesträd, både ek och ask. Områdets södra del är registrerat som objekt med naturvärde av Skogsstyrelsen.

Almlav	VU, S, T	
Guldlockmossa	S, T	
Gulnål	S, T	
Myskbock	S	
Rostfläck	S, T	
Rävticka	S	
Sotlav	S, T	

Inventerare DG

414 klass 4 2,0 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi:

N2000:



Ålderdomligt beteslandskap med grova avenbokar, bokar och ekar. Området ansluter till större, trädlösa betesmarksområden. Det är inte påträffat några naturvårdsarter i objektet.

Inventerare: DG

415 klass 3 0,4 ha

Blandlövchage av ek-lind typ

Nbi: Lövängsrest

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ



Betesmark med grova hamlade lindar, spärrgreniga ekar, grov lönn och avenbok. I åkerkanten växer gamla sälgar med gnagspår av myskbock. En mindre delen av området är registrerat som objekt med naturvärde enligt Skogsstyrelsen.

Dvärgbägarlav	NT, S, T	
Fällmossa	S, T	
Myskbock	S, T	

Inventerare DG

416 klass 4 1,3 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi:

N2000:

Ekhagmark med inslag ask, asp, björk, rönn, lönn. Området innehåller flera grova, spärrgreniga ekar men är kraftigt igenvuxen av yngre träd. Objektet innehåller inga naturvårdsarter men hyser vissa biotopvärden som är knutna till artrika bryn och grova träd.

Inventerare DG

417 klass 3 0,8 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Lövängsrest

N2000:



Välhävdat betesmark som är glest bevuxen med lönn, lind, bok, björk, enstaka granar och klibbal i fuktigare partier. Naturvärdena i objektet är knutna till gamla träd som växer i en öppen betesmark. I området finns tidigare hamlad lind.

Fällmossa	S, T	
Lönnlav	S, T	
Sotlav	S, T	

Inventerare DG

418 klass 3 6,7 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp, lgenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: Lövängsrest

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ

Trädklädd betesmark med tydliga spår efter tidigare lövängsbruk i form av hamlade lindar och lönnar. Området utgör en mosaik av slutna och mer öppna miljöer. I trädskiktet växer ek, lind, bok, ask, apel, sälg och klibbal. I kanterna mot den öppna marken finns välutvecklade bryn. Området ligger på inägomark och har troligen mycket lång kontinuitet som trädbevuxen jordbruksmark. Området utgörs av ett registrerat objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsen.

Fällmossa	S, T	
Barkkornlav	S, T	
Blåsippa	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Orangepudrad klotterlav	NT	
Platt fjädermossa	S, T	

Inventerare DG

420 klass 2 7,2 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp, lgenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi:Lövängsrest

N2000: Trädklädd betesmark av fennoskandisk typ, 9070



Östra delen av området utgörs av en trädklädd betesmark med tydliga spår efter tidigare lövängsbruk i form av flera hamlade lindar. Området utgör en mosaik av slutna och mer öppna miljöer. I trädsiktet växer ek, lind, lönn och avenbok. Västra delen av området utgörs av mer slutna skog som domineras av senvuxen ek i södra delen och avenbok i norra delen. Området ligger på inägomark och har troligen mycket lång kontinuitet som trädbevuxen jordbruksmark. Området utgörs av ett registrerat objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsen.

Barkkornlav	S, T	
Blåsippa	S, T	
Fällmossa	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Klosterlav	VU, T	
Lönnlav	S, T	
Plattfjädermossa	S, T	
Trubbfjädermossa	S, T	
Trädporcella	S, T	
Tvåfläckig praktbagge	S	

Inventerare DG

421 klass 2 0,4 ha

Hassellund

Nbi Hassellund

N2000:



Östvärd, blockig, sluttning med hassel. Trädsnittet domineras av björk och ek. Hasseln i objektet är inte så grov men är troligen mycket gammal. Området är tydligt påverkat av grönsten och i sluttningen växer rikligt med blåsippa och vispstarr. Naturvärdena i objektet är knutna till gammal hassel och blockig näringsrik mark i sluttning.

Blåsippa	S, T	
Fällmossa	S, T	
Kantarellmussling	S	
Rostticka	S, T	
Skogsbingel	T	
Vispstarr	T	
Västlig husmossa	v	

Inventerare DG

422 klass 3 0,5 ha

Hasselrik lövblandskog

Nbi Lövskogslund

N2000:



Hasselrik lövskog i blockig sluttning med ek, lönn, björk, klibbal och gran. Marken är påverkad av grönsten vilket indikeras av riklig förekomst av blåsippa. Skogen är opåverkad av skogsbruksåtgärder i sen tid och ger ett orört intryck.

Blåsippa	S, T	
Kantarellmussling	S	
Rostticka	S, T	

Inventerare DG

423 klass 4 0,4 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: Lövängsrest

N2000:



Fem hamlade lindar som växer i skogsbrynet viket utgörs av grova bokar och ekar. Inga naturvårdsarter hittades vid inventeringen men området har visst biotopvärde i de hamlade träden och de grova bokarna.

Inventerare: DG

424 klass 3 3,5 ha

Klibbalskog av översilningstyp

Nbi: Alsumpskog

N2000:



Alsumpskog som huvudsakligen breder ut sig omkring Gllimåns slingrande lopp. Skogen utgörs av ett flackt område som påverkar miljön med vattenståndsförändringar under året. Förutom klibbal växer här gammal ask, asp, björk och gran.

Blåmossa	S, T	Habitatdirektivet bilaga 5
Stor sotdyna	NT	

Inventerare DG

425 klass 3 0,7 ha

Ädellövskog

Nbi: Sekundär ädellövnaturskog, Lövängsrest

N2000:



Blockig sluttning mot väster med blandskog av bok, avenbok, lönn, gran, tall, björk, rönn och ask. Det finns enstaka hamlade askar och flerstammiga lönnar och avenbogar. Dessa indikerar att området brukats som löväng men det finns inga spår efter avverkning eller annan skötsel i sen tid. I området finns rikligt med död ved av olika slag

Blåmossa	S, T	Habitatdirektivet bilaga 5
Fällmossa	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Plattfjädermossa	S, T	

Inventerare DG

426

klass 2

1,38 ha

Boskog av lågörttyp

Nbi: Sekundär ädellövnaturskog

N2000:



Boskog i en brant, blockig sluttning mot nordväst. Förutom bok finns gammal avenbok, ek och enstaka gamla lindar med hamlingsspår. Skogen innehåller flera naturvårdsarter knutna till gammal ädellövskog. Det finns rikligt med död ved och grova träd med bohål.

Bokkantlav	NT, S, T	
Bokvårtlav	NT, S, T	
Havstulpanlav	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Platt fjädermossa	S, T	
Vispstarr	T	

Inventerare DG

427 klass 3 2,8 ha

Ek-bok-björkskog, Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi:

N2000:



Varierat blandskogsområde som domineras av bok och ek på frisk mark. På fuktig mark övergår skogen till aldominerad sumpskog. I delar av området finns rikligt med inväxande gran. I hela området finns rikligt med död ved och naturvärdesträd. Objektet saknar tecken på sentida skogsbruksåtgärder. En öppen kallkälla finns i norra delen

Bäckbräsma	S, T	
Småvänderot	VU	

Inventerare DG

429 klass 4 0,7 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi:

N2000:

Litet lövskogsparti som domineras av bok, ek och avenbok, I ett röse växer ett par lindar som tidigare har varit hamlade. De flesta träden är senvuxna och flera avenbogar växer i flerstammiga buketter. Objektet innehåller inga naturvårdsarter men hyser vissa biotopvärden i de gamla träden.

Inventerare DG

430 klass 4 0,7 ha

Klibbalskog av översilningstyp

Nbi:

N2000:



En liten alskog i sluttning utmed ett mindre bäckflöde, på småblockig mark. Flera av alarna har början till sockelbildning. I norra kanten av området växer gamla knotiga avenbokar och hassel.

Inventerare DG

431 klass 3 1,1 ha

Igenväxt äng/hagmark av lindtyp

Nbi: Lövängsrest

N2000:



Boskog med inslag av ek och hamlade lindar som ligger i anslutning till öppna betesmarker. Området betas till största delen och övergången från öppen mark till sluten skog är inte tydlig. Inga naturvårdsarter är funna, men området har påtagliga biotopvärden i mängden död ved, naturvårdsträd och solbelysta bryn.

Inventerare DG

432 klass 4 14,7 ha

Ekskog

Nbi:

N2000:



Stort ekskogsområde med grönstenspåverkad flora. Här växer rikligt med blåsippa, skogsbingel och murgröna. Området är nyligen gallrat men flera naturvärdesträd finns kvar i området. I fuktigare stråk växer klibbal

Blåsippa	S, T	
Brandticka	S	
Murgröna	S, T	
Skogsbingel	T	
Vispstarr	T	

Inventare: DG

433 klass 3 4,4 ha

Brantskog av ädellövrík typ

Nbi: Ädellövsog, Bergbrant

N2000:



Ekdominerad skog i branterna av Trollaberget. Förutom ek består trädskiktet hudsakligen av bok, lind, avenbok, björk, asp och rönn. Dessutom är inslaget av gran stort i norra delen. Hassel dominerar buskskiktet och floran är tydligt påverkad av grönsten med rikliga förekomster av blåsippa och skogsbingel. Området är påverkat av stenbrytning men har fortfarande kvar dramatiska block- och klippbranter mot väster.

Blåsippa	S, T	
Brandticka	S	
kantarellmussling	S	
Mindre poppelglasvinge	NT	
Murgröna	S, T	
Skogsbingel	T	
Vispstarr	T	

Inventerare DG

434

klass 3

7,6 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp, lgenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: lövängsrest

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ, 9070



Stort mosaikartat betesmarksområde med tätare bokdominerade skogsmiljöer som varvas med mer öppen betesmark som innehåller många fina hagmarksträd av ek, lind, lönn och ask.

Fällmossa	S, T	
Guldlockmossa	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Lönnlav	S, T	
Platt fjädermossa	S, T	

Inventerare DG

435 klass 3 0,7 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: Lövängsrest

N2000:



Ädellövskog intill den öppna betesmarken som består av ek, avenbok, bok och lind. Några av lindarna bär spår efter hamling. Marken är blockig och floran är tydligt påverkad av grönsten.

Barkkornlav	S, T	
Fällmossa	S, T	
Lundstarr	T	
Skogsbingel	T	
Vispstarr	T	

Inventerare DG

436 klass 3 2,0 ha

Blandsumpskog

Nbi

N2000



Sumpskogsparti som domineras av klibbal men med stort inslag av, björk och tall. En mindre bäck rinner genom området. Det finns rikligt med klen död ved på grund av självgallring.

Inventerare DG

437 klass 3 4,7 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp och av ask-almtyp

Nbi: Lövängsrest

N2000:



Varierat lövskogsområde i gårdsnära läge som domineras av ek, lind, ask och bok. Flera hamlade träd visar på markens tidigare brukande. Området har en bitvis rik lundflora med bland annat underviol, nässelklocka och blåsippa. Ett antal döda almar bidrar med grov död ved. Del av området har nyligen gallrats. I norra delen av objektet har tidigare stenbrytning orsakat stora stentippar.

Blåsippa	S, T	
Fällmossa	S, T	
Lindskål	S	
Rostfläck	S, T	
Skogsbingel	T	
Sydlig sotticka	NT	
Underviol	S, T	

Inventerare EAr

438 klass 2 1,3 ha

Blandädellövlund

Nbi: Ädellövskog

N2000:



Ädellövskogsområde med rik lundflora med exempelvis vårärt, blåsippa, skogsbingel och underviol. Delar av området har gallrats i sen tid. Trädsiktet domineras av ek, bok, avenbok, lönn och lind. Det finns flera äldre träd i området även om det huvudsakliga trädsiktet är yngre. Delar av området är påverkat av stenbrytning.

Blåsippa	S, T	
Fällmossa	S, T	
Lönnlav	S, T	
Platt fjädermossa	S, T	
Skogsbingel	T	
Trädporcella	S, T	
Underviol	S, T	
Vårärt	S, T	

Inventerare DG

439 klass 2 1,2 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp.

Nbi: Lövängsrest

N2000:

Litet skogsområde som domineras av äldre ek med inslag av asp, björk, avenbok samt ett par hamlade lindar som växer på rösen. I norra delen sträcker sig området upp på en höjd med berg i dagen och tunt jordtäckte. Här växer några tallar, enbuskar och senvuxna ekar.

Blåsippa	S, T	
Fjällsopp	S	
Klippfrullania	S, T	
Lönnlav	S, T	
Rostfläck	S, T	
Trädporella	S, T	
Vispstarr	T	

Inventerare DG

440 klass 2 3,5 ha

Bok- avenbok- ekskog

Nbi: Sekundär ädellövnaturskog

N2000:



Avenboksdominerad lövskog med stort inslag av bok ek och björk. Enstaka lindar med hamlingspår finns i området. Avenbokarna växer i buketter med kläna och senvuxna stammar. För några år sedan avverkades gran i området. I övrigt är området inte påverkat av sentida skogsbruk. Största delen av området är registrerat som objekt med naturvärde enligt skogsstyrelsen och är skyddat som biotopskyddsområde.

Blåsippa	S, T	
Grov fjädermossa	S, T	
Lindskål	S	
Platt fjädermossa	S, T	
Vispstarr	T	

Inventerare DG

441 klass 2 2,3 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi:Lövängsrest

N2000:



Betesmarksområde med flera hamlade, grova lindar och enstaka lönnar. Området har betats fram till nyligen och har en mosaikartad struktur med öppnare partier och tätare områden. Det finns rikligt med solbelysta bryn i området. Området är registrerat som objekt med naturvärde av Skogsstyrelsen.

Blåsippa	S, T	
Skogsbingel	T	
Trubbfjädermossa	S, T	
Trädporella	S, T	
Vårärt	S, T	


Inventerare EA

442 klass 1 11,1 ha

Blandädellövlund, blandlövhage av ek-lindtyp, Bokskog av högörttyp

Nbi Lövängsrest

N2000 Bokskog av örtrik typ. 9130, Ek-avenbokskog av buskstjärnblomma-typ, 9160





Romperödsberget är ett stort grönstensområde med mycket rik lundflora med bland annat gulsippa, tandrot, vårärt, vätteros, underviol och blåsippa. Hela området betas av nötkreatur. Orådet är mosaikartat och innehåller både mindre ytor med öppen betesmark och helt orörda brantområden där skogen är mycket gammal och har fått utvecklas fritt under många år. Men huvudsakligen består området av en gles ädellövskog som domineras av avenbok och ek men med stort inslag av bok, lind, lönn och ask. I området finns flera gamla hamlade lindar. Spår efter stenbrytning i området är tydliga i form av stora skrotstenstippar och vattenfyllda bergahålor. Hela området är registrerat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen och hyser mycket höga artvärden inom många olika organismgrupper. Platsen är sedan tidigare välinventerad och många fynd av naturvårdarter är registrerade utöver de som är noterade här.

Blåsippa	S, T	
Bokkantlav	NT, S, T	
Bokvårtlav	NT, S, T	
Brödmärgsticka	NT, T	
Cinnoberspindling	NT	
Druvfingersvamp	NT, S	
Fjällsopp	S	
Grov baronmossa	S, T	
Gulsippa	S, T	
Kortskaftad parasitpik	VU	
Lindskål	S	
Lunglav	NT, S, T	
Saffransspindling	NT	
Skogsbingel	T	
Svart trolldruva	S, T	
Tandrot	S, T	
Underviol	S, T	
Vårärt	S, T	
Väteros	S, T	

Inventerare DG

443 klass 3 3,6 ha

Blandlövhage av ek-lind typ

Nbi: Lövängsrest, Ädellövskogsmark

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ, 9070



Betade hagmarker runt gården Romperöd. Området är glestbevuxet med främst ek och ask men även lind, asp, björk och tall. I området finns rikligt med solbelysta bryn med hagtorn, slån, rosor, björnbär och hassel. Flera äldre hamlade askar finns i området. Området är registrerat som nyckelbiotop av skogsstyrelsen och hyser även många naturvårdsarter som inte noterats här.

Almlav	VU, S, T	
Blomskägglav	S, T	
Blåsippa	S, T	
Fällmossa	S, T	
Gulnål	S, T	
Korallticka	NT, S	
Mindre poppelglasvinge	NT	
Sotlav	S, T	
Svart askbastborre	NT	
Sydlig blekspik	NT, T	

Inventerare DG

444 klass 2 0,7 ha

Klibbalskog av översilningstyp

Nbi: Alsumpskog

N2000: Lövsumpskogar av fennoskandisk typ. 9080



Alsumpskog med ett bäckflöde som korsar området centralt. I beståndet finns rikligt med död ved. Det finns inga spår efter sentida skogsbruksåtgärder. Området har inte lång skoglig kontinuitet men har utvecklats så att området har påtagliga biotopvärden. Objektet är registrerat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.

Bäckbräsa	S, T	
Gullpudra	S, T	
Västlig husmossa	S, T	

Inventerare DG

445 klass 4 3,4 ha

Ekskog

Nbi:

N2000:

Ekskog som är gallrat för att utveckla ett produktionsbestånd. I Objektet finns rikligt med naturvärdesträd som hyser naturvårdsarter. Området hyser inte så mycket död ved.

Blomskägglav	S, T		
Barkkornlav	S, T		
Fällmossa	S, T		
Klippfrullania	S, T		

Inventerare DG

446 klass 3 0,9 ha

Barrsumpskog

Nbi: Barrsumpskog

N2000:



Liten svacka med sumpskog som domineras av senvuxen gran och tall. Objektet ligger omgiven av äldre flerskiktad barrblandskog. I objektet finns måttligt med klen död ved och enstaka naturvårdsarter som hör till miljön.

Kornknutmossa	S	
Stor revmossa	S, T	

Inventerare Dg

447 klass 2 4,5 ha

Lövsumpskog

Nbi: Lövsumpskog

N2000:

Sumpskog utmed bäckfårorna till Romperödsån. I norra delen bildar bäcken ett kvillområde med flera bäckfårar. Trädsiktet utgörs av ask, klibbal, björk, ek, rönn, gran och tall. Träden är till stor del senvuxna och står ofta i buketter eller på socklar. Mattor av bäckbräsma, missne och rankstarr breder ut sig i fältsiktet. Det finns rikligt med död ved och området ger ett orört intryck.

Bäckbräsma	S, T	
Fällmossa	S, T	
Guldlockmossa	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Kärrfibbla	S, T	
Missne	S, T	
Rostfläck	S, T	

Inventerare DG

448 klass 2 4,7 ha

Blandlövhage

Nbi: Hagmark

N2000:

Betesmarksområde runt en av gårdarna i Bosarp. Området är mycket varierat och består av både av öppna buskmarker och mer slutna trädmiljöer. Centralt i området finns en sandig höjd med gamla tallar. Södra delen är en mer eller mindre öppen hagmark, glest bevuxen med ek och ask. En bäck flyter genom området och kantas av al och ask. I hela området finns välutvecklade bryn av slån, hagtorn, rosor och hassel. I norra delen finns flera gamla fruktträd som troligen är rester av en gammal fruktträdgård. Hela området betas av nötkreatur.

Backsippa	S, T	
Fällmossa	S, T	
Kantarellmussling	S, T	
Knägräs	T	
Rostfläck	S, T	

Inventerare EA

449 klass 2 4,2 ha

Blandsumpskog

Nbi: Lövrik barrnatskog

N2000:

Olikåldrigt och flerskiktat lövrikt barrbestånd med ett förflutet som skogsbete. Viss sockelbildning hos klibbal. Det mosaikartade området är mestadels fuktigt med rännilar som skapar kvilliknande partier. Hög artrikedom både i träd- och buskskikt. I området har inget skogsbruk bedrivits på mycket länge och mängden död ved är stor. Området är skyddat som biotopskydd och registrerat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen

Bäckbräsma	S	
Havstulpanlav	S, T	
Hårklomossa	S, T	Habitatdirektivet bilaga 2
Klippfrullania	S, T	
trädporella	S, T	

Inventerare EA

,

450 klass 2 2,4 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Lövskogslund

N2000



Lövskogsbevuxna inägobackar. Trädsiktet är artrikt med ek, asp, avenbok, lind och lönn. Här finns också en del äldre hasselbuskar och välutvecklade bryn med slån och hagtorn. En mindre bäck har sitt flöde genom norra och östra delen av området. Runt bäcken växer en sumpskog med grova klubbalar på stora socklar

Blåsippa	S, T	
Bäckbräsa	S, T	
Fällmossa	S, T	
Grå skärelav	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Rostfläck	S, T	

Inventerare EA

451 klass 4 0,9 ha

Ädellövskog

Nbi:

N2000

Lövskogsområde med många olika trädslag och domineras av ek. Beståndet är brukat som produktionsbestånd men variationen av trädslag och grönstensgynnad flora innebär att det finns visst artvärde.

Barkkornlav	S, T	
Blåsippa	S, T	
Fällmossa	S, T	
Rostfläck	S, T	

Inventerare EA

452 klass 3 5,5 ha

Ädellövskog av örtrik typ

Nbi: Lövskogslund, Sekundär ädellövnaturskog

N2000:



Ett stort grönstensområde med mycket rik lundflora med bland annat gulsippa, tandrot, vårärt, och blåsippa. Skogen utgörs av en varierad ädellövskog med stor variation av trädslag. Ek, bok och avenbok dominerar i området men inslaget av lind, lönn och asp. I östra kanten sträcker sig ett fuktigt stråk där klibbal dominerar. Stor del av området brukas genom plockhuggning men mindre områden är helt orörda i sen tid. Spår efter stenbrytning i området är tydliga i form av skrotstenstippar och vattenfyllda bergahålor. Området är registrerat som nyckelbiotop och objekt med naturvärde av Skogsstyrelsen och hyser höga artvärden inom flera olika organismgrupper. Platsen är sedan tidigare välinventerad och många fynd av naturvårdarter är registrerade utöver de som är noterade här.

Blåsippa	S, T	
Fällmossa	S, T	
Gulsippa	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Tandrot	S, T	
Vårärt	S, T	

Inventerare EA

453 klass 2 4,0 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Hagmark, Lövängsrest

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ, 9070



Gårdsnära betesmark med grova ekar, bokar och enstaka lindar och askar med hamlingsspår. Det finns även flera gamla hasselbuskar och Frukträd. I gränsen mellan slutna trädmiljöer och den öppna betesmarken finns välutvecklade bryn av blommande buskar.

Blåsippa	S, T	
Fällmossa	S, T	
Grå skärelav	S, T	
Gulsippa	S, T	

Inventerare EA

454 klass 2 6,3 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Hagmark

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ, 9070



Gårdsnära betesmark med grova, spärrgreniga hagmarksekar, tallar och enstaka lindar. De norra delarna är nyligen kraftigt utglesade men hyser rikligt med naturvärdesträd. De södra delarna är mer slutna ock utgör en viktig kantzon mot omgivande skog. Många av ekarna är ihåliga med mulm. Delar av området är registrerat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.

Fällmossa	S, T	
Grå skärelav	S, T	
Rostfläck	S, T	

Inventerare EA

455 klass 4 6,3 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Hagmark

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ, 9070

Gårdsnära betesmark med grova, spärrgreniga hagmarksekar. Området har nyligen glesats ut kraftigt och flera grova ekar har avverkats.

Grå skärelav	S, T	
--------------	------	--

Inventerare EA

456 klass 2 1,4 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: Lövlund

N2000:



Ekdominerat bestånd med grova spärrgreniga ekar avenbokar och bokar. Området är kraftigt igenvuxet av yngre träd som konkurrerar med de gamla ekarna.

Inventare EA

457 klass 3 0,9 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: Lövlund

N2000:

Tidigare betesmark med gamla ekar och hamlade lindar och ett buskskikt med hassel.

Rostfläck	S, T	
-----------	------	--

Inventare EA

458 klass 2 0,9 ha

Hedbokskog

Nbi: Hedbokskog

N2000:



Blockig ädellövskogsbacke som domineras av bok och ek. Senvuxna och undertryckta träd har till stor del gallrats bort nyligen. Kvarvarande träd hyser påtagliga artvärden

Fällmossa	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Trädporcella	S, T	

Inventerare EA

459 klass 3 0,7 ha

Blandlövskog av ek-lindtyp

Nbi: Lövängsrest

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ, 9070

Hagmark med flera mindre lövdungar med ek, lönn och lind. Några av lindarna är hamlade. Längs stenmurarna och i dungarna finns många fina hasselbuskar.

Rostfläck	S, T	
-----------	------	--

Inventerare EA

460 klass 3 1,3 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: Lövlund

N2000:

Ekdominerat bestånd med grova spärrgreniga ekar runt gården.

Grå skärelav	S, T	
--------------	------	--

Inventerare EA

461 klass 2 2,7 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Lövängsrest, Hagmark

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ, 9070

Betesmarksområde med många äldre ekar, askar lindar och enstaka hagmarksbokar. Flera av dem har håligheter. En av de gamla lindarna är hamlad. Död ved finns i området som torrträd.

Grå skärelav	S, T	
--------------	------	--

Inventerare EA

462 klass 3 1,7 ha

Ekhage

Nbi: Hagmark

N2000:



Betesmarksområde på mager mark med huvudsakligen medelålders ek men med enstaka grova, gamla ekar. Buskskiktet utmärks av gamla enar.

Fällmossa	S, T	
-----------	------	--

Inventerare EA

463 klass 2 2,1 ha

Blandskog

Nbi: Sekundär lövnaturskog, sekundär ädellövnaturskog

N2000:

Blockig, östvänd sluttning med naturskogslik blandskog som är rik på mossor tack vare hög luftfuktighet. Trädskiktet är mycket varierat och domineras av tall, gran, bok, ek och asp. Beståndet är flerskiktat och flera träd är senvuxna. Det finns rikligt med död ved i olika stadier.

Fällmossa	S, T	
-----------	------	--

Inventerare EA

464 klass 3 0,6 ha

Hedbokskog

Nbi: Hedbokskog

N2000:

Liten bokskogshöjd på torr, mager mark. Beståndet är enskiktat och hyser måttligt med död ved. Några av de äldre träden hyser naturvårdsarter som är typiska för gammal bokskog.

Bokvårtlav	NT, S, T	
Grynig filtlav	NT, S, T	
Platt fjädermossa	S, T	

Inventerare EA

465 klass 2 1,5 ha

Hedbokskog

Nbi: Hedbokskog

N2000:

Gammal bokskog öster om betesmarken. Genom området går en blockrik ås med senvuxen bokskog. Många av bokarna har hål och en del är innanrötade. Det finns rikligt med död ved i området, både som lågor och som högstubbar. I delar av objektet är trädskiktet yngre men överallt är skogen orörd och har stått utan skogsbruksåtgärder. För att gynna naturvärdena har dock gran avverkats nyligen i objektet. Några av de äldre träden hyser naturvårdsarter som är typiska för gammal bokskog. Objektet är skyddat som biotopskydd och registrerat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.

Bokkantlav	NT, S, T	
Bokvårtlav	NT, S, T	
Klippfrullania	S, T	
Trädporcella	S, T	

Inventerare EA

466 klass 3 1,1 ha

Blandlövhage

Nbi: Lövängsrest, Hagmark

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ, 9070

Betesmarksområde med flera gamla bokar och avenbokar, samt grova hamlade lindar.

Bokkantlav	NT, S, T	
Fällmossa	S, T	

Inventerare EA

467 klass 3 0,4 ha

Igenväxt äng/ hagmark av ask-almtyp

Nbi: Lövängsrest

N2000:

Litet område nära gården med hamlade askar. Flera av askarna är i dåligt skick på grund av askskottsjuka. Några askar har dött och bidragit till stor mängd död ved. Området är kraftigt igenvuxet och har inte brukats som löväng på mycket länge. Området är registrerat som objekt med naturvärde enligt Skogsstyrelsen.

Fällmossa	S, T	
Klippfrullania	S, T	

Inventerare EA

468 klass 4 0,8 ha

Igenväxt äng /hagmark av lind-ektyp

Nbi:

N2000:



Igenväxt betesmark och lövängsrest med hamlad lönn och grova hagmarksbokar. I övrigt växer här asp, klibbal, björk och hassel. Det finns måttligt med död ved i form av lågor av asp och lönn i objektet

Inventerare EA

469 klass 2 3,2 ha

Hedbokskog

Nbi: Hedbokskog

N2000: Bokskog av fryle-typ, 9110

Gammal bokskog med lång kontinuitet på näringsfattig mark. Bokarna är senvuxna med håligheter och bohål. Förutom bok växer här gamla tallar och ung björk där bokarna står glest. Inväxande gran har avvecklats genom återkommande avverkningar. Det finns måttligt med död ved i området, både som lågor och som högstubbar. Objektet är skyddat som biotopskydd och registrerat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.

Barkkornlav	S, T	
Fällmossa	S, T	
Havstulpanlav	S, T	
Klippfrullania	S, T	

Inventerare DG

470 klass 4 0,8 ha

Igenvuxen ekhagmark

Nbi:

N2000:



Ekbacke i före detta betesmark. Naturvärdena i objektet är knutna till äldre spärrgreniga ekar och grova aspar. Gamla enar visar på att området tidigare har en öppen betesmarksmiljö.

Inventerare EA

471 klass 2 1,4 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: Lövlund

N2000:

En liten blockrik höjd med gammal lövskog. Uppe på höjden växer en gammal hamlad lind och runt om växer gammal buketformig avenbok och senvuxna bokar. Intill höjden finns en fuktig svacka med rikligt med död ved i form av både lågor och högstubbar. Här finns gamla vårtbjörkar och hålträd.

Bokkantlav	NT, S, T	
Fällmossa	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Platt fjädermossa	S, T	
Rostfläck	S, T	

Inventerare EA

472 klass 4 3,7 ha

Ädellövskog

Nbi:

N2000:



Området utgörs av en nyligen gallrad ädellövskog där bok och ek domineras. Beståndet är enskiktat och saknar död ved. Det finns enstaka äldre träd kvar i beståndet både grova träd och senvuxna klenare träd. Området ligger i direkt anslutning till ädellövskogsområden med höga naturvärden.

Barkornlav	S, T	
------------	------	--

Inventerare EA

473 klass 2 4,9 ha

Blandlövchage av ek-lindtyp

Nbi: Lövängsrest, Hagmark

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ, 9070



Trädklädd betesmark med tydliga spår efter tidigare lövängsbruk i form av hamlade lindar. Området utgör en mosaik av slutna och mer öppna miljöer. I trädskiktet växer ek, lind, ask och apel. I kanterna mot den öppna marken finns välutvecklade bryn. Floran utmärks av en rik lundflora med blåsippor, vårärt och skogsbingel. Området ligger på inägomark och har troligen mycket lång kontinuitet som trädbevuxen jordbruksmark. Området utgörs av en registrerad nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsen

Blåsippa	S, T	
Fällmossa	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Rostfläck	S, T	
Skogsbingel	T	
Storrams	S, T	
Trädporrella	S, T	
Vårärt	S, T	

Inventerare EA

474 klass 3 2,2 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: Lövlund

N2000:

Blandskog med lind, ask, klibbal, ek, bok, avenbok, gran och hassel. Trädslagsfördelning och spår efter hamling på några askar tyder på att området tidigare har utgjorts av en öppen trädmiljö. Det finns rikligt med död ved i objektet. Nyligen är objektet gallrat för att gynna de gamla lövträden och lundfloran.

Blåsippa	S, T	
Storrams	S, T	

Inventerare EA

475 klass 4 0,6 ha

Hagmark

Nbi:

N2000:

Betesmark med grova, spärrgreniga ekar i västra delen. I östra delen växer flera gamla buketter med avenbok.

Inventerare EA

476 klass 2 1,2 ha

Klibbalskog av översilningstyp

Nbi: Alsumpskog

N2000:



Alsumpskog som breder ut sig runt ett bäckflöde. Alarna växer i buketter på socklar. Det finns rikligt med död ved och träd med håligheter. I södra delen, väster om bäcken domineras skogen av senvuxen avenbok som växer i buketter tillsammans med hassel ek, och tall. Området är registrerat som objekt med naturvärde av Skogsstyrelsen.

Fällmossa	S, T	
Gullpudra	S, T	
Bäckbräsma	S, T	

Inventerare EA

477 klass 3 0,8 ha

Ädellövskog

Nbi: Sekundär ädellövnaturskog

N2000:



Äldre ädellövskog som domineras av ek och bok. Inslag av lind finns i branter. Beståndet är relativt opåverkat av skogsbruk och innehåller flera grova bokar, några med håligheter och bohål. Mot åkerkanten växer de äldsta ekarna

Inventerare EA

478 klass 4 1,0 ha

Ädellövskog

Nbi:

N2000:



Gammal blandskog som växer i blockig sluttning ner mot sumpskog. Skogen domineras av bok och gran med inslag av avenbok, ek och gammal björk. I beståndet finns rikligt med död ved och stor diameterspridning på träden.

Inventerare EA

479 klass 3 0,7 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: Lövlund

N2000:



Gamla ädellövträd i igenvuxen betesmark, trädskiktet utgörs av ek, ask, avenbok, lönn, lind, apel och hassel.

Inventerare EA

480 klass 3 0,4 ha

Lövsumpskog

Nbi: Lövsumpskog

N2000:



Sumpskog på näringsrik mark som domineras av Klibbal, lönn, ask och hassel. Området gränsar till betesmark.

Inventerare EA

481 klass 3 0,4 ha

Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp

Nbi: Lövlund

N2000:



Litet skogsområde som delvis betas av får. Skogen består av äldre ek, lind, bok och avenbok. Några av träden har håligheter och bohål. Död ved finns som ett par grova eklågor och högstubbe.

Barkkornlav	S, T	
Havstulpanlav	S, T	
Storrams	S, T	

Inventerare EA

482 klass 3 0,3 ha

Ädellövskog

Nbi: Sekundär ädellövnaturskog

N2000:

Äldre bokskog i något blockig sluttning. Beståndet är flerskiktat och har stor diameterspridning, där flera träd är senvuxna och några är toppbrutna.

Inventerare EA

483 klass 3 1,6 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Hagmark

N2000:

Betesmarksområde med spärrgreniga grova ekar och någon lind. I buskskiktet växer gamla enar.

Inventerare EA

484 klass 2 1,2 ha

Blandlövhage av ek-lindtyp

Nbi: Lövängsrest

N2000: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ, 9070



Delvis igenvuxet hagmarksområde med många hamlade träd av lind, ask och lönn. Förutom de hamlade träden finns grova gamla träd av ek, avenbok, ask, bok och lönn. I området finns även äldre apel och hassel.

Fällmossa	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Rostfläck	S, T	

Inventerare EA

485 klass 3 1,4 ha

Lövskogslund

Nbi: Lövängsrest, Lövskogslund

N2000:



Brant sluttning mot väster, med bokskog som har stort inslag av avenbok, lind och ek. Objektet har tydlig grönstenspåverkan vilket bekräftas av rikliga förekomster av blåsippa. I södra delen finns stora mängder skrotsten från tidigare stenbrytning. Flera träd har tydliga spår efter hamling.

Blåsippa	S, T	
Fällmossa	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Platt fjädermossa	S, T	
Skogsbingel	T	

Inventerare DG

486 klass 2 0,3 ha

Lövskogslund

Nbi: Lövängsrest, Lövskogslund

N2000:



Litet bestånd med bokskog som har stort inslag av avenbok, lind och ek. Objektet har tydlig grönstenspåverkan vilket bekräftas av rikliga förekomster av blåsippa och vårärt. I södra delen står en gammal hamlad ask med flera naturvårdsarter så som almlav och grov baronmossa.

Almlav	VU, S, T	
Blek kraterlav	VU, T	
Fällmossa	S, T	
Grov baronmossa	S, T	
Guldlockmossa	S, T	
Klippfrullania	S, T	
Platt fjädermossa	S, T	
Skogsbingel	T	
Storrams	S, T	

Inventerare DG



Naturvärdesinventering
av preliminära värdetrakter
Osby – Glimåkra 2021

I SAMARBETE MED:

