

Preparathäfte 2009

Kemiska växtskyddsmedel för yrkesmässig
jordbruks- och trädgårdsnäring

oktober 2009

Aktiviteten är delfinansierad med
EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden



LÄNSSTYRELSEN
I SKÅNE LÄN

Information om Preparathäfte 2009

Häftets delar

Preparat A-Ö

I det inledande preparatregistret finns, i bokstavsordning efter preparatnamn, alla kemiska växtskyddsmedel som är godkända för användning i yrkesmässig jordbruks- och trädgårdsnäring. Även utvidgat användningsområde (*off label*) finns med. Preparat vars godkännande gått ut finns med om de får lov att användas under 2010. Betningsmedel, för annat än potatis, är ej medtagna i listan.

Uppgifterna är hämtade från Bekämpningsmedelsregistret på Kemikalieinspektionens hemsida (www.kemi.se).

Aktiv substans A-Ö

Samma preparat som i *Preparat A-Ö* finns här sorterade i bokstavsordning efter den aktiva substansen.

Preparatgrupper

Här är preparaten grupperade efter de aktiva substanserna. Första sidan innehåller ogräs- samt insektspreparat och andra sidan innehåller svamppreparat.

Preparat vars godkännande upphört

Här finns preparat vars godkännande upphört på senare år.

Bäst före-datum

Häftet är uppdaterat med den senaste information som fanns i Bekämpningsmedelsregistret på www.kemi.se den 16 oktober 2009.

Sammanställning

Länsstyrelsen i Skåne län har svarat för sammanställning av materialet. Om du har synpunkter på det arbetet eller om du vill beställa ett häfte kan du ringa 044/040-25 20 00 eller maila

skane@lansstyrelsen.se

Kontaktperson: Per Modig

Innehållsförteckning

	sida
Preparat A-Ö	3
Aktiv substans A-Ö	16
Preparatgrupper	20
Preparat vars godkännande upphört	22

Preparat A-Ö

Kemiska växtskyddsmedel för yrkesmässig jordbruks- och trädgårdsnäring

Preparaten är placerade i bokstavsordning. Betningsmedel, för annat än potatis, är ej upptagna.

Preparat		Aktiv substans	Användningsområde
A			
Acanto	2L	pikoxystrobin 250 g/l	Mot svampangrepp i odlingar av korn, havre, råg, rågvete och vete. Behandling får ej ske senare än 35 dagar före skörd.
Acanto Prima	2L	cyprodinil 30 vikt%, pikoxystrobin 8 vikt%	Mot svampangrepp i odlingar av korn, havre, råg, rågvete och vete. Behandlingen får ej ske senare än vid begynnande axgång.
Acrobat WG	1L	dimetomorf 9 vikt%, mancozeb 60 vikt%	Mot svampangrepp i odlingar av potatis och kepalök. Behandling får ej ske senare än 30 dagar före skörd. Får ej användas för behandling av ätliga växtdelar. <i>Off label:</i> Preparatet får användas för bekämpning av svampsjukdomar i odlingar av spenatfrö. Högsta tillåtna dos: 1,2 l Acrobat WG/ha i 150-200 l/vatten. Högst två behandlingar per säsong.
Admiral 10 EC	2L	pyriproxyfen 100 g/l	Mot skadeinsekter i växthusodlingar av prydnadsväxter, tomat och gurka. Behandling av ätliga växtdelar får ej ske senare än 3 dagar före skörd.
Alar 85 SG	1L	daminozid 86 vikt%	För tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus. Behandlade plantor ska sköljas två gånger med vatten enligt bruksanvisningen.
Aliette 80 WG	2L	fosetylaluminium 80 vikt%	Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar, prydnadsväxter, sallat och frilandsgurka. Behandling i jordgubbar får ej ske senare än 42 dagar före skörd, sallat 14 dagar och frilandsgurka 4 dagar före skörd
Ally 50 ST	2L	metsulfuronmetyl 50 vikt-%	Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg, rågvete och lin. Endast för vårbehandling.
Ally Class 50 WG	2L	karfentrazonetyl 40 vikt%, metsulfuronmetyl 10 vikt%	Mot ogräs i odlingar av vete, råg, havre, korn och rågvete, med eller utan insädd av rajgräs som fånggröda. Endast vårbehandling.
Amistar	2L	azoxystrobin 250 g/l	Mot svampangrepp i odlingar av stråsäd. Behandling i stråsäd får ej ske senare än vid begynnande blomning. Mot svampangrepp i odlingar av raps och rybs. Behandlingen i raps och rybs får ej ske senare än 28 dagar före skörd. Mot svampangrepp i odlingar av potatis. Behandling av potatis får ej ske senare än 14 dagar före skörd. Mot svampangrepp i odlingar av sockerbetor. Behandling av sockerbetor får ej ske senare än 40 dagar före skörd. Mot svampangrepp i odlingar av ärtor och åkerbönor. Behandling av ärtor och åkerbönor får inte ske senare än: 14 dagar före skörd av färska ärtor utan skida 14 dagar före skörd av färska ärtor/bönor med skida 35 dagar före skörd av torkade ärtor/bönor. Mot svampangrepp i odlingar av sallatslök, gräslök och jordgubbar. Behandling av sallatslök, gräslök och jordgubbar får ej ske senare än 7 dagar före skörd. Mot svampangrepp i odlingar av morot, palsternacka och persiljerot. Behandling av morot, palsternacka och persiljerot får ej ske senare än 10 dagar före skörd. Mot svampangrepp i odlingar av kepalök, schalottenlök, vitlök, dill, persilja, stjälselleri, rödkål, vitkål, blomkål, broccoli, savoykål, brysselkål, grönkål, kinakål, sallat och ruccola. Behandling av kepalök, schalottenlök, vitlök, dill, persilja, stjälselleri, rödkål, vitkål, blomkål, broccoli, savoykål, brysselkål, grönkål, kinakål, sallat och ruccola får ej ske senare än 14 dagar före skörd. Mot svampangrepp i odlingar av purjolök. Behandling av purjolök får ej ske senare än 42 dagar före skörd. Mot svampangrepp i odlingar av rödbeta, kålrot och rova. Behandling av rödbeta, kålrot och rova får ej ske senare än 40 dagar före skörd. Mot svampangrepp i skogsplantaskolor. Mot svampangrepp i odlingar av gräsfrö. <i>Off label:</i> Preparatet får användas mot mjöldagg i odlingar av gurka och tomat i växthus samt i prydnadsväxter i växthus. Dos tomat och gurka: 0,08%-ig lösning. 20 liter lösning per 100 m². Högst 3 behandlingar per kulturomgång. Karenstid: 3 dagar. Dos prydnadsväxter: 1 l Amistar/ha i 400-600 liter vatten. Preparatet får användas för bekämpning av svampsjukdomar på greener. Dos: 1 l/ha. Högst 3 behandlingar per år. preparatet får användas för svampsjukdomar i odlingar av hallon, rotselleri, frilandsgurka och i plantskolekulturer. Hallon, maxdos: 1 l/ha, högst 2 behandlingar med 7 dagars intervall, karenstid: 10 dagar. Rotselleri, maxdos: 1 l/ha, högst 2 behandlingar med 12 dagars intervall, karenstid: 14 dagar. Frilandsgurka, maxdos: 1 l/ha, högst 3 behandlingar med 10 dagars intervall, maxdos/säsong: 500 gr/ha, karenstid: 3 dagar. Plantskolekulturer, maxdos: 0,1 %-ig lösning, högst 2 behandlingar/säsong.
Apollo 50 SC	2L	klofentezin 500 g/l	Mot spinnkvalster i odlingar av frukt. Behandling får ej ske senare än vid musöronstadiet.
Ariane S	2L	MCPA 238 g/l, fluroxipyr-1-metylheptylester 58 g/l, klopyralid 20 g/l	Mot örtogräs i odlingar av stråsäd och gräsfrövall. I stråsäd endast för vårbehandling och senast vid första nodstadiet (BBCH 31).

Preparat		Aktiv substans	Användningsområde
Astrum	2L	tepraloxidim 50 g/l	Mot gräsogräs i odlingar av potatis, sockerbeta, ärt, bönor, kepalök, purjolök, morötter samt i odlingar av nordmannsgran. Behandling av potatis och ärt får ej ske senare än 35 dagar före skörd. Behandling av sockerbeter får ej ske senare än 56 dagar före skörd. Behandling av bönor får ej ske senare än 50 dagar före skörd. Behandling av kepalök, purjolök och morötter får ej ske senare än 28 dagar före skörd.
Atlantis OD	2L	mesosulfuronmetyl 10 g/l, jodsulfuronmetyl-natrium 2 g/l	Mot ogräs i odlingar av höstvetete, råg och rågvete.
Attribut SG 70	2L	propoxikarbazonnatrium 70 vikt%	Mot ogräs i odlingar av vete. Endast för vårbehandling.
B			
Bacara	2L	flurtamon 250 g/l, diflufenikan 100 g/l	Mot ogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre. Endast en behandling får utföras per gröda. <i>Off label:</i> Preparatet får användas mot ogräs i energiskog. Dos: 2 l Bacara/ha. Skyddshandskar skall användas vid tillblandning av sprutvätska och påfyllning av spruttanken.
Barclay Gallup 360	2L	glyfosat 486 g/l	Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av oljeväxter, 3. i samband med skörd genom avstrykning med aggregat kopplat till skördetröska.
Barclay Gallup Biograde 360	2L	glyfosat 486 g/l	Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av oljeväxter, 3. i samband med skörd genom avstrykning med aggregat kopplat till skördetröska.
Barclay Gallup Hi-Aktiv 360	2L	glyfosat 661 g/l	Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av oljeväxter, 3. i samband med skörd genom avstrykning med aggregat kopplat till skördetröska.
Basagran M75	2L	bentazon 273 g/l, MCPA 89 g/l	Mot ogräs i odlingar av vall, med eller utan skyddssäd. Endast för vårbehandling och senast vid bestockningens huvudfas (BBCH 25) hos skyddssåden. Behandling i ren vall får ej ske senast 42 dagar före skörd.
Basagran SG	2L	bentazon 95 vikt%	Mot ogräs i odlingar av ärt, åkerbönor, slätter- eller frövall, stråsäd med vallinsädd samt i majs. Endast vårbehandling. Doseringen av Basagran SG får inte överskrida 0,5 kg bentazon/ha i odlingar av ärt och åkerbönor. <i>Off label:</i> Preparatet får användas mot ogräs i odlingar av bruna bönor. Dos: max 0,6 l/ha.
Basamid Granulat	1L	dazomet 97 vikt%	Mot markburna svampsjukdomar, jordlevande insekter, nematoder och ogräs i odlingar av prydnadsväxter och i skogsplantaskolor. För inblandning i jord.
BASF Cycocel Plus	2L	klormekvatklorid 460 g/l	För stråförlängning i odlingar av råg. Behandlingen får ej ske senare än i första nodstadiet. För tillväxtreglering av prydnadsväxter. För stråförlängning i odlingar av gräs för utsäde.
BASF Forbel 750	2L	fenpropimorf 750 g/l	Mot svampangrepp i odlingar av stråsäd före blomning. Mot svampangrepp i odlingar av purjolök. Behandling av purjolök får ej ske senare än 30 dagar före skörd
Basta	2L	glufosatammonium 200 g/l	Mot icke önskvärd vegetation på/i åkermark: 1. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av jordgubbar och i utsädesodlingar av baljväxter och oljeväxter. Behandling i jordgubbar endast efter skörd. 2. i skogsplantering. I övrigt får endast behandling ske före grösans uppkomst och efter skörd. Frukt och bärodling: Behandling på våren eller efter skörd. Parker, trädgårdar, plantskolor och industriområden: Endast före uppkomst eller efter skörd i grönsaks- eller morotsodlingar.
Baycor 25 WP	2L	bitertanol 25 vikt%	Mot utvintringssvampar i odlingar av höstsäd och i gräsmattor. Mot svampangrepp i skogsplantaskolor genom betning av barroch lövträdsfrö samt genom sprutning i stickling- och fröbäddar. <i>Off label:</i> Preparatet får användas för bekämpning av svampsjukdomar i yrkesmässig odling av plantskolekulturer. Dos: 0,05-0,15%-ig lösning. Högst 3 behandlingar per säsong. Får endast användas om inga ätliga växtdelar skall skördas under året.

Preparat		Aktiv substans	Användningsområde
Beta-Baythroid SC 025	2L	betacyflutrin 2,5 vikt%	Mot skadeinsekter i odlingar av potatis, brysselkål, vitkål, rödkål, salladskål, grönkål, gröna ärter, raps, rybs, höstvetete, vårvete, råg, rågvete, äpple, päron, fodermajs, sockerbeta, foderbeta, torkade ärter, gräsfrö, klöverfrö och prydnadsväxter. Ej för bekämpning av enbart bladlöss. Behandling av brysselkål, vitkål, rödkål, salladskål, grönkål, gröna ärter och klöverfrö till utsäde får ej ske senare än 7 dagar före skörd. Behandling av äpple, päron och fodermajs får ej ske senare än 14 dagar före skörd. Behandling av vete, råg, rågvete och ärter (torkade) får ej ske senare än 21 dagar före skörd. Behandling av potatis, foderbetor och sockerbetor får ej ske senare än 28 dagar före skörd. Behandling av raps, rybs och gräsfrö till utsäde får ej ske senare än 53 dagar före skörd.
Betanal Power	2L	desmedifam 160 g/l fenmedifam 160 g/l	Mot örtogräs i odlingar av foderbetor och sockerbetor
Betanal SC	2L	fenmedifam 160 g/l	Mot ogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor, rödbetor och jordgubbar före blomning samt i skogsplantskolor
Betasana 2000	2L	fenmedifam 160 g/l	Mot ogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor, rödbetor, jordgubbar före blomning samt i skogsplantskolor.
Bio Blast Ogräsättika Y 10%	2L	ättiksyra 105 g/l	Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar.
Bionim	2L	azadiraktin 0,3 vikt%	Mot skadeinsekter på prydnadsväxter <i>För sista användningsdag, se sid 22.</i>
Biscaya OD 240	2L	tiaklopid 240 g/l	Mot skadeinsekter i odlingar av raps, rybs och potatis. <i>Off label:</i> Preparatet får användas mot klöverspetsvivel i utsädesodlingar av röd-, alsike- och vitklöver. Dos: högst 0,3 l/ha. Högst en behandling per år.
Blast & Ogräsättika Y 24%	2L	ättiksyra 250 g/l	Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar
Boxer	2L	prosulfokarb 800 g/l	Mot ogräs i odlingar av höstsäd och potatis. <i>Off label:</i> Preparatet får användas för bekämpning av gräsogräs i utsädesodling av ängsgröe. Preparatet får användas för bekämpning av ogräs i odlingar av jordgubbar. Maxdos: 2,5 l Boxer/ha. Högst 2 behandlingar per år. Behandlingstidpunkt: efter skörd och i nyplantering.
Butisan S	2L	metazaklor 500 g/l	Mot ogräs i odlingar av kålväxter, potatis, raps och rybs <i>Off label:</i> Preparatet får användas för bekämpning av ogräs i odlingar av oljedådra. Dos: 2,0 l/ha. En behandling i grösans 2-4 bladsstadiet.
Butisan Top	2L	metazaklor 375 g/l, kvinmerak 125 g/l	Mot ogräs i odlingar av raps och rybs. <i>Off label:</i> Preparatet får användas mot ogräs i fältmässig odling av plantskolekulturer. 1. Maxdos 2 l/ha 2. 1 behandling/år 3. Växter på behandlade fält ska inte hanteras förrän efter 7 dagar.
C			
Calypso SC 480	2L	tiaklopid 481 g/l	Mot skadeinsekter i odlingar av jordgubbar på friland. Behandling av jordgubbar får ej ske senare än 3 dagar före skörd. Mot skadeinsekter i odlingar av äpple, päron, plommon och körsbär. Behandling av frukt får ej ske senare än 14 dagar före skörd. <i>Off label:</i> Preparatet får användas mot skadeinsekter i frilandsodlingar av hallon. Dos: 0,25 l/ha. Högst två behandlingar per år. Karenstid: 3 dagar. En skyddszon på 10 meter till omgivningen måste tillämpas.
Candit	2L	kresoximmetyl 50 vikt%	Mot svampangrepp i odlingar av äpple, päron, jordgubbar, vinbär, krusbär och prydnadsväxter i växthus. Endast för användning i äpple- och päronodlingar där marken mellan trädraderna är bevuxen. Behandling av äppel- och päronträd får ej ske senare än 42 dagar före skörd. Behandling av jordgubbar, vinbär och krusbär får ej ske senare än 14 dagar före skörd. <i>Off label:</i> Preparatet får användas för bekämpning av mjöldagg i vinodlingar på friland. Dos: 0,015%-ig lösning, max 1500 l/ha. Högst 3 behandlingar från blomning och fram till dess att druvorna har nästan full storlek men inte har börjat att mogna. Behandlingsintervall: 7-14 dagar. Karenstid: 35 dagar. Preparatet får användas mot svampsjukdomar i odlingar av purjolök. Dos: högst 0,75 kg Candit/ha. Endast 1 behandling per säsong. Karenstid: 14 dagar Samma fält får inte behandlas ofare än vart femte år.
Centium 36 CS	2L	klomazon 360 g/l	Mot ogräs i odlingar av potatis, ärter och morötter. <i>Off label:</i> Preparatet får användas mot ogräs i odlingar av frilandsgurka. 1 behandling med 0,25 l/ha. Preparatet får användas för bekämpning av ogräs i utsädesodlingar av spenatfrö. Dos: 0,25 l/ha. Samma fält får inte behandlas oftare än vart tredje år. Preparatet får användas för bekämpning av ogräs i utsädesodlingar av Chrysanthemum. Dos: 0,25 l/ha vid ett tillfälle. Samma fält får inte behandlas oftare än vart tredje år.

Preparat		Aktiv substans	Användningsområde
Cerone	2L	etefon 480 g/l	För stråförlängning i odlingar av höstråg. Behandlingen får ej ske senare än vid begynnande axgång. För mognadsreglering av tomater samt tillväxtreglering av prydnadsväxter. Behandling av tomater får ej ske senare än 7 dagar före skörd.
Chekker	2L	amidosulfuron 12,5 vikt%, jodsulfuronmetyl-natrium 1,25 vikt%	Mot ogräs i odlingar av vete, korn, höstråg och rågvete. Endast för vårbehandling.
Clinic	2L	glyfosat 486 g/l	Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. i samband med skörd genom avstrykning med aggregat kopplat till skördetröska.
Cliophar 100 SL	2L	klopyralid 100 g/l	Mot ogräs i odlingar av oljeväxter, kålväxter, lin, stråsäd, gräsfrö, majs, betor, efter skörd i jordgubbar, i skogsplantskolor och skogsplantering på åker.
Comet	2L	pyraklostrobin 250 g/l	Mot svampangrepp i odlingar av stråsäd och sockerbetor. Behandling av stråsäd får ej ske senare än 35 dagar före skörd. Behandling av sockerbetor får ej ske senare än 30 dagar före skörd. Användning i stråsäd får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning. <i>Off label:</i> Preparatet får användas för bekämpning av svampsjukdomar i odlingar av spenatfrö. Högsta tillåtna dos: 1 l Comet/ha i 150-200 l vatten. Högst 2 behandlingar per säsong.
Confidor WG 70	2L	imidakloprid 70 vikt%	Mot skadeinsekter i odlingar av prydnadsväxter i växthus Mot skadeinsekter i odlingar av tomat, gurka och paprika i växthus genom droppbevattning. Behandling av ätliga växtdelar får ej ske senare än 3 dagar före skörd. <i>Off label:</i> Preparatet får användas för bekämpning av bladlöss vid plantuppträff i växthus av sallat och sallatskål. Dos för 1000 plantor: 3,4 g Confidor WG till 20 l/vatten. 1 behandling per kultur får utföras. Behandling får ej ske senare än 42 dagar före skörd.
Conserve	2L	spinosad 120 g/l	Mot skadeinsekter i odlingar av prydnadsväxter, tomat och gurka i växthus. Behandling av ätliga växtdelar får ej ske senare än 3 dagar före skörd.
Cougar	2L	diflufenikan 100 g/l, isoproturon 500 g/l	Mot ogräs i odlingar av stråsäd. <i>Off label:</i> Preparatet får användas mot ogräs i energiskog. Dos: Högst 2 l Cougar/ha.
Cycocel		se BASF Cycocel	
Cyperb	2L	cypermetrin 107,3 g/l	Mot skadeinsekter före blomning i odlingar av frukt, jordgubbar, krusbär, raps och rybs. Mot skadeinsekter i odlingar av havre, korn, råg, vete och rågvete före eller i samband med axgång samt i trädgårdsplantskolor, i odlingar av bönväxter, kålväxter, morötter, purjolök, julgrannar, prydnadsväxter, sockerbetor och örter i växthus och på friland. Ej för bekämpning av enbart bladlöss. Bekämpning av skadegörare i bönväxter och ärtväxter i blomning får ske endast nattetid utanför binas flygtid. Behandling av bön- och ärtväxter, morötter samt sockerbetor får ej ske senare än 21 dagar före skörd, kålväxter och purjolök senast 14 dagar före skörd.
D			
Danadim Progress	2L	dimetoat 400 g/l	Mot skadeinsekter i odlingar av sockerbetor, brysselkål, blomkål, isbergssallat och morötter. Behandling får ej ske senare än 21 dagar före skörd. Kål dock senast 28 dagar före skörd och morötter dock senast 35 dagar före skörd.
Danitron 5 SC	2L	fenpyroximat 5,2 vikt%	Mot kvalster i odlingar av jordgubbar och prydnadsväxter. Behandling i jordgubbar får ej ske senare än 7 dagar före skörd.
Decis	2L	deltametrin 25 g/l	Mot skadeinsekter i odlingar av oljeväxter, åkerbönor, klöverfrö, gräsfrö och majs före blomning. I odlingar av stråsäd senast vid begynnande blomning. I odlingar av frukt, bär, kål, spenat, sallat, dill, persilja, kepalök, purjolök, potatis, betor, rotgrönsaker, örter (ej sockerörter), gurka samt på prydnadsväxter utomhus och golfgreener. I växthus endast med tripstickmetoden. Ej för bekämpning av enbart bladlöss, förutom i stråsäd där bladlöss får bekämpas från slutet av axgång fram till begynnande blomning (stadium 59-61). Bekämpning av bladlöss får ske i en dos av högst 0,2 l preparat/ha. Behandling av ätliga växtdelar får ej ske senare än 14 dagar före skörd, konservärter dock 10 dagar, sallat, dill, persilja och purjolök 7 dagar samt övriga blad- och rotgrönsaker 5 dagar före skörd.
Delan WG	2L	ditianon 70 vikt%	Mot svampangrepp i odlingar av äpple, päron, plommon och körsbär. Behandling får ej ske senare än 21 dagar före skörd.
DU-DIM 48 SC	2L	diflubensuron 480 g/l	Mot skadeinsekter i odlingar av äpple, päron och kål. Behandling i fruktodlingar får ske högst 2 gånger efter blomning. Mot flug- och mygglarver i odlingar av champinjoner. Behandling av ätliga växtdelar på äpple, päron och kål får ej ske senare än 28 dagar före skörd. Behandling av champinjoner får ej ske senare än 21 dagar före skörd.
Duplosan DP	2L	diklorprop-P 715 g/l	Mot örtogräs i odlingar av stråsäd och gräsfrö samt i slättevall och betesvall på åkermark. Släpp inte mjölkkor på betesvall tidigare än 14 dagar efter behandling.
Duplosan Meko	2L	mekoprop-P 600 g/l	Mot örtogräs i odlingar av stråsäd och gräsfrö samt i slättevall och betesvall på åkermark. Släpp inte mjölkkor på betesvall tidigare än 14 dagar efter behandling. <i>För sista användningsdag, se sid 22.</i>

Preparat		Aktiv substans	Användningsområde
Duplosan Super	2L	diklorprop-P 369,5 g/l, MCPA 196 g/l, mekoprop-P 157,3 g/l	Mot örtogräs i odlingar av stråsäd, frukt och gräsfrö samt i slättervall och betesvall på åkermark. Släpp inte mjölkkor på betesvall tidigare än 14 dagar efter behandling.
E			
Eagle WG	2L	amidosulfuron 75 vikt%	Mot örtogräs i odlingar av stråsäd, med eller utan insädd av gräs eller klöver som fånggröda. I stråsäd endast för vårbehandling.
Electis	1L	mankozeb 66,7 vikt%, zoxamid 8,3 vikt%	Mot svampangrepp i odlingar av potatis. Behandling får ej ske senare än 30 dagar före skörd. Får ej användas för behandling av ätliga växtdelar.
Envision	2L	glyfosat 607 g/l	Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. för nedvisning av gröna växtdelar i odlingar av oljeväxter, 3. i samband med skörd genom avstrykning med aggregat kopplat till skördetröska.
Epok 600 EC	2L	fluazinam 400 g/l, metalaxyl-M 200g/l	Mot svampangrepp i odlingar av potatis. Behandling får ej ske senare än 7 dagar före skörd. <i>Off label:</i> Preparatet får användas mot bladsvamp, penséodling och rosodling. Dos penséodling: 50-100 ml till 100 l vatten. 150-200 ml utspädd lösning per m ² . Dos rosodling: 100 ml till 100 l vatten. Högst tre behandlingar. Skyddshandskar skall användas under och efter behandling vid arbete med plantorna. Preparatet får användas för bekämpning av bladmögel i odlingar av prydnadsväxter i växthus. Dos: 50-100 ml till 100 l vatten. 150-200 ml utspädd lösning per m ² . Högst 3 behandlingar. Skyddshandskar ska användas under och efter behandling vid arbete med plantorna.
Event Super	2L	fenoxaprop-P 69 g/l	Mot flyghavre, renkavle och åkerven i odlingar av vete, råg, rågvete och korn.
Exemptor 10 GR	2L	tiaklopid 10 vikt%	Mot skadeinsekter i odlingar av prydnadsväxter. Endast för inblandning i odlingssubstrat avsett för krukodling. Inblandning i odlingssubstrat ska ske inomhus med hjälp av automatisk utrustning. Behandlade krukor får tidigast ställas ut på friland en vecka efter plantering. Andningsmask ska användas när granulat blandas med odlingssubstrat.
Express 50 T	2L	tribenuronmetyl 50 vikt%	Mot örtogräs i odlingar av stråsäd och betesvall samt i insädd av slättervall (gräs, rödklöver, lucern) med eller utan skyddssäd. Mot ogräs i odlingar av timotejfrö under insäningsåret. Betesdjur får ej släppas på behandlad betesmark tidigare än 7 dagar efter behandling. <i>Off label:</i> Preparatet får användas för bekämpning av ogräs i insädd av slättervall bestående av gräs och vitklöver.
F			
Fastac 50	2L	alfacypermetrin 50 g/l	Mot skadeinsekter i odlingar av stråsäd. Behandling i stråsäd får ej ske senare än 42 dagar före skörd. Mot skadeinsekter i odlingar av höstraps och höstrybs. Mot skadeinsekter i odlingar av vårraps och vårrybs. Behandlingen i raps och rybs får ej ske senare än 28 dagar före skörd. Mot skadeinsekter i odlingar av potatis. Behandling av potatis får ej ske senare än 14 dagar före skörd. Mot skadeinsekter i odlingar av sockerbetor och foderbetor. Behandling i betor får ej ske senare än 14 dagar före skörd. Mot skadeinsekter i odlingar av ärter och bönor. Behandling i ärter och bönor får ej ske senare än 7 dagar före skörd. Mot skadeinsekter i odlingar av jordgubbar. Behandling av jordgubbar får ej ske senare än 3 dagar före skörd. Mot skadeinsekter i odlingar av kepalök, purjolök, rödkål, vitkål, savoykål, spetskål, blomkål och broccoli. Behandling i kepalök, purjolök, rödkål, vitkål, savoykål, spetskål, blomkål och broccoli får ej ske senare än 7 dagar före skörd. Mot skadeinsekter i odlingar av sallat och ruccola på friland. Behandling av sallat och ruccola får inte ske senare än 7 dagar före skörd. Mot skadeinsekter i odlingar av majs. Behandling i majs får ej ske senare än 56 dagar före skörd. Mot skadeinsekter i odlingar av klövervallar och lucernvallar. Behandling i klövervallar och lucernvallar får ej ske senare än 7 dagar före skörd. Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 90%.
Fazor	2L	maleinhydrazid 81 vikt%	För gröningshämmande behandling av kepalök. Behandling får ej ske senare än 10 dagar före uppkörning eller lossning av löken. Fazor får inte användas på lök som ska säljas till konsumenter före februari året efter behandlingen.

Preparat		Aktiv substans	Användningsområde
Fenix	2L	aklonifen 600 g/l	Mot ogräs i odlingar av arter, potatis, morötter, sättkepalök, dill för fröproduktion, palsternacka, jordärtskocka och kummin samt i skogsplantskolor och energiskog (salix). Endast före uppkomst i odlingar av konservärt, potatis, palsternacka, dill och jordärtskocka. Behandling i odlingar av torkade ärtor får inte ske senare än i utvecklingsstadiet 32 (2 utvecklade internoder). Behandling av morötter får inte ske senare än i tvåbladsstadiet. Behandling av planterad kepalök får inte ske senare än i fyrbladsstadiet. Behandling av kummin får endast ske under insåningsåret. <i>Off label:</i> Preparatet får användas för bekämpning av ogräs i odlingar av åkerbönor. Dos: högst 2,5 l/ha. Behandling ska ske före uppkomst. Preparatet får användas mot ogräs vid drivning av prydnadslökväxter i växthus. Dos: 0,1 l Fenix per 10 l vatten. Preparatet får användas mot ogräs i odlingar av frösådd lök. Dos: max 0,7 l Fenix/ha. Högst 2 behandlingar. Behandling får ej ske senare än i 4-bladsstadiet. Preparatet får användas mot ogräs efter uppkomst i odlingar av palsternackor. Dos: Högst 1,5 l/ha efter uppkomst; 3 behandlingar om 0,5 l/ha eller 2 behandlingar om 0,75 l/ha.
Fiesta T	2L	kloridazon 360 g/l, kvinmerak 60 g/l	Mot ogräs i odlingar av sockerbeter. Högst 1 behandling/säsong <i>Off label:</i> Preparatet får användas för bekämpning av snärjmåra i odlingar av spenatfrö. Högsta tillåtna dos: 3 l Fiesta T/ha i 150-200 l vatten. 1 behandling mellan sådd och uppkomst.
Finalsan Ogräs Effekt koncentrat Proffs	2L	pelargonsyra 186,7 g/l	Mot ogräs, mossor och alger i trädgårdar och på allmänna platser.
Flexity	2L	metrafenon 300 g/l	Mot svampangrepp i odlingar av korn, havre, råg, rågvete och vete. Behandling får ske senast vid begynnande blomning (stadie 61).
Floramite 240 SC	2L	bifenazat 240 g/l	Mot spinnevalster i odlingar av prydnadsväxter, plantskolor, jordgubbar samt i odlingar av gurka och tomat i växthus. Behandling av jordgubbar får ej ske senare än 3 dygn före skörd. Behandling av tomat och gurka får ej ske senare än 1 dygn före skörd.
Floxy	2L	fluroxypyr-1-metylheptylester 259,4 g/l	Mot örtogräs i odlingar av stråsäd, fodermajs, gräsfrövall, betesvallar och slåttervallar samt på gräsmattor. Betesdjur får ej släppas på behandlad betesmark tidigare än 7 dagar efter behandling. Vall får tidigast sköras 7 dagar efter behandling.
Focus Ultra	2L	cykloxidim 100 g/l	Mot gräsogräs i odlingar av blomkål, bönor, energiskog, jordgubbar, foder- och kokärter, klöverfrö, lusern, lök, morötter, oljelin, raps, rybs, rödsvingel, selleri, sockerbeter, vitkål, potatis (ej färskpotatis) senast när bladen är 20 cm höga, i plantskolor samt efter skörd i odlingar av hallon, rabarber och svarta vinbär. Behandling av jordgubbar och lök får ej ske senare än 40 dagar före skörd, blomkål, bönor, morötter, selleri, sockerbeter och vitkål 60 dagar före skörd. Behandling av raps och rybs får ske senast i 6-örtbladstadiet med en högsta dos om 0,6 kg verksamt ämne per hektar och före begynnande knoppstadium med en högsta dos om 0,4 kg verksamt ämne per hektar samt arter senast i 2-nodstadiet. Behandlade skördeprodukter av oljelin får inte användas till livsmedelsändamål. <i>Off label:</i> Preparatet får användas för bekämpning av gräsogräs i utsädesodlingar av rådis- och spenatfrö.
Forbel 750 EC	2L	fenpropimorf 750 g/l	Mot svampangrepp i odlingar av stråsäd före blomning.
Forester	2L	cypermetrin 100 g/l	Mot skadeinsekter på barrträdplanter. Barrträdplanter får endast behandlas centralt i plantskola, vid maskinell plantering eller vid efterbehandling av planterade planter. Central behandling skall utföras i plantskolor o. dyl. med sluten appliceringsmetod där överskottet av behandlingsvätskan recirkulerar eller med metod som godtas av Kemikalieinspektionen. Barrotsplanter skall rinna av före säckning. Mot insektsangrepp på obarkat virke. Behandlat virke ska märkas. Behandlat virke får inte flottas eller förvaras i vattendrag, sjö eller annat vattenområde. Vid bevattning ska lakvattnet recirkulera och får inte släppas ut i vattenområde. Behandling av obarkat virke ska anmälas till Skogsvårdsstyrelsen i god tid före behandlingen.
Fox 480 SC	2L	bifenox 480 g/l	Mot ogräs i odlingar av raps. <i>Off label:</i> Preparatet får användas mot ogräs i utsädesodlingar av gräs insått i höst- och vårraps. Dos: högst 0,8-1,0 liter produkt/ha. Högst en behandling per år.
Frupica SC	2L	mepanipyrim 42 vikt%	Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar på friland. Behandling får ej ske senare än 7 dagar före skörd. <i>Off label:</i> Preparatet får användas mot svampangrepp i skogsplantskolor. Dos: 0,8 l produkt/ha. Högst två behandlingar. För att skydda akvatiska organismer krävs att anvisningarna i "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd" följs liksom att bestämmelserna i Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1997:2 iakttas.
Fungazil 100	2L	imazalilsulfat 133,5 g/l	Mot svampsjukdomar i odlingar av potatis genom betning av utsäde. Ej för betning av utsäde till odling av färskpotatis. <i>Off label:</i> Preparatet får användas för bekämpning av mjöldagg i yrkesmässig odling av gurka i växthus. Dos: 0,075%-ig lösning. Högst 2 behandlingar. Karenstid: 3 dagar.

Preparat	Aktiv substans		Användningsområde
G			
Gallery	2L	isoxaben 500 g/l	Mot ogräs i odlingar av frukt, jordgubbar, vinbär, krusbär, i skogsplanteringar på åker, i skogsplantskolor samt i bestånd och planteringar av förvedade prydnadsväxter. Behandling i vinbär och krusbär får inte ske senare än 120 dagar före skörd.
Glyfonova 360 SL	2L	glyfosat 486 g/l	Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. i samband med skörd genom avstrykning med aggregat kopplat till skördetröska.
Glyfonova Bio	2L	glyfosat 486 g/l	Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. i samband med skörd genom avstrykning med aggregat kopplat till skördetröska.
Glyphogan 480 SL	2L	glyfosat 486 g/l	Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. i samband med skörd genom avstrykning med aggregat kopplat till skördetröska.
Glyphomax	2L	glyfosat 486 g/l	Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av oljeväxter, 3. i samband med skörd genom avstrykning med aggregat kopplat till skördetröska.
Glyphomax Bio	2L	glyfosat 486 g/l	Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av oljeväxter, 3. i samband med skörd genom avstrykning med aggregat kopplat till skördetröska.
Glypro Bio	2L	glyfosat 486 g/l	Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av oljeväxter, 3. i samband med skörd genom avstrykning med aggregat kopplat till skördetröska.
Goliath	2L	metamitron 700 g/l	Mot ogräs i odlingar av sockerbetor och foderbetor.
Goltix SC 700	2L	metamitron 700 g/l	Mot ogräs i odlingar av sockerbetor och foderbetor.
Goltix Trippel WG	2L	metamitron 28 vikt%, etofumesat 6,5 vikt%, fenmedifam 6,5 vikt%	Mot ogräs i odlingar av sockerbetor.
Goltix WG	2L	metamitron 71 vikt%	Mot ogräs i odlingar av betor och jordgubbar samt i plantskolor.
Gratil 75 WG	2L	amidosulfuron 75 vikt%	Mot örtogräs i odlingar av stråsäd, lin, betesvall, gräsfrövall och slåttervall. I stråsäd endast för vårbehandling. Betesdjur får ej släppas på behandlad betesmark tidigare än 7 dagar efter behandling. <i>Off label:</i> Preparatet får användas mot örtogräs i odlingar av nordmannsgran. Dos: högst 20 g/ha.
H			
Harmony 50 SX	2L	tifensulfuronmetyl 50 vikt%	Mot örtogräs i vete, korn, råg, rågvete, havre, med eller utan insädd, samt i fodermajs och betesvall. Endast för vårbehandling. Behandling i majs får ej ske senare än 60 dagar före skörd. Betesdjur får ej släppas på behandlad betesmark tidigare än 7 dagar efter behandling.
Harmony Plus 50 T	2L	tribenuronmetyl 17 vikt%, tifensulfuronmetyl 33 vikt%	Mot örtogräs i odlingar av stråsäd med eller utan gräsinsädd. Endast för vårbehandling.
Hormotex 750	2L	MCPA 918 g/l	Mot örtogräs i odlingar av stråsäd, lin, potatis och gräsfrö samt i slåttervall och betesvall på åkermark. Behandling i stråsäd får ske senast vid första nodstadiet (BBCH 31). Betesdjur får inte släppas på betesvall tidigare än 14 dagar efter behandling. Behandling i slåttervall får ske senast 34 dagar före skörd.
Hussar	2L	jodsulfuronmetyl-natrium 5 vikt%	Mot ogräs i odlingar av höstvet, höstråg, rågvete, vårvete och vårkorn. Endast för vårbehandling. <i>Off label:</i> Preparatet får användas för bekämpning av gräsogräs i utsädesodling av rödsvingel på våren. Preparatet får användas för bekämpning av gräsogräs i utsädesodling av ängsgröe på våren.
Hussar OD	2L	jodsulfuronmetyl-natrium 100 g/l	Mot ogräs i odlingar av höstvet, höstråg och rågvete. Behandling får ske senast i 2-nodsstadiet. Endast för vårbehandling.
Hylobi Forest	2L	lambda-cyhalotrin 100 g/l	Mot skadeinsekter på barrträdsplanter. Barrträdsplanter får endast behandlas centralt i plantskola, vid maskinell plantering eller vid efterbehandling av planterade planter. Central behandling skall utföras i plantskolor o. dyl. med slutna appliceringsmetod där överskottet av behandlingsvätskan recirkulerar eller med metod som godtas av Kemikalieinspektionen.
J			
Jablo Glyfosat	2L	glyfosat 486 g/l	Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. i samband med skörd genom avstrykning med aggregat kopplat till skördetröska.

Preparat		Aktiv substans	Användningsområde
Jenton	1L	fenpropimorf 375 g/l pyraklostrobin 100 g/l	Mot svampangrepp i odlingar av korn, havre, råg, rågvete och vete. Behandling i korn och havre får inte ske efter blomning. Behandling i vete, råg och rågvete får ej ske senare än 35 dagar före skörd. Användning i stråsäd får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning.
K			
Karate 2,5 WG	2L	lambda-cyhalotrin 2,5 vikt%	Mot skadeinsekter före blomning i odlingar av oljeväxter, åkerböna, majs och klöverfröodlingar. Mot skadeinsekter i odlingar av stråsäd och gräsfrö senast vid begynnande blomning. I odlingar av jordgubbar, kål, potatis, rotgrönsaker, sockerbeter och ärter. Ej för bekämpning av enbart bladlöss, förutom i stråsäd där bladlöss får bekämpas från slutet av axgång fram till begynnande blomning (stadium 59-61). Behandling av ätliga växtdelar får ej ske senare än 14 dagar före skörd, sockerbeter och rotgrönsaker ej senare än 21 dagar, konservärter dock 10 dagar före skörd. Bekämpning av bladlöss får ske i en dos av högst 0,3 kg preparat/ha.
Karate med Zeon teknologi	2L	lambda-cyhalotrin 100 g/l	Mot bitande och sugande insekter i odlingar av: - raps, ryps, senapsfrö, åkerböna, majs och klöverfrö före blomning. - vete, råg, rågvete, korn, havre, vall och gräsfrö senast vid begynnande blomning. - sockerbeter, knipplök, kepalök, vitlök, scharlottenlök, morot, palsternacka, pepparrot, rotpersilja, rödbeta och rotselleri senast 21 dagar före skörd. - potatis, huvudkål, savoykål, blomkål, broccoli, brysselkål, jordgubbar, körsbär, plommon, ärter (torkade) och böna (torkade) senast 14 dagar före skörd. - persilja, gräslök och purjolök senast 7 dagar före skörd. - ärtor (färska med eller utan skida), böna (färska med skida), tomat och gurka (växthus) senast 3 dagar före skörd. - prydnadsväxter (växthus) och plantskolekulturer (växthus och friland).
Kerb FLO 400	2L	propyzamid 400 g/l	Mot ogräs i odlingar av höstraps, höstrybs, sallat (sådd och planterad), äpple, päron, plommon, körsbär, energiskog och prydnadsväxter på friland samt i skogsplanteringar. Behandling av sallat får ej ske senare än 40 dagar före skörd.
Kohinor 70 WG	2L	imidakloprid 70 vikt%	Mot skadeinsekter i odlingar av prydnadsväxter i växthus Mot skadeinsekter i odlingar av tomat, gurka och paprika i växthus genom droppbevattning. Behandling av ätliga växtdelar får ej ske senare än 3 dagar före skörd.
Kumulus	3	svavel 80 vikt%	Mot mjöldagg i odlingar av stråsäd, sockerbeter, prydnadsväxter, frilandsgurka, frukt, jordgubbar, konservärt, morot, palsternacka, kålrot, vinbär och krusbär samt skogsplantskolor. Behandling av morot, palsternacka och kålrot får ej ske senare än 10 dagar före skörd. Behandling av konservärt får ej ske senare än 7 dagar före skörd.
Kvick Down Bio	2L	glyfosat 486 g/l	Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. i samband med skörd genom avstrykning med aggregat kopplat till skördetröska.
L			
Lexus 50 WG	2L	flupyrsulfuronmetylnatrium 50 vikt%	Mot ogräs i höstvete, höstråg och rågvete. Får användas högst en gång per gröda. Behandling får ej ske senare än 45 dagar före skörd.
Logo	2L	foramsulfuron 30 vikt%, jodsulfuronmetyl-natrium 1 vikt%	Mot ogräs i odlingar av julgranar och prydnadsgrönt samt i plantskolor.
M			
Matricon	2L	klopyralid 100 g/l	Mot ogräs i odlingar av oljeväxter, kålväxter, lin, stråsäd, gräsfrö, majs, betor, efter skörd i jordgubbar, i skogsplantskolor och skogsplantering på åker.
Mavrik 2F	2L	tau-fluvalinat 240 g/l	Mot skadeinsekter i odlingar av stråsäd, oljeväxter, potatis och ärtor. Behandling av stråsäd får ej ske senare än 28 dagar före skörd. Behandling av oljeväxter får ej ske senare än 56 dagar före skörd. Behandling av potatis får ej ske senare än 14 dagar före skörd. Behandling av ärt får ej ske senare än: 7 dagar före skörd av färsk ärt, 28 dagar före skörd av torkad ärt. <i>Off label:</i> Preparatet får användas mot skadeinsekter i plantskolor på friland. Dos: 0,075 -0,25 l/ha i 100-1000 l vatten. Högst 2 behandlingar per säsong. Preparatet får användas för bekämpning av klöverspetsvivel i utsädesodlingar av alsike-, röd- och vitklöver. Dos: Högst 0,3 l/ha. Högst 2 behandlingar per säsong.
Maxim 100 FS	2L	fludioxonil 9,3 vikt%	Mot svampsjukdomar i odlingar av potatis genom betning av utsäde. Endast i betningsmaskin, särskilt avsedd för ändamålet.
MCPA 750	2L	MCPA 918,6 g/l	Mot örtogräs i odlingar av stråsäd, potatis, lin för teknisk användning och gräsfrö samt i slätterravall och betesvall på åkermark. Behandling i stråsäd får ske senast vid första nodstadiet (BBCH 31). Betesdjur får inte släppas på betesvall tidigare än 14 dagar efter behandling. Behandling i slätterravall får ske senast 34 dagar före skörd.
Mentor	2L	fenpropimorf 300 g/l, kresoximmetyl 150 g/l	Mot svampangrepp i odlingar av stråsäd före blomning.

Preparat		Aktiv substans	Användningsområde
Merit Forest WG	2L	imidakloprid 70 vikt%	Mot insektsangrepp på obarkt virke. Behandlat virke ska märkas. Mot skadeinsekter på barrträdplanter. Barrträdplanter får endast behandlas centralt i plantskola, vid maskinell plantering eller vid efterbehandling av planterade planter. Central behandling skall utföras i plantskolor o. dyl. med sluten appliceringsmetod där överskottet av behandlingsvätskan recirkulerar eller med metod som godtas av Kemikalieinspektionen. Barrotsplanter skall rinna av före säckning. Tillse att fåglar inte utsätts för medlet.
Merit Turf	2L	imidakloprid 0,5 vikt%	Mot larver av trädgårdsborre och harkrank på golfbanor och idrottsanläggningar belagda med gräs. Efter spridning måste produkten vattnas ner med 5-10 mm vatten.
Mesuro 500 SC	1L	metiokarb 500 g/l	Mot skadeinsekter i odlingar av majs och sockerbetor genom betning av utsäde. Mot skadeinsekter i odlingar av prydnadsväxter.
Mesuro snigelgift	2L	metiokarb 4 vikt%	Får endast användas i yrkesmässig odling. Mot sniglar i odlingar av köksväxter före plantering eller uppkomst samt i stråsäd och oljeväxter senast vid 4-5 bladstadiet. Mot sniglar och örönvilar i odlingar av jordgubbar före blomning eller efter skörd. Mot gräsuggor i odlingar av rosor. Mot sniglar i odlingar av icke ätliga plantskoleväxter. Medlet bör läggas ut så att husdjur inte kan komma åt det.
Moddus 250 EC	2L	trinexapak 250 g/l	För stråförlängning i odlingar av råg. Behandlingen får ej ske senare än i flaggbladstadiet. För stråförlängning i odlingar av timotej och rödsvingel för utsäde. <i>Off-label:</i> Preparatet får användas som stråförlängning i utsädesodlingar av frögräs.
Mogeton WP	2L	kvinoklamin 25 vikt%	Mot levermossa i plantskolor.
Monceren FS 250	2L	pencycuron 250 g/l	Mot svampangrepp i odlingar av potatis genom betning av utsäde i samband med sättning eller utsortering från lagerhus. Behandling får ej ske senare än 63 dagar före skörd.
Monitor	2L	sulfosulfuron 80 vikt%	Mot ogräs i odlingar av vete och rågvete. Endast för vårbehandling.
Mospilan SG	2L	acetamiprid 20 vikt%	Mot skadeinsekter i odlingar av äpple, päron, körsbär, raps, rybs, sallat på friland samt i prydnadsväxter. Behandling får ej ske senare än 14 dagar före skörd av äpple, päron, körsbär och sallat. Behandling av raps och rybs får ej ske efter blomning. <i>Off-label:</i> Preparatet får användas mot skadeinsekter i odlingar av gurka i växthus. Dos: 0,25 - 0,50 kg Mospilan SG/ha. Högst 3 behandlingar/år. Karenstid: 3 dagar.
N			
Nimbus CS	2L	metazaklor 250 g/l, klomazon 33 g/l	Mot ogräs i odlingar av raps, rybs och fodermärgkål. Behandling får inte ske senare än 3 dagar efter sådd.
Nissorun	1L	hexytiazox 10 vikt%	Mot spinnkvalster i odlingar av frukt, växthusgurka och tomat samt efter skörd i odlingar av jordgubbar. Behandling av växthusgurka och tomat får endast ske i samband med biologisk bekämpning. Högsta tillåtna dos 1 kg preparat/ha och behandling i odlingar av frukt, växthusgurka och tomat. Behandling i odlingar av frukt får högst ske en gång efter blomning och ej senare än 30 dagar före skörd. Behandling av växthusgurka och tomat får högst ske 2 gånger och ej senare än 3 dagar före skörd. <i>Off-label:</i> Preparatet får användas för bekämpning av spinnkvalster i plantskolor och odlingar av prydnadsväxter. Dos Prydnadsväxter: 0,05%-ig lösning och högst 2 behandlingar per säsong. Dos Plantskola: 1 kg Nissorun/ha och högst 2 behandlingar per säsong.
Nufarm MCPA 750	2L	MCPA 918,6 g/l	Mot örtogräs i odlingar av stråsäd, potatis och gräsfrö samt i slättervall och betesvall på åkermark. Mot örtogräs i odlingar av lin. Behandling i stråsäd får ske senast vid första nodstadiet (BBCH 31). Betesdjur får inte släppas på betesvall tidigare än 14 dagar efter behandling. Behandling i slättervall får ske senast 34 dagar före skörd. Behandlade skördeprodukter av oljelin får inte användas till livsmedelsändamål.
O			
Optica Diklorprop 600	2L	diklorprop-P 600 g/l	Mot örtogräs i odlingar av stråsäd och gräsfrö samt i slättervall och betesvall på åkermark. Släpp inte mjölkkor på betesvall tidigare än 14 dagar efter behandling.
Optica Mekoprop	2L	mekoprop-P 600 g/l	Mot örtogräs i odlingar av stråsäd och gräsfrö samt i slättervall och betesvall på åkermark. Släpp inte mjölkkor på betesvall tidigare än 14 dagar efter behandling. <i>För sista användningsdag, se sid 22.</i>
Optica Trio	2L	diklorprop-P 369 g/l, MCPA 196 g/l, mekoprop-P 157 g/l	Mot örtogräs i odlingar av stråsäd och gräsfrö samt i slättervall och betesvall på åkermark. Behandling i stråsäd får ske senast vid 2-nodstadiet (BBCH 32). Betesdjur får inte släppas på betesvall tidigare än 14 dagar efter behandling. Behandling i slättervall får ske senast 34 dagar före skörd.

Preparat		Aktiv substans	Användningsområde
P			
Perstorp Ogräsättika	2L	ättiksyra 250 g/l	Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar.
Pirimor	1L	pirimikarb 50 vikt%	Mot bladlöss i odlingar av lantbruksgrödor, frukt, jordgubbar, grönsaker, prydnadsväxter samt i plantskolor. I växthus, endast på prydnadsväxter. Behandling av ätliga växtdelar får ej ske senare än 14 dagar före skörd, med undantag för följande grödor som har 7 dagars karenstid: dill, sallat, spenat samt ärtor och bönor där baljorna inte förtäres.
Platform 40 WG	2L	karfentrazonetyl 40 vikt%	Mot ogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre. Endast vårbehandling.
Platform 50 WG	2L	karfentrazonetyl 50 vikt%	Mot ogräs i odlingar av vete, råg, havre, korn och rågvete. Endast vårbehandling.
Plenum 50 WG	2L	pymetrozin 50 vikt%	Mot skadeinsekter i odlingar av prydnadsväxter i växthus
Prestige FS 370	2L	pencykuron 21,9 vikt%, imidaklopid 10,5 vikt%	Mot svampsjukdomar samt mot skadeinsekter i odlingar av potatis genom betning av utsäde i samband med sättnings eller utsortering från lagerhus. Behandling får ej ske senare än 100 dagar före skörd.
Previcur N	2L	propamokarb 722 g/l	Mot svampangrepp i odlingar av gurka, tomat, sallat och prydnadsväxter. Behandling av ätliga växter får ej ske senare än 21 dagar före skörd.
Primus	2L	florasulam 50 g/l	Mot örtogräs i odlingar av stråsäd och gräsfrö samt i slåttervall och betesvall på åkermark. Behandling av stråsäd får ej ske senare än vid begynnande axgång. Betesdjur får ej släppas på behandlad betesmark tidigare än 7 dagar efter behandling.
Proline EC 250	2L	protiokonazol 258 g/l	Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn. Får användas högst 2 gånger per gröda. Behandling i korn får ej ske senare än 45 dagar före skörd. Behandling i vete, råg och rågvete får ej ske senare än 35 dagar före skörd.
Proplant	2L	propamokarb 722 g/l	Mot svampangrepp i odlingar av gurka, tomat, sallat och prydnadsväxter. Behandling av ätliga växter får ej ske senare än 21 dagar före skörd.
Pyramin DF	2L	kloridazon 65 vikt%	Mot ogräs i odlingar av sockerbetor, rödbetor, kepalök och spenat.
R			
Ranman	2L	cyazofamid 400 g/l	Mot svampangrepp i odlingar av potatis. Behandling får ej ske senare än 7 dagar före skörd. <i>Off-label:</i> Preparatet får användas för bekämpning av svampangrepp i odlingar av frilandsgurka. Dos: 0,2 l/ha. Högst 6 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Karenstid: 3 dagar.
Raptol	2L	rapsolja, raffinerad 825 g/l, pyretriner 4,59 g/l	Mot insekter på rumsväxter, trädgårds- och lantbruksgrödor.
Reglone	1L	dikvat dibromidsalt 374 g/l	För nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av potatis, i odlingar av jordgubbar endast efter bärsköörden, i utsädesodlingar av baljväxter och sockerbetor samt vid ojämn mognad i odlingar av raps, rybs, lin och foderärt. Mot ogräs i odlingar av grönsaker senast före uppkomst. I odlingar av gräslök, körvel, persilja, rabarber och sparris får dock behandling även ske efter uppkomst men då endast med avskärmas spruta. Mot ogräs i odlingar av äpple, päron, plommon, körsbär, vinbär, jordgubbar, hallon, krusbär och björnbär senast före blomning och endast med avskärmas spruta. Mot ogräs i odlingar av potatis, vallmo och i klöverfrövallar. Behandling i odlingar av potatis och lin får ej ske senare än 10 dagar före skörd, i oljeväxter och foderärt ej senare än 7 dagar före skörd och i vallmo senast vid 4-6-bladstadiet. <i>Off-label:</i> Preparatet får användas mot bekämpning av ogräs i plantskolor. Högst: 1 behandling per säsong. Dos: max 2,5 l Reglone per ha.
Revus	2L	mandipropamid 250 g/l	Mot svampsjukdomar i odlingar av potatis och sallat på friland samt tomat i växthus. Behandling i potatis får inte ske senare än 3 dagar före skörd Behandling i sallat får inte ske senare än 7 dagar före skörd. Behandling i tomat får inte ske senare än 3 dagar före skörd.
Ridomil Gold MZ Pepite	1L	mankozeb 64 vikt%, metalaxyl-M 3,88 vikt%	Mot svampangrepp i odlingar av potatis. Behandling får ej ske senare än 30 dagar före skörd.
Rizolex 50 FW	2L	tolklofosmetyl 500 g/l	Mot svampangrepp i odlingar av potatis genom betning av utsäde i samband med sättnings eller utsortering från lagerhus. Mot utvintringssvampar i odlingar av höstsäd.
Roundup	2L	glyfosat 486 g/l	Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. i samband med skörd genom avstrykning med aggregat kopplat till skördetröska.
Roundup Bio	2L	glyfosat 486 g/l	Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av oljeväxter, 3. i samband med skörd genom avstrykning med aggregat kopplat till skördetröska.
Roundup Max	2L	glyfosat 74,7 vikt%	Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i lantbruksgrödor avsedda för livsmedel och foder dock endast för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av oljeväxter.

Preparat		Aktiv substans	Användningsområde
Rovral 500 A	2L	ipridion 500 g/l	Mot svampsjukdomar i odlingar av oljeväxter, kål, örter, bönor, sockerbetor och lök genom betning av utsäde. Mot svampangrepp i odlingar av potatis genom betning av utsäde.
Roxion 40 EC	2L	dimetoat 400 g/l	Mot skadeinsekter i odlingar av sockerbetor, brysselkål, blomkål, isbergssallat och körsbär. Behandling får ej ske senare än 21 dagar före skörd. Kål dock senast 28 dagar före skörd. <i>Off label:</i> Preparatet får användas mot svärbekämpade insekter i plantskolor, både i växthus och på friland. Dos: 0,1 - 0,15%-ig lösning. Produkten får inte användas på eller i närheten av blommande växter. Produkten får endast användas på icke ätliga växter/växtdelar.
S			
Safari 50 DF	2L	triflusaluronmetyl 50 vikt%	Mot ogräs i odlingar av sockerbetor och foderbetor.
Scala	2L	pyrimetanil 400 g/l	Mot svampsjukdomar i blomsterlök samt i odlingar av prydnadsväxter, äpple, päron och jordgubbar. Behandling av äpple och päron får ej ske senare än 28 dagar före skörd. Behandling i jordgubbar får ej ske senare än 7 dagar före skörd. <i>Off label:</i> Preparatet får användas för bekämpning av svampsjukdomar i yrkesmässiga odlingar av tomater i växthus. Dos: 0,1-0,15%-ig lösning. Högst 2 behandlingar. Karenstid: 3 dagar.
Select	2L	kletodim 240 g/l	Mot gräsogräs i odlingar av jordgubbar, lin för teknisk användning och betor, klöver, potatis, morötter, kepalök, raps, rybs, rödsvingel, örter samt i plantskolor och skogsplanteringar. Behandling av jordgubbar och kepalök får ej ske senare än 40 dagar före skörd och morötter inte senare än 60 dagar före skörd. Behandling av betor och potatis får ej ske senare än 60 respektive 35 dagar före skörd, örter före 2-nodstadiet samt lin, raps och rybs före blomning. Höstbehandling av klöver, raps och rybs får ej ske senare än 1 november.
Sencor	2L	metribuzin 70 vikt%	Mot ogräs i odlingar av potatis och morötter. I färskpotatis sorter endast för utsäde.
Shirlan	2L	fluazinam 500 g/l	Mot svampangrepp i odlingar av potatis och kepalök. Behandling i potatis får ej ske senare än 7 dagar före skörd och i kepalök ej senare än 28 dagar före skörd.
Signum	2L	boskalid 26,7 vikt%, pyraklostrobin 6,7 vikt%	Mot svampangrepp i odlingar av morot, palsternacka, vitkål, rödkål, savoykål, brysselkål, blomkål, broccoli och persiljerot. Behandling av morötter, palsternackor, vitkål, rödkål, savoykål, brysselkål, blomkål, broccoli och persiljerot får inte ske senare än 14 dagar före skörd. Mot svampangrepp i odlingar av sallat och rucola. Behandling av sallat och rucola får inte ske senare än 7 dagar före skörd. Mot svampangrepp i odlingar av plommon och körsbär. Behandling av plommon och körsbär får inte ske senare än 3 dagar före skörd. Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar. I jordgubbsodling får behandling endast ske med bandspruta. Behandling av jordgubbar får ej ske senare än 3 dagar före skörd. Mot svampangrepp i odlingar av ärtor och bönor. Behandling av ärtor och bönor får inte ske senare än: 14 dagar före skörd av färska ärtor utan skida, 21 dagar före skörd av torkade ärtor och bönor. Mot svampangrepp i odlingar av potatis. Behandling av potatis får ej ske senare än 3 dagar före skörd. <i>Off label:</i> Preparatet får användas mot svampsjukdomar i utsädesodlingar av spenatfrö. Dos: 0,5 l/ha Högst 4 behandlingar per säsong. Preparatet får användas mot svampsjukdomar i odlingar av prydnadsväxter i växthus.
Spin Out 300	2L	kopparhydroxid 323 g/l	För tillväxtreglering av skogsplanter odlade i odlingskärl. Endast för maskinell behandling.
Sportak EW	1L	prokloraz 450 g/l	Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn före axgång. Mot svampangrepp i odlingar av raps och rybs före full blom. <i>Off label:</i> Preparatet får användas för bekämpning mot svampsjukdomar på greener. Dos: 1,0-1,5 l/ha. Högst 3 behandlingar per år.
Spotlight 24 EC	2L	karfentrazonetyl 241 g/l	Mot ogräs i potatisodlingar. För bladdödning av potatis. Behandling får ej ske senare än 7 dagar före skörd.
Spotlight Plus	2L	karfentrazonetyl 60 g/l	Mot ogräs i potatisodlingar. För bladdödning av potatis. Behandling får ej ske senare än 7 dagar före skörd. Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 50%.
Starane 180	2L	fluroxipyr-1-metylheptylester 259,4 g/l	Mot örtogräs i odlingar av stråsäd, fodermjäs, gräsfrövall, betesvallar och slåttervallar samt på gräsmattor. Betesdjur får ej släppas på behandlad betesmark tidigare än 7 dagar efter behandling. Vall får tidigast skördas 7 dagar efter behandling.
Starane XL	2L	fluroxipyr-1-metylheptylester 144,1 g/l, florasulam 2,5 g/l	Mot örtogräs i odlingar av stråsäd, gräsfrövall, betesvall och slåttervall. Endast för vårbehandling. Betesdjur får ej släppas på behandlad betesmark tidigare än 7 dagar efter behandling. Vall får tidigast skördas 7 dagar efter behandling.
Stereo 312.5 EC	2L	cyprodinil 250 g/l, propikonazol 63 g/l	Mot svampsjukdomar i odlingar av vete, råg, rågvete och korn före axgång.

Preparat		Aktiv substans	Användningsområde
Stomp SC	2L	pendimetalin 400 g/l	Mot ogräs i odlingar av lök, morötter och bruna bönor. <i>Off label:</i> Preparatet får användas för bekämpning av ogräs i odlingar av palsternacka. Dos: högst 5 l Stomp totalt/ha. Efter uppkomst: högst 2,5 liter/ha, som får fördelas på flera givor. Behandling får inte ske senare än då två örtblad finns.
Stratego EC 250	2L	propikonazol 125 g/l, trifloxystrobin 125 g/l	Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn. Behandling i stråsäd får ej ske senare än vid begynnande blomning.
Sumi-alpha 5 FW	2L	esfenvalerat 50 g/l	Mot skadeinsekter i odlingar av raps, rybs, lin och senap före blomning. Mot skadeinsekter i odlingar av korn, havre, vete, råg och rågvete senast vid begynnande blomning. Mot skadeinsekter i odlingar av potatis, majs, sockermajs, sockerbetor, foderbetor, rödbetor, ärtor (ej färska ärtor med skida), blomkål, broccoli, vitkål, rödkål, savoykål och spetskål på friland. Mot skadeinsekter i odlingar av gräsfrö, gräsmattor och på golfbanor. Mot skadeinsekter i tomma växt- och champinjonhus genom spridning med dimgenerator. Ej för bekämpning av enbart bladlöss, förutom i stråsäd där bladlöss får bekämpas från slutet av axgång fram till begynnande blomning (stadium 59-61) i en dos av högst 0,25 l/ha. Behandling av majs, sockermajs, sockerbetor, foderbetor och rödbetor får ej ske senare än 60 dagar före skörd, färska ärtor 14 dagar före skörd, torkade ärtor 30 dagar före skörd, samt potatis, blomkål, broccoli, vitkål, rödkål, savoykål och spetskål 7 dagar före skörd.
Svavelkalkvätska 30 Be ⁰	1L	kalciumpolysulfid 190 g/l	För kartgallring i odlingar av plommon. Mot svamp och kvalster i odlingar av frukt och bär. Behandling får inte ske senare än under blomning.
Switch 62,5 WG	2L	cyprodinil 37,5 vikt%, fludioxonil 25 vikt%	Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar. Behandling får ej ske senare än 10 dagar före skörd. Behandling får endast ske med bandspruta.
T			
Tandus 180	2L	fluroxipyr-1-heptylmetylerster 259,4 g/l	Mot örtogräs i odlingar av stråsäd, fodermajs, gräsfrövall, betesvallar och slåttervallar samt på gräsmattor. Betesdjur får ej släppas på behandlad betesmark tidigare än 7 dagar efter behandling. Vall får tidigast sköras 7 dagar efter behandling.
Tanos 50 WG	2L	famoxadon 25 vikt%, cymoxanil 25 vikt%	Mot svampangrepp i odlingar av potatis. Behandling får ej ske senare än 14 dagar före skörd.
Tattoo	1L	mankozeb 302 g/l, propamokarb 248 g/l	Mot svampangrepp i odlingar av potatis. Behandling får ej ske senare än 30 dagar före skörd. Får ej användas för behandling av ätliga växtdelar.
Teldor WG 50	2L	fenhexamid 50 vikt%	Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar, plommon, körsbär, hallon, vinbär och tomat. Behandling får ej ske senare än 3 dagar före skörd av tomat och för övriga växtslag 7 dagar före skörd. <i>Off label:</i> preparatet får användas för bekämpning av gråmögel i skogsplantskolor. Högsta tillåtna dos är 750 g aktiv substans per ha (1,5 kg medel per ha). Medlet får appliceras högst tre gånger per säsong. Preparatet får användas för bekämpning av gråmögel i vinodlingar på friland. Dos: 0,1%-ig lösning, högst 1500 l/ha. 1 behandling vid begynnande mognad. Karenstid: 21 dagar.
Tern 750 EC	2L	fenpropidin 750 g/l	Mot svampangrepp i odlingar av stråsäd före blomning.
Terpal (II)	2L	mepikvatklorid 305 g/l, etefon 155 g/l	För stråförkortning i odlingar av höstråg. Behandlingen får ej ske senare än vid begynnande axgång.
Tilt 250 EC	2L	propikonazol 250 g/l	Mot svampangrepp i odlingar av stråsäd före blomning och i skogsplantskolor.
Tilt Top 500 EC	2L	fenpropimorf 375 g/l, propikonazol 125 g/l	Mot svampangrepp i odlingar av stråsäd före blomning och gräsfrö.
Titus WSB	2L	rimsulfuron 25 vikt%	Mot ogräs i odlingar av potatis och fodermajs. <i>Off label:</i> Preparatet får användas mot ogräs i odlingar av nordmannsgran. Dos: högst 30 g/ha. Preparatet får användas mot ogräs i skogsplantskolor. Dos: högst 50 g produkt/ha och år. Högst två behandlingar.
Tomahawk 180 EC	2L	fluroxypyr-1-metylheptylerster 259,4 g/l	Mot örtogräs i odlingar av stråsäd, fodermajs, gräsfrövall, betesvallar och slåttervallar samt på gräsmattor. Betesdjur får ej släppas på behandlad betesmark tidigare än 7 dagar efter behandling. Vall får tidigast sköras 7 dagar efter behandling. <i>Off label:</i> Preparatet får användas för bekämpning av örtogräs i utsädesodlingar av rådisfrö. Dos: 0,5 l/ha i 150-200 l vatten. Högst 3 behandlingar per säsong. Preparatet får användas mot ogräs på banvallar. Dos: 1,5-2,0 l/ha. Produkten får inte användas i anslutning till sjöar och vattendrag.
Topas 100 EC	2L	penkonazol 100 g/l	Mot svampangrepp i odlingar av äpple, päron och prydnadsväxter. Mot svampangrepp i jordgubbsplanter efter skörd. Behandling av fruktträd får ej ske senare än 21 dagar före skörd.
Topflor	2L	flurprimidol 14,7 g/l	För tillväxtreglering av prydnadsväxter. <i>För sista användningsdag, se sid 22.</i>
Topsin WG	1L	tiofanatmetyl 70 vikt%	Mot svampsjukdomar i odlingar av höstsäd, prydnadsväxter och i gräsmattor. Mot markburna svampsjukdomar i samband med sådd och plantering av prydnadsväxter genom jordbehandling. Behandling av höstsäd får ske senast i 2-nodstadiet.

Preparat		Aktiv substans	Användningsområde
Totril	1L	ioxinil 301,5 g/l	Mot ogräs i odling av kepalök. Behandling får ej ske senare än 60 dagar före skörd.
Touchdown Premium	2L	glyfosat 396 g/l	Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av oljeväxter, 3. i samband med skörd genom avstrykning med aggregat kopplat till skördetröska.
U			
Unix 75 WG	2L	cyprodinil 75 vikt%	Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn före axgång.
V/W			
Warrant 700 WG	2L	imidakloprid 70 vikt%	Mot skadeinsekter i odlingar av prydnadsväxter i växthus Mot skadeinsekter i odlingar av tomat, gurka och paprika i växthus genom droppbevattning. Behandling av ätliga växtdelar får ej ske senare än 3 dagar före skörd. <i>Off label:</i> Preparatet får användas mot bladlöss vid plantupptragning i växthus av sallat och sallatskål.
Verdys	2L	glyfosat 486 g/l	Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av oljeväxter, 3. i samband med skörd genom avstrykning med aggregat kopplat till skördetröska.
Vertimec	2L	abamectin 18 g/l	Mot skadeinsekter och kvalster på prydnadsväxter. Mot kvalster i odlingar av jordgubbar på friland. Behandling av jordgubbar får ej ske senare än 10 dagar före skörd. Mot skadeinsekter i odlingar av äpple och päron. Behandling av äpple och päron får ej ske senare än 28 dagar före skörd. Medlet får inte blandas med olja vid behandling av ätliga växtdelar. Mot skadeinsekter i odlingar av tomat och gurka i växthus. Behandling av tomat och gurka får ej ske senare än 10 dagar före skörd.

Aktiv substans A-Ö

Aktiv substans	Preparat
A	
abamectin 18 g/l	Vertimec
acetamiprid 20 vikt%	Mospilan SG
aklonifen 600 g/l	Fenix
alfacypermetrin 50 g/l	Fastac 50
amidosulfuron 12,5 vikt%, jodsulfuronmetyl-natrium 1,25 vikt%	Chekker
amidosulfuron 75 vikt%	Eagle WG
amidosulfuron 75 vikt%	Gratil 75 WG
azadiraktin 0,3 vikt%	Bionim
azoxystrobin 250 g/l	Amistar
B	
bentazon 273 g/l, MCPA 89 g/l	Basagran M75
bentazon 95 vikt%	Basagran SG
betacyflutrin 2,5 vikt%	Beta-Baythroid SC 025
bifenazat 240 g/l	Floramite 240 SC
bifenox 480 g/l	Fox 480 SC
bitertanol 25 vikt%	Baycor 25 WP
boskalid 26,7 vikt%, pyraklostrobin 6,7 vikt%	Signum
C	
cyazofamid 400 g/l	Ranman
cykloxidim 100 g/l	Focus Ultra
cymoxanil 25 vikt%, famoxadon 25 vikt%	Tanos 50 WG
cypermetrin 100 g/l	Forester
cypermetrin 107,3 g/l	Cyperb
cyprodinil 250 g/l, propikonazol 63 g/l	Stereo 312.5 EC
cyprodinil 30 vikt%, pikoxystrobin 8 vikt%	Acanto Prima
cyprodinil 37,5 vikt%, fludioxonil 25 vikt%	Switch 62,5 WG
cyprodinil 75 vikt%	Unix 75 WG
D	
daminozid 86 vikt%	Alar 85 SG
dazomet 97 vikt%	Basamid Granulat

Aktiv substans	Preparat
deltametrin 25 g/l	Decis
desmedifam 160 g/l, fenmedifam 160 g/l	Betanal Power
diflubensuron 480 g/l	DU-DIM 48 SC
diflufenikan 100 g/l, flurtamon 250 g/l	Bacara
diflufenikan 100 g/l, isoproturon 500 g/l	Cougar
diklorprop-P 369 g/l, MCPA 196 g/l, mekoprop-P 157 g/l	Optica Trio
diklorprop-P 369,5 g/l, MCPA 196 g/l, mekoprop-P 157,3 g/l	Duplosan Super
diklorprop-P 600 g/l	Optica Diklorprop 600
diklorprop-P 715 g/l	Duplosan DP
dikvat dibromidsalt 374 g/l	Reglone
dimetoat 400 g/l	Danadim Progress
dimetoat 400 g/l	Roxion 40 EC
dimetomorf 9 vikt%, mancozeb 60 vikt%	Acrobat WG
ditianon 70 vikt%	Delan WG
E	
esfenvalerat 50 g/l	Sumi-alpha 5 FW
etefon 155 g/l, mepikvatklorid 305 g/l	Terpal (II)
etefon 480 g/l	Cerone
etofumesat 6,5 vikt%, metamitron 28 vikt%, fenmedifam 6,5 vikt%	Goltix Trippel WG
F	
famoxadon 25 vikt%, cymoxanil 25 vikt%	Tanos 50 WG
fenhexamid 50 vikt%	Teldor WG 50
fenmedifam 160 g/l	Betanal SC
fenmedifam 160 g/l	Betasana 2000
fenmedifam 160 g/l, desmedifam 160 g/l	Betanal Power
fenmedifam 6,5 vikt%, metamitron 28 vikt%, etofumesat 6,5 vikt%	Goltix Trippel WG
fenoxaprop-P 69 g/l	Event Super
fenpropidin 750 g/l	Tern 750 EC
fenpropimorf 300 g/l, kresoximmetyl 150 g/l	Mentor
fenpropimorf 375 g/l, pyraklostrobin 100 g/l	Jenton
fenpropimorf 375 g/l, propikonazol 125 g/l	Tilt Top 500 EC

Aktiv substans	Preparat
fenpropimorf 750 g/l	BASF Forbel 750
fenpropimorf 750 g/l	Forbel 750 EC
fenpyroximat 5,2 vikt%	Danitron 5 SC
florasulam 2,5 g/l, fluroxipyr-1-metylheptylester 144,1 g/l	Starane XL
florasulam 50 g/l	Primus
fluazinam 400 g/l, metalaxyl-M 200g/l	Epok 600 EC
fluazinam 500 g/l	Shirlan
fludioxonil 25 vikt%, cyprodinil 37,5 vikt%	Switch 62,5 WG
fludioxonil 9,3 vikt%	Maxim 100 FS
flupyrsulfuronmetylnatrium 50 vikt%	Lexus 50 WG
fluroxipyr-1-heptylmetylester 259,4 g/l	Tandus 180
fluroxipyr-1-metylheptylester 144,1 g/l, florasulam 2,5 g/l	Starane XL
fluroxipyr-1-metylheptylester 259,4 g/l	Starane 180
fluroxipyr-1-metylheptylester 58 g/l, MCPA 238 g/l, klopyralid 20 g/l	Ariane S
fluroxipyr-1- metylheptylester 259,4 g/l	Floxy
fluroxipyr-1- metylheptylester 259,4 g/l	Tomahawk 180 EC
flurprimidol 14,7 g/l	Topflor
flurtamon 250 g/l, diflufenikan 100 g/l	Bacara
foramsulfuron 30 vikt%, jodsulfuronmetyl-natrium 1 vikt%	Logo
fosetylaluminium 80 vikt%	Aliette 80 WG
G	
glufosatommonium 200 g/l	Basta
glyfosat 396 g/l	Touchdown Premium
glyfosat 486 g/l	Barclay Gallup 360
glyfosat 486 g/l	Barclay Gallup Biograde 360
glyfosat 486 g/l	Clinic
glyfosat 486 g/l	Glyfonova 360 SL
glyfosat 486 g/l	Glyfonova Bio
glyfosat 486 g/l	Glyphogan 480 SL
glyfosat 486 g/l	Glyphomax

Aktiv substans	Preparat
glyfosat 486 g/l	Glyphomax Bio
glyfosat 486 g/l	Glypro Bio
glyfosat 486 g/l	Jablo Glyfosat
glyfosat 486 g/l	Kvick Down Bio
glyfosat 486 g/l	Roundup
glyfosat 486 g/l	Roundup Bio
glyfosat 486 g/l	Verdys
glyfosat 607 g/l	Envision
glyfosat 661 g/l	Barclay Gallup Hi- Aktiv 360
glyfosat 74,7 vikt%	Roundup Max
H	
hexytiazox 10 vikt%	Nissorun
I	
imazalilsulfat 133,5 g/l	Fungazil 100
imidaklopid 0,5 vikt%	Merit Turf
imidaklopid 10,5 vikt%, pencykuron 21,9 vikt%	Prestige FS 370
imidaklopid 70 vikt%	Confidor WG 70
imidaklopid 70 vikt%	Kohinor 70 WG
imidaklopid 70 vikt%	Warrant 700 WG
imidaklopid 70 vikt%	Merit Forest WG
ioxinil 301,5 g/l	Totril
ipridion 500 g/l	Rovral 500 A
isoproturon 500 g/l, diflufenikan 100 g/l	Cougar
isoxaben 500 g/l	Gallery
J	
jodsulfuronmetyl-natrium 1 vikt%, foramsulfuron 30 vikt%	Logo
jodsulfuronmetyl-natrium 1,25 vikt%, amidosulfuron 12,5 vikt%	Chekker
jodsulfuronmetyl-natrium 100 g/l	Hussar OD
jodsulfuronmetyl-natrium 2 g/l, mesosulfuronmetyl 10 g/l	Atlantis OD
jodsulfuronmetyl-natrium 5 vikt%	Hussar
K	
kalciumpolysulfid 190 g/l	Svavelkalkvätska 30 Be ⁰
karfentrazonetyl 241 g/l	Spotlight 24 EC

Aktiv substans	Preparat
karfentrazonetyl 40 vikt%	Platform 40 WG
karfentrazonetyl 40 vikt%, metsulfuronmetyl 10 vikt%	Ally Class 50 WG
karfentrazonetyl 50 vikt%	Platform 50 WG
karfentrazonetyl 60 g/l	Spotlight Plus
kletodim 240 g/l	Select
klofentezin 500 g/l	Apollo 50 SC
klomazon 33 g/l, metazaklor 250 g/l	Nimbus CS
klomazon 360 g/l	Centium 36 CS
klopyralid 100 g/l	Cliophar 100 SL
klopyralid 100 g/l	Matrigon
klopyralid 20 g/l, MCPA 238 g/l, fluroxipyr-1-metylheptylester 58 g/l	Ariane S
kloridazon 360 g/l, kvinmerak 60 g/l	Fiesta T
kloridazon 65 vikt%	Pyramin DF
klormekvatklorid 460 g/l	BASF Cycocel Plus
kopparhydroxid 323 g/l	Spin Out 300
kresoximmetyl 150 g/l, fenpropimorf 300 g/l	Mentor
kresoximmetyl 50 vikt%	Candit
kvinmerak 125 g/l metazaklor 375 g/l,	Butisan Top
kvinmerak 60 g/l, kloridazon 360 g/l	Fiesta T
kvinoklamin 25 vikt%	Mogeton WP
L	
lambda-cyhalotrin 100 g/l	Hylobi Forest
lambda-cyhalotrin 100 g/l	Karate med Zeon teknologi
lambda-cyhalotrin 2,5 vikt%	Karate 2,5 WG
M	
maleinhydrazid 81 vikt%	Fazor
mancozeb 60 vikt%, dimetomorf 9 vikt%	Acrobat WG
mandipropamid 250 g/l	Revus
mankozebe 302 g/l, propamokarb 248 g/l	Tattoo
mankozebe 64 vikt%, metalaxyl-M 3,88 vikt%	Ridomil Gold MZ Pepite
mankozebe 66,7 vikt%, zoxamid 8,3 vikt%	Electis

Aktiv substans	Preparat
MCPA 196 g/l, diklorprop-P 369,5 g/l, mekoprop-P 157,3 g/l	Duplosan Super
MCPA 196 g/l, diklorprop-P 369 g/l, mekoprop-P 157 g/l	Optica Trio
MCPA 238 g/l, fluroxipyr-1-metylheptylester 58 g/l, klopyralid 20 g/l	Ariane S
MCPA 89 g/l, bentazon 273 g/l	Basagran M75
MCPA 918 g/l	Hormotex 750
MCPA 918,6 g/l	MCPA 750
MCPA 918,6 g/l	Nufarm MCPA 750
mekoprop-P 157 g/l, diklorprop-P 369 g/l, MCPA 196 g/l	Optica Trio
mekoprop-P 157,3 g/l, diklorprop-P 369,5 g/l, MCPA 196 g/l	Duplosan Super
mekoprop-P 600 g/l	Duplosan Meko
mekoprop-P 600 g/l	Optica Mekoprop
mepanipirim 42 vikt%	Frupica SC
mepikvatklorid 305 g/l, etefon 155 g/l	Terpal (II)
mesosulfuronmetyl 10 g/l, jodsulfuronmetyl-natrium 2 g/l	Atlantis OD
metalaxyl-M 200g/l, fluazinam 400 g/l	Epok 600 EC
metalaxyl-M 3,88 vikt%, mankozebe 64 vikt%	Ridomil Gold MZ Pepite
metamitron 28 vikt%, etofumesat 6,5 vikt%, fenmedifam 6,5 vikt%	Goltix Trippel WG
metamitron 700 g/l	Goliath
metamitron 700 g/l	Goltix SC 700
metamitron 71 vikt%	Goltix WG
metazaklor 375 g/l, kvinmerak 125 g/l	Butisan Top
metazaklor 500 g/l	Butisan S
metiokarb 4 vikt%	Mesurool snigelgift
metiokarb 500 g/l	Mesurool 500 SC
metrafenon 300 g/l	Flexity
metribuzin 70 vikt%	Sencor
metsulfuronmetyl 10 vikt%, karfentrazonetyl 40 vikt%	Ally Class 50 WG
metsulfuronmetyl 50 vikt-%	Ally 50 ST

Aktiv substans	Preparat
P	
pelargonsyra 186,7 g/l	Finalsan Ogräs Effekt koncentrat Proffs
pencycuron 250 g/l	Monceren FS 250
pencykuron 21,9 vikt%, imidaklopid 10,5 vikt%	Prestige FS 370
pendimetalin 400 g/l	Stomp SC
penkonazol 100 g/l	Topas 100 EC
pikoxystrobin 250 g/l	Acanto
pikoxystrobin 8 vikt%, cyprodinil 30 vikt%	Acanto Prima
pirimikarb 50 vikt%	Pirimor
prokloraz 450 g/l	Sportak EW
propamokarb 248 g/l, mankozebe 302 g/l	Tattoo
propamokarb 722 g/l	Previcur N
propamokarb 722 g/l	Proplant
propikonazol 125 g/l, trifloxystrobin 125 g/l	Stratego EC 250
propikonazol 125 g/l, fenpropimorf 375 g/l	Tilt Top 500 EC
propikonazol 250 g/l	Tilt 250 EC
propikonazol 63 g/l, cyprodinil 250 g/l	Stereo 312.5 EC
propoxikarbazonnatrium 70 vikt%	Attribut SG 70
propyzamid 400 g/l	Kerb FLO 400
prosulfokarb 800 g/l	Boxer
protiokonazol 258 g/l	Proline EC 250
pymetrozin 50 vikt%	Plenum 50 WG
pyraklostrobin 100 g/l, fenpropimorf 375 g/l	Jenton
pyraklostrobin 250 g/l	Comet
pyraklostrobin 6,7 vikt%, boskalid 26,7 vikt%	Signum
pyretriner 4,59 g/l, rapsolja, raffinerad 825 g/l	Raptol
pyrimetanol 400 g/l	Scala
pyriproxyfen 100 g/l	Admiral 10 EC
R	
rapsolja, raffinerad 825 g/l, pyretriner 4,59 g/l	Raptol
rimisulfuron 25 vikt%	Titus WSB
S	
spinosad 120 g/l	Conserve
sulfosulfuron 80 vikt%	Monitor

Aktiv substans	Preparat
svavel 80 vikt%	Kumulus
T	
tau-fluvalinat 240 g/l	Mavrik 2F
tepraloxidim 50 g/l	Astrum
tiaklopid 10 vikt%	Exemptor 10 GR
tiaklopid 240 g/l	Biscaya OD 240
tiaklopid 481 g/l	Calypso SC 480
tifensulfuronmetyl 33 vikt%, tribenuronmetyl 17 vikt%	Harmony Plus 50 T
tifensulfuronmetyl 50 vikt%	Harmony 50 SX
tiofanatmetyl 70 vikt%	Topsin WG
tolklofosmetyl 500 g/l	Rizolex 50 FW
tribenuronmetyl 17 vikt%, tifensulfuronmetyl 33 vikt%	Harmony Plus 50 T
tribenuronmetyl 50 vikt%	Express 50 T
trifloxystrobin 125 g/l, propikonazol 125 g/l	Stratego EC 250
triflusulfuronmetyl 50 vikt%	Safari 50 DF
trinexapak 250 g/l	Moddus 250 EC
Z	
zoxamid 8,3 vikt%, mankozebe 66,7 vikt%	Electis
Ä	
ättiksyra 105 g/l	Bio Blast Ogräsättika Y 10%
ättiksyra 250 g/l	Blast & Ogräsättika Y 24%
ättiksyra 250 g/l	Perstorp Ogräsättika

Preparatgrupper

Preparatgrupp	Preparat	Aktiv substans	Används mot	Verkn.sätt
diaziner	Basagran SG/MPCA	bentazon	ogräs	K
diaziner	Fiesta T/ Pyramin DF	kloridazon	ogräs	S
difenyletrar	Fenix	aklonifen	ogräs	K
	Fox 480 EC	bifenox	ogräs	K
fenoxisyror	Nufarm MCPA 750	MCPA	ogräs	S
fenoxisyror	OPTICA diklorprop 600	diklorprop	ogräs	S
fenoxisyror	OPTICA mekoprop	mekoprop	ogräs	S
sulfonylureor	Ally 20 DF	metsulfuronmetyl	ogräs	S
sulfonylureor	Express 50T	tribenuronmetyl	ogräs	S
sulfonylureor	Gratil 75 WG	amidosulfuron	ogräs	S
sulfonylureor	Harmony 75 DF	tifensuronmetyl	ogräs	S
sulfonylureor	Hussar	jodsulfonmetyl-natrium	ogräs	S
sulfonylureor	Lexus	flupyrsulfuronmetylnatrium	ogräs	S
sulfonylureor	Monitor	sulfosulfuron	ogräs	S
sulfonylureor	Safari 50 DF	triflursulfuronmetyl	ogräs	S
sulfonylureor	Titus WSB	rimsulfuron	ogräs	S
triaziner	Sencor	metribuzin	ogräs	S
ureaherbicid	Cougar	isoproturon (+diflufenikan)	ogräs	S (+K)
PPO-hämmare	Spotlight Spotlight Plus	Karfentrazonetyl	ogräs	K
karbamater	Betanal Classic	fenmedifam	ogräs	K
karbamater	Mesuroi	merkaptodimetur	insekter	M
karbamater	Pirimor	pirimikarb	insekter	G, K, T
karbamater	Skipper	tiokarb	insekter	M
neonikotinider	Biscaya	tiaklopid	insekter	S
neonikotinider	Cruiser	tiametoxam	insekter	
neonikotinider	Gaucha, Prestige, Confidor WG 70, Merit Forest WG, Warrant 700WG	imidaklopid	insekter	S
neonikotinider	Montur	imidaklopid (+teflutrin)	insekter	S (+K(G))
neonikotonider	Chinook	imidaklopid (+betacyflutrin)	insekter	S (+K)
neonikotinider	Mospilan	acetamiprid	insekter	S
organisk fosforförening	Danadim Progress, Roxion 40 EC	dimetoat	insekter	K, S
syntetisk pyretroid	Cyperb	cypermetrin	insekter	K, M
syntetisk pyretroid	Decis	deltametrin	insekter	K, M
syntetisk pyretroid	Fastac 50	alfacypermetrin	insekter	K, M
syntetisk pyretroid	Karate	lambda-cyhalotrin	insekter	K, M
syntetisk pyretroid	Mavrik 2F	tau-fluvalinat	insekter	K, M
syntetisk pyretroid	Sumi-alpha 5 FW	esfenvalerat	insekter	K, M

Verkningssätt: G=gasverkande, K=kontaktverkande, LS=lokalsystemiskt, M=magverkande, S=systemiskt, T=translaminärt.

Preparatgrupp	Preparat	Aktiv substans	Används mot	Verkn.sätt
anilinopyrimidiner	Acanto Prima	cyprodinil (+pikoxystrobin)	svamp	S, T
anilinopyrimidiner	Stereo	cyprodinil (+propikonazol)	svamp	S, T (+S)
anilinopyrimidiner	Unix	cyprodinil	svamp	S, T
benzamider	Electis	zoxamid (+mankozebe)	svamp	K (+K)
benzofenoner	Flexity	metrafenon	svamp	S
cyanoacetamid-oxim	Tanos	cymoxanil (+famoxadon)	svamp	T (+K)
cyanoimidazoler	Ranman	cyazofamid	svamp	K
dinitroaniliner	Epok	fluazinam (+mefenoxam)	svamp	K (+S)
dinitroaniliner	Shirlan	fluazinam	svamp	K
ditiokarbamater	Acrobat WG	mankozebe (+dimetomorf)	svamp	K (+T)
ditiokarbamater	Ridomil Gold MZ Pepite	mankozebe (+metalaxyl-M)	svamp	K (+S)
ditiokarbamater	Tattoo	mankozebe (+propamokarb)	svamp	K(+S)
fenylamider	Epok	mefenoxam (+fluazinam)	svamp	S (+K)
fenylamider	Ridomil Gold MZ Pepite	mefenoxam (+mankozebe)	svamp	S (+K)
imidazoler, triazoler	Amistar Duo	propikonazol (+azoxystrobin)	svamp	S (+S, T)
imidazoler, triazoler	Baycor	bitertanol	svamp	S
imidazoler, triazoler	Proline EC 250	protiokonazol	svamp	S
imidazoler, triazoler	Sportak	prokloraz	svamp	K, LS
imidazoler, triazoler	Stereo 321,5	propikonazol (+cypridonil)	svamp	S (+S, T)
imidazoler, triazoler	Stratego EC 250	propikonazol (+trifloxystrobin)	svamp	S (+T)
imidazoler, triazoler	Tilt 250 EC	propikonazol	svamp	S
imidazoler, triazoler	Tilt Top 500 EC	propikonazol (+fenpropimorf)	svamp	S (+S)
karboxylsyraamider	Acrobat WG	dimetomorf (+mankozebe)	svamp	T (+K)
karboxylsyraamider	Revus	mandipropamid	svamp	T+K
MBC-fungicider	Topsin WG	tiofanatmetyl	svamp	S
morfoliner	Forbel	fenpropimorf	svamp	S
morfoliner	Jenton	fenpropimorf (+pyraklostrobin)	svamp	S (+T)
morfoliner	Tern	fenpropidin	svamp	S
morfoliner	Tilt Top	fenpropimorf (+propikonazol)	svamp	S (+S)
strobiluriner	Acanto	pikoxystrobin	svamp	S, T
strobiluriner	Acanto Prima	pikoxystrobin (+cypridonil)	svamp	S, T (+S, T)
strobiluriner	Amistar	azoxystrobin	svamp	S, T
strobiluriner	Amistar Duo	azoxystrobin (+propikonazol)	svamp	S, T (+S)
strobiluriner	Comet	pyraklostrobin	svamp	T
strobiluriner	Jenton	pyraklostrobin (+fenpropimorf)	svamp	T (+S)
strobiluriner	Stratego EC 250	trifloxystrobin (+propikonazol)	svamp	T (+S)
strobiluriner	Tanos	famoxadon (+cymoxamil)	svamp	K (+T)

Verkningssätt: G=gasverkande, K=kontaktverkande, LS=lokalsystemiskt, M=magverkande, S=systemiskt, T=translaminärt.

Preparat vars godkännande har upphört under senare år

Listan upptar endast preparat klass 1L och 2L som använts inom jordbruk och trädgårdsnäring. Betningsmedel är ej upptagna.

Preparat	Medlet får inte saluhållas eller överlåtas efter	Medlet får inte användas efter
Duplosan Meko	2009-05-31	2010-05-31
Optica Mekoprop	2009-05-31	2010-05-31
Topflor	2009-12-31	2010-06-30
Bionim	2009-12-31	2010-06-30
Decis	2009-12-31	2010-12-31
Butisan S	2009-12-31	2010-12-31
Mentor	2009-12-31	2010-12-31
Stomp SC	2009-12-31	2010-12-31
Betasana 2000	2010-02-28	2011-02-28
Totril	2010-02-28	2011-02-28
Betanal SC	2010-02-28	2011-02-28

Euparen M50 WG	2007-02-28	2007-02-28
Bladex 500 SC	2007-06-30	2007-12-31
Birlane Granulat	2007-06-30	2007-12-31
Sumithion NA 50 E	2008-06-30	2008-11-24
Basudin 600 EW	2008-06-30	2008-12-05
Marshal 25 EC	2008-10-31	2008-12-12
Gusathion WP	2007-12-31	2008-12-31
Arelon flytande	2007-12-31	2008-12-31
Astix DP	2008-12-31	2009-12-31
Tramat 50 EC	2008-12-31	2009-12-31
Rovral 75 WG	2008-12-31	2009-12-31
Ecoval No.1 Mot Ogräs koncentrat	2008-12-31	2009-12-31
Chipco Green 75 WG	2008-12-31	2009-12-31

Gråmarkerade preparat får inte längre användas utan ska lämnas till destruktion.

För preparat som gått ut tidigare hänvisas till *Bekämpningsmedelsregistret* på www.kemi.se

