

Klockgentiana i Skåne 2006-2007



Titel:	Klockgentiana i Skåne 2006-2007
Utgiven av:	Länsstyrelsen i Skåne län
Författare:	Alf Porenus och Kjell-Arne Olsson
Beställningsadress:	Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 MALMÖ Tfn: 040-25 20 00 skane@lansstyrelsen.se
Copyright:	Länsstyrelsen i Skåne län. Rapporten får gärna citeras eller refereras med uppgivande av källa. Samtliga fotografier är tagna av författaren.
ISBN:	978-91-86079-51-2
Länsstyrelserapport	2009:7
Layout:	Maria Sandell, Länsstyrelsen i Skåne län
Tryckt:	2009
Omslagsbild:	Klockgentiana. Foto: Alf Porenus

Förord

Åtgärdsprogram för bevarande av klockgentiana och alkonblåvinge ingår i en storsatsning för hotade arter och biotoper som Naturvårdsverket och Länsstyrelserna genomför med syfte att till år 2015 minska andelen hotade arter med 30 %. Genom åtgärdsprogrammen kan riktade åtgärder sättas in mot de arter som har behov av sådana för sin överlevnad, men dessa åtgärder förväntas även gynna många fler arter. Arbetet med åtgärdsprogrammen är därmed ett led i arbetet med att uppnå nationella och regionala miljömål.

Under åren 2006 och 2007 har Lunds botaniska förening, på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län, återinventerat klockgentiana (*Gentiana pneumonanthe*) på alla lokaler som registrerats i den senaste landskapsinventering ”projekt Skånes Flora 1989 - 2005”. Arten förekommer på fuktiga ängar och hedar, samt längs sjö- och åstränder. Många av dessa miljöer har i Skåne försvunnit genom dikning, betas alltför hårt för att få någon frösättning eller så har de inte haft någon skötsel alls. Klockgentiana är dessutom värdväxt för den ännu sällsyntare fjärilsarten alkonblåvinge (*Maculinea alcon*), som i Skåne endast förekommer på två av de tre större klockgentianalokalerna.

Syftet var att få en heltäckande bild över var i landskapet klockgentiana förekommer och hur stora dessa förekomster är. Genom denna överblick kan man se var expansionsmöjligheterna för fjärilen finns. I Skåne förekommer i dagsläget endast tre större lokaler med klockgentiana (Revingehed, Hunnerödsmosse och Skanörs ljun) där de två första hyser de befintliga populationerna med alkonblåvinge. Det finns därmed få möjligheter till spridning av fjärilen i nuläget. Däremot behöver resurser sättas in för att återuppta och/eller anpassa skötsel för att gynna klockgentiana och säkra artens långsiktiga fortlevnad i Skåne, samt att även ge en framtida grund för att bevara alkonblåvinge.

Malmö januari 2009

Gabrielle Rosquist

Nationell koordinator för åtgärdsprogram för hotade arter

Innehållsförteckning


Förord	3
Uppdrag och genomförande	5
Resultat	6
Hot.....	7
 Redogörelse för de enskilda lokalerna.....	 8
Skanörs ljun, Vellinge kommun	8
Hunneröds mosse, Svedala kommun.....	13
Önneslövs fälad, Lunds kommun	15
Skrylle, Lunds kommun	16
Rögle fälad, Lunds kommun.....	17
Måryds fälad, Lunds kommun	18
Kungsmarken, Lunds kommun.....	19
Vaselund, Lunds kommun	19
Bosarp, Sjöbo kommun	20
Flygrakancaféet, Sjöbo kommun	21
Kråkebacken, Svalöv kommun	21
Svenstorps–Bolshus fälad, Svalövs kommun.....	22
Konga, Svalövs kommun.....	22
Farhult, Höganäs kommun	22
Hjälmsjön, Örkelljunga kommun.....	23
Lilla sjö, Hässleholms kommun	25
Höjalsjön, Hässleholms kommun	26
Gängessjön, Hässleholms kommun	27
Vittsjön, Hässleholms kommun	27
Vieån, Hässleholms kommun	27
Helge å – Härlinge, Hässleholms kommun	28
Skeingesjön, Hässleholms och Osby kommuner	29
Hanavrå, Hässleholms kommun	31
Norresjö, Hässleholms kommun	33
Immeln, Osby kommun	33
Gammelen, Osby kommun	33
Malsjön, Osby kommun	34
Rönnebodaån – Nedraryd, Osby kommun	35
Vasaltheden, Båstads kommun	36
Dagshög–Torekov, Båstads kommun	37
 Inventerare	 39
Referenser	40
 Appendix	 41

Uppdrag och genomförande

Inom ramen för Åtgärdsprogrammen för hotade arter har Lunds Botaniska Förening på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län inventerat klockgentiana *Gentiana pneumonanthe* i Skåne. Inventeringen har skett på de lokaler som rapporterats under den senaste landskapsinventeringen för den skånska kärlväxtfloran – Projekt Skånes Flora 1989–2005.

Klockgentiana är fridlyst och placerad i kategorin sårbar (VU) i den nationella rödlistan för hotade arter (Gärdenfors 2005). Den växer på fukthedar och fuktängar, gärna utmed sjö- och åstränder och ofta med följeväxter som pors och blåtåtel (Naturtyp 6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr enligt EU's art- och habitatdirektiv och Vegetationstyp 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ, Pålsson 1998). Klockgentiana är värdväxt för alkonblåvinge, som är klassad som sårbar (VU) i Sverige.


Klockgentiana är en sydvästlig art i Sverige. I Skåne har arten genom tiderna blivit funnen på omkring 150 lokaler, varav drygt 100 under perioden 1923–1973, se figur 1. Under inventeringen av Skånes Flora 1989–2005 har klockgentiana noterats från 30 lokaler, se figur 2. Merparten av dessa lokaler besöktes år 2006, resterande lokaler jämte återbesök på några lokaler gjordes år 2007. Totalt besöktes 54 dellokaler, representerande 30 geografiskt sammhållna lokaler. På varje dellokal noterades antal florala stänglar. Om antalet stänglar överskred 200 gjordes en uppskattning av antal.



Figur 1. Klockgentiana i Skåne fram till 1973. Ofyllda ringar fynd före 1923, fyllda ringar 1923–1973 (Weimark, 1985).

Resultat

Klockgentiana återfanns på 22 av 30 lokaler och i 33 av 54 dellokaler. Det motsvarar 65 % av de dellokaler som man fann klockgentiana under undersökningarna 1989–2005 (tabell 1). Många av lokalerna är individfattiga, endast några få områden som Skanörs ljun, Revingehed och Hunneröds mosse förefaller idag ha individrika och livskraftiga populationer. Dessa lokaler har det gemensamt att de hävdas genom bete eller slåtter. Kännetecknande för lokaler där arten gått ut är upphört bete, förändrad markanvändning eller generell uttorkning.



Figur 2. Klockgentiana i Skåne efter 1989 (Floran i Skåne, 2007). Fyllda prickar anger återfynd 2006–2007 och ofyllda ringar visar fynd 1989–2005 som ej återfanns 2006–2007.

Hot

Betesmarker.

Ett allvarligt hot mot många lokaler tycks vara igenväxning till följd av dålig eller upphörd hävd. Å andra sidan bör arten fredas från bete juli–september, då observationer vid olika tidpunkter från en och samma lokal tyder på att arten gärna betas. Då klockgentiana är ljuskrävande och inte tycks klara högre markvegetation, är dock bete fram till midsommar nödvändig för att hålla nere gräsvegetationen under försommaren.

På den betade fuktheden Skanörs ljung visade sig klockgentiana 2007 vara känslig för kraftig blöta. De flesta dellokaler inom detta område var vattensjuka eller översvämmade och ett mycket begränsat antal individ observerades detta år.

Sjöstränder.

Vid sjöstränder växer klockgentianan i pors och blåtåtel-samhällen ända ute vid strandkanten. Förutom röjning av ideella krafter tycks begränsad markstörning vara positiv. Så t.ex. förekommer arten vid båtplatser och uppbyggda eldstäder intill vattenbrynet. I övrigt är sjöstränder svårare att hantera ur skötselsynpunkt. Vid mycket högt vattenstånd, såsom fallet var 2007, riskerar strandlokalerna dränkas med utebliven förekomst som följd.

Fuktsänkor i skog.

Klockgentiana har gått ut från ett antal lokaler med små populationer, som kan beskrivas som gläntor med blåtåtelbevuxna fuktsänkor i skog. Generell uttorkning, igenväxning eller ändrad skogsskötsel är troliga orsaker härtill.



Figur 3. Klockgentiana. Foto Alf Porenus.

Redogörelse för de enskilda lokalerna

Skanörs ljun, Vellinge kommun

a. Beskrivning: Fukthed med fuktsänkor 950–1000 m N och 1200 m NV nya klubbhuset på Ljunghusens Golfklubb, Skanör socken, Vellinge kommun (figur 4).

RN: O 1315750–3116450, N 6144850–6144950

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blåttåtel eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ

Områdesskydd: naturreservat

Hävd: bete, men djuren verkar inte gå i denna del av reservatet, mest pors och ljun

Status 2006–2007: Antal florala stänglar: 200.

Inventerare och datum: APo 060824

Hot: Fuktsänkorna kan växa igen med pors och ljun.

Kommentar: Dessa förekomster utgörs av små fuktsänkor med brunag, 10–25 m², i den omgivande, igenväxta ljungheden i östra delen av Ljungen. Här i området längs golfbanans nordliga gräns och ca 100 m norrut i ljungheden förekommer ett 10-tal sådana fuktsänkor med vardera mellan 10–20 individ.



Figur 4. Skanörs ljun, dellokal a. Foto Alf Porenus.

b. Beskrivning: Fukthed 2,2 km VSV Ljunghusens fd station, Skanör socken, Vellinge kommun

RN: O 1315050, N 6145550

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blååtäl eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ

Områdesskydd: naturreservat

Hävd: bete; lågt

Status 2006–2007: Antal florala stänglar: 170.

Inventerare och datum: APo/BSI 060823

Hot: Igenväxning om betet upphör

Kommentar: På den angivna koordinaten, som ligger nära landsvägen och intill den markväg som går i nord-sydlig riktning mitt på ljungen, förekommer på en yta om 50×50 m 170 ganska glest spridda ex, i mindre väl avbetade ytor mellan relativt höga porsbuskar.

c. Beskrivning: Fukthed 1,5 km VSV Ljunghusens fd station, Skanör socken, Vellinge kommun (figur 5).

RN: O 1315750, N 6145550

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blååtäl eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ

Områdesskydd: naturreservat

Hävd: bete; godtagbart

Status 2006–2007: Antal florala stänglar: 320.

Inventerare och datum: APo/BSI 060823

Hot: Igenväxning om betet upphör



Figur 5. Skanörs ljung, dellokal c. Foto Alf Porenus.

d. Beskrivning: Fukthed 500 m NO campingplatsen, Skanör socken, Vellinge kommun (figur 6).

RN: O 1314250, N 6145250

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ

Områdesskydd: naturreservat

Hävd: bete; godtagbart

Status 2006–2007: Antal florala stänglar: ca 1500.

Inventerare och datum: APo/BSI 060823.

Hot: Igenväxning om betet upphör.

Kommentar: Den största och mest sammanhängande förekomsten av klockgentiana på Skanörs ljung finns i denna västra del av Ljungen. Inom ett område på ca 400×400 m förekommer >1500 ex av klockgentiana i väl betad grässvål mellan tuvor av ljung, pors och björnbär.

e. Beskrivning: Fukthed 800 m V Ljunghusens fd station, Skanör socken, Vellinge kommun
RN: O 1316450, N 6145750

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blååtäl eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ

Områdesskydd: naturreservat

Hävd: bete; godtagbart på skonorna

Status 2006–2007: Inget fynd av klockgentiana.

Inventerare och datum: APo 060824.

Hot: Igenväxning om betet upphör.

Kommentar: Fukthed inom reservatet Skanörs ljung på norra sidan väg 100 (norr gamla järnvägsbanken mot östra gränsen av reservatet). Denna del betades 2006 av nöt. Fuktheden är här starkt igenväxt med manshöga pors- och björnbärssnår. Här finns dock enstaka skonor med inslag av högorter och betad grässvål.



Figur 6. Skanörs ljung, dellokal d. Foto Alf Porenus.

f. Beskrivning: Fukthed 900 m SV Ljunghusens fd station, Skanör socken, Vellinge kommun. (figur 7).

RN: O 1316550, N 6145150

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blååtäl eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ

Områdesskydd: naturreservat

Hävd: bete; godtagbart

Status 2006–2007: Antal florala stänglar: 400.

Inventerare och datum: APo 060824.

Hot: Igenväxning om betet upphör

Kommentar: I den östligaste delen av Ljungen nära reservatsgränsen finns på ett avstånd av ca 100 m från varandra, tre ca 10×50 m stora fuktsänkor, med brunag och gles, lågvuxen pors. I vardera av dessa sänkor förekommer mellan 100–200 stänglar av klockgentiana.



Figur 7. Skanörs ljung, dellokal f. Foto Alf Porenus.

Hunneröds mosse, Svedala kommun

a. Beskrivning: Fukthed/lågstarräng 300 m NV Hunneröd, Börringe socken, Svedala kommun (figur 8).

RN: O 1347850, N 6154250–6154395

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blåttåtel eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ samt 5.2.3.3. Lågstarräng

Områdesskydd: saknas

Hävd: bete; godtagbart

Status 2006–2007: Antal florala stänglar 2006: 110. Antal florala stänglar 2007: 813.

Inventerare och datum: APo/LSk 060724 och APo 070806

Hot: Igenväxning om betet upphör.

Kommentar: Lokalen utgörs av en ca 150×50 m stor, delvis fuktig betesmark. Den torra sommaren 2006 växte klockgentiana enbart i den något fuktigare södra delen, den regnrika sommaren 2007 över hela betesmarken. Bete verkade ej förekomma vid besöket 2007.



Figur 8. Hunneröds mosse, dellokal a. Foto Alf Porenus.

b. Beskrivning: Mosse 400 m VNV Hunneröd, Börringe socken, Svedala kommun.

RN: O 1347750, N 6154250

Naturtyp: 7140 Öppna, svagt välvda mossar

Vegetationstyp: 3.1.4. Mossvegetation, Mjukmatte- och lösbottenveg.

Områdesskydd: saknas

Hävd: ingen hävd; uppslag av björk, al och brakved

Status 2006–2007: Antal florala stänglar 2006. Antal florala stänglar 2007: 8.

Inventerare och datum: APo/LSk 060724 samt APo 070806.

Hot: Igenväxning samt uttorkning

c. Beskrivning: Fuktäng 550 m NNV Hunneröd, Börringe socken, Svedala kommun.

RN: O 1347950, N 6154450

Naturtyp: 6430 Högörtängar

Vegetationstyp: 5.2.3.2 Fuktäng, Filipendula ulmaria-typ

Områdesskydd: saknas

Hävd: området slås, välskött

Status 2006–2007: Antal florala stänglar 2006: 660. Antal florala stänglar 2007: ca 700

Inventerare och datum: APo/LSk 060724 och APo 070824.

Hot: Ett hot mot beståndet skulle vara om hävden genom slåtter upphör (sker idag på ideell basis genom Svedala Naturvårdsförening).

Kommentar: Lokalen är belägen ca 150 m NNO "Lemmeströkärret" i den södra delen av den del av fuktängen som slås samt på ca 10 m av fuktängen söder om staketet till den hävdade delen. På en yta av ca 75×50 m fanns 2006 totalt 660 stänglar, varav 36 söder staketet. Beståndet är bland de individtätaste av alla förekomster i Skåne.

Önneslövs fälad, Lunds kommun

Beskrivning: Frisk betesmark 700 m SV Nygård, Bonderup socken, Lunds kommun (figur 9).

RN: O 1349250, N 6171950

Naturtyp: 6270 Artrika torra–friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ

Vegetationstyp: 5.1.3.3 Gräshed, *Nardus stricta*-typ

Områdesskydd: saknas

Hävd: bete av nöt och häst, adekvat.

Status 2006: Antal florala stänglar 54.

Inventerare och datum: APo 060801

Hot: Inget

Kommentar: Lokalen är en betad fäladsmark med fuktsvackor, rik på en och björnbärssnår. Här växer även exempelvis borsttåg, stagg och slåttergubbe. Ett 50-tal stänglar av klockgentiana rapporterades inom detta område under 1991. Omkring 100 m NO om nuvarande växtplats för klockgentiana (inne i ”nästa” beteshage) finns en större fuktsänka med om vintern stövel djupt vatten. I kanten av denna sänka förekom även för ca 15 år sedan klockgentiana. Här är den dock inte sedd de senaste åren. I denna sänka breder krypfloka och klotgräs ut sig på ca ½ hektar.



Figur 9. Önneslövs fälad. Foto Alf Porenus.

Skrylle, Lunds kommun

a. Beskrivning: Rest av glänta med fuktsvacka i tidigare granskog 1200 m OSO Tygelsjö, Dalby socken, Lunds kommun

RN: O 1344950, N 6176150

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blååtåtel och starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ

Områdesskydd: saknas

Hävd: ingen.

Status 2006–2007: Inget fynd av klockgentiana.

Inventerare och datum: APo 060727

Kommentar: Fuktsvackan är uttorkad sedan ca 10 år tillbaka och klockgentiana är inte sedd här under denna tid. Blååtåtel finns fortfarande kvar på växtplatsen. Större delen av granbeståndet i väster och norr har fallit i någon av senare års stormar och till stor del ersatts med lövsly. Beståndet 1989 kan ha rört sig om ca 10 individ (minnesbild APo).

b. Beskrivning: Tidigare glänta i granskog, numera igenväxande björkslymark 550 m NO Rögle kloster, Hardeberga socken, Lunds kommun

RN: O 1344950, N 6177250

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blååtåtel och starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ

Områdesskydd: saknas

Hävd: ingen

Status 2006–2007: Inget fynd av klockgentiana.

Inventerare och datum: APo 060727

Kommentar: Blååtåtel och knapptåg förekommer på denna 10×10 m lilla plätt. Redan för ca tio år sedan försvann emellertid klockgentiana på grund av upptorkning och igenväxning av gläntan. Beståndet 1989 kan ha rört sig om <10 individ (minnesbild APo).

c. Beskrivning: Tidigare glänta i björkskog, numera igenväxande björkslymark, 250 m V ”Kycklingfabrik”, Dalby socken, Lunds kommun

RN: O 1345350, N 6175650

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blååtåtel och starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ

Områdesskydd: saknas

Hävd: ingen.

Status 2006: Inget fynd av klockgentiana.

Inventerare och datum: APo 060727.

Kommentar: Redan för ca tio år sedan försvann arten på grund av upptorkning och igenväxning. Beståndet 1989 kan ha rört sig om <10 individ (minnesbild APo).

d. Beskrivning: Tidigare glänta i björkskog, numera igenväxande björkslymark, 250 m VNV ”Kycklingfabrik”, Dalby socken, Lunds kommun

RN: O 1345350, N 6175750

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blåtåtel och starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ

Områdesskydd: saknas

Hävd: ingen.

Status 2006–2007: Inget fynd av klockgentiana. Inventerare och datum: APo 060727

Kommentar: Redan för ca tio år sedan försvann arten på grund av upptorkning och igenväxning. Beståndet 1989 kan ha rört sig om <10 individ (minnesbild APo).

Rögle fälad, Lunds kommun

Beskrivning: Fuktsvacka i östra kanten av enefälad 950m O Rögle kloster, Hardeberga socken. Lunds kommun (figur 10).

RN: O 1345450, N 6176850

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blåtåtel och starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ

Områdesskydd: saknas

Hävd: bete av nöt, senare år av get.

Status 2006–2007: Antal florala stänglar 2006: 2. Antal florala stänglar 2007: 5.

Inventerare och datum: APo 060801 och APo 0708014.

Hot: Igenväxning och uttorkning

Kommentar: Under 1990-talet började fuktsvackan torka upp alltmer och den ca 25×25 m stora ytan är numera torr. Ytan inhägnades för något år sedan som skydd mot bete. Bete borde dock förekomma på försommaren för att hålla grässvålen nere. Arten är observerad årligen sedan början av 1990-talet, men med stadigt sjunkande antal stänglar.

Måryds fälad, Lunds kommun

Beskrivning: enefälad med fuktsänkor 1650 m VNV Måryd, S. Sandby socken, Lunds kommun.

RN: O 1346350, N 6177250

Naturtyp: 6270 Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ

Vegetationstyp: 5.1.3.3. Gräshed. *Nardus stricta*-typ

Områdesskydd: naturreservat

Hävd: bete av nöt

Status 2006–2007: Inget fynd av klockgentiana.

Inventerare och datum: APo 060801, 070901

Kommentar: Betesmarken är en nötbetad enefälad i nordvästra delen av Måryds fälad med en del fuktsvackor. I början av 1990-talet fanns runt två av dessa svackor enstaka exemplar av klockgentiana. Under 90-talet torkade fuktsvackorna upp alltmer och klockgentianan försvann.



Figur 10. Rögle fälad. Foto Alf Porenus.

Kungsmarken, Lunds kommun

Beskrivning: fuktig gräsmark inom golfbaneområde 100 m NO Golfklubbens klubbhus NO om bäcken från Glomsjön, S. Sandby socken, Lunds kommun..

RN: O 1341050, N 6178950

Naturtyp: 6430 Högörtäng

Vegetationstyp: 5.2.3. Fuktäng

Områdesskydd: naturreservat

Hävd: sen slåtter

Status 2006–2007: Inget fynd av klockgentiana.

Inventerare och datum: GMn 060810

Kommentar: Klockgentiana fanns förr även i fuktigare partierna i den ovanliggande betesmarken intill stenåldersgårdsgården, som numera är igenväxande av bl.a. älgört. Inget fynd gjordes heller här i augusti 2006 (APo). Klockgentiana blommade även i betesmarken väster om golfbanan i början av 2000-talet.

Vaselund, Lunds kommun

Beskrivning: Ca 1 ha stort fuktängsområde på Revingefältet 500 m O Vaselund gård, Hällestad socken, Lunds kommun (figur 11)

RN: O 1352250, N 6174050

Naturtyp. 6410 Fuktäng med blååtäl och starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng *Molinia caerulea*-typ

Områdesskydd: saknas

Hävd: bete

Status 2006–2007: Antalet florala stänglar ca 1500.

Inventerare och datum: APo 060727

Hot: Möjligen för tidigt bete

Kommentar: En av Skånes tre individrikaste förekomster av klockgentiana. Arrendatorn hägnade in förekomsten 2006 (från 1 juni till 1 september) för att skydda klockgentianan för bete under tiden för äggläggning och tidig larvutveckling hos alkonblåvingen. Lokalen är känd åtminstone sedan 1965.



Figur 11. Vaselund. Foto Alf Porenus.

Bosarp, Sjöbo kommun

Beskrivning: tidigare fuktsvacka, numera utgrävd damm 1300 m SO Bosarp, Sövde socken, Sjöbo kommun

RN: O 13633050, N 6160850

Naturtyp: (ej tillämpligt)

Vegetationstyp: (ej tillämpligt)

Områdesskydd: saknas

Hävd: (ej tillämpligt)

Status 2006–2007: Inget fynd av klockgentiana.

Inventerare och datum: APo 060727

Kommentar: Fuktsvackan är sannolikt utgrävd under senare år för att skapa vattenhål för betande djur. Numera finns här en 10×20m stor damm, igenväxande med bredkaveldun och svalting.

Flygrakancaféet, Sjöbo kommun

Beskrivning: Fuktängsparti i skogsområde väster Flygrakancaféet, Sövde socken, Sjöbo kommun.

RN: O 1367550, N 6165950

Naturtyp: 6410: Fuktängar med blååtäl eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng *Molinia caerulea*-typ

Områdesskydd: saknas

Hävd: ingen

Status 2006–2007: Inget fynd av klockgentiana.

Inventerare och datum: GMn 070810

Kommentar: Lokalen upptäcktes 1984 med 5 florala stänglar. 1990 observerades en planta med knopp. På grund av skogsvårdande avverkning och nyplanteringar kunde lokalen med säkerhet inte återfinnas 2007. Försök att finna klockgentiana i *Molinia*-vegetation blev resultatlös.

Kråkebacken, Svalöv kommun

Beskrivning: Igenväxande betesmark 1 km NV Kågeröds kyrka, Kågeröd socken, Svalövs kommun

RN: O 1331150, N 6212050

Naturtyp: 6430 Högörtäng

Vegetationstyp: 5.2.3 Fuktäng

Områdesskydd: saknas

Hävd: ingen

Status 2006–2007: Inget fynd av klockgentiana.

Inventerare och datum: HJo 060922

Hot: Igenväxning

Kommentar: Betesmarken är fortfarande obetad och hyser numera meterhög fuktängsvegetation.

Svenstorps–Bolshus fälad, Svalövs kommun

Beskrivning: fäladsmark 1200 m SO Källstorps gård i Svenstorps-Bolshus fälad, Svalöv socken, Svalövs kommun.

RN: O 1333250, N 6204450

Naturtyp: 6270 Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ

Vegetationstyp: 5.2.3 Fuktäng

Områdesskydd: saknas

Hävd: bete

Status 2006–2007: Inget fynd av klockgentiana.

Inventerare och datum: HJo 060922

Hot: Inget så länge bete förekommer.

Konga, Svalövs kommun

Beskrivning: Fukthed 200x200 m, 500 m SSV Kongaö, Konga socken, Svalövs kommun

RN: O 1336650, N 6211650

Naturtyp: 6410: Fuktängar med blåtåtel eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng *Molinia caerulea*-typ

Områdesskydd: saknas

Hävd: bete

Status 2006–2007: Antal florala stänglar: 19.

Inventerare och datum: HJo 060922

Hot: Inget så länge bete förekommer under försommaren.

Farhult, Höganäs kommun

Beskrivning: fukthed innanför vassbältet vid Skälderviken 800–900 m NNV Farhults kyrka, Farhults socken, Höganäs kommun (figur 12)

RN: O 1307750–1307850, N 6236850

Naturtyp: 6410: Fuktängar med blåtåtel eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.1 Fuktäng *Deschampsia cespitosa*-typ

Områdesskydd: saknas

Hävd: bete

Status 2006–2007: Antal florala stänglar: 75.

Inventerare och datum: APo 060910

Hot: upphörande bete



Figur 12. Farhult. Foto Alf Porenus.

Hjälmsjön, Örkelljunga kommun

a. Beskrivning: Sjöstrand vid Hjälmsjöns södra strand, Örkelljunga socken, Örkelljunga kommun

RN: O 1344850, N 6241250

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ.

Områdesskydd: saknas

Hävd: Ingen

Status 2006–2007: Inget fynd av klockgentiana.

Inventerare och datum: LSi 060902

Kommentar: Förekomsten fanns på en sjöstrand nedanför ett fritidshus vid Hjälm sjöns södra strand. Klockgentianan, som senast sågs här 1992, satt i en isolerad blåttåtel tuva intill en brygga och försvann i samband med att bryggan togs bort. Strandbiten är nu delvis igenväxt med alsly och vass.

b. Beskrivning: Sjöstrand 1100 m NO väg 24/Ringarpsvägen, Örkelljunga socken, Örkelljunga kommun

RN: O 1345750, N 6241650

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blåttåtel eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ.

Områdesskydd: saknas

Hävd: ingen

Status 2006–2007: Inget fynd av klockgentiana.

Inventerare och datum: LSi 060902

Kommentar: Lokalen är en sjöstrand med pors och blåttåtel vid Hjälm sjöns östra strand. Lokalen ligger något över högvattenlinjen och är intakt, men arten kunde inte återfinnas 2006. Den är inte sedd här sedan 1997 (LSi).

c. Beskrivning: Sjöstrand vid Hjälm sjöns norra strand, Örkelljunga socken, Örkelljunga kommun

RN: O 1346050, N 6242350

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blåttåtel eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ.

Områdesskydd: saknas

Hävd: ingen

Status 2006–2007: Antal florala stänglar: 80.

Inventerare och datum: LSi 060902

Hot: Ett eventuellt hot mot kan vara den driftvall, som då och då uppkommer.

Kommentar: Lokalen utgörs av en sjöstrand med blåttåtel, pors, blodrot och enstaka småbuskar av al och viden. Gentianalokalen ligger ungefär vid högsta vattenlinjen och sträcker sig ett 10-tal meter utmed stranden. På andra sidan en raserad betongbrygga finns ytterligare ett litet, ca 1 meter långt bestånd.

Lilla sjö, Hässleholms kommun

a. Beskrivning: Sjöstrand vid Lilla sjös NO-sida, Vittsjö socken, Hässleholms kommun (figur 13)

RN: O 1364050, N 6246950

Naturtyp: 6410 Fuktäng med blåttåtel eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ.

Områdesskydd: saknas

Hävd: ingen

Status 2006–2007: Antal florala stänglar: 40.

Inventerare och datum: APo 060822

Hot: Möjligen igenväxning

Kommentar: Lokalen är en sjöstrand med pors och blåttåtel vid en blandskogsinramad liten sjö. Klockgentiana växer alldeles i sjökanten i denna vegetation eller i kanterna där marken röjts, i detta fall för en mindre eldstad.



Figur 13. Lilla sjö, dellokal a. Foto Alf Porenus.

Höjalsjön, Hässleholms kommun

a. Beskrivning: Sjöstrand 500 m ONO Höjalen, Vittsjö socken, Hässleholms kommun.

RN: O 1363850, N 6247250

Naturtyp: 6410 Fuktäng med blåttåtel eller starr

Vegetationstyp. 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ.

Områdesskydd: saknas

Hävd: ingen

Status 2006–2007: Inget fynd av klockgentiana.

Inventerare och datum: LÅk 060727

Hot: igenväxning

Kommentar: Sjöstrand vid södra stranden av Höjalsjön (som ligger ett par hundra meter norr Lilla sjö) med pors och blåttåtel. Under 1996 rapporterades 13 florala stänglar.

b. Beskrivning: Sjöstrand 600 m ONO Höjalen, Vittsjö socken, Hässleholms kommun.

RN: O 1363950, N 6247250

Naturtyp: 6410 Fuktäng med blåttåtel eller starr

Vegetationstyp. 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ.

Områdesskydd: saknas

Hävd: ingen

Status 2006–2007: Antal florala stänglar: 4.

Inventerare och datum: LÅk 060727

Hot: Igenväxning

Kommentar: Likaledes sjöstrand vid södra stranden av Höjalsjön med pors och blåttåtel. Under 1996 rapporterades 22 florala stänglar.

Gängessjön, Hässleholms kommun

Beskrivning: strandäng 100 m NV Gängessjöns N-spets, Vittsjö socken, Hässleholms kommun.

RN: O 1364350, N 6248450

Naturtyp: 6410 Fuktäng med blååtåtel eller starr

Vegetationstyp. 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ.

Områdesskydd: saknas

Hävd: bete av häst

Status 2006–2007: Antal florala stänglar 9.

Inventerare och datum: LÅk 060805

Hot: Inget så länge betet fortgår

Vittsjön, Hässleholms kommun

Beskrivning: Betesmark med fuktsänkor 400–500 m NNV Kallsjön, Vittsjö socken, Hässleholms kommun

RN: O 1369550–1369650, N 6249750

Naturtyp: 6410 Fuktäng med blååtåtel eller starr

Vegetationstyp. 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ.

Områdesskydd: saknas

Hävd: bete av nöt

Status 2006–2007: Antal florala stänglar 20.

Inventerare och datum: LÅk 060805

Hot: Inget så länge betet fortgår

Vieån, Hässleholms kommun

a. Beskrivning: Fuktäng vid Vieån 1150 m NV Jakobstorp, Verum socken, Hässleholms kommun

RN: O 1378050, N 6249450

Naturtyp: 6410 Fuktäng med blååtåtel eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ.

Områdesskydd: saknas

Hävd: ingen

Status 2006–2007: Inget fynd av klockgentiana. Inventerare och datum: LÅk 060803

Hot: Igenväxning

Kommentar: Översvämningsmark vid Vieån, där 6 exemplar av klockgentiana blommade 2001. Lokalen är numera igenväxt av pors.

b. Beskrivning: Fuktäng vid Vieån 1375 m NO Jakobstorp, Verum socken, Hässleholms kommun

RN: O 1378050, N 6249450

Naturtyp: 6410 Fuktäng med blååtäl eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ.

Områdesskydd: saknas

Hävd: bete av häst

Status 2006.–2007: Antal florala stänglar 1.

inventerare och datum: LÅk 060803

Hot: Inget så länge betet fortgår.

Kommentar: Lokalen är en hästbetad betesmark med fuktsänkor 300 m från Vieån. Under 2001 noterades 32 florala stänglar.

Helge å – Härlinge, Hässleholms kommun

a. Beskrivning: Fuktäng på västra sidan av Helge å ca 1 km norr inloppet i Skeingesjön, 1650 m SSV Söndregård, Verum socken, Hässleholms kommun.

RN: O 1381050, N 6250850

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blååtäl eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ.

Områdesskydd: saknas

Hävd: sen slåtter

Status 2006–2007 : Antal florala stänglar 90.

Inventerare och datum: LÅk 060727

Hot: Inget så länge slåttern fortgår.

Kommentar: Brukaren slår vallen först efter att klockgentianan blommat ut.

b. Beskrivning: Fuktäng på västra sidan av Helge å ca 1 km norr inloppet i Skeingesjön, 1750 m SSV Söndregård, Verum socken, Hässleholms kommun.

RN: O 1380950, N 6250750

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ.

Områdesskydd: saknas

Hävd: sen slåtter

Status 2006–2007 : Antal florala stänglar 52.

Inventerare och datum: LÅk 060727

Hot: Inget så länge slåttarna fortgår

Kommentar: Bonden slår vallen först efter att klockgentianan blommat ut.

c. Beskrivning: Porsmad på östra sidan av Helge å ca 1 km norr inloppet i Skeingesjön, 1400 m SSV Söndregård, Verum socken, Hässleholms kommun.

RN: O 1381150, N 6251550

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ.

Områdesskydd: saknas

Hävd: bete av får

Status 2006–2007 : Antal florala stänglar 1.

Inventerare och datum: LÅk 060727

Hot: Möjligen för kraftigt bete

Kommentar: År 2000 noterades 50 florala stänglar.

Skeingesjön, Hässleholms och Osby kommuner

a. Beskrivning: Sjöstrand vid sydöstra delen av Skeingesjön 900 m NV Skeinge Säteri, Verum socken, Hässleholms kommun

RN: O 1382250, N 6249550

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ.

Områdesskydd: saknas

Hävd: ingen

Status 2006–2007: Antal florala stänglar 110.

Inventerare och datum: LÅk 060803

Hot: Troligen inget

Kommentar: Sparsam förekomst 1997.

b. Beskrivning: Sjöstrand vid östra delen av Skeingesjön 500 m ONO Ferön, Osby socken, Osby kommun

RN: O 1382650, N 6251250

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blååtäl eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ.

Områdesskydd: saknas

Hävd: ingen

Status 2006–2007: Inget fynd av klockgentiana.

Inventerare och datum: LÅk 060803, APo 070807

Kommentar: Lokalen möjligen förstörd av utfyllnad vid ny sommarstuga. Under 2007 var det dessutom högt vattenstånd i sjön.

c. Beskrivning: Sjöstrand vid östra sidan av Skeingesjöns norra vik, 600 m SO Spetsberget, Osby socken, Osby kommun (figur 14).

RN: O 1382950, N 6252350

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blååtäl eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ.

Områdesskydd: saknas

Hävd: ingen

Status 2006–2007: Antal florala stänglar 58.



Figur 14. Skeingesjön, dellokal c. Foto Alf Porenus.

Inventerare och datum: APo 060822, 070807

Hot: Troligen inget

Kommentar: Lokalen besöktes under inventeringen av Floran i Skåne 1997–2004 vid ett flertal tillfällen. Antalet florala stänglar har varierat från 3 till 160. Under 2006 inräknades 58 florala stänglar (APo). Under 2007 låg lokalen under vatten på grund av högt vattenstånd i sjön (APo). Lokalen utgörs av en ca 30 m lång strandkant med pors och blååtätel på ömse sidor av en båtplats. Klockgentianan växer alldeles i strandkanten, ofta i blååteltuvor eller i kanten av båtansvändarsliten grässvål. Lokalen har ingen skötsel och det finns sannolikt inget särskilt hot, då arten tycks kunna fortleva i detta naturliga pors-blååtelsamhälle.

Hanavrå, Hässleholms kommun

a. Beskrivning: Porsmad vid Lillån 300 m SV N. Hanavrå, Visseltofta socken, Hässleholms kommun.

RN: O 1377850, N 6256750

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blååtätel eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ.

Områdesskydd: saknas

Hävd: bete t.o.m. 2006

Status 2006. : Inget fynd av klockgentiana.

Inventerare och datum: LÅk 060805, APo 070822

Hot: Troligen inget

Kommentar: Under 1992 rapporteras en floral stängel. Maden betades fortfarande 2006 och tycktes då opåverkad jämfört med 1992. Under 2007 mycket högt vattenstånd.

b. Beskrivning: Fuktäng vid Lillån 200 m SV Tvillingkvarn, Visseltofta socken, Hässleholms kommun (figur 15).

RN: O 1378050, N 6256850

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blååtäl eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ.

Områdesskydd: saknas

Hävd: bete av häst

Status 2006–2007: Inget fynd av klockgentiana.

Inventerare och datum: LÅk 060805, APo 070822

Hot: Troligen inget

Kommentar: Från denna lokal fick inventeraren vid mitten av 1990-talet ett tips om 100-tals individ av klockgentiana (muntligt ÅWg). Lokalen besöktes emellertid inte förrän några år senare (2001) då endast 3 floral stängel inräknades. Fuktängen betades då av häst, vilket även var fallet 2006 och 2007.



Figur 15. Hanavrå, dellokal b. Foto Alf Porenus.

Norresjö, Hässleholms kommun

Beskrivning: Fuktäng i SO-viken av Norresjö 900 m NNO Gräsljunga, Visseltofta socken, Hässleholms kommun

RN: O 1382050, N 6258950

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blååtätel eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ.

Områdesskydd: saknas

Hävd: bete av får

Status 2006. : Antal florala stänglar 8.

Inventerare och datum: LÅk 060805.

Hot: Troligen inget

Immeln, Osby kommun

Beskrivning: Strand på S. Ramnö i sjön Immeln, Örkened socken, Osby kommun

RN: O 1408950, N 6241750

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blååtätel eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ.

Områdesskydd: saknas

Hävd: röjning med häcksax

Status 2006–2007: Antal florala stänglar 10

Inventerare och datum: IAn 060810.

Hot: Troligen inget

Kommentar: Den några kvadratmeter stora lokalen har under en lång följd av år genom ideell kraft röjts med häcksax. Årligen brukar här finnas 10–20 florala stänglar.

Gammelen, Osby kommun

a. Beskrivning: Fuktäng öster om sjön Gammelen i Helge ås vattensystem 2000 m VNV Gullarps gård, Osby socken, Osby kommun.

RN: O 1383050, N 6250650

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blååtätel eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ.

Områdesskydd: saknas

Hävd: ingen

Status 2006–2007: Antal florala stänglar 69.

Inventerare och datum: JoN 060816.

Hot: Upphört bete

Kommentar: Fuktängen har tidigare betats. Under 2002 räknades 80 florala stänglar av klockgentiana.

b. Beskrivning: Fuktäng öster om sjön Gammelen i Helge ås vattensystem 2100 m VNV Gullarps gård, Osby socken, Osby kommun.

RN: O 1383050, N 6250750

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blååtätel eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ.

Områdesskydd: saknas

Hävd: ingen

Status 2006–2007: Antal florala stänglar 115.

Inventerare och datum: JoN 060816.

Hot: Upphört bete

Kommentar: Fuktängen har tidigare betats. Under 2002 räknades 85 florala stänglar av klockgentiana.

Malsjön, Osby kommun

Beskrivning: Fuktäng strax innanför porsbältet vid Malsjöns östra strand, Osby socken, Osby kommun (figur 16).

RN: O 1384250, N 6248150

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blååtätel eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ.

Områdesskydd: saknas

Hävd: bete av nöt **Status 2006–2007:** Antal florala stänglar 42.

Inventerare och datum: APo 060810.

Hot: Inget så länge bete förekommer



Figur 16. Malsjön. Foto Alf Porenus.

Kommentar: Lokalen utgörs av en lågvuxen, välbetad fukthed med stagg och knägräs strax innanför porsbältet vid Malsjöns östra strand. Klockgentianan växer här på något torrare mark än på de flesta andra insjöstrandlokaler, ofta i obetade veketågstuvor. Under 2002 blommade ”100-tals” stänglar av klockgentiana (KAO).

Rönnebodaån – Nedraryd, Osby kommun

Beskrivning: Strandäng vid Rönnebodaån, Nedraryds gård, Örkened socken, Osby kommun
RN: O 1402250, N 6254950

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ.

Områdesskydd: saknas

Hävd: bete av nöt och slåtter

Status 2006–2007: Antal bestånd 32 med 1–30 florala stänglar (enligt markägare). Antal bestånd 2007: ca 25 (enl. markägaren).

Inventerare och datum: KAO 060910.

Hot: Inget så länge bete förekommer

Kommentar: Vid ett besök i början av september 2006 kunde inga blommande exemplar av klockgentiana upptäckas. Markägaren berättade emellertid att 32 bestånd hade blommat fint en månad tidigare men sedan hade de flesta individer blivit uppätta av kreaturen. 2005 hade 28 blommande bestånd inräknats (KAO).

Vasaltheden, Båstads kommun

a. Beskrivning: Fukthål i betesmark SO Glimminge plantering, Karups socken, Båstads kommun (figur 17).

RN: O 1308150, N 6253950

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blååtäl eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ.

Områdesskydd: saknas

Hävd: bete av nöt

Status 2006. : Inget fynd av klockgentiana.

Inventerare och datum: APo 060910, 070813.

Hot: Ej tillämpligt



Figur 17. Vasaltheden. Foto Alf Porenus.

Kommentar: Lokalen ligger på V. Karup-sidan av sockengränsen (sterngårdesgård) SO Glimminge plantering och är en lätt kuperad slänt ned mot Skälderviken med smärre fuktigare sänkor. Grässvålen är troligen gödslad.

b. Beskrivning: Fukthål i betesmark SO Glimminge plantering, Grevie socken, Båstads kommun

RN: O 1308250, N 6253950

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blåttåtel eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ.

Områdesskydd: inget

Hävd: bete av nöt

Status 2006–2007: Antal florala stänglar 2006: 15. Antal florala stänglar 2007: 11.

Inventerare och datum: APo 060910 och APo 070813.

Hot: Inget så länge bete förekommer

Kommentar: Lokalen ligger på Grevie-sidan av sockengränsen SO Glimminge plantering och utgörs av en betad, relativt öppen gräsmark på sandjord med en och björnbärssnår. I en blöt, 5×40 m sänka noterades klocklång, krypvide, blåttåtel, ängsvädd, knapptåg och dvärglin.

Dagshög–Torekov, Båstads kommun

a. Beskrivning: Mindre fuktängspartier 200–700 m NNV Dagshög, V. Karup socken, Båstads kommun.

RN: O 1303650, N 6257100–600

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blåttåtel eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ.

Områdesskydd: naturreservat

Hävd: bete av nöt

Status 2006–2007: Inget fynd av klockgentiana.

Inventerare och datum: APo 060910, 070813.

Hot: Inget

Kommentar: Lokalen ligger inom naturreservatet på Bjärehalvöns SV-kust från Dagshög upp mot Torekov. Området hyser tätvuxna, vindpinade en- och björnbärssnår med stråk av ljun, klocklång och kråkris. I små gläntor finns fuktigare partier med pors och blåttåtel, vilka skulle kunna utgöra lämpliga lokaler för klockgentiana.

b. Beskrivning: Fuktäng 950 m NNV Dagshög, V. Karup socken, Båstads kommun. (fig. 18).

RN: O 1303650, N 6257650

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blååtåtel eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ.

Områdesskydd: naturreservat

Hävd: bete av nöt

Status 2006–2007: Inget fynd av kockgentiana.

Inventerare och datum: APo 060910, 070813.

Hot: Inget

Kommentar: Lokalen utgör öppnare parti vid större pöl och omgivande fuktmarker. Inget fynd vare sig 2006 eller 2007.



Figur 18. Dagshög–Torekov, dellokal b. Foto Alf Porenus.

c. Beskrivning: Fuktäng 500 m S Reningsverket i Torekov, V. Karup socken, Båstads kommun (fig. 19).

RN: O 1303650, N 6258150

Naturtyp: 6410 Fuktängar med blååtåtel eller starr

Vegetationstyp: 5.2.3.5 Fuktäng, *Molinia caerulea*-typ.



Figur 19. Dagshög–Torekov, dellokal c. Foto Alf Porenus.

Inventerare

APo = Alf Porenus

BSI = Bengt Sandkull

GMn = Göran Mattiasson

HJo = Henrik Johansson

IAn = Ingvar Andersson

JAn = Jörgen Andersson

JoN = Johnny Nilsson

KAO = Kjell-Arne Olsson

LSi = Leif Sigbo

LSk = Lennart Segerbäck

LÅk = Lars Åkerman

ÅWg= Åke Widgren

Referenser

Apelquist, T och Bengtsson, O. 2007. Åtgärdsprogram

för alkonblåvinge och klockgentiana 2007-2011.

Gärdenfors, U. (ed.) 2005. *Rödlistade arter i Sverige 2005 – The 2005*

Red List of Swedish Species. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Pålsson, L. (red.) 1998. Vegetationstyper i Norden. Nordiska Ministerrådet.

Tyler, T. m. fl. (red.), *Floran i Skåne. Arterna och deras utbredning*. Lund.

Weimarck, H. & Weimarck, G. 1985. *Atlas över Skånes flora*. Lund.

Appendix 1. Förekomst av klockgentiana 2006/2007 jämfört med Projekt Skånes Flora 1989-2003. Antal individ; x anger förekomst (antal ej uppgivet)

Lokal	Kommun	Socken	Projekt Skånes Flora	2006/2007
Skanörs ljunng a.	Vellinge	Skanör	x	200
Skanörs ljunng b.	Vellinge	Skanör	x	170
Skanörs ljunng c.	Vellinge	Skanör	ej rapporterad	320
Skanörs ljunng d.	Vellinge	Skanör	ej rapporterad	1500
Skanörs ljunng e.	Vellinge	Skanör	x	0
Skanörs ljunng f.	Vellinge	Skanör	x	400
Hunneröds mosse a.	Svedala	Börtinge	x	110/843
Hunneröds mosse b.	Svedala	Börtinge	ej rapporterad	2/83
Hunneröds mosse c.	Svedala	Börtinge	>100	660/~700
Önneslövs fålad	Lund	Bonderup	~50	54
Skrylle a.	Lund	Dalby	~10	0
Skrylle b.	Lund	Hardeberga	<10	0
Skrylle c.	Lund	Dalby	<10	0
Skrylle d.	Lund	Dalby	<10	0
Rögle fålad	Lund	Hardeberga	~10	2/5
Måryds fålad	Lund	S. Sandby	<5	0
Kungsmarken	Lund	S. Sandby	3	0
Vaselund	Lund	Hällestad	x	1500
Bosarp	Sjöbo	Sövde	x	0
Flygrakancaféet	Sjöbo	Sövde	1	0
Kråkebacken	Slalöv	Kågeröd	2	0
Svenstorps-Bolshus fålad	Slalöv	Svalöv	1	0
Konga	Slalöv	Konga	flera	19
Farhult	Slalöv	Farhult	~175	75
Hjälmsjön a.	Slalöv	Örkelljunga	x	0
Hjälmsjön b.	Slalöv	Örkelljunga	x	0
Hjälmsjön c.	Slalöv	Örkelljunga	x	80
Lilla sjö a.	Hässleholm	Vittsjö	40	40
Lilla sjö b.	Hässleholm	Vittsjö	>100	16
Höjalsjön a.	Hässleholm	Vittsjö	13	0
Höjalsjön b.	Hässleholm	Vittsjö	22	4

Lokal	Ort	Socken	Projek Skånes Flora	2006/2007
Grängessjön	Hässleholm	Vittsjö	x	9
Vittsjön	Hässleholm	Vittsjö	x	20
Vieån a.	Hässleholm	Verum	6	0
Vieån b.	Hässleholm	Verum	32	1
Helge å – Härlinge a.	Hässleholm	Verum	4	90
Helge å – Härlinge b.	Hässleholm	Verum	11	52
Helge å – Härlinge c.	Hässleholm	Verum	1	1
Skeingesjön a.	Hässleholm	Verum	sparsamt	110
Skeingesjön b.	Hässleholm	Osby	3	0/0
Skeingesjön c.	Hässleholm	Osby	40–60 1997–2002, 3 2004	58/0
Hanavrå a.	Hässleholm	Visseltofta	1	0/0
Hanavrå b.	Hässleholm	Visseltofta	3	0/0
Norresjö	Hässleholm	Visseltofta	x	8
Immeln	Osby	Örkened	5–20	10
Gammelen a.	Osby	Osby	80	69
Gammelen b.	Osby	Osby	85	115
Malsjön	Osby	Osby	100-tals	42
Rönnebodaån – Nedraryd	Osby	Örkened	x	32
Vasaltheden a.	Båstad	Karup	x	0/0
Vasaltheden b.	Båstad	Grevie	x	15/11
Dagshög–Torekov a.	Båstad	Karup	x	0
Dagshög–Torekov b.	Båstad	Karup	x	0
Dagshög–Torekov c.	Båstad	Karup	x	53
Summa antal lokaler med fynd			30	22
Summa antal dellokaler med fynd			54	33

Appendix 2. Lokalförteckning över klockgentiana 2006-2007

Lokal	Socken	RN ost	RN nord	RUBIN	Biotopskydd	Geografiskt läge	Biotop
Skanörs Ljung a.	Skanör	1315750–3116450	6144850–6144950	1C8d 48–4914, 4907	NR, Natura 2000	950–1200m N–NV nya Klubbhuset	fukthed
Skanörs Ljung b.	Skanör	1315050	6145550	1C9d 0500	NR, Natura 2000	2,2 km VSV Ljunghusens fd stn	fukthed
Skanörs Ljung c.	Skanör	1315750	6145550	1C9d 0507	NR, Natura 2000	1,5 km VSV Ljunghusens fd stn	fukthed
Skanörs Ljung d.	Skanör	1314250	6145250	1C9c 0242	NR, Natura 2000	500 m NO campingplatsen	fukthed
Skanörs Ljung e.	Skanör	1316450	6145750	1C9d 0714	NR, Natura 2000	800m V Ljunghusens fd stn	fukthed
Skanörs Ljung f.	Skanör	1316550	6145150	1C9d 0115	NR, Natura 2000	900m SV Ljungusens.f d stn	fukthed
Hunneröds mosse a.	Böringe	1347850	6154250–6154390	2C0j 4228–4328	Natura 2000	300 m NV Hunneröd	fukthed/lågstarräng
Hunneröds mosse b.	Böringe	1347750	6154250	2C0j 4227	Natura 2000	400 m VNV Hunneröd	mosse
Hunneröds mosse c.	Böringe	1347950	6154450	2C0j 4429	Natura 2000	550 m NNV Hunneröd	fuktäng
Önneslövs fålad	Bonderup	1349250	6171950	2C4j 1942	-	700m SV Nyggård	frisk betesmark
Skrylle a.	Dalby	1344950	6176150	2C5i 1149	-	1200m OSO Tygelsjö	glänta i granskog
Skrylle b.	Hardeberga	1344950	6177250	2C5i 2249	-	550m NO Rögle kloster	glänta i granskog
Skrylle c.	Dalby	1345350	6175650	2C5j 0603	-	250m V Kycklingfabrik	björkslyskog
Skrylle d.	Dalby	1345350	6175750	2C5j 0703	-	250m VNV Kycklingfabrik	björkslyskog
Rögle fålad	Hardeberga	1345450	6176850	2C5j 1804	-	950 m O Rögle kloster	enefålad
Måryds fålad	S. Sandby	1346350	6177250	2C5j 2213	NR, Natura 2000	1650m VNV Måryd	enefålad
Kungsmarken	S. Sandby	1341050	6178950	2C5i 3910	NR, Natura 2000	100 m NV Golfklubbens klubbhus	fuktig gräsmark
Vaselund	Hällestad	1352250	6174050	2D4a 4022	N2000	500m O Vaselund gård	fuktäng
Bosarp	Sövde	1363050	6160850	2D2c 0830	-	1300m SO Bosarp	fuktsvacka
Flygrakancaféet	Sövde	1367550	6165950	2D3d 1026	-	skogsområde väster Flygrakancaféet	fuktängsparti
Kråkebacken	Kågeröd	1331150	6212050	3C2g 2011	-	1 km NV Kågeröds kyrka	igenväxande betesmark

Lokal	Socken	RN ost	RN nord	RUBIN	Biotopskydd	Geografiskt läge	Biotop
Svenstorps–Bolshus fälad	Svalöv	1333250	6204450	3C0g 4432	-	1200 m SO Källstorps gård	fäladsmark
Konga	Konga	1336650	6211650	3C2h 1416	-	500 m SSV Kongaö	fukthed
Farhult	Farhult	1307750–1307850	6236850	3C7b 1827– 1828	N2000	800–900 m NNV Farhults kyrka	fukthed
Hjälmsjön a.	Örkelljunga	1344850	6241250	3C8i 1248	-	Hjälmsjöns södra strand	sjöstrand
Hjälmsjön b.	Örkelljunga	1345750	6241650	3C8j 1607	-	1100 m NO väg 24/ Ringarpsvägen	sjöstrand
Hjälmsjön c.	Örkelljunga	1346050	6242350	3C8j 2310	-	Hjälmsjöns norra strand	sjöstrand
Lilla sjö a.	Vittsjö	1364050	6246950	3D9c 1940	-	Lilla sjös NO-sida	sjöstrand
Lilla sjö b.	Vittsjö	1363950	6247050	3D9c 2039	-	Lilla sjös NV-sida	sjöstrand
Höjalsjön a.	Vittsjö	1363850	6247250	3D9c 2238	-	500m ONO Höjalen	sjöstrand
Höjalsjön b.	Vittsjö	1363950	6247350	3D9c 2339	-	600m ONO Höjalen	sjöstrand
Grängessjön	Vittsjö	1364350	6248450	3D9c 3443	-	100m NV Gängessjöns N-spets	strandäng
Vittsjön	Vittsjö	1369550– 1369650	6249750	3D9d 4745– 46	-	400–500m NNV Kallsjön	betesmark med fuktsänkor
Vieån a.	Verum	1378050	6249450	3D9f 4430	-	1150m NV Jakobstorp	fuktäng
Vieån b.	Verum	1369650	6249750	3D9f 4944	-	1375m NO Jakobstorp	fuktäng
Helge å – Härlinge a.	Verum	1381050	6250850	4D0g 0810	N2000	1650m SSV Söndregård	fuktäng
Helge å – Härlinge b.	Verum	1380950	6250750	4D0g 0709	N2000	1750m SSV Söndregård	fuktäng
Helge å – Härlinge c.	Verum	1381150	6251050	4D0g 1011	N2000	1400m SSV Söndregård	mad
Skeingesjön a.	Verum	1382250	6249550	3D9g 4522	N2000	900 m NV Skeinge Säteri	sjöstrand
Skeingesjön b.	Osby	1382650	6251250	4D0g 1226	N2000	500m ONO Ferön	sjöstrand
Skeingesjön c.	Osby	1382950	6252350	4D0g 2329	N2000	600 m SO Spetsberget	sjöstrand
Hanavrå a.	Visseltofta	1377850	6256750	4D1f 1728	-	300 m SV N. Hanavrå	porsmad
Hanavrå b.	Visseltofta	1377850	6256850	4D1f 1830	-	200 m SV Tvillingkvarn	fuktäng
Norresjö	Visseltofta	1382050	6258950	4D1g 3920	-	900 m NNO Gräsljunga	fuktäng

Lokal	Socken	RN ost	RN nord	RUBIN	Biotopskydd	Geografiskt läge	Biotop
Immeln	Örkened	1408950	6241750	3E8b 1739	-	S. Ramnö i Immeln	strand
Gammelen a.	Osby	1383050	6250650	4D0g 0630	-	2100m VNV Gullarps gård	fuktäng
Gammelen b.	Osby	1383050	6250750	4D0g 0730	-	2080 m VNV Gullarps gård	fuktäng
Malsjön	Osby	1384250	6248150	3D9g 3142	-	Maljsjöns Ö strand	fukthed
Rönnebodaån- Nedraryd	Örkened	1402550	6254950	4E0a 4925	-	Rönnebodaån vid Nedraryds gård	strandäng
Vasaltheden a.	Ö. Karup	1308150	6253950	4C0b 3931	N2000	SO Glimminge plantering	fukthål i betesmark
Vasaltheden b.	Grevie	1308250	6253950	4C0b 3932	N2000	1,2 km SV Vasalt	fukthål i betesmark
Dagshög - Torekov a.	Ö. Karup	1303650	6257150	4C1a 2136	NR	200-700 m NNV Dagshög	fuktäng
Dagshög - Torekov b.	Ö. Karup	1303650	6257650	4C1a 2636	NR	950 m NNV Dagshög	fuktäng
Summa lokaler	30						
Summa dellokaler	54						

Så mycket som fem procent av våra djur, växter och svampar löper risk att dö ut. En storsatsning för att bevara dem och deras livsmiljöer ingår i Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas arbete. Det är en del av arbetet för att klara riksdagens miljökvalitetsmål, som exempelvis **Ett rikt odlingslandskap**, **Myllrande våtmarker** och **Ett rikt växt- och djurliv**.

Som en del av åtgärdsprogrammet för bevarande av klockgentiana, *Gentiana pneumonanthe*, och alkonblåvinge, *Maculinea alcon*, inventeras under 2006/2007 förekomsten av klockgentiana på samtliga lokaler i Skåne där arten rapporterades under den senaste landskapsinventeringen, Projek Skånes Flora 1989-2005. Klockgentiana återfanns 2006/2007 på 22 av de 30 lokaler som noterats under 1989-2005. De flesta lokaler är individfattiga och det är endast tre områden, Skanörs ljun, Revingehed samt Hunneröds mosse, som har större, livskraftiga populationer.

