SKYDDSVÄRDA VÅTMARKER I VÄSTERNORRLANDS LÄN



LÄNSSTYRELSEN
VÄSTERNORRLANDS LÄN

PUBLIKATION
1994:2

SKYDDSVÄRDA VÅTMARKER I VÄSTERNORRLANDS LÄN

STEFAN GRUNDSTRÖM & SÖREN UPPSÄLL

PUBLIKATION 1994:2

Layout och redigering: Alf Pedersen
Omslagsfoto: Jan Lundqvist
Tryck omslag: Stiltryck, Härnösand
Tryck inlaga: Länsstyrelsens tryckeri, Härnösand
Upplaga: 200 ex

INNEHÅLL

INLEDNING 1

NATURFÖRHÅLLANDEN
- Våtmarkstyper 3
- Geologi och markförhållanden 4
- Våtmarker och deras utbredning 4
- Något om vegetation och flora 5
- Mossor som indikerar artrika miljöer 6

METODIK 8

SAMMANSTÄLLNING AV INVENTERADE MYRAR 10

OMRÅDESBESKRIVNINGAR
- Kommentarer 13
- Ånge kommun 14
- Sundsvalls kommun 97
- Timrå kommun 140
- Härnösands kommun 152
- Kramfors kommun 156
- Sollefteå kommun 161
- Örnsköldsviks kommun 303

KÄLLFÖRTECKNING 399

INLEDNING

Sverige är ett av de proportionellt sett myrrikaste länderna i världen. I jämförelse med övriga Europa, Ryssland undantaget, är Sverige också det land som har störst andel hydrologiskt ostörda myrar. Den övervägande delen av dessa myrar återfinns i norrlandslänen. Landet uppvisar också en ovanligt stor variationsbredd när det gäller myrtyper. Vi har således ett stort internationellt ansvar att bevara myrar i Sverige och inte minst i Västernorrlands län.

En av anledningarna till att arbetet med våtmarksinventeringen (VMI) sattes igång var det ökade intresset för brytning av energitorv och för skogsdikning under slutet av 1970-talet. I samband med denna exploatering framstod ett stort behov av att känna till och undanta våtmarker/myrar med höga naturvärden. Intresset för brytning av energitorv har idag i viss mån stagnerat. Gällande tillstånd för torvtäkt finns endast på sex myrområden i länet, varav brytning påbörjats eller pågår i hälften av dessa. I dag utgör skogsbruket det största hotet mot våtmarkerna. Dikningar av sumpskogar med hög bonitet, så kallade skyddsdikningar i samband med avverkningar, byggande av skogsbilvägar, körskador från skogsmaskiner samt avverkning av skog/myrmosaiker utgör de största hoten. Ytterligare hotfaktorer mot våtmarkerna utgörs av vattenkraftutbyggnad samt våtmarkskalkning.

Den nu genomförda våtmarksinventeringen i Västernorrlands län är en del i den rikstäckande våtmarksinventering som, med Statens Naturvårdsverk som huvudman, bedrivits i landet sedan i början på 1980-talet. Tidigare översiktliga kartläggningar av landets våtmarker har visat att kunskapsunderlaget var mycket ojämnt.

För Västernorrlands län har kunskapsläget emellertid varit förhållandevis bra. I början på 1980-talet gjordes en länstäckande genomgång och klassificering utifrån tolkningar av svart-vita flygbilder. Underlaget för urvalet av våtmarker utgjordes av Sveriges Geologiska Undersökningar´s torvmarkskarta. Minimiarealen sattes till 70 ha men även i övrigt skiljde sig metodiken från den nu praktiserade VMI-metodiken, (se avsnittet metodik).

Sedan tidigare finns också ett flertal rapporter, allt från mycket detaljerade beskrivningar över enskilda myrar till mer översiktliga inventeringar. På länsstyrelsen finns även ett omfattande material som utgörs av manuskript till opublicerade inventeringar, fältanteckningar och artlistor. Problemet med denna omfattande och heterogena dokumentation är att den bitvis är svårtillgänglig och att den saknar en gemensam bedömningsgrund. Behovet från länsstyrelsen har därför varit stort att samla denna spridda dokumentation.

Målet med inventeringen är därför att presentera en heltäckande kunskapsbas för länets våtmarker med avseende på deras naturvärde.

Den naturvärdesbedömning som här redovisas ska utgöra ett underlag för beslut i ärenden som berör våtmarker. Exempel på sådana ärenden är:

Områdesskydd enligt naturvårdslagen (NVL)
Torvtäktsärenden
Dikningsärenden
Avverkningsanmälningar
Vägdragningar
Vattenkraftsutbyggnad
Kalkningasärenden

Våtmarksdata ska också ingå i det faktaunderlag som fordras för en effektiv miljöövervakning och naturresursplanering. Ett viktigt syfte är dessutom att öka den allmänna kunskapen om och därmed förståelsen för våtmarkerna.

NATURFÖRHÅLLANDEN

Under denna rubrik redogörs för de olika våtmarkstyper som använts för att beskriva våtmarkerna i inventeringen. Här ges också en kortfattad karaktäristik över länets geologiska förhållanden samt våtmarkernads utbredning. Vidare ges en översiktlig beskrivning av våtmarkernas vegetation och flora samt sist något om mossor som indikatorer för artrika miljöer.

Våtmarkstyper

1. **Mosse av nordlig typ. (Nordlig mosse)** Vanlig myrtyp som står blandmyren och risrika skogskärr nära. Kärrväxter förekommer fläckvis. Myrtypen kan vara både öppen och glest tallbevuxen (tallmosse) och förekommer ofta som breda kantzoner mot fastmark. Myrtypen saknar lagg.

2. **Svagt välvd mosse.** Mossetyp med svagt välvt, ofta öppet mosseplan och tydliga laggkärr. Oftast ett rätt så homogent mosseplan utan strukturer. Kan stå de övriga mossetyperna nära.

3. **Strängad mosse.** Mosse med välutvecklade strukturer i form av parallella strängar och stora höljor. Kan vara svagt sluttande och ibland terrängtäckande. Öppen-glest tallbevuxen.

4. **Koncentrisk mosse.** En strukturerad mosse med koncentriskt välvt mosseplan. Endast mossar kan anta denna form som innebär att mossen är kupolformad, dvs högst på ett mindre parti varifrån den sluttar allsidigt ut mot kanten. Tydliga strukturer med strängar, höljor, randskog och lagg.

5. **Excentrisk mosse.** Dessa mossar sluttar solfjäderformigt från en punkt, eller en sida som i stort sett saknar välvning, men påminner i övrigt om en koncentrisk mosse. Övergångstyper mot den strängade mossen förekommer.

6. **Blandmyr**. Mycket vanlig myrtyp där större eller mindre mosseytor ligger i mosaik med kärrytor. Myrtypen kan vara öppen eller glest tallbevuxen. Myrtypen står både mosse av nordlig typ och fastmattekärr (med tuvor) nära.

7. **Strängblandmyr.** Blandmyr med tydliga glest tallbevuxna mossesträngar på ett "kärrgolv". Förekommer i sin utpräglade form endast i norra Ångermanland på gränsen mot Lappland. Bildar övergångstyper mot strängflarkkärr.

8. **Strängflarkkärr**. Kärrtyp med tydligt utvecklade fastmattesträngar och mjuklösbottenflarkar. Strängflarkkärren har oftast en mycket svag lutning men kan i extremfall luta kraftigt och bildar då terrassformer. Strängkärren är oftast mycket glest tallbevuxen.

9. **Öppet kärr. (Topogent kärr)** Den vanligaste kärrtypen vilken innefattar planasvagt sluttande och i huvudsak öppna kärrytor. Alltifrån lösbottenkärr till fastmattekärr med ristuvor innefattas. Övergångstyper mot strängkärr med diffusa strukturer är vanligt.

10. **Skogskärr.** En heterogen våtmarkstyp som innefattar glest-tätnande trädbevuxen kärrartad mark. Pga tolkningssvårigheter är det svårt att avgränsa typen mot tallbevuxen mosse av nordlig typ (tallmosse) och blandmyr.

    Myrtypen är oftast tallbevuxen och risdominerad och ganska tuvig. Det förekommer dock även starr- och örtdominerade skogskärr liksom kärr där glasbjörk, gråal och gran är rikliga. Myrtypen bildar oftast kantzoner mellan fastmark och andra myrtyper.

11. **Soligent kärr.** Relativt starkt lutande (> 3 %) kärrytor som oftast är öppna men kan vara glest trädbevuxna och släta-svagt strukturerade. I våra regioner är kärrtypen nästan alltid av fastmattetyp.
12. **Backkärr.** Starkt sluttande kärr (> 8 %). I länet mycket ovanlig myrtyp, jämför soligent kärr ovan.
13. **Strandkärr.** Även detta en ganska heterogen grupp där det enda som är samlande är läget vid vattendrag eller sjö samt att det i huvudsak ska vara öppet. Både smala zoner vid slingrande åar (sk mader) och större öppna mjukmattekärr vid sjöar är av denna typ.

    De träd och buskar som förekommer är mest glasbjörk, gråal och viden. Tidigare viktiga slåttermarker (sk raningar) som numera oftast är starkt tuviga.
14. **Strandskog.** Skogsbevuxen våtmarkstyp vid olika typer av stränder. Pga tidvisa översvämmningar dominerar oftast lövträden, videarter, gråal och glasbjörk. Övergår i ett diffust sätt i vanlig sumpskog eller skogskärr.
15. **Sumpskog.** Stor heterogen våtmarksgrupp där den relativt täta trädtäckningen och läget utanför strandpåverkade zoner är samlande. Gransumpskog dominerar men även blandsumpskog med både löv och gran är vanligt. Tallsumpskog förekommer också men står oftast tallmossen eller tallkärret nära.

Geologi och markförhållanden

Västernorrlands län, dvs landskapet Medelpad och större delen av landskapet Ångermanland, vilar mestadels på urberg som är ca 2 000 miljoner år gammalt. Kalkfattiga bergarter såsom granit och gnejs dominerar och dessa ger primärt dåliga näringsbetingelser.

Längs kusten finns betydande områden med basrika bergarter, dvs bergarter med hög halt av bl a kalk och magnesium. T ex i Nora och Nordingrå socknar finns gabbro, anortosit och diabaser som ger betydligt rikare näringsbetingelser. På Alnön och inom Hässjö och Tynderö socknar finns också kalkförande bergarter av vulkaniskt ursprung. På flera andra ställen i länet finns stråk av basrika bergarter, främst diabas, som lokalt kan ge en rik vegetation.

I västra delarna av länet, dels i Borgsjö socken i Medelpad, dels i Edsele och Ramsele socknar i Ångermanland finns kalkrik morän från jämtlandssiluren. Den centraljämtska berggrunden består mestadels av ren kalksten och inlandsisen har transporterat material mot öster och sydöst till bl a dessa socknar.


Av jordarterna dominerar morän i de vidsträckta skogslandskapet. Sedimentjordarter dominerar i älvdalarna och vid kustens mindre slättområden. Den jordart som är intressant i detta sammanhang, dvs torv finns spridd i hela länet men är vanligast i inlandets skogshöjder mellan älvdalarna.

Våtmarkerna och deras utbredning

Ca 80 % av länet täcks av skog medan myr täcker ca 10 %. Av dessa 90 %, skogsmark och myr, består ca 20 % av torvmark och våt fastmark, dvs de markslag som innefattas i denna inventering.

Av denna våtmarksareal så betraktas ca 45 % som skogsmark, dvs produktionen överstiger 1 m3sk/ha och år. Resterande, ca 55 %, betraktas som myr men är i många fall ändå trädbevuxna.

Inom den naturgeografiska regionen 30 A finns det mesta av Västernorrlands våtmarker. Regionen 32 C är också mycket våtmarksrik men denna region täcker så liten del av länet. (Se karta).



Länets myrar är förhållandevis små sett i ett norrländskt perspektiv. Endast ett fåtal når en sammanhängande areal över 250 ha, däribland Mossaträsk - Stormyran, Stormyran vid Stavarn i Anundsjö samt Röjtjärnsmyran-komplexet i Torps socken.

De våtmarkstyper som dominerar i länet är främst kärr av olika slag samt blandmyrar, dvs blandningar av kärr och mosse. Även mossar av nordlig typ liksom barrsumpskogar är mycket vanliga. Utpräglat nordliga våtmarkstyper såsom strängblandmyr och soligena kärr är ovanliga, åtminstone över större sammanhängande ytor. I norra Ångermanland, på gränsen mot Lappland, finns en del exempel på dessa myrtyper. Sydliga våtmarkstyper, t ex högmossar finns det några exempel på längs kusten. Stormyran och Måckelmyran i Njurunda socken är kanske de vackraste exemplen på tydligt välvda mossar.

Något om vegetation och flora på länets myrar

Mossar. Vegetationen på mossar är mycket enhetligt i länet. Tuvor och strängar domineras nästan alltid av ris, ljung och/eller kråkbär, tuvull och i bottenskiktet rostvitmossa (Sphagnum fuscum). Tranbär, dvärgbjörk, rosling och hjortron förekommer oftast liksom några eller flera arter renlavar (släktena Cladina och Cladonia). Tall finns alltid men ofta i små och förkrymta former. I höljor är vegetationen alltid artfattig med t ex kallgräs, tuvull och tuvsäv som dominanter. Bottenskiktet i höljorna täcks av någon eller några vitmossarter, främst Sphagnum majus och S. balticum. Andra ofta förekommande kärlväxter är vitag och rundsileshår. Rena lösbottenhöljor förekommer också med bl a levermossorna Gymnacolea inflata och Cladopodiella fluitans. I mer tätt

tallbevuxna mossar tillkommer några skogsarter, t ex blåbär, lingon , odon och i vissa delar även skvattram. I bottenskiktet på tallmossar finns även vanliga mossor som Pleurozium schreberii, Sphagnum angustifolium och S. magellanicum.

Fattiga kärr. De näringsfattigaste kärren står mossevegationen nära. På öppna fattigkärr tillkommer t ex flaskstarr, trådstarr, dystarr, vattenklöver samt mossorna Sphagnum papillosum och Straminergon stramineum. På trädbevuxna kärr, s k skogskärr i dess övergångsformer mot öppna kärr tillkommer främst klotstarr jämfört med tallmossarna. Även trådstarr och taggstarr kan dominera skogskärren. Skogskärren kan vara dominerade av både tall, gran och löv men kan också vara en blandning av dessa.

Intermediära kärr. Här tillkommer ett stort antal arter som kräver mer basrik mark. Av kärlväxter blir främst blåtåtel och tuvsäv kraftigt dominerande. Enbuskar, snip, knagglestarr, nålstarr, vitstarr, dvärglummer, blodrot och slåtterblomma är vanliga i intermediära kärr, både öppna och glest skogsbevuxna. Av mer exklusiva växter kan bl a kärrull, brunag, skavfräken och myggblomster förekomma. Bland mossorna är t ex Paludella squarossa, Sphagnum warnstorfii, Loeskypnum badium och Warnstorfia sarmentosa indikatorarter för intermediära kärr. I intermediära skogskärr tillkommer ett antal örter som skogsnäva, kärrfibbla och älgört. Lövinslaget ökar normalt ju rikare kärren är.

Rika kärr. I kalkpåverkade områden finns rikkärr och i vissa fall även vad som brukar kallas extremrikkärr. Av kärlväxter finns på länets rikkärr ofta rikligt med gräsull (kan även finnas på en del intermediära kärr) samt mer sparsamt hårstarr, tagelstarr, sumpnycklar, smalfräken och tagelsäv. Sällsynta rikkärrsarter i Västernorrland är bl a myrbräcka, brudsporre, axag, huvudstarr och blodnycklar. Av mossorna blir ofta Sphagnum warnstorffi, Tomentypnum nitens, Campylium stellatum och Scorpidium scorpidoides dominerande på rikkärr. Pseudocalliergon trifarium kan hittas i rika mjukmattor och Scorpidium cossonii samt några Palustriella-arter och Philonotis-arter vid källpåverkade kärr.

I rika eller extremrika skogskärr (sumpskogar) kan bl a guckusko, finbräken och kärrknipprot växa.

Strandkärr. I denna typ av våtmark är vegetationen mycket mångformig och oftast zonerad på ett tydligt sätt. Riktiga vassar med t ex sjöfräken, norrlandsstarr och flaskstarr kan dominera större ytor i sjöar och smala zoner ivattendrag. Längre upp vidtar ofta ett mer heterogent tuvigt starr- och örtbälte vars sammansättning varierar kraftigt beroende på storleken på vattendraget, översvämningsregim, näringsrikedom m m. Styltstarr med sina karakteristiska huvuden är en vanlig art i denna naturtyp. Videbuskar blir allt vanligare närmare fastmarken och spridda björkar och tallat förekommer också. Örter som är vanliga i översvämmade kärr på lite fastare underlag är t ex älgört, kärrviol, kråkklöver och kabbleka. Bland mossorna kan t ex Sphagnum riparium, Sphagnum fimbriatum och Climacium dendroides uppträda i riklig mängd. Tämligen släta strandkärr av mer ordinär myrtyp med t ex blåtåtel och trådstarr är också vanlig längs vissa mindre vattendrag.

Till mångformigheten i denna naturtyp bidrar i viss mån också bäverdämningar.

Mossor som indikerar artrika miljöer

Vid tidigare utförda inventeringar av våtmarker har man vanligen beskrivit deras vegetationstyper utifrån kärlväxter. Tyvärr räcker det inte att använda kärlväxter som indikatorarter när det gäller att hitta miljöer som är intressanta även för den lägre floran och faunan. Mossorna är däremot mycket användbara i detta avseende då de ofta är

starkt knutna till variabler som fuktighetsgrad, mineral- och näringsstatus, beskuggning, skoglig kontinuitet mm. För att identifiera särskilt skyddsvärda våtmarksbiotoper är därför mossorna ofta överlägsna kärlväxterna. Med särskilt skyddsvärda biotoper menas här biotoper som innhåller hotade och/ eller sällsynta arter samt sådana som i sig själv är hotade eller mycket artrika. Att detaljinventera mossfloran är mycket arbetskrävande och för den som inte är specialist ofta en övermäktig uppgift.s

För att komma förbi dessa svårigheter kan man använda sig av sk indikatorarter. Detta är arter som: - 1) är knutna till biotoper som riskerar att förstöras vid exploatering, - 2) är bundna till särskilt skyddsvärda biotoper, - 3) inte är svåra att känna igen, - 4) som växer så att man normalt hittar dem utan detaljgranskning, - 5) som inte har alltför begränsad utbredning

Nedan listas de mossor som indikerar biotoper med hotade eller sällsynta arter samt sådana biotoper som är sällsynta eller mycket artrika. Från Hedenäs & Löfroth, Svensk Bot. Tidskr. 86 (1992):

Indikatorer i hela sitt svenska utbredningsområde

Amblystegium saxatile	Brachythecium rivulare	Brachythecium turgidum
Bryum neodamense	Bryum weigelii	Calliergon giganteum
Calliergon megalophyllum	Campylium protensum	Catoscopium nigritum
Cinclidium subrotundum	Conardia compacta	Conocephalum conicum
Cratoneuron filicinum	Ctenidium molluscum	Dichelyma capillaceum
Dicranum bonjeanii	Dicranum flagellare	Dicranum fragilifolium
Fontinalis hypnoides	Fossombronia incurva	Geocalyx graveolens
Hamatocaulis vernicosus	Hyrohypnum-arter	Jungermannia hyalina
Jungermannia leiantha	Jungermannia obovata	Leskea polycarpa
Lophozia rutheana	Meesia longiseta	Meesia triquetra
Moercknia hibernica	Myrinia pulvinata	Nardia insecta
Odontoschisma denudatum	Oncophorus virens	Palustriella-arter
Philonotis calcarea	Philonotis seriata	Plagiomnium elatum
Plagiothecium latebricola	Plagiothecium ruthei	Pseudocalliergon lyccopodioides
Pseudocalliergon trifarium	Pseudocalliergon turgescens	Radula lindenbergiana
Rhytidiadelphus subpinnatus	Riccardia chamaedryfolia	Riccardia incurvata
Riccardia multifida	Riccardia palmata	Riccia fluitans
Ricciocarpus natans	Scapania degenii	Scorpidium cossonii
Scorpidium scorpidioides	Sphagnum contortum	Sphagnum teres
Sphagnum wulfianum	Tomentypnum nitens	Trichocolea tomentella
Tritomaria polita	Warnstorfia trichophylla	Warnstorfia tundrae

Indikatorer enbart i norra Sverige

Calliergon cordifolium	Calliergonella cuspidata	Climacium dendroides
Drepanocladus i snäv mening (samtliga arter)		
Rhynchostegium riparioides	Thuidium-arter	

METODIK

VMI står för våtmarksinventering och den metod som använts vid länets våtmarksinventering. Metoden är framtagen av statens naturvårdsverk och finns beskriven i SNV PM 1680-83. Den definition av våtmarker som används inom ramen för VMI lyder enligt följande:

Våtmark är sådan mark där vatten under en stor del av året, finns nära under, i eller strax över markytan samt vegetationstäckta vattenområden.

Inventeringen omfattar alla länets våtmarker större än 50 ha. I vissa delar och där kännedom om specifika värden funnits har även våtmarker mindre än 50 ha inventerats. Urvalet av dessa senare är emellertid inte på något sätt konsekvent. Sumpskogar som inte ligger i anslutning till öppna våtmarker har också utelämnats. Detta pga att det för närvarande pågår en omfattande sumpskogsinventering av samtliga i landet förekommande sumpskogstyper. Denna inventering utförs av skogsvårdsstyrelserna med skogsstyrelsen som huvudman.

VMI-metodiken har en arbetsgång som är uppdelad i tre steg vilka beskrivs nedan. Arbetet med steg 1 utfördes i Medelpad under 1990 och för Ångermanlands del under 1992-93. Under fältsäsongen 1990 besöktes ett 40-tal myrar i Medelpad och 1993 ytterligare 25 st i Ångermanland. För Ångermanlands del har äldre fältdata från ett 30-tal myrar också förts in i VMIs databas.

I steg 1 identifieras våtmarken (som vidare benämns objekt) i flygbild. Här har svart-vita flygbilder använts i Medelpad och i den östra delen av Örnsköldsviks kommun. I övriga delar av Ångermanland har infraröda (IR) flygbilder utnyttjats. I flygbildstolkningen bedöms faktorer som grad och typ av ingrepp, beskogning, blöthet samt hydrotopografi. Kompletterande information inhämtas också från litteratur och kartor. Utifrån flygbilden ritas en skiss där objektet avgränsas och delas in i delområden efter våtmarkstyp, sk delobjekt. Från denna skiss utförs arealberäkningar av såväl delobjekt som objekt och objektet benämns utifrån övergripande våtmarkstyp. Samtliga av dessa data registreras via blanketter i en våtmarksdatabas på naturvårdsverket.

I steg 2 görs en ADB-baserad poängberäkning av preliminära naturvärdesklasser. Detta sker utifrån det i steg 1 registrerade materialet. Faktorer som här spelar en avgörande roll för värderingen är representation, orördhet/ostördhet, storlek, mångformighet och raritet. Denna klassning sker med delobjekten som "grundenhet" och utgående från naturgeografisk region.

Steg 3 utgörs av en översiktlig fältinventering. De i steg två högst poängsatta objekten inventeras. För länet som helhet har 10 % av de tolkade objekten fältbesökts. Inventeringen syftar till att kontrollera tolkningen, ingreppen och värderingen samt att dela in delobjekten i element. I elementen registreras arter, främst mossor och kärlväxter, och beskrivs vegetationstyper. Vidare görs en bedömning av objektets övriga värden som t ex landskapsbild, faunistiska och floristiska värden, representativitet och värden för kulturmiljövården.

Utifrån de data som samlats in vid fältinventeringen tillsammans med den preliminära naturvärdesklassningen som gjorts i steg 2 görs så en slutgiltig naturvärdesbedömning. Här ges vissa myrtyper och nyckelord extrapoäng. Det kan t ex gälla strängblandmyrar som i sig representerar en mångformighet eller högmossar som representerar en i regionen sällsynt myrtyp. Även andra inslag i delobjekten som bidrar till mångformighet ges poäng. Det gäller bl a företeelser så som källor, bäckdråg, förekomst av naturskog mm. Även delobjekt med höga zoologiska, botaniska och geovetenskapliga värden ges extrapoäng.

Den slutgiltiga naturvärdesbedömningen leder fram till att objekten klassificeras i fyra klasser:

Klass 1 Särskilt värdefulla objekt . Detta innebär att dessa våtmarker tillhör de mest skyddsvärda inom respektive naturgeografisk region. Ett grundkrav för dessa objekt är ekologisk stabilitet, de måste med andra ord vara väsentligt opåverkade av mänskliga ingrepp.

Klass 2 Ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt. Dessa våtmarker bör ses som en grupp där starka motiv för bevarande av naturvärdena finns. De är i princip opåverkade av ingrepp och kan, tillsammans med klass 1-objekten, betraktas som ett urval representativa och ekologiskt stabila våtmarker i respektive naturgeografisk region.

Klass 3 Objekt med vissa naturvärden. Dessa våtmarkerna utgör en mer heterogen grupp, vad det gäller motiv för bevarande, än klasserna ovan. Ofta finns dock indikationer på naturvärden, t ex storlek, mångformighet eller botaniska värden. I denna grupp varierar frekvensen av ingrepp och några slutsatser om ekologisk stabilitet kan inte dras generellt.

Klass 4 Objekt utan nämnvärt naturvårdsintresse. Till dessa våtmarker hör de som bedöms vara starkt påverkade - förstörda av ingrepp.

Parallellt med arbetet enligt VMI-metodiken har också information från befintlig litteratur och andra källor om länets våtmarker sammanställts. Detta rör sig om tidigare av länsstyrelsen publicerade rapporter och inventeringar samt opublicerade dito i manuskriptform, artlistor, fältanteckningar och annat opublicerat material vid länsstyrelsen samt landskapsfloror. Rapporten "Skyddsvärda våtmarker i Västernorrlands län" kan sägas utgöra en sammansmältning av allt detta material. Ambitionen har varit att åstakomma en skrift som samlar all denna information om länets våtmarker, utifrån naturvårdens perspektiv.

SAMMANSTÄLLNING AV INVENTERADE MYRAR

Under denna rubrik presenteras statestik i form av tabeller och stapeldiagram för de våtmarker som bearbetats enligt VMI-metodiken. Materialet är hämtat från den databas för våtmarksdata som finns vid naturvårdsverket.

Tabell 1

Antal objekt och våtmarksareal fördelat på klass och kommun


Kommun	Klass 1 Antal	Areal (ha)	Klass 2 Antal	Areal (ha)	Klass 3 Antal	Areal (ha)	Klass 4 Antal	Areal (ha)	Summa: Antal	Areal (ha)
Ånge	18	2 760	45	3 605	90	5007	13	749	166	12 121
Timrå	1	146	8	902	6	65			15	1 113
S-vall	5	411	20	1 581	43	2 163	6	383	74	4 538
H-sand			1	33	2	324			3	357
K-fors			1	56	3	140			4	196
Soll-å	43	7 785	47	4916	117	8 472	20	2 093	227	23 266
Ö-vik	30	4 978	33	4 123	90	7 509	10	1 069	163	17 679
Summa:	97	16 080	155	15 216	351	23 680	49	4 294	652	59 270
%	27		26		40		7		100	

Tabell 2

Antal delobjekt och areal av varje myrtyp


Myrtyp	Antal	Areal
Blandmyr av mosaiktyp	232	7025
Sträng-blandmyr	25	530
Obestämbart kärr p g a ingrepp	2	7
Soligent kärr	33	623
Sträng-flarkkärr	114	2315
Topogent kärr	862	21 800
Strandkärr vid vattendrag	83	1 780
Strandkärr vid sjö	9	154
Excentrisk mosse	4	74
Koncentrisk mosse	6	154
Nordlig mosse	377	10 936
Svagt välvd mosse	21	331
Platåformigt välvd mosse	2	46
Sluttande mosse	33	649
Obestämbar myr p g a ingrepp	22	906
Bevuxen sjö	6	115
Backkärr	1	18
Limnogen strandfuktäng	2	19
Strand vid vattendrag	30	383
Sjöstrand	4	55
Limnogen strandsumpskog	28	519
Sumpskog	273	5 245
Tjärn	189	1 160
Vegetationstäckt vattenyta	3	39

Figur 1 Summa våtmarksyta per klass och kommun
VMI i Västernorrlands län




SNV/M.Löfroth 1994

Figur 2 Summa yta per påverkansgrad och kommun
VMI i Västernorrlands län



SNV/M.Löfroth 1994

ÅNGE KOMMUN


SUNDSVALL
Leringen
Torpshammar
Gissjön
Ljungaverk
NORDANSTIG
LJUSDAL
BRÄCKE
ÅNGE
Ljungan
Alby
Östavall
Holmsjön
Haverö
Håverm
HÄRJEDALEN
ÖSTERSUND
18
17
6(G)
5(F)
0
10
20
30 km
Skala 1 : 500 000

OMRÅDESBESKRIVNINGAR

Kommentarer

Presentationen av våtmarkerna är uppdelad på kommuner där en kommun utgör ett kapitel. Först i varje kapitel finns en kommunkarta med våtmarkerna inprickade med ett löpnummer för kommunen. Därefter följer en objektsvis presentation av de högst klassade våtmarkerna, dvs klass 1 och 2. I denna presentation är våtmarkerna utförligt beskrivna enligt nedan.

Överst på varje våtmarksobjekt finns ett "huvud" där vårmarkens **namn** och **löpnummer** inom kommunen anges.

Därefter anges **Värdeklass** med romerska siffror (se klassificering under rubriken Metodik).

Geokod anges så alfanumeriskt t ex 17F 2C 4B7A. Där står 17F för topografiskt storblad, 2C för 5km-ruta (ekonomiskt kartblad), 4B för km-ruta och slutligen anger 7A 100m-ruta.

Areal anges i ha och avser våtmarksareal, dvs totalarealen minus fastmarksinslag och öppet vatten i forma av tjärnar och större vattendrag.

Flygbild anger fotograferingsår på den bild som använts vid tolkningen. Om våtmarken inte fältbesökts anger detta årtal uppgifternas aktuallitet.

Höh står för höjd över havet.

VMI-nr utgör våtmarkens identifikationsnummer, t ex 17F 2C02 där 2C står för 5km-ruta och 02 för löpnummer inom denna ruta. Under detta nummer finns våtmarken registrerad i naturvårdsverkets nationella databas.

Efter rubriken **Naturvårdsobjekt** anges det nummer våtmarken har i länsstyrelsens naturvårdsregister, t ex N60 044. Här stå N för naturvårdsobjekt och i de fall det står NR utgör objektet riksintresse för naturvården. De två första siffrorna är kommunkod och de tre följande ett löpnummer.

Sist i huvudet anges **Fältbesökt** där det noteras årtal samt namn på de personer som fältbesökt och på något sätt dokumenterat naturvärden på lokalen.


Efter huvudet finns en karta som utgör ett utdrag från den topografiska kartan med våtmarkens gräns inritad. Nedan denna följer en klartext där våtmarken beskrivs översiktligt under rubriker som **Vegetation och flora, Fauna, Påverkan, Bedömning** samt **Källa.**

Sista delen av varje kapitel upptas av en "katalog" där samtliga dokumenterade våtmarker inom respektive kommun kortfattat och i stolpform presenteras. Denna presentation utgörs av den information som finns inlagd på naturvårdsverkets nationella våtmarksdatabas. Katalogen är bitvis kompletterad med våtmarker som inte finns inlagda i VMI samt med källhänvisningar.

För varje objekt redovisas VMI-nummer, numeriskt angivna koordinater för 100m-ruta, klass och namn. Vidare anges även objektets övergripande våtmarkstyp, totalareal, våtmarksareal (inom parantes), höjd över havet (möh), år då den använda flygbilden fotograferats (Flygb.), år för fältbesök (Fält) samt namn på den som tolkat våtmarken (Det:). Efter detta kan en mängd olika nyckelord anges. Därefter redovisas för respektive delobjekt: våtmarkstyp, areal och antal ytor, trädtäckning, grad och typ av påverkan samt nyckelord. Vidare redovisas delobjektens element och deras morfologisk typ, %-uella andel av delobjektet, grad av trädtäckning och skogstyp, översiktlig vegetationstyp samt hydrologisk typ. För fältbesökta delobjekt anges vegetationstyp.

Bredmyran. nr 5

Värdeklass II
Geokod 17F 2C 4B7A
Areal 95 ha
Flygbild 1987
Höh 280 m
VMI-nr 17F 2C02
Naturvårdsobjekt N60 044
Fältbesökt 1983, M Muhr.
1978-06, M Dynesius.



Bredmyran lutar svagt mot V och avvattnas via en mindre bäck ut i Enstern. Några tjärnas av varierande storlek finns i myrområdet. Området avgränsas i norr av en skogsbilväg. Myrens östra del utgörs av ett stort och öppet *strängflarkkärr*. Mot kanterna övergår strängkärren i svagt strukturerade kärrytor. I södra kanten finns en *blandmyr* med tallbevuxna mosseytor utspridda på ett fastmattekärr. *Risrika skogskärr* med bitvis ganska tät krontäckning dominerar den östra delen runt tjärnarna och bäcken.

Vegetation och flora: Det öppna kärret har en intermediär-rik vegetation. Bladvass, blåtåtel, vitag och snip är rikliga arter i kärrytorna. Rik-kärrsindikatorer som ängsnycklar, gräsull och axag förekommer på myren.

Fauna: Värdeklass III i fågelinventeringen.


Påverkan: Större delen av myrkomplexet är opåverkat. I V delen finns partier med dikespåverkan och den övre delen påverkas svagt av en väg.

Bedömning: Myren är till större delen opåverkad med det stora och blöta strängflarkkärret som värdefullaste del. Vegetationen är bitvis rik med en av få axag-förekomster i länet. Myren är ornitologiskt skyddsvärd.

Källa: Dynesius, M. och Simonsson, P. Fågelmyrar i Västernorrlands län Rapport 1980:13 från länsstyrelsen, Härnösand.

Våtmarker vid Sotån. nr 7

Värdeklass II
Geokod 17F 2D 3D3F
Areal 190 ha
Flygbild 1987
Höh 290-306 m
VMI-nr 17F 2D02
Naturvårdsobjekt N60 163



Långsträckt våtmarksområde på båda sidor om Sotån från tillflödet vid Väster-Sotsjön till Sottjärn 4 km västerut. Närmast ån, som bitvis är ganska slingrande och har flera sel, finns *öppna strandkärr,* men bitvis även *trädbevuxna strandkärr.*


De dominerade våtmarkstyperna är *glest tallbevuxen blandmyr* samt *barrsumpskog* som ställvis glesnar ut i rena skogskärr. Rena *tallmossar* av lite större yta förekommer i ö delen.

Påverkan: Den södra kanten mot fastmarken störs något av skogsbilvägen men också av enklare körvägar. Lokalt finns också äldre diken i blandmyr-området.

Bedömning: Tämligen stort och mångformigt våtmarksområde med lokala ingrepp. Området är värdefullt främst på grund av det slingrade vattendraget med i huvudsak ostörda omgivningar och stort inslag av sumpskog.

Håflon. nr 11

Värdeklass II
Geokod 17F 2E 2D 9F
Areal 97 ha
Flygbild 1987
Höh 300 m
VMI-nr 17F 2E O2
Naturvårdsobjekt N60 164



Myromåde vid Håtjärnarna som helt omges av skogsbilvägar. De centrala delarna utgörs av vanliga *tallmossar,* risrika *skogskärr* samt öppna *strandkärr* och lövrik *strandskog.* I V respektive SO kanten finns *öppna mossar* som är svagt välvda. Området är hydrologiskt stört av vägar, avverkningar och diken på flera ställen längs kanterna.


Bedömning: Myren är värdefull främst p g a mångformigheten och förekomsten av för regionen ovanlig myrtyp (svagt välvd öppen mosse). Dessutom finns här geovetenskapliga värden i form av en välutvecklad åsrygg.

Häxtjärnflon m fl. nr 13

Värdeklass I
Geokod 17F 2G 2B5C
Areal 127 ha
Flygbild 1987
Höh 395-410 m
VMI-nr 17F 2GO1
Naturvårdsobjekt N60 050
Fältbesökt 1990, S Grundström och M Löfroth

Våtmarksområdet består av Storflon vid Häxtjärnen, Häxtjärnflon söder om tjärnen samt två myrarmar mot norr. Myrarna sluttar svagtmåttligt mot SO och avvattnas via Häxtjärnsbäcken på andra sidan länsgränsen. Runt Häxtjärnen utbreder sig *öppna kärr* av fastmatte- och mjukmattetyp, glest trädbevuxna *blandmyrar* och tallmossar. Mot SO och V finns vidsträckta *tallkärr.* De två myrarna i norr utgörs mest av blandmyr varav en välutvecklad *strängblandmyr* i den NO delen (Brattmyran). Små partier med sluttande *strängflarkkärr* återfinns i smalare zoner.

Vegetation och flora: Tall dominerar befintlig trädskikt och mosseytorna är av ordinär risfuscumtyp mestadels. Kärren domineras av svagt intermedär vegetation men smärre partier rikkärr förekommer. Snip, ängsnycklar, fjällskära och gräsull förekommer allmänt men sparsamt även Sphagnum subsecundum och Campylium stellatum. Sphagnum teres och Calliergon richardsonii återfinns i ett källpåverkat kärr.




Påverkan: I norra delen finns körskador av terrängfordon. Den SO delen vid bäcken verkar störd av en äldre dammreglering längre ner.

Bedömning: Medelstort, endast svagt lokalt påverkat myrområde med stor mångformighet. Tämligen stora kärrytor med intermediär-rik vegetation och förekomst av källor.

N Lövåsmyran/ Smalmyran. nr 16

Värdeklass II
Geokod17F 2J 4C1A
Areal 100 ha
Flygbild 1987
Höh 425-455
VMI-nr 17F 2J01
Naturvårdsobjekt N60 213




Myren domineras av *strängade, svagt sluttande mossar* med *sluttande kärrdråg* emellan. I NV delen ligger ett *strängflarkkärr* som diffust övergår i ett mjukmattekärr. Strängkärret är delvis uppdelat i smala strängar och stora lösbottenflarkar och delvis i tätt liggande strängar och flarkar. I södra och östra delen finns flikar med *sumpskog* och *skogskärr* som i vissa delar är dikningspåverkande. Ett blött bäckdråg med gles skog ligger centralt i Smalmyran.

Påverkan: I södra delen finns ett litet dikessystem och längs kanterna finns på flera ställen basvägar.

Bedömning: Myrområdet är till största delen hydrologiskt ostört Den stora ytan med relativt väldifferentierade svagt sluttande mossar och kärr ger ett mycket högt bevarandevärde.

Lappmyran. nr 17

Värdeklass II
Geokod 17F 2J 4C7E
Areal 103 ha
Flygbild 1987
Höh 400-410 m
VMI-nr 17F 2J02
Naturvårdsobjekt N60 166



Lappmyran ligger vid Stor-Grundsjöns södra strand och myren sluttar svagt ner mot sjön. Genom myren rinner två mindre bäckar och i östra delen ligger en liten tjärn. Myren sitter ihop med Porassomyran i öster genom en smal trädbevuxen myrarm.

Myrens största delobjekt är en *svagt välvd mosse* vars centrala del är helt öppen och kanterna är tallbevuxna. Partier av mossen är differentierade i strängar, tuvor och höljor.

Den östra delen av myren har en delvis välutbildad storskalig struktur med stråk av tallmossar som löper parallellt med kärrdråg.


Kring tjärnen finns ett gungflykärr och i kanterna finns partier med skogskärr och sumpskog.

Påverkan: En körväg i södra delen samt ett kort dike vid tjärnen.

Bedömning: Myren är i sin helhet lite påverkad vilket är ovanligt i denna trakt. Den stora svagt välvda mossen är en ovanlig myrtyp i regionen vilket motiverar det höga bevarandevärde.

Fagerflon. nr 18

Värdeklass II
Geokod 17F 3A 1C9I
Areal 85 ha
Flygbild 1987
Höh 330-345 m
VMI-nr 17F 3AO1
Naturvårdsobjekt N60 159



Fagerflon ligger V om Hortesberget branta V-sluttning. Myren är utbildad på sidorna om en bäck och sluttar ner mot bäcken på ömse sidor. Bäcken passerar två små tjärnar. Myren avvattnas mot N ut i Hortesån. Centralt i myren ligger en *öppen-glest tallbevuxen mosse* och två ytor med *öppna kärr*. I södra delen finns dessutom ett strängflarkkärr. Bäcken omges av en bitvis ganska tät *strandskog*. Längs kanterna förekommer zoner med *skogskärr*.


Påverkan: En basväg i SV kanten och en hel del avverkningar ända ut i myrkanten. Dessutom är myrholmar och troligen en del sumpskog i N delen avverkad.

Bedömning: Fagerflon är en mångformig och lite påverkad myr. De blötaste kärrytorna vid bäcken samt strandskogen utgör de värdefullaste delområdena.

Anmärkning: Halva myren ligger i Jämtlands län.

Rörmyran. nr 21

Värdeklass II
Geokod 17F 3B 1E5F
Areal 105 ha
Flygbild 1987
Höh 270-280 m
VMI-nr 17F 3BO3
Naturvårdsobjekt N60 161




Rörmyran ligger i en svag västsluttning och omges av låga moränhöjder. Myren avvattnas i NV och SV delen ut i Enstern. Myren avgränsas i söder av en skogsbilväg. Flera tjärnar och fastmarksholmar finns i myren. En stor del av myren utgörs av *öppna fastmattekärr, strängflärkkärr* och *trädbevuxna kärr* i kantzoner. Centralt ligger två tydligt utformade *mossar* som avvattnas av breda kärrlaggar mot öster. Partier med otydligt utformade rismyrar utgör en övergångstyp mellan mosse och kärr.

Påverkan: I södra kanten finns några diken och en skogsbilväg.

Bedömning Rörmyran är till största delen opåverkad av ingrepp och är tämligen mångformig med bl a flera tjärnar och blöta kärr. Här finns vanliga myrtyper som är representativa för regionen.

Finnsjömyran. nr 26

Värdeklass II
Geokod 17F 3G4E6F
Areal 70 ha
Flygbild 1987
Höh 260-270 m
VMI-nr 17F 3G01
Naturvårdsobjekt N60 113
Fältbesökt 1979-07, P Simonsson.



Myren sluttar svagt mot väster och avvattnas helt av Juån. Myren avgränsas i NO av järnvägen och övergår via små sumpskogspartier i Flarkmyran mot SO. V om myren finns ett blockområde.

Vegetation: Den östra delen är en tallbevuxen blandmyr. Den västra delen består av ett fattigt-intermediärt strängflarkkärr med stor del tallbevuxna strängar och stora vattenfyllda flarkar. Ett parti med rena mossesträngar förekommer också. Myrens sydligaste delar består till stor del av fastmattekärr med högstarrvegetation. I myrens kanter finns tallmossepartier som övergår i sumpskog.


Fauna: Vid fältbesöket sågs krickor (häckande) samt 2 tranor.

Påverkan: Järnvägen går precis i myrkanten och påverkar myren lokalt.

Bedömning: En medelstor i huvudsak opåverkad myr som är ganska mångformig. Den värdefullaste delen torde vara det stora strängflarkkärret som till stor del är mycket blött. Vegetationen är delvis intermediär med enstaka mer krävande arter.

Flarkmyran. nr 28

Värdeklass II
Geokod 17F 3H 3A5E
Areal 100 ha
Flygbild 1987
Höh 270-275
VMI-nr 17F 3HO1
Naturvårdsobjekt N60 227
Fältbesökt 1979-07, P Simonsson.
1990-08, S Grundström och M Löfroth (N delen).



Den N delen sluttar svagt mot söder ner mot den slingrande Juån. Den S delen består av ett flackt område vid Juån. Myren avgränsas i norr av järnvägen och övergår i NV via sumpskogsytor i Finnsjömyran (17F3GO1).

Den norra delen upptas av en *strängad mosse* med ett glest trädskikt och stora mjukmattehöljor, av ett *öppet kärr* (mjuk-fastmatta) och en *tallsumpskog*. Mossen övergår ställvis i blandmyr. Den södra delen består av *strandkärr* som delvis är öppna och delvis trädbevuxna. Även här finns rätt stora sumpskogsytor.

Vegetation och flora: Längs ån finns högörtvegetation med bl a kärrsilja och älgört men också fastmattekärr av blåtåtel-tuvsävtyp. De övriga kärren är av fattig-intermediär typ och verkar helt sakna rikare inslag. Höljorna i mossen domineras av tuvull och kallgräs. I tallsumpskogen i norra delen finns omväxlande risvegetation och ört/gräsvegetation och även här är blåtåtel en dominant.


Fauna: Reproducerande flodpärlmussla i Juån 1990.

Påverkan: Strandkärren är tydligt regleringspåverkade och delvis stadda i igenväxning med ungt lövsly. Regleringen härrör troligen från en damm i myrens västra del. I norra delen finns mindre diken och även järnvägen har påverkat myren lokalt.

Bedömning: Medelstort och tämligen mångformigt våtmarksområde med lokala störningar. Värdefull är främst de ovanligt stora ytorna med tallsumpskog och strandkärr (något stört). Ordinär flora och fågelfauna utan kända exklusiva inslag.

Lommyran. nr 29

Värdeklass II
Geokod 17F 3I 3E9I
Areal 77 ha
Flygbild 1987
Höh 370-390 m
VMI-nr 17F 3IO1
Naturvårdsobjekt N60 107,
del av NR60 047
Fältbesökt 1983, M Muhr.
1978-06, M Dynesius.



Myrområdet hyser flera fastmarksholmar, sluttar svagt mot söder och avvattnas via Långtjärnsbäcken som utgör myrens gräns mot söder. Den avverkningspåverkade delen söder om bäcken har ej tagits med i våtmarks-objektet. Myren domineras av *strängflarkkärr* och *släta kärr* av mjukfastmattetyp. Mot kanterna övergår kärren i skogsbevuxen rismyr.

Vegetation och flora: Stora delar har en intermediär vegetation. Strängarna är oftast väl avsatta med fastmatte- och ristuvegetation. Flera flarkgölar förekommer varav några är terrasserade. Utåt kanterna på strängkärret bildar fastmattorna större sammanhängande områden som ställvis övergår i blandmyr. Av rikindikerande arter finns bl a brunag, björnbrodd, ängsnycklar och myggblomster. På torrträd i strängkärret växer varglav.

Fauna: Värdeklass III i fågelinventeringen.


Påverkan: En körväg som troligen använts av skogsbruket går över myren i norra delen.

Bedömning: Lommyran är en medelstor myr som är hydrologiskt ostörd. Myren hyser ovanligt väldifferentierade strängflarkkärr med ställvis terrasserade flarkgölar. Myren är botaniskt intressant med ovanliga arter såsom varglav, myggblomster och brunag.

Källa: Dynesius, M och Simonsson, P, Fågelmyrar i Västernorrlands län Rapport 1980:13 från länsstyrelsen i Härnösand.

Hättomyran. nr 32

Värdeklass II
Geokod 17F 3J 3B7F
Areal 55 ha
Flygbild 1987
Höh 400-410 m
VMI-nr 17F 3JO1
Naturvårdsobjekt N60 108,
del av NR 60 047
Fältbesökt 1978, M Dynesius.



Hättomyran ligger i en långsräckt båge nedanför Stormyrberget. Myren sluttar svagt mot SV och avvattnas mot söder till Långtjärnbäcken. I södra delen vid vägen ligger några småtjärnar. Den centrala delen upptas av ett mycket välutvecklat *strängflarkkärr* med breda strängar som är glest

trädbevuxna. På myren finns också ett mer diffust strängat kärr samt ett *lösbottenkärr* vid en igenväxande tjärn. Flera små *sumpskogspartier* finns utåt kanterna.

Fauna: Värdeklass IV i fågelinventeringen.


Påverkan: En basväg utmed myrkanten i söder. Landsvägen påverkar den södra kanten något.

Bedömning: Myren hyser ett ovanligt välutbildat och stort sammanhängande strängflarkkärr med stora flarkgölar. För övrigt finns här vanliga myrtyper. Myren är huvudsakligen opåverkad och bör ses som en del av det högt värderade Stormyrankomplexet.

Källa: Dynesius, M. och Simonsson, P. Fågelmyrar i Västernorrlands län. Rapport 1980:13 från länsstyrelsen i Härnösand.

Storflon vid Floberget. nr 38

Värdeklass II
Geokod 17F 4H 3A9J
Areal 93 ha
Flygbild 1987
Höh 430-435 m
VMI-nr 17F 4HO1
Naturvårdsobjekt N60 170
Fältbesökt 1981, M Muhr och K Due.



Myren ligger Ö om Florberget 3 km Ö om Östavall. Myren är nästan plan och den södra delen och tjärnen avvattnas via Storflobäcken åt öster. Myrens norra delar avvatttnas åt norr via en mindre bäck ut i Ljungan. *Tallmossor, skogskärr* samt *blandmyrar* dominerar Storflon men på några ställen förekommer *öppna kärr* av både mjukmatte- och lösbottentyp.

Vegetation och flora: Vegetationen i kärren är fattig-intermediär med bl a trådstarr och tuvsäv som vanliga arter och förekomst av flera brunmossor. En stor del av Storflon upptas av glest trädtäckta blandmyrar där fattiga-intermediära fastmattekärr övergår i mosseytor och fastmark. Skogskärren är delvis rätt så täta och övergår i sumpskog.

Påverkan: Ett dike från Storflotjärnen löper i myrens sydöstra del. Från myrens mitt kommer ytterligare ett dike till Storflobäcken. Landsvägen från Östavall skär genom myrens södra del.

Bedömning: Hydrotopografiskt är Storflon rätt så homogen och saknar välutbildade myrtyper. Bäcken är utgrävd till ett kraftigt dike och även vägen påverkar myren men påverkan får ändå totalt sett anses vara svag. Myren är ställvis botaniskt intressant med en artrik brunmossflora och förekomst av varglav på torrakor.

Källa: Due, K. och Muhr, M. Tretton myrar i Västernorrlands län. Rapport 1983:1 från länsstyrelsen i Härnösand.

Stormyran 4 km Ö Råsjön. nr 39


Värdeklass I
Geokod 17F 4I 1E1G
Areal ca 200 ha
Flygbild 1987
Höh 380-400 m
VMI-nr 17F 4IO1
Naturvårdsobjekt N60 179,
del av NR 60 047
Fältbesökt 1981, M Muhr och K Due.
1978-06, M Dynesius.

Myrområdet består av Stormyran och Päckersmyrorna. Den sydöstra delen hänger ihop med Hättomyran via en skogbevuxen myrarm. Myren sluttar i huvudsak mot nordväst och väster. Myrarna avvattnas av Stormyrbäcken vilken rinner utmed myrkanten i NV riktningen och av Slipbäcken vilken rinner i Stormyrans norra kant i västlig riktning. I södra delen ligger Stormyrtjärnen.

Stormyran domineras av en *stor strängflarkmyr.* Strängarna är väl avsatta, upp till 1 m höga och övergår stundom till mossesträngar. En stor del av

strängarna är trädbevuxna. Flarkarna är stora med mjukmattor, lösbottnar och vattenfyllda flarkgölar. För övrigt förekommer *tallkärr* och *öppna fastmattekärr* med övergångar mot blandmyrar samt ett smalt strandkärr vid bäcken.

Päckersmyrorna består av *öppna mjukmattekärr,* ett *litet strängflarkkärr* samt även här tallkärr mot kanterna. I området mellan myrarna och vid bäckarna finns rätt stora ytor med *sumpskog*.



Vegetation och flora: Kärrvegetation dominerar helt med alltifrån fattiga till medelrika växtsamhällen. Blåtåtel, bladvass och dvärgbjörk är vanliga dominanter på strängarna. Flera rikkärrsarter förekommer på strängmyren bl a sumpnycklar och myggblomster. Intressant är även förekomsten av krypvide på mjukmattor i myren samt den rikliga förekomsten av varglav på torrakor. Fattiga tallkärr av främst klotstarrtyp finns i V och S delen. Rika tallkärr förekommer längs vissa kanter och vid Stormyrbäcken. De senare domineras bl a av Sphagnum warnstrofii i bottenskiktet och i fältskiktet förekommer t ex nålstarr och dytåg.

Fauna: Värdeklass III i fågelinventeringen.

Påverkan: Några basvägar och en kraftledning går över myren. Stormyrbäcken är förlängd med ett 300 m långt dike.


Bedömning: Stormyran hyser mycket välutvecklade strängflarkmyrar, bitvis med terrasserade flarkgölar. Ovanligt stora ytor av tallkärr och sumpskog förekommer också i område. På myren finns flera rikkärrsarter och en del sällsynta växter såsom varglav och sumpnycklar. Myrområdet är mycket stort och huvudsakligen opåverad av allvarliga ingrepp.

Källa: Dynesius, M. och Simonsson, P. Fågelmyrar i Västernorrlands län. Rapport 1980:13 från länsstyrelsen i Härnösand.

Due, K. och Muhr, M. Tretton myrar i Västernorrlands län. Rapport 1983:1 från länsstyrelsen i Härnösand.

Myr vid Byggningstjärn. nr 41

Värdeklass II
Geokod 17F 4I 2E7E
Areal 50 ha
Flygbild 1987
Höh 390-400 m
VMI-nr 17F 4I03
Naturvårdsobjekt N60 174




Myren omger Byggningstjärnen och är plan svagt lutande mot väster. Den domineras av ett *öppet mjuk- fastmattekärr* som delvis är differentierat i ett *strängflarkkärr.* I norra och södra delen finns *mossar* som är glest tallbevuxna och delvis strängade med mjukmattehöljor. I anslutning till mossarna finns kärrdråg som fungerar som laggar. Mot kanterna uppträder *skogskärr* och mellan fastmarksholmarni söder finns *sumpskog*. Vid tjärnen finns en smal bård av gungflykärr.

Påverkan: Ingen i flygbild synlig påverkan.

Bedömning: Myren är liten men helt opåverkad av allvarliga ingrepp. Det öppna och blöta kärret med strängstrukturer och tjärnen utgör en värdefull våtmarkstyp. Förutsättningar finns för rika kärrytor då myrområdena norr och söder om Byggningstjärnen hyser rikkärr.

Djuptjärnsmyran-Lokmyran m fl. nr 43

Värdeklass I
Geokod 17F 4J 4B1I
Areal 170 ha
Flygbild 1987
Höh 380-400 m
VMI-nr 17 F 4J02
Naturvårdsobjekt N60 215
Fältbesökt 1990-08, S Grundström och M Löfroth.



Våtmarksområdet består av Djuptjärnsmyran och Lokmyran samt sumpskogar mellan myrarna och sumpskog vid Rigåsbäcken. Tre små tjärnar finns i våtmarken. Våtmarkerna ligger i södra kanten av Borgsjö rikområde som är påverkat av Jämtlands kalkberggrund. De våtmarkstyper som dominerar är diffust strukturerade *fastmattekärr* samt *tallkärr, tallmossar* och *gransumpskog*.

Vegetation: De öppna myrarna har en intermediär-rik vegetation med främst blåtåtel och tuvsäv som dominanter tillsammans med mossorna Campylium stellatum och Sphagnum warnstorfi i bottenskiktet. På Lokmyran förekommer ett stort bestånd av axag och av andra rikkärrsarter finns här t ex björnbrodd och fjällskära. Små lösbottenflarkar med bl a myggblomster samt ristuvor med lågvuxen tall förekommer på de öppna, svagt sluttande kärren. På Lokmyran finns några källor med rik brunmosseflora där bl a Bryum Weigelii, Scorpidium cossoni och Calliergon richarsonii växer. Fattiga tallkärr och tallmossor övergår i varann på ett diffust sätt. Sumpskogen är mestadels grandominerad och delvis ganska gles p g a äldre plockhuggningar. Vid bäcken finns mer sluten och högvuxen gran-sumpskog med ovanlig flora. Spädstarr och repestarr förekommer sparsamt tillsammans med högörter i en bitvis ganska blöt sumpskog med socklar. Sphagnum wulfianum förekommer enstaka i en torrare sumpskogsstyp.

Fauna: Häckande duvhök samt spår efter bivråk och tretåig hackspett i våtmarksområdet.

Påverkan: Större delen av sumpskogen samt fastmarksholmarna bär spår av äldre avverkningar. En ny skogsbilväg har dragits in västerifrån och avverkningar planeras i delar av sumpskogen.

Bedömning: Våtmarksområdet är stort och mångformigt med flera värdefulla våtmarkstyper och området saknar störande hydrologiska ingrepp. Här finns ganska stora ytor med rik gransumpskog och rikkärr med källor. Intressant är den stora förekomsten av axag, en av de få i Medelpad.

Porsmyran-Långtjärnen. nr 45

Värdeklass II
Geokod 17F 5B 2E5F
Areal 135 ha
Flygbild 1987
Höh 280-300 m
VMI-nr 17F 5BO1
Naturvårdsobjekt N60 052
Fältbesökt 1978-06, B Sundberg.


Porsmyran ligger SV om Myckelmyrbergets och Bubergets branta sluttningar. Myrområdet är långsträckt och mosaikartat med stor del tjärnar, små myrpartier och fastmarksholmar samt några större myrytor. Den V delen avvattnas mot NV via Långtjärnen och Länsterån och den Ö delen avvattnas mot S via småtjärnar ut i Fäningsån.

De mest framträdande delarna är *strängflarkkärr* samt diffust strukturerade kärr som är öppna-glest trädbevuxna. Kring en av tjärnarna finns en *mosse* med strängar och mjukmattehöljor. Runt en del av tjärnarna finns öppna gungflykärr. Mot fastmarken och speciellt då i NV och SO delen finns stora ytor

med lövrika *skogskärr* och *sumpskogar.*


Fauna: Värdeklass III fågelinventeringen. Här förekommer bl a gluttsnäppa, enkelbeckasin, trana, vigg och knipa.

Påverkan: I mitten finns ett dikat område med




lokal påverkan. Två basvägar skär rakt över myren och en ny skogsbilväg påverkar den SO delen. En kraftledning går över Långtjärnen men berör våtmark i liten utsträckning.

Bedömning: Områden är mångformigt och huvudsakligen lite påverkat. De värdefullaste delområdet torde vara de tydligt utbildade strängflarkkärren som har stor andel mycket blöta ytor. Högt skyddsvärde ur ornitologisk synpunkt.



Smålåsflon. nr 51

Värdeklass II
Geokod 17F 5F 4E4J
Areal 40 ha
Flygbild 1987
Höh 300 m
VMI-nr 17F 5FO1
Naturvårdsobjekt N60 112
Fältbesökt 1979-07, P Simonsson.



Myren sluttar svagt mot SO. Den domineras av *tallmossar* som delvis är differentierade i strängar och mjukmattehöljor. Flera *kärrdråg* avvattnar mossarna och bildar laggar. I södra och norra kanten finns lövdominerade täta skogskärr. En bäck rinner i NO kanten.


Mossarna är till stor del tätt tallbevuxna och risdominerade. Den strängade delen är delvis en blandmyr med mjukmatteflarkar där dystarr och kallgräs dominerar. Strängarna är i denna del dominerade av tuvull, tuvsäv och taggstarr. De blöta kärrdrågen är av högstarrtyp. I myrens NV kant finns ett exemplar av klibbal.

Skogsvägar omger myren och kan ha en svag lokal påverkan.

Smålåsflon utgörs av en väl utbildad storskalig struktur med svagt sluttande mossor som avvattnas av kärrdråg. Intressant inlandslokal för klibbal. Myren är hydrologiskt ostörd.

Håbäcksmyrorna. nr 54

Värdeklass II
Geokod 17F 5J 2A7B
Areal 52 ha
Flygbild 1987
Höh 350-370 m
VMI-nr 17F 5JO1
Naturvårdsobjekt N60 117
Fältbesökt 1979-07, P Simonsson.



Myrarna ligger vid Håbäcken och sluttar svagt-måttligt mot norr. *Tre tjärnar* ligger i våtmarken. I söder finns ett *strängflarkkärr*, med några flarkgälar. Håbäcken bildar på mellersta delen ett *gungfly-sumpkärr*. Sådana kärr finns även runt tjärnarna. I övrigt förekommer öppna-glest trädbevuxna *mjuk-fastmattekärr* med mindre lösbottenpartier samt *risrika skogskärr*.


Vegetation och flora: Vegetationen är *intermediär-rik*. I de öppna kärren förekommer starrarter som dy-, vit-, tråd-, hirs-, trind-, och flaskstarr. Strängkärret utgörs dels av fastmattesträngar där blåtåtel och tuvsäv dominerar och flarkar där bl a ängsull och dybläddra förekommer. Vid tjärnarna och vid bäcken finns sumpkärrbårder med högstarrarter och där även vass och vattenklöver förekommer. I kanterna finns skogskärr och blandmyrar med dvärgbjörk och klotstarr som vanliga arter. Av ovanligare rikkärrsarter förekommer ängsnycklar, sumpnycklar, klubbstarr och trindstarr.

Påverkan: En skogsbilväg skär genom myrkomplexet fast vägen går mest över fastmark.

Bedömning: Ett medelstort myrområde som i huvudsak är hydrologiskt ostört. Det höga bevarandevärdet beror främst på stora ytor med rikkärr.

Myr V Byberget. nr 57

Värdeklass II
Geokod 17F 6B 0C2E
Areal 65 ha
Flygbild 1987
Höh 290 m
VMI-nr 17F 6B02
Naturvårdsobjekt N60 053
Fältbesökt 1979, P Simonsson.



Myren ligger strax V om Bybergets branta sluttning. Två bäckar rinner genom våtmarken och vid bäckarna finns *strandskog*. Dessutom finns *sumpskog, blandmyr, öppet kärr* och ett litet *strängflarkkärr.*


Axag har hittats i myrområdet vilket tyder på mycket rika förhållanden.

Myren är lokalt hydrologiskt störd pga vägen mellan Byberget och myren.

Bedömning: Medelstort och mångformigt våtmarksområde med en av få axag- förekomster i Medelpad. Förutsättningar för en rik flora.

Storflötten V delen. nr 59

Värdeklass I
Geokod 17F 6C 1B3J
Areal 115 ha
Flygbild 1987
Höh 515-540 m
VMI-nr 17F 6CO1
Naturvårdsobjekt N60 007
Fältbesökt 1976, T Arnström mfl.
1976-06, B Sundberg.



Storflötten ligger på en högplatå och är en av Medelpads högst belägna myrar. Nederbördsområdet är litet och avrinningen sker i stort sett i alla väderstreck men den är störst i myrens östra delar. Den centrala delen är en öppen myrvidd medan de perifera delarna är mer mosaikartade med smala myrarmar och fastmarksholmar. (Berggrunden i området består av granodiorit och granit och ger alltså primärt upphov till fattiga näringbetingelser).

Den centrala delen utgörs av en välutbildad *strängflarkmyr* med breda strängar av mestadels kärrtyp men bitvis är strängarna av ren mossetyp. Flarkarna är både av mjukmatte- och av lösbottentyp med en del större flarkgölar. Söder om strängflarksystemet finns *öppna fastmattekärr* med ristuvor som ställvis övergår i blandmyr. Den norra delen hyser också ett strängflarkkomplex som dock är betydligt mindre. Nära fastmarken är *skogskärr* och *blandmyrar* dominerade.

Vegetation och flora: Vegetationen är *huvudsakligen fattig*. Dominerande arter i de blötaste delarna är främst flaskstarr, dystarr, kallgräs och vattenklöver samt Sphagnum majus och S balticum. De fastare delarna domineras av tuvsäv, tuvull, klotstarr, taggstarr och dvärgbjörk samt Sphagnum papillosum, S fuscum och S angustifolium. Trädskiktet består mestadels av glasbjörk, gran och lågvuxen tall. I ett smalt samt sluttande parti i norra delen finns svagt intermediär vegetation med bla dominerade nålstarr och stjärnstarr.

Fauna: Värdeklass II i fågelinventeringen med bl a enkelbeckasin, tofsvipa, trana, sävsparv och gluttsnäppa. Vid ett senare tillfälle har även myrsnäppa setts på Storflötten.

Påverkan: Den östra delen är kraftigt dikespåverkad och denna del räknas här ej in i klass I-objektet. Myrens omgivningar är avverkade till stora delar och ofta har man avverkat ända ut mot myren.

Bedömning: Storflötten hyser ett ovanligt välutvecklat strängflarksystem av blandmyrtyp som är ovanligt i Medelpad. Större delen består av mosse- och fattigkärrsvegetation utan särskilda botaniska värden. Intressant är dock förekomsten av varglav på torrakor. Myren har ett rikt fågelliv med bl a myrsnäppa.


Källa Dynesius, M. och Simonsson, P. Fågelmyrar i Västernorrlands län. Rapport 1980:13 från länsstyrelsen i Härnösand.

Arnström, T. mfl. Fem myrar i Västernorrlands län vegetationsinriktad naturinventering. Rapport 1979:9 från länsstyrelsen i Härnösand.

Björkbäck, F. 1970. TELMA. Skyddsvärda myrar i Y-län. Prel förteckning.

Boflon. nr 66

Värdeklass II
Geokod 17F 6F 4A6J
Areal 22 ha
Flygbild 1987
Höh 425-430 m'
VMI-nr 17F 6FO2
Naturvårdsobjekt N60 111
Fältbesökt 1979-07, P Simonsson.



Boflon ligger på en vattendelare och är svagt sluttande såväl mot NV som NO. Myren omges av tre branta bergknallar varifrån den mottar mycket fastmarksvatten. Myren utgörs av ett *öppet-glest trädbevuxet rikkärr*. I mitten av myren finns en liten flarkgöl. I nordöstra kanten finns ett område med *lövrik sumpskog*.


Fastmattekärr överväger på myren och dessa domineras av främst tuvsäv och ullsäv. Låg ristuvor samt lågvuxen gran finns spridda över kärret. Mot kanterna tätnar träd- och buskskiktet och tuvinslaget ökar. I östra kanten finns ett rikare parti där gräsull och knagglestarr växer rikligt. Här finn också ett blötare dråg med riklig förekomst av ängsnycklar. I en utlöpare mot NO finns ängskärrvegetation med bl a Kung Karls spira och tvåblad.

NO kanten finns gamla myrodlingar med ett tätt dikessystem. Även i nordvästra kanten finns gamla diken.

Boflon är en liten rikmyr med svag dikespåverkan. Den rika vegetationen med flera mindre vanliga rikkärrsarter motiverar ett mycket högt bevarandevärde.

Granmyran. nr 67

Värdeklass II
Geokod 17F 6F 4A6J
Areal 18 ha
Flygbild 1987
Höh 220-225 m
VMI-nr 17F 6GO1
Naturvårdsobjekt N60 114
Fältbesökt 1979-07, P Simonsson.



Granmyran ligger nedanför Torsåsens östsluttnning och myren sluttar svagt mot öster. Myren består av öppna-glest skogbevuxna kärr med sumpskog i kanterna.


Myrens södra del är ett tallkärr med ett golv av fast- och mjukmattor i vilket det ligger ristuvor som domineras av ljung och rosling. I myrens norra del är kärrgolvet fastare med kärr- och åkerfräken samt slidstarr som vanliga arter. Här förekommer också en del krävande arter såsom tvåblad och knärot. Fläckvis finns öppnare högstarrpartier.

Vägen går längs västra kanten och kan ha en lokal påverkan. I östra delen har en del sumpskog avverkats. Körvägar går i nord-sydlig riktning över myren.

Granmyran är representativ för området med en blandning av öppna och skogbevuxna kärr med rik vegetation. Myren är lokalt påverkad men förekomsten av rikkärr med ovanliga arter motiverar ett mycket högt bevarandevärde.

Stormyran vid Staftjärnarna. nr 77

Värdeklass II
Geokod 17F 7C 2C2C
Areal 110 ha
Flygbild 1987
Höh 440 m
VMI-nr 17F 7CO1
Naturvårdsobjekt N60 O86
Fältbesökt 1990-08, S Grundström, M Löfroth (Östra delen).



Stormyran är långsmal, i den centrala delen rinner en stor bäck och i nedre delen ligger Staftjärnarna. Myren är ställvis öppen och ställvis glest skogbevuxen. Dominerande våtmarkstyper är *tallmossar*, glest trädbevuxna *blandmyrar, skogskärr* längs bäcken samt *öppna kärr* av fastmattetyp. De olika

myrtyperna glider ofta över i varandra på ett diffust sätt.

Vegetation: Fattiga ris- och starr/vitmosssamhällen dominerar vegetationen. Enstaka dvärgtätört förekommer på tuvor på tallmossen norr om tjärnarna. Längs bäcken finns något artrikare och heterogenare partier med mer lövinslag i träd- och buskskikt samt en del örter. De öppna kärren har fläckvis en intermediär flora med bl a ängsnycklar och björnbrodd och krävade brunmossor. Enstaka intermediära källor finns längs östra kanten.


Fauna: Två bäverhyddor vid bäcken. En storlom sågs i en av tjärnarna vid fältbesöket.

Påverkan: Området saknar allvarliga ingrepp. Enstaka körvägar förekommer och ett gammalt dike finns vid ett av de öppna kärren. Skogsbilvägarna i norra delen kan ha en svag lokal hydrologisk påverkan.

Bedömning: Ett medelstort och tämligen homogent myrområde med representativa myr- och vegetationstyper. Myren är i stort sett lite påverkad och har en del intressanta florainslag med för Medelpad ovanliga arter såsom dvärgtätört och björnbrodd.

Fällåsmyran. nr 90

Värdeklass I
Geokod 17F 7H 2E3I
Areal 60 ha
Flygbild 1987
Höh 250 m
VMI-nr 17F 7HO1
Naturvårdsobjekt N60 057
Fältbesökt 1978-07, P Simonsson.
1990-09, S Grundström.



Fällåsmyran ligger i det från Jämtlands-siluren kalkpåverkade Borgsjöområdet. Myren är långsträckt, i huvudsak plan och i den östra änden rinner Gammelån. Den västra delen består mest av *tallkärr* och *sumpskog* medan den östra delen även hyser ytor med *öppet kärr*. En stor del upptas av öppen-glest tallbevuxen blandmyr med mossetuvor.

Vegetation och flora: Tall dominerar träd- och buskskiktet men även enbuskar, mindre gran samt glasbjörk, gråal, rönn och sälg förekommer. Växtsamhället är mycket tuvigt i både öppna och trädbevuxna delar med starr-vegetation på "kärrgolvet". Markvegetationen indikerar tydligt kalkpåverkan med flera mycket krävande arter. T ex så finns gräsull, sump-, blodnycklar, brudsporre, kärrsälting och av mossor är Campylium stellatum, Scorpidium cossoni och Calliergon giganteum vanliga. Här finns också enstaka myrstarr och knärot. I den lilla tjärnen (Flarken) i södra delen växer nordnäckros och gul näckros.

Påverkan: Sumpskogen är mestadels plockhuggen men är i vissa delar tämligen "ostörd". En röjd skoterled går över myren. De öppna delarna förefaller stadda i svag igenväxning med ganska nyetablerade tallgenerationer med detta har troligen en naturlig förklaring.


Bedömning: En av de största sammanhängande och minst störda myr/sumpskogs- områdena i den kalkpåverkade Borgsjötrakten. Här finns synnerligen artrika och mångformiga växtsamhällen med en stor uppsättning rikkärrs-arter.

Klimpmyran. nr 91

Värdeklass II
Geokod 17F 7I 3B3E
Areal 18 ha
Flygbild 1987
Höh 270 m
VMI-nr 17F 7IO1
Naturvårdsobjekt N60 115
Fältbesökt 1979-07, P Simonsson.

Klimpmyran är en plan myr med en liten *tjärn* i V kanten. Myren avvattnas mot V till Gammelån. Myren utgörs av en *tallmosse*, ett *tallkärr* och en *lövrik sumpskog* i västra och norra kanten.

Runt tjärnen finns en mjukmattebård med flaskstarr




samt lösbottenpartier med bl a dystarr. Tallmossen är risdominerad med renlavar på de torraste delarna. Tallkärret norr om tjärnen består av högstarrdominerade fastmattor samt hög ristuvor. Buskskiktet är välutvecklat med både glasbjörk, en och viden. Fläckvis finns rikkärrvegetation med bl a ängsnycklar, gräsull och enstaka blodnycklar.

En körväg går i södra kanten samt i nord-sydlig riktning rakt över myren.

Bedömning: Klimpmyran har ett högt bevarandevärde p g a den delvis rika vegetationen. Myren är hydrologiskt ostörd vilket är ovanligt i detta område.

Bynäsmyran. nr 92

Värdeklass II-III
Geokod 17F 7I 3D7I
Areal 35 ha
Flygbild 1987
Höh 170 m
VMI-nr 17F 7IO2
Naturvårdsobjekt N60 116
Fältbesökt 1979-07, P Simonsson.



Myren är plan-svagt SV-sluttande ner mot Harrån. Myren utgörs av ett *glest tallbevuxet och tuvat kärr* och en öppen blandmyr. Öster om myren finns ett *kraftigt dikespåverkat område* som idag har ganska tätt med skog. Runt om myren finns stora ytor med *sumpskog*.


Kärret består av ristuvor på ett fastmattegolv med bl a kärrfräken, sjöfräken, kärrspira och vattenklöver. Tallarna är 4-5 m höga och i träd- och buskskikt förekommer även glasbjörk. I SV kanten finns ett *rikkärrsparti* med bl a sumpnycklar, brudsporre och tagelstarr.

Den östra delen är kraftigt påverkad av ett gammalt dike. Denna del består av rätt så tät och lövrik skog. En gammal stig eller körväg går över myren.

Bedömning: Bynäsmyran är en medelstor rikmyr med en för denna trakt typisk rikkärrsvegetation. Större delen av myren saknar störande ingrepp och dessa delar har värdeklass II.

Boltjärnmyran. nr 93

Värdeklass II
Geokod 17F 7I 4C6I
Areal 24 ha
Flygbild 1987
Höh 185-200 m
VMI-nr 17F 7IO3
Naturvårdsobjekt N60 058
Florainventerat R Lidberg m fl.
Landskapsflora i Medelpad.



Myren besår av ett *glest trädbevuxet kärr* som sluttar svagt mot öster ner mot Markbäcken. Myren övergår mot kanterna i rena skogskärr och sumpskog.


Rikkärr med bl a huvudstarr, tagelstarr, gräsull, brudsporre, sumpnycklar och tvåblad.

Vägen skär myren längs västra kanten. En större stig eller kör- väg går över myren i N-S riktning. En stor kraftledning går över i den östra delen.

Bedömning: Myren har en mycket artrik flora med ett flertal mindre vanliga rikkärrsarter. Den är hydrologiskt störd av vägen och härigenom svagt igenväxande.

Granbodmyren. nr 98

Värdeklass II
Geokod 17F 7J 4B7J
Areal Ca 10 ha
Flygbild 1987
Höh 190-200 m
VMI-nr 17F 7JO3
Naturvårdsobjekt N60 019
Florainventerat R Lidberg m fl.
Landskapsflora i Medelpad.



Myren består av *glest trädbevuxet kärr* som sluttar svagt mot söder. Myren avvattnas via Skarpbäcken som rinner SV om myren.

Rikkärr med bl a blodnycklar, brudsporre, gökusko och glansvide.


Vägen stör myren hydrologiskt vilket gör att den troligen sakta växer igen.

Bedömning: Litet extremrikkärr med mycket exklusiva floravärden.

Flarkmyran vid Stugusjön. nr 100

Värdeklass II
Geokod 17F 8b 1B4E
Areal 93 ha
Flygbild 1987
Höh 400-405 m
VMI-nr 17F 8BO1
Naturvårdsobjekt N60 216

Myren omger Stugusjöns östra del samt Stugusjöån söder därom. I norr avgränsas myren av en väg. Myrområdet är flackt och avvattnas helt via Stugusjöån ut i Länstersjön. Myren domineras av de ställvis mycket blöta kärren vid Flarken och ån.




Dessa är delvis trädfria men troligen videbevuxna och delvis glest trädtäckta. Strax SO om sjön finns en sluttande mosse som är svagt excentrisk. N om sjön finns tallmossor som altenerar med kärrdråg av mjukmatte-fastmattetyp. I norra delen finns partier med skogskärr.

Påverkan: Ett dike skär över den norra delen och har en lokal påverkan. En väg skär över myren i N delen.

Bedömning: De värdefullaste delarna utgörs av de breda översvämningskärren samt den svagt utbildade excentriska mossen. Myren hyser för övrigt ordinära myrtyper. Våtmarken har en lokal påverkan från väg och diken men de finaste delarna verkar ostörda.

Ocksjöflon. nr 101

Värdeklass II
Geokod 17F 8B 2E4A
Areal 60 ha
Flygbild 1987
Höha 410-420 m
VMI-nr 17F 8BO2
Naturvårdsobjekt N60 059
Fältbesökt 1983, M Muhr,
1978-07, M Dynesius.



Ocksjöflon är en långsmal myr som ligger på en vattendelare. Den västra delen avvattnas till Ocksjön medan den Ö delen avvattnas via smala myrdråg och tjärnar ut i Harrsjön. Myren sitter via smala myrarmar ihop med Gräsmyran på Jämtlandssidan.

Den centrala delen är blöt och består av ett långsträckt *strängflarkkärr* med några större *lösbottenkärr* och övergångar mot *öppna fastmattekärr* mot kanterna. I övergången mot fastmark samt i myrarmarna i öster finns vanliga myrkantsamhällen i form av *tallmossar* och *skogskärr*.

Vegetation: Strängkärret består av fastmatte- och ristuvesträngar med lågvuxen tall och lösbottenmjukmatteflarkar. Kärret är *intermediärt* med bl a dvärgbjörk, ljung, trådstarr och blåtåtel på strängar och fastmattor. Flasktarr, tuvsäv, bladvass, vitstarr och stor-sileshår är vanliga arter i flarkarna där ställvis rena flarkgölar förekommer. I norra delen finns ett otydligt strukturerat kärrparti där bl a björnbrodd växer. Skogskärren i kanterna är mest av vanlig klotstarrtyp.

Fauna: Värdeklass II i fågelinventeringen med bl a tofsvipa, skogssnäppa och varfågel.


Påverkan: Några basvägar samt ett gammalt dike i V delen.

Bedömning: Strängflarkkärret är väl utbildat med kraftiga strängar och flera flarkgölar. Myren saknar allvarliga ingrepp och har ett högt ornitoligiskt skyddsvärde.

Källa: Fågelmyrar i Västernorrlands län. Dynesius, M. och Simonsson, P. Rapport 1980:13 från länsstyrelsen i Härnösand.

Våtmarker vid Stortjärnen. nr 102

Värdeklass II
Geokod 17F 8B 1E5J
Areal 100 ha
Flygbild 1987
Höh 400 m
VMI-nr 17F 8BO3
Naturvårdsobjekt N60 081
Fältbesökt 1990-08, S Grundström och M Löfroth.
1978-06, M Dynesius.



Myrområdet vid Stortjärnen är långsträckt och flikigt. De våtmarkstyper som dominerar är *tallmossar* med inslag av blandmyrar, *svagt soligena kärr* som delvis är diffust strängade och delvis är tydliga *strängflarkkärr*, samt *sumpskog* av lite olika typ. Dessutom finns trädbevuxna strandkärr vid bäcken, löv- och blandskogskärr i små partier samt ett litet *backkärr* i östra kanten.

Vegetation och flora: Fattig till intermediär vegetation med stor mångformighet. Allmän förekomst av krävande arter som gräsull och björnbrodd samt olika brunmossor i kärren. Artrika sumpskogsytor med högörter som kärrfibbla och fjällskära.

Fauna: Bäverdämning vid bäcken öster om Stortjärnen. Värdeklass III i fågelinventeringen.


Påverkan: Vägen har en svag lokal påverkan i östra delen. Hyggen i västra delen som i viss mån omfattar tidigare sumskog. Plockhuggning i hela området i våtmarken och på fastmarksholmar.

Bedömning: Våtmarksområdet är mångformigt och delvis mycket mosaikartat och i sin helhet lite påverkat. Representativa myr- och vegetationstyper med tämligen artrik kärlväxt- och mossflora.

Källa: Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Halsta-Stormyran. nr 113

Värdeklass I
Geokod 17F 8I 0C9C
Areal 90 ha
Flygbild 1987
Höh 200 m
VMI-nr 17F 8I01
Naturvårdsobjekt N60 217
Fältbesökt 1990-09, S Grundström.



Myren ligger i det kalkrika Borgsjö-området med påverkan från den jämtländska silur-berggrunden. Centralt i myren rinner Markbäcken mot söder. Längs bäcken finns en *blandsumpskog* och för övrigt finns *tallkärr* och glest bevuxna *fastmattekärr*. Delen norr om själva myren består av *gransumpskog* i mosaik med örtrik barrskog på frisk mark.

Vegetation och flora: Större delen upptas av ett tuvigt växtsamhälle med ris och mossevegetation på tuvorna. Därimellan uppträder en artrik vegetation utan egentliga dominanter. Tall och i viss utsträckning gran dominerar trädskiktet men även glasbjörk, gråal och viden är vanliga.

Vanliga arter i skogskärr och sumpskog är t ex humleblomster, älgört, strätta, styltstarr och brunrör och mer sparsamt förekommer brudsporre, guckusko, sumpnycklar, grönkulla, slåtterblomma och fjällskära. I de öppnare kärren dominerar främst blåtåtel, trådstarr och bladvass.

Myrens bottenskikt domineras ofta av Sphagnum warnstorfi, Totentypnum nitens och ställvis också Campylium stellatum. Av exklusivare brunmossor finns bl a Scorpidium cossoni och Calliergon giganteum.

Fauna: Spår av bäver längs bäcken.

Påverkan: Vägarna samt kraftledningen över östra kanten är att betrakta som ganska marginella störningar liksom de upphuggna lederna i myrens längsriktning. Ett nytt ingrepp finns i norra delen där en ny skogsbilväg dragits över sumpskogsområdet. I anslutning till denna väg finns nya diken ett par hundra meter mot söder. Myrens öppnare delar ser att vara på väg att växa igen till tallkärr men detta är troligen en naturlig process.

Bedömning: Halsta-Stormyran är ett väl sammanhållet och ett för Borgsjöområdet ovanligt stort myr/sump skogsområde. Mycket artrik vegetation med en stor uppsättning rikkärrs- och rikskogsarter med inslag av rariteter som brudsporre och guckusko. Lokala skador finns i form av nya diken och angränsande vägar men i huvudsak är våtmarkerna lite störda.


Lombäck-Stormyran. nr 114

Värdeklass I
Geokod 17F 8I 1D4D
Areal 80 ha
Flygbild 1975
Höh 200 m
VMI-nr 17F 8I02
Naturvårdsobjekt N60 088,
del av N60 140
Fältbesökt 1990-09, S Grundström.

Myren ligger i det kalkrika Borgsjöområdet och centralt i våtmarken rinner Lombäcken. De våtmarkstyper som dominerar är *glest trädbevuxna fastmattekärr* och *sumpskog*.

Vegetation och flora: Tall dominerar trädskiktet både i de öppnare kärrpartierna och i sumpskogen. Gran dominerar ställvis i sumpskogsytorna. De vanliga lövträden förekommer allmänt och framför allt längs bäcken är är lövinslaget stort.

Liksom på övriga myr/sumpskogsområden i trakten är det en stor tuvighet i både kärr och sump-



skog. Ställvis övergår kärrytorna i rena blandmyrar med små mossepartier. Mellan tuvorna uppträder en artrik moss- och kärl-växtflora med stort örtinslag och ett flertal rikindikerande arter.


Trådstarr (D), Älgört, Campylium stellatum (D) , Tuvsäv (D), Revsmörblomma, Tomentypnum nitens (D) , Knagglestarr, Skogsnäva, Sphagnum warnstorfi (D) , Hirsstarr, Slåtterblomma,, Sphagnum subfulvum , Snip, Vitmåra, Sphagnum subsecundum , Gräsull, Kärrviol, Paludella squarossa , Slidstarr, Vänderot, Scorpidium cossoni, Rörflen, Liljekonvalj, Scorpidium revolvens , Tuvstarr, Brudborste, Warnstorfia exannulata Lundelm.

Påverkan: I norra delen finns dikespåverkan i kanten och i östra kanten går en kraftledning med svaga körskador. Liksom övriga myrar i området är kärrpartierna på väg att växa igen till tallkärr men detta är troligen helt naturligt.

Bedömning: Lombäck-Stormyran är ett av de största sammanhållna myr/sump- skogsområdena i detta rikområde. Våtmarkerna är i huvudsak opåverkade av störande ingrepp och en del av sumpskogen är naturskogsliknande med gamla och döda träd. Vegetationen är synnerligen artrik och mångformig med ett stort antal rikkärrs- och rikskogsarter.

Våtmarker vid Vammen. nr 117


Värdeklass II
Geokod 17F 8J 1A0G
Areal ca 45 ha
Flygbild 1987
Höh 200-220 m
VMI-nr 17F 8JO1
Naturvårdsobjekt del av N60 019.
Ingår i NR60 140
Florainventerat 1975-76, R Lidberg m fl.
Landskapsflora i Medelpad.



De våtmarkstyper som förekommer är *skogskärr, blandmyr, sumpskog* och *öppna strandkärr* av gungfly-typ. Våtmarken förefaller hydrologiskt ostörda. Fynd av guckusko och finbräken i sumpskogen vid Vammen


Bedömning: Våtmarksområdet vid Vammen är mångformigt och ostört.

Området är kalkpåverkat och hyser därför goda förutsättningar för en rik flora och fauna.



Halmmyran. nr 118

Värdeklass I
Geokod 17F 8J 1COE
Areal ca 30 ha
Flygbild 1987
Höha 250 m
VMI-nr 17F 8J02
Naturvårdsobjekt N60 028
Fältbesökt 1990-08, S Grundström, M Löfroth.



Halmmyran ligger i Borgsjös extremrikområde med påverkan från den jämtländska kambrosiluren. Myren sluttar svagt mot SV. Den centrala delen utgörs av ett *glest trädbevuxet fastmattekärr* som mot kanterna övergår i *skogskärr* och *barrsumpskog*. Den SV delen består av ett större parti med sumpskog.

Vegetation och flora: Det centrala kärret är mestadels av fastmattetyp med ristuvor, lågvuxen tall och björk samt enbuskar spridda över ytan. Flera rikkärrsarter är vanliga däribland gräsull och kärrsälting. Bottenskiktet domineras av rikmossor, t ex Campylium stellatum och Sphagnum warnstorfii. Mot kanterna ökar trädskiktens täthet och höjd och även gran blir vanligt. Här är vegetationen av extremriktyp med bl a tvåblad, sumpnycklar, hårstarr, trindstarr och fjällskära som vanliga arter. Mer sparsamt förekommer rariteter som huvudstarr, guckusko, brudsporre, trådfräken och smalfräken. I bottenskiktet finns förutom ovan nämnda mossarter även Totemtypnum nitens, Palustriella sp. och Calliergon giganteum.


Påverkan: Myren saknar allvarliga ingrepp. Sumpskogen är något plockhuggen men ger delvis ett naturskogsintryck. Den centrala delen ut att vara stadd i igenväxning med ung tallskog som etablerats under torrår på 80-talet.

Bedömning: Halmmyran är en av de bäst utvecklade extremrikmyrarna i området med mycket artrik och delvis sällsynt kalkmyrflora. Våtmarken är förhållandevis stor och lite påverkad. Viss skötsel med röjning av den centrala delen kunde dock vara önskvärd.

Källa: Guvå, L 1972. Naturvårdsinventering i Västernorrlands län. Del 3 Medelpad.

Stormyran vid Långmarksberget. nr 119

Värdeklass II
Geokod 17F 9H OD6B
Areal 15 ha
Flygbild 1987
Höh 495 m
VMI-nr 17F 9HO1
Naturvårdsobjekt N60 066
Fältbesökt 1978-06, P Simonsson.



Myren ligger på vattendelare och sluttar svagt mot både väster och söder. Myren omges av hyggen åt alla håll utom i söder. Den centrala delen består av ett *fastmattekärr* och en *blandmyr* samt några blötare kärrdråg. Runt om finns en kantzon med *skogskärr*. Ett litet parti i norra delen ligger i Jämtlands län.

Vegetation och flora: Den centrala delen består dels av tuvsävdominerade kärr och dels av mosseytor med hjortron och taggstarr. Spritt förekommer också ristuvor och över hela den centrala delen växer låga granar. I kanterna finns *rika partier* med bl a Kung Karls spira, tvåblad och brudsporre. Andra myrkanter består av fattiga klotstarrkärr.


Påverkan: Inga diken berör myren men omgi-

vande avverkningar kan ha påverkat den. Svaga körskador finns i den södra delen.

Bedömning: Myren är lite hydrologiskt störd och ligger som en "oas" i ett hårt avverkat område. Myrtyperna är vanliga med mestadels fattig vegetation men små partier med ängskärrvegetation motiverar ett högt bevarandevärde.

Gubby-Stormyran. nr 122

Värdeklass II
Geokod 17F 9I 3E2I
Areal 20 ha
Flygbild 1987
Höh 415-425 m
VMI-nr 17F 9IO2
Naturvårdsobjekt Del av N60 016. Ingår i NR60 140.
Fältbesökt 1979-07, P Simonsson.



Gubby-Stormyran ligger nedanför Ratåsens branta sydsluttning. Lombäcken rinner genom myren i N-S riktning. Myren sluttar ner mot bäcken på båda sidor. Myren utgörs till stor del av ett *öppet fastmattekärr* som övergår i en gles trädtäckt blandmyr mot kanterna.


Vegetation och flora: Fastmattekärret domineras av trådstarr och tuvsäv. Vegetationen får betecknas som intermediär med enstaka förekomst av rikarter som blodnycklar och jämtlandsstarr samt mer allmänt fjällskära och björnbrodd. Längs bäcken finns en smal remsa med ängskärrvegetation där bl a hårstarr och tvåblad har påträffats.

Påverkan: Myren saknar allvarliga ingrepp även om en stor del av omgivningen har avverkats utan att lämna tillräckliga zoner mot myren.

Bedömning: Liten opåverkad myr med intermediär-rik vegetation. Myren bör ses som en del av Lombäcken som i sin helhet har en mycket artrik och ovanlig flora.

Bysättermyran. nr 123

Värdeklass I
Geokod 17F 9J 3D1C
Areal 44 ha
Flygbild 1987
Höh 310 m
VMI-nr 17F 9J01
Naturvårdsobjekt N60 055
Fältbesökt 1990-09, S Grundström.



Bysättermyran ligger i det kalkrika Borgsjöområdet med påverkan från den jämtländska kambrosilurberggrunden. Våtmarken består dels av en *strandskog* längs Gråsjöbäcken och en *blandmyr*. Blandmyren består av tallbevuxna kärr och mosseytor samt mindre ytor med mjukmattekärr.

Vegetation och flora: Rik-extremrik vegetation med dominans av bla trådstarr, blåtåtel, styltstarr och i bottenskiktet Scorpidium scorpioides, Campylium stellatum och Loeskypnum badium. Längs bäcken finns ett mycket örtrikt växtsamhälle med omväxlande tuvor och blöta partier samt en hel del lågor. I trädskiktet finns främst tall, gran, glasbjörk och gråal. Sparsamma fynd av rikindikatorer som axag och sumpnycklar samt mossorna Pseudocalliergon trifarium och Sphagnum teres.

Påverkan: Området förefaller hydrologiskt helt ostört och strandskogen längs bäcken verkar ha naturskogskvaliteter.

Bedömning: Bysättermyran är en väl sammanhållen helt ostörd våtmark med mycket rik flora.

Lekmyran. nr 128

Värdeklass II
Geokod 17G 0E 4B4E
Areal ca 60 ha
Flygbild 1988
Höha 470-485 m
VMI-nr 17G 0EO2
Naturvårdsobjekt Del av N60 168
Fältbesökt 1983, M Muhr (V delen).



Lekmyran ligger strax S om Stormyrskogens naturreservat. Myren är plan i vissa deler och svagt N-sluttande i vissa delar. Myren avvattnas mot NO till Öratjärnsmyrarna. Den utgörs mestadels av *öppna-glest tallbevuxna mossar, blandmyrar* och *smala kärrdråg*.


Vegetation och flora: Den östra delen består till stor del av öppen mosse som är mjukmattedominerad med ristuvor och en del strängar mot kanterna. I nordligaste delen ligger en blandmyr. Ett litet högstarrkärr som är mycket blött med stora lösbottenpartier utgör starten på bäcken som avvattnar stora delar av myren. Området runt Timåstjärnen har inte besökts men verkar bestå av glest trädbevuxna soligena kärr i mosaik med fastmarksholmar.

Påverkan: Söder om Lekmyran finns ett rätt omfattande dikessystem som delvis berör Lekmyran. Det är möjligt att det som idag är det blöta kärret är en fd tjärn som sänkts i syfte att utvinna slåttermark. En ny skogsbilväg i V kanten skär av Lekmyran från Kalvmyran. Nya avverkningar har gjorts på uddarna i NV kanten och fler avverkningar är planerade längs norra kanten.

Bedömning: Medelstor myr med ringa påverkan och i huvudsak ordinära myrtyper med fattig vegetation. Den Ö delen verkar intressant med små soligena kärr i mosaik med sumpskog och fastmark.

Stormyran 3 km N Naggen. nr 130

Värdeklass I
Geokod 17G 1C 4B0F
Areal 200 ha
Flygbild 1988
Höh 380-390 m
VMI-nr 17G 1CO1
Naturvårdsobjekt N60 061
Fältbesökt 1983, M Muhr.
1983, E Bohlin.
1979-06, M Dynesius.



Myren ligger i en sänka mellan sjöarna Hångstaörn och Lomsjön. Myren sluttar svagt mot NO resp åt SV. Den östra delen avvattnas via Stormyrbäcken som rinner i södra kanten. På myren finns två tjärnar. Stormyran består till största delen av *öppna strängflarkkärr* av varierande blöthetsgrad men också svagt differentierade *mjuk-fastmattekärr* och *strandkärr*. Utkanterna utgörs av *skogskärr* och *tallmossar*.

Vegetation och flora: Vegetationen är mestadels *intermediär* men både rikare och fattigare partier förekommer. Vanliga dominanter i de öppna kärren är trådstarr, blåtåtel, dvärgbjörk, vitstarr, vitag

och tuvsäv. Kärren hyser rikindikerande mossarter såsom Scorpidium revolvens, Sphagnum subnitens, Campylium stellatum och Scorpidium scorpioides. Ängsnycklar, björnbrodd och tätört är rikliga i vissa delar. Mindre ytor i myrens utkanter utgörs av trädbevuxna kärr med varierande näringsrikedom samt risdominerade tallmossor. Myrkantsamhällen av blandskogstyp finns i några små partier. Högstarr- och videvegetation med visst örtinslag finns längs Stormyrbäckens stränder.

Fauna: Värdeklass II i fågelinventeringen med bl a tofsvipa, sävsparv, enkelbeckasin och storspov.

Påverkan: En skogsbilväg korsar myren i det smala centrala partiet. En mindre körväg går i NO kanten och ett flertal älgtorn finns på myren. En kraftledning korsar myren i östra delen. Sjöarna är reglerade och detta kan påverka myrarnas hydrologi. Omfattande avverkningar har gjorts i omgivningarna under 80-talet.

Bedömning: Stormyran hyser stora ytor öppna och blöta kärr som delvis är uppdelade i mycket tydliga strängar och flarkar. Myren är i sin helhet lite påverkad även om både vägen och sjöregleringarna kan ha stört myrens naturliga hydrologi. Myren har ett mycket högt skyddsvärde ur ornitologisk synpunkt med hög täthet av vanliga myrfågelarter. Ställvis finns en artrik flora med ett flertal mera krävande moss- och kärlväxtarter.


Källa: Bohlin, E. 1983. "Iggesundsmyrar". Opubl rapport.

Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Porsomyran-Björntjärnarna. nr 133

Värdeklass II
Geokod 17G 1D 1D5G
Areal 90 ha
Flygbild 1988
Höh 400-405 m
VMI-nr 17G 1DO2
Naturvårdsobjekt N60 218
Florainventerat 1977, R Lidberg m fl.
Landskapsflora i Medelpad.

Porsomyran ligger vid Stensjöns norra strand och sluttar svagt ner mot sjön. Den västra delen utgörs av ett *öppet mjukmattekärr* med delvis välutvecklat *strängflarksystem* samt en glest tallbevuxen



mosse. Den östra delen av Porsmyran utgörs främst av *glest trädbevuxna kärr* men också av *sumpskogsytor*. Våtmarkerna vid ån och Björntjärnarna består av *skogskärr* och *sumpskog* av varierande slutenhet.


Bl a ängsnycklar, odonvide och Kung Karls spira förekommer.

Myrens norra delar påverkas av vägen. I övergången mot Kosomyren i öster finns ett ganska nytt dikessystem.

Bedömning: Långsmalt tämligen mångformigt våtmarksområde med mycket vattenkontakt . Myren saknar allvarliga ingrepp och hyser ytor med något rikare flora.

Myrar S Över-Stensjön. nr 134

Värdeklass II
Geokod 17G 1D 0D7C
Areal 125 ha
Flygbild 1988
Höh 400-415 m
VMI-nr 17G 1DO3
Naturvårdsobjekt N60 219
Fältbesökt 1990-09, S Grundström.




Våtmarksområdet ligger söder, väster och öster om över-Stensjön. Området är mosaikartat och förgrenat och hänger delvis inte ihop så bra. De våtmarkstyper som förekommer är *blandmyr, tallkärr, tallmosse, gransumpskog*. Ett flertal fastmarksholmar och fastmarksuddar finns i våtmarksområdet.

Vegetation och flora: Mest ordinär rismosse- och fattig kärrvegetation men rätt så stora partier med intermediär kärrvegetation i både öppna och tallbevuxna delar. Dominanter i kärrytorna är främst blåtåtel, tuvsäv och trådstarr samt Sphagnum papillosum och S subsecundum. Förekomst av flera diffusa källflöden främst i södra kanten med brunmossor som Scorpidium revolvens och Loeskypnum badium samt ängsnycklar och björnbrodd. Strandkärren är mestadels glest trädbevuxna men för övrigt mycket heterogena. Gransumpskogsytorna är ris- och vitmossdominerade med flytande övergångar mot frisk blåbärstyp. Längs bäckarna finns blötare och något örtrikare sumpskog med bl a ormbär och kärrfibbla.

Fauna: Mycket avverkningspår efter bäver vid småbäckarna. Reproducerande flodpärlmussla i Stensjöån 1990.


Påverkan: Den västra delen vid tjärnen är hydrologiskt störd av både gamla diken och den nya skogsbilvägen. Den närmaste omgivningen och fastmarksholmarna är totalt sett förvånansvärt lite påverkad av modernt skogsbruk och bitvis finns fina naturskogspartier med mycket sälg och hänglavar.

Bedömning: Flikigt och mångformigt våtmarksområde som till större delen är lite stört av både nyare skogsbruk, vägar och diken. Stora ytor med artrik fastmattekärr- och strandkärrvegetation samt små fina sumpskogytor.



Stormyran i Stormyrskogen. nr 138

Värdeklass I
Geokod 17G 1E 0D2D
Areal 85 ha
Flygbild 1988
Höh 420-445 m
VMI-nr 17G 1EO2
Naturvårdsobjekt NR60 031.
Naturreservat.
Fältbesökt 1976, Arnström, T. mfl. 1983, M Muhr.



Stormyrans närmaste omgivningar utgörs av granskogar som till stor del har urskogskaraktär. Terrängen är starkt kuperad med flera branta berg i närheten. Den V delen av myren sluttar mot SO och den centrala delen sluttar något mot N. Myren avvattnas mot NO via Stormyrbäcken ut i Stor-Ulvsjön. I myrens södra del ligger en stor tjärn.

Myren domineras av *kärrkomplex* med stor andel *strängflarkkärr*. Den västra delen lutar kraftigt och där finns ett terrasserat strängflarkkärr med stora flarkgölar. På myren finns också en *tallmosse,* en del *blandmyr* samt en tjärn som vuxit igen till ett gungfly. Myrkanterna utgörs av olika typer av skogskärr och sumpskogsytor.

Vegetation och flora: Vegetationen är *fattig till intermediär*. De fastare delarna av kärren domineras ofta av tuvsäv och blåtåtel. De blötare delarna är mer heterogena med bla vitstarr, dystarr, vattenklöver och kallgräs som vanliga arter. I kärren förekommer enstaka mera krävande arter som sumpnycklar,brunag, myggblomster samt olika mossor, t ex Sphagnum contortum, Sp teres,

Pseudocalliergon trifarium, Cratonerum filicanum och Calliergon giganteum. Mossepartierna är oftast av vanlig fuscumtyp och risdominerad. Ställvis finns träd- och buskskikt i de centrala delarna med främst lågvuxen tall samt dvärgbjörk och en. Mot kanterna finns tätare trädskikt med både glasbjörk, tall och gran.

Påverkan: Tjärnen i norra kanten (kallas Tjärnbotten) har sänkts i syfte att utvinna slåttermark. Bäcken öster om den fd tjärnen rinner i en fåra bredvid den ursprungliga. Även bäcken mellan Stormyrtjärnen och Tjärnbotten har troligen fördjupats i samma syfte.

Bedömning: Stormyran är ett differentierat myrkomplex både med avseende på myrtyper och vegetation. Speciellt strängflarkkärren med bitvis terrasserade flarkgölar är av högt värde. Myren är förutom de äldre sänkningsingreppen helt ostörd och har även av modernt skogsbruk helt ostörda omgivningar. Myren är botaniskt intressant med förekomst av rikkärr- och källkärrvegetation.

Källa: Andersson, B. Stormyrskogen, en naturbeskrivning. Rapport 1983:4 från länsstyrelsen i Härnösand.

Arnström, T. m fl. Fem myrar i Västernorrlands län. Rapport 1979:9 från länsstyrelsen i Härnösand.

Myr S Storulvsjötjärnen. nr 139

Värdeklass II
Geokod 17G 1E 0E4A
Areal 63 ha
Flygbild 1988
Höh 410-430 m
VMI-nr 17G 1EO3
Naturvårdsobjekt NR60 031 (delvis).

Myren hänger hydrologiskt ihop med Stormyran i väster och avvattnas mot norr till Storulvsjön. Den södra halvan ligger i Stormyrskogens naturreservat med grandominerad gammelskog. De våtmarkstyper som finns är *öppna kärr* som delvis är soligena, *öppna strandkärr* vid bäckens nedre del, *skogskärr, tallmosse* och små ytor med lövrik sumpskog.

Bedömning: De soligena kärren med inslag av




källor hyser goda förutsättningar för intermediär till rik flora. Våtmarkerna förefaller helt fria från störande ingrepp.

Källa: Andersson, B. Stormyskogen, en naturbeskrivning. Rapport 1983:4 från länsstyrelsen i Härnösand.

Abborrtjärnmyran m fl. nr 140

Värdeklass II
Geokod 17G 1E 4A9C
Areal ca 240 ha våtmark
Flygbild 1988
Höh 400-440 m
VMI-nr 17G 1EO4
Naturvårdsobjekt N60 078
Florainventerat R Lidberg mfl.
Landskapsflora i Medelpad.



Objektet består av en *myrmosaik* öster om Stormörtsjön. Myrarna ligger kring fyra tjärnar och ett flertal fastmarksholmar splittrar upp våtmarken. Myrarna hänger hydrologiskt inte ihop utan

avvattnas åt olika håll. Grusåsar förekommer i NV delen.

Myren vid *Vittjärnen* består av en delvis strängad *tallmosse* och en tallbevuxen *blandmyr*. Centralt i myren rinner Stormörtsjöbäcken mot nordöst.

Myren vid *Fisklöstjärnen* består dels av en *öppen mosse* i västra delen och dels av en *tallmosse* i östra delen. Båda mossarna är till stor del strukturerade i strängar och höljor men saknar egentliga laggar. Myren avvattnas mot väster till Rävåsbäcken. Söder om tjärnen ligger ett blött *kärrdråg* som delvis är differentierat i strängar och flarkar.

Myrarna vid *Flattjärnen* präglas av den igenväxande tjärnen med *gungflykärr* och fria vattenspeglar och strandkärr vid bäckarna och Flattjärnån. Strandkärren är delvis trädbevuxna och delvis öppna av sumpkärrtyp. Dessutom finns myrflikar med glest trädbevuxna *fastmattekärr* och *blandmyrar*. Området avvattnas åt norr.

Myrarna vid *Abborrtjärnen* består av en mosaik med *blandmyrar, tallmossor,* och fastmarksholmar. Norr om tjärnen finns en öppen *fastmattekärr*. Från Abborrtjärnen rinner en mindre bäck till Flattjärnen.


Vegetation och flora: I kärret SO om Fisklöstjärnen har bla kärrull påträffats.

Påverkan: Området är i sin helhet lite påverkat. Vid Flattjärnen finns en svag påverkan av gamla diken och vid Abborrtjärnen finns ett nytt dikessystem i gränsen mot fastmarken. Längs Ö kanten av Vittjärnen går en skogsbilväg som har en lokal påverkan. Vid vägen finns även en mindre grustäkt.

Bedömning: Mycket stort område med skogsmyrmosaik som är hydrologiskt ostört. Här finns flera olika våtmarkstyper alltifrån mycket blöta kärr till trädbevuxna mossar.

Örsmyrorna. nr 142

Värdeklass II-IV
Geokod 17G 2A 2E3H
Areal 220 ha
Flygbild 1988
Höh 395-400 m
VMI-nr 17G 2AO2
Naturvårdsobjekt N60 220



Örsmyrorna är ett långsmalt våtmarksområde längs Örsån. Örsån har ett slingrande lopp och längs ån finns öppna glest trädbevuxna *strandkärr* samt en lövrik *strandskog* i V delen. För övrigt finns en mosaik av *öppna kärr, skogskärr, tallmossar* och *sumpskog*. I den västra delen, norr om bäcken är ett 60 ha stort område kraftigt dikespåverkat och är idag av en obestämbar våtmarkstyp.

Bedömning: Områdets naturvärden är troligen främst knutet till den slingrande ån med de närmast omgivande strandvåtmarkerna.

Röjtjärnsmyran m fl. nr 144

Värdeklass I
Geokod 17G 2C 2E2F
Areal Ca 480 ha våtmark
Flygbild 1988
Höha 380-390 m
VMI-nr 17G 2CO1
Naturvårdsobjekt NR60 062
Fältbesökt 1981, K Due och M Muhr
1978-07, C Kjellkvist och P Simonsson.


Myrkomplexet som är ett av länets största breder ut sig mellan Oxsjön och Vikören. Myrarna avvattnas främst av Oxsjöån och Röjtjärnsbäcken. I myrområdet ligger två sjöar, Nores- och Sönnersjön som är halvt igenväxta samt en tjärn, Röjtjärnen.

Stora sammanhängande *mossar* finns på Röjtjärnmyran. Vidsträckta *mjukmattekärr* och *öppna blandmyrar* uppträder på Brännäsmyran. Sjöarna omges av öppna *sumpkärr*. Strängade området är inte framträdande men det finns några små *strängflarkkärr*. Tre mindre och två större *rikkärr* finns på myrarna. Vid kanterna växer olika

typer av *skogskärr. Sumpskog* förekommer som små partier i södra delen och som större sammanhängande ytor längs norra kanten och vid Oxsjöån.

Vegetation och flora: Brännäsmyran består nästan helt av fattiga mjukmattekärr med flaskstarrdominans. Ställvis övergår dessa kärr i ostrukturerade blandmyrar. Mot kanterna finns klotstarrdominerade tallkärr och ett något rikare blandskogskärr.

Spångmyran sluttar svagt mot SO och utgörs bl a



av ett intermediärt mjukmattekärr med bl a Sphagnum pulchrum och S subsecundum. Mot NO övergår kärret i ett svagt differentierat strängflarkkärr med ställvis rik vegetation där bla sumpnycklar och björnbrodd förekommer.

Vid *Nores- och Sönnersjön* breder vidsträckta högstarrsumpkärr ut sig med tätvuxen tråd- och flaskstarr.

Norra delen av *Röjtjärnsmyran* består av mosseområden, både öppna och tallbevuxna. Öster och söder om Röjtjärnen finns intermediära-rika kärr. Där myren börjar smalna av i söder finns flera skogsdungar med källor där det finns en rik mossflora. Av rikkärrsarter finns t ex myggblomster, björnbrodd och sumpnycklar samt brunmossorna Campylium stellatum, Calliergon giganteum och Scorpidium scorpioides. Dessutom finns en ovanlig vitmossart, Sphagnum obtusum.

Fauna: Värdeklass I i fågelinventeringen med en mycket art- och individrik fågelfauna. Bl a bläsänder, en stor måskoloni, tranor och lärkfalk.

Påverkan: De blöta kärren vid sjöarna har brukats som slåttermarker och det är troligt att vissa sänkningsingrepp har gjorts. Ö delen av Spångmyran och områdena V om Sönnersjön har använts till myrodling och består idag av björkdominerade torvmoar med ett stort inslag av björnmossor. Några synliga basvägar korsar Spångmyran och Röjtjärnsmyran. I östra delen kanten finns nya diken på ett par ställen.


Bedömning: Myrkomplexet är mycket stort och totalt sett lite påverkat. Området hyser ett flertal våtmarkstyper som är representativa för regionen men också några typer som är mindre vanliga, t ex de blöta sumpkärren vid sjöarna. Myrarna har högsta skyddsvärde i fågelinventeringen p g a en både art- och individrik fågelfauna. Vegetationen är också mångformig med mindre rikkärrsområen och några källor som värdefullaste delar.

Källa: Due, K. och Muhr M. Tretton myrar Rapport 1983:1 från länsstyrelsen i Härnösand.

Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

S Järvtjärnmyran. nr 147

Värdeklass II
Geokod 17G 2E 4A5H
Areal 85 ha
Flygbild 1988
Höh 375-380 m
VMI-nr 17G 2EO1
Naturvårdsobjekt N60 221
Fältbesökt 1983, E Bohlin.



Järvtjärnmyran ligger norr om Järvåsens branta sluttning. I södra kanten ligger Järvtjärnen som är ca 400x200 m stor. Myren sluttar svagt mot söder och avvattnas via bäcken från Järvtjärnen och vidare mot öster till Saxån.

Myrens centrala del utgörs av en *öppen-glest tallbevuxen mosse* med omgivande *laggkärr*. På myren finns också *skogskärr, blandmyrar* och *öppna fastmattekärr*. Mot myrens kanter uppträder ytor med *blandsumpskog*. Myren hänger ihop med den NV delen av Järvtjärnmyran via en trädbevuxen myrarm. Objektet har avgränsats på vattendelaren.

Vegetation och flora: Vegetationen är mestadels *fattig-intermediär* men lite *rikare kärr* och blandmyrar uppträder på flera ställen. Dessa är ofta glest trädtäckta med ett stort inslag av brunmossor i bottenskiktet. Av mer krävande fältskiktsarter finns t ex ängsnycklar, gräsull och nålstarr. Mot kanterna finns fattiga-intermediära tallkärr samt blandskogsbevuxna myrkanter. I de senare förekommer ängskärrvegetation där bl a Kung Karls Spira, strätta och ormrot är vanliga. En källa av fattigare typ finns i närheten av tjärnen.

Påverkan: Vinterkörvägar korsar myren på ett par ställen. Ett gammalt dike finns i det centrala mossepartiet men detta är igenväxt idag. Torvkoncessionsansökan finns.

Bedömning: Järvtjärnmyran hyser mestadels ordinära myrtyper med i huvudsak liten påverkan. Vegetationen är intermediär-till rik i vissa delar och här finns både vegetationstyper och växtarter som är mindre vanliga i länet. De värdefullaste delområden torde vara de rika kärr- och sumpskogspartierna.


Källa: Bohlin, E. 1983. "Iggesundsmyrar". Opubl rapport.

Stormyran 3 km S Saxen. nr 150

Värdeklass II
Geokod 17G 2F 0D4E
Areal 80 ha
Flygbild 1988
Höh 405-415 m
VMI-nr 17G 2FO1
Naturvårdsobjekt N60 222
Fältbesökt 1989-10, S Grundström.

Stormyran ligger öster om landsvägen mellan byarna Saxen och Kilen. Två småtjärnar och några fastmarksholmar ligger i myrområdet. Hela myren sluttar svagt mot söder och avvattnas via Hällsjöån.

Myrens västra del domineras av ett *öppet kärr* som delvis är *diffust strängat*. Den östra delen utgörs av två *svagt välvda mossar*, öppna kärrytor och ostrukturerade blandmyrytor. Mot kantena finns glest skogbevuxna blandmyrar och bitvis täta skogskärrdungar. De små tjärnarna omges av smala gungflykärr.




Vegetation och flora Den västra delen har en *intermediär vegetation*. Fastmatteytor dominerar men ställvis finns också mjukmatte- och lösbottenpartier. De fastare delarna domineras av blåtåtel, trådstarr och tuvull och har ett svagt utvecklat bottenskikt med bl a Sphagnum papillosum och S subfulvum. De blötare delarna är mer heterogena med främst dystarr och ängsull som rikliga arter. Scorpidium scorpidiodes dominerar bottenskiktet fläckvis. Av mossarna i östra delen är den ena öppen och den andra tallbevuxen. Tydliga laggkärr avvattnar mossorna. Även i den östra delen finns små strängflarkkärr och större fastmattekärrytor.

Påverkan: Partier med kraftig dikespåverkan (äldre myrodlingar) finns på två ställen. Dessa har idag vuxit igen med lövträd. Vid Hundtjärnen finns rester efter lador. Mot vägen finns små myrar med viss dikes- och körvägspåverkan. Avverkningar har gjorts ända ut i myren i södra delen.

Bedömning: Myren är ganska variationsrik med flera myrtyper som är representativa för Medelpad men också något ovanligare typer i form av svagt välvda mossar. Myren är i sin helhet lite påverkad och har en stor andel öppna och blöta myrytor med intermediär vegetation.

Gällsjömyran mfl. nr 153

Värdeklass I
Geokod 17G 3A 3E4F
Areal 250 ha våtmark
Flygbild 1988
Höh 370-380 m
VMI-nr 17G 3AO1
Naturvårdsobjekt N60 176
Fältbesökt 1990-09, Ö delen, S Grundström.



Myrkomplexet runt Gällsjön är stort och mångformigt med ett flertal tjärnar och fastmarksholmar. Centralt i våtmarksområdet rinner Gransjöån. De våtmarkstyper som dominerar är *öppet kärr* (mjuk-fastmatta), *tallkärr,* öppnaglest trädbevuxna *strandkärr, strängflarkkärr* samt små ytor med olika typer av sumpskog.


Vegetation och flora: Tall dominerar trädskiktet i både glesare och tätare delar men ställvis finns ett betydande lövinslag. Kärren är fattiga till intermediära med dominans av främst tuvsäv, blåtel, trådstarr och flaskstarr samt olika vitmossor i bottenskiktet. Av intressanta lite mer krävande arter förekommer t ex björnbrodd, ängsnycklar och mossorna Sphagnum subnitens och Campylium stellatum. Enstaka små mosseytor finns på några ställen.

Påverkan: Smärre dikningsingrepp finns på några ställen liksom lokala skador av terrängkörning och en skogsbilväg. I norra kanten har anslutande sumpskog avverkats på flera ställen

Bedömning: Gällsjömyran-komplexet är ett mycket stort och lite stört våtmarksområde. Mångformigheten är stor med tjärnar, ån och fastmarks holmar som ligger i mosaik med myrytorna. Myr- och vegetationstyperna är ordinära men representativa för regionen.

N Järvtjärnmyran. nr 155

Värdeklass I
Geokod 17G 3D 0E8H
Areal 135 ha
Flygbild 1988
Höh 367-375 m
VMI-nr 17 G 3DO1
Naturvårdsobjekt N60 223
Fältbesökt 1983, E Bohlin.



Myren ligger vid Getingtjärnen, Flottatjärnen och Norestjärnen. Ett flertal mindre bäckar rinner genom våtmarkerna och området avvattnas mot norr via Brännbergsån ut i Roggsjön. En stor del utgörs av *glest trädbevuxna kärr* och *sumpskogar. Öppna fast-mattekärr* förekommer också liksom några små tallmossar. Tjärnarna omges av *gungflykärr* och bäckarna av *buskrika strandkärr.*

Myren hänger ihop med den SO delen av Järvtjärnmyran via en trädbevuxen myrarm. Objektet har delats på vattendelaren.

Vegetation och flora: De glest trädbevuxna partierna utgörs delvis av fattiga tallkärr och blandmyrar men delvis också av rikare blandskogskärr. De rikare delarna domineras ofta av blåtåtel med förekomst av rikindikerade arter som strätta, Kung

Karls spira, ormrot, gräsull och slåtterblomma. I de öppna kärren finns ställvis en rik vegetation med bla ängsnycklar och knagglestar samt rikmossorna Campylium stellatum och Tomentypnum nitens. Gungflykärren vid tjärnarna är högstarrdominerade med sammanhängande vitmossmattor inåt myren. Strandkärren vid bäckarna är videbevuxna och tuviga med främst styltstarr som dominant och ett visst örtinslag. Norr om Norestjärnen finns en källa med avvikande vegetation där bl a mossorna Crautoneron commutatum och Calliergon giganteum växer.

Påverkan: Vinterkörvägar korsar myren på ett flertal ställen. En väg berör Flottatjärnens västra del. Runt Norestjärnen är vegetationen kraftigt påverkad av en bäverdämning.

Bedömning: Ett mycket mångformigt våtmarkskomplex med stora ytor rika skogskärr och sumpskogar som värdefullaste delområden. Området är opåverkat av dikningsingrepp och i sin helhet lite stört.

Källa: Bohlin, E. 1983. "Iggesundsmyar". Opubl rapport.

Vimyrorna. nr 158

Värdeklass II
Geokod 17G 4C 0E1B
Areal 125 ha
Flygbild 1988
Höh 340-355 m
VMI-nr 17G 4CO1
Naturvårdsobjekt N60 224
Fältbesökt 1983, E Bohlin.



Vimyrorna sluttar svagt ner mot Alderängsån som rinner mot norr genom myrens centrala del. Myren domineras av svagt sluttande *öppna kärr* som delvis är differentierade i *strängflarkkärr*. Längs ån finns *strandkärr* som delvis är trädfria och delvis övergår i *strandskogar*. Mot kanterna förekommer tallkärr occh små tallmossor. I östra delen finns flera fastmarksholmar.

Vegetation och flora: Intermediära fastmattekärr som är tuvade och strängade dominerar i NV och SO delarna av myren. Blåtåtel, blodrot och slåtterblomma är karakteristiska i fältskiktet och Sphagnum warnstorfii och S subfulvum dominerar oftast bottenskiktet. Här förekommer också en del rikindikerande arter såsom ängs- och sumpnycklar samt gräsull och fjällskära. I de centrala delarna utbreder sig fattigare starrsamhällen med stor del lösbottnar. Intermediära skogskärr förekommer med sparsamma inslag av rikmossor som Campylium stellatum och Tomentypnum nitens. Täta videsnår och styltstarrtuvor med visst örtinslag dominerar vegetationen kring Alderån.

Påverkan: Myren är lite påverkad. De mest synliga är ett par vinterkörvägar. Några äldre diken finns vid västra och södra kanten. En damm fanns tidigare i Alderängsån i norra kanten av myren men några spår av den syns inte idag.

Bedömning: Myren är i sin helhet lite påverkad även om omgivningarna till stor del har avverkats. Inga speciellt väldifferentierade myrtyper förekommer men här finns rätt stora ytor med blöta kärr och lövrika strandskogar. Vegetationen är delvis rik med flera lite mer krävande moss- och kärlväxtarter.

Källa: 1983, Bohlin, E. "Iggesundsmyrar". Opubl rapport.



Byggmyren. nr 160

Värdeklass II
Geokod 17G 7E 2E0D
Areal 50 ha
Flygbild 1987
Höh 245 m
VMI-nr 17G 7E01
Naturvårdsobjekt N60 073
Fältbesökt 1974, P Simonsson.




De våtmarkstyper som finns är *sumpskog, skogskärr* och små öppna kärrytor med diffusa strängar. Översilade sumpskogar och kärr med förekomst av guckusko och klippbräcka.

Bedömning: Det mycket höga bevarandevärdet motiveras av de rika sumpskogarna och skogskärren.

Påverkan: Våtmarkstyperna är svagt lokalt påverkade av dikning och skogsbilväg.

Våtmarker vid Lönntjärnen. nr 162

Värdeklass II
Geokod 17G 7A 3E5D
Areal Ca 45 ha våtmark
Flygbild 1988
Höh 280-290 m
VMI-nr 17G 8AO2
Naturvårdsobjekt NR60 023
Florainventerat 1976, R Lidberg m fl.
Landskapsflora i Medelpad.



Norr och väster om Lönntjärnen finns rätt stora ytor med *trädbevuxna rikkärr* och *rika sumpskogar*. Små ytor med öppnare kärr förekommer också. I tjärnen finns en bred bård med högstarr- eller fräkenvassar.


I våtmarken förekommer bl a myrstarr, huvudstarr, hårstarr, smaldunört, gräsull, brudsporre och guckusko.

Flera körvägar går över våtmarken.

Bedömning: Våtmarken vid Lönntjärnen hyser mycket rika växtsamhällen vilket motiverar ett mycket högt bevarandevärde.

Myr vid Trätmyrtjärn. nr 169

Värdeklass II
Geokod 17G 8F 4A9C
Areal 100 ha
Flygbild 1988
Höh 395-405 m
VMI-nr 17G 8FO1
Naturvårdsobjekt N60 169
Fältbesökt 1983, M Muhr.



Myren ligger 5 km V om sjön Leringen uppe på Leringsåsen. Myren är plan-svagt sluttande mot norr resp söder. I myren finns *tre tjärnar* som är mer eller mindre igenväxta. Myren domineras av *öppna kärr* som delvis är differentierade i *strängflarkkärr*. Rätt så stora ytor upptas också av *skogskärr* och glest trädtäckt *blandmyr*.

Vegetation och flora: *Fattiga till intermediära kärr* av olika typ dominerar. Strängflarkkärren består av fastmattesträngar och lösbottenflarkar med brunmossdominans i kanterna.


Stormyrtjärnen är kraftigt igenväxt med vassar av flaskstarr och sjöfräken. Skogskärren är dels intermediära tallkärr, dels olika typer av blandskogskärr. I dessa kärrpartier förekommer bl a ullsäv och ängsnycklar.

Påverkan: Ett dike från Stormyrtjärnen mot norr samt en ny skogsbilväg i västra kanten utgör de allvarligaste ingreppen. Det är troligt att alla tjärnar tidigare har sänkts i viss omfattning för att utvinna slåttermark.

Bedömning: Myrkomplexet är mångformigt och är i huvudsak lite påverkat. De rätt stora ytorna med öppna och blöta kärr samt de frodiga skogskärren utgör värdefulla inslag i ett annars ganska våtmarksfattigt område.

Våtmarker vid Hiån. nr 170

Värdeklass II
Geokod 17G 8H 3B5I
Areal 74 ha
Flygbild 1988
Höh 245-250 m
VMI-nr 17G 8HO1
Naturvårdsobjekt N60 225




Våtmarkerna ligger längs Hiån. Olika typer av *skogskärr* och *sumpskogar* dominerar helt. I vardera änden av området ligger två småtjärnar, Hiåtjärnen och Prästtjärnen. Små öppna kärrdråg förekommer sparsamt.

Körvägar påverkar våtmarksområdet något. Den västra delen påverkas svagt av en skogsbilväg.

Våtmarksområdet är homogent med ovanligt stora ytor strandkärr och sumpskog. Allvarliga ingrepp saknas.

Värsjömyran. nr 172

Värdeklass I
Geokod 18G 0B 1A2D
Areal 90 ha
Flygbild 1989
Höh 400-430 m
VMI-nr 18G 0BO1
Naturvårdsobjekt Del av NR 60 017
Naturreservat
Fältbesökt 1970, F Björkbäck.
1990, S Grundström.



Värsjömyran ligger i en västsluttning ner mot Värsjön i det sk Jämtgaveln-området som är ett stort sammanhängande naturskogsområde. Myren utgörs till stor del av *strängflarkkärr* med stor andel vackert utbildade terrassgölar. En stor del av myren utgörs av *glest trädbevuxna blandmyrar* och *skogskärr* men också små öppna ostrukturerade kärr och sumpskogsytor förekommer spritt.

Vegetation och flora: Flarkkärren har en intermediär vegetation med förekomst av bl a hirsstarr och

dvärglummer samt Sphagnum warnstorfii, Scorpidium scorpioides och Campylium stellatum i bottenskiktet. På torrakor i strängkärret finns en sparsam förekomst av varglav. I skogskärr vid Värsjöbäcken finns rika partier där bl a tvåblad, brakved och nålstarr växer.

Påverkan: Vägen vid sjön påverkar myren marginellt. Två körvägar går från vägen upp mot öster och påverkar myren något.


Bedömning: Myrens stora värde ligger i de väl utbildade strängflarkkärren med bitvis terrasserade flarkgölar. Myren är i sin helhet ostörd och ligger i ett stort naturskogsområde.

Källa: Björkbäck, F. 1970, TELMA. Skyddsvärda myrar i Y-län. Opublicerad rapport.

Olsson, H. 1974, Jämtgaveln, Naturvårdsundersökning. Länstyrelsen i Västernorrlands län.

Avamyran-Nybyggemyran. nr 173

Värdeklass I
Geokod 18G 0B 2B3H
Areal 115 ha
Flygbild 1989
Höh 420-445 m
VMI-nr 18G 0BO2
Naturvårdsobjekt Del av NR 60 017
Naturreservat
Fältbesökt 1978-06, K-E Johansson.



Myrområdet består av Avamyran, Nybyggemyran och Hästmyran. Myrarna sluttar svagt ner mot sjöarna Storavan och Nybyggesjön samt bäcken därimellan. Området mellan Nybyggemyran och Avamyran är mosaikartat med flera fastmarksholmar. *Glest trädtäckta rismyrar* dominerar stora delar. Dessa är troligen både av mosse- och kärrtyp med tall som dominerar trädslag. Rena *mossar* som är öppna-glest trädbevuxna och delvis strukturerade förekommer på några ställen. *Öppna kärr* finns på Hästmyran men också som smala dråg på andra ställen. I västra kanten av Nybyggemyran ligger ett vackert utbildat *strängflarkkärr*. Vid Storavan och vid bäcken finns öppna *strandkärr* av gungflytyp.

Vegetation: Mestadels fattigt. Fläckvis finns intermediär vegetation med förekomst av ängsnycklar och nålstarr. Inlandslokal för pors.

Fauna: Värdeklass III (Nybyggemyran) och IV (Avamyran) i fågelinventeringen.

Påverkan: Två körvägar passerar myren. Möjligen har bäcken och Storavan påverkats av dämningar i äldre tid.

Bedömning: Myrkomplexet är stort och saknar allvarlig påverkan. Myrtyperna är representativa för regionen. Läget i ett stort naturskogsområde höjer värdet ytterligare.


Källa: Dynesius, M. och Simonsson, P. Fågelmyrar i Västernorrlands län. Rapport 1980:13 från länsstyrelsen i Härnösand.

Olsson, H. 1974 Jämtgaveln, naturvårdsundersökning.



Svarttjärnflon. nr 174

Värdeklass II
Geokod 18G 0B 3D0A
Areal 85 ha
Flygbild 1989
Höh 440-455 m
VMI-nr 18G 0B O3
Naturvårdsobjekt delvis i NR60 017
Naturreservat




Svarttjärnflon är en plan-svagt sluttande myr som i huvudsak avvattnas mot söder till Storavan. I den östra resp sydöstra kanten liger två tjärnar, Svarttjärnen och Baktjärnen. Myrens centrala del upptas av *mossar* på vardera sidan om bäcken mellan tjärnarna. I norra delen finns tre ytor med *öppna mjuk-fastmattekärr*. Längs kanterna uppträder vanliga myrkantsamhällen i form av glest trädbevuxna rismyrar.

Påverkan: En körväg passerar myren i nord-sydlig riktning.

Bedömning: Medelstort representativt myrområde utan störningar. Myrens läge i ett naturskogsområde höjer värdet ytterligare.

Norsmyran. nr 179

Värdeklass II
Geokod 18G 0B 4B4J
Areal 60 ha
Flygbild 1989
Höh 450-470 m
VMI-nr 18G 0B08
Naturvårdsobjekt ingår i NR60 017
Naturreservat
Fältbesökt 1978-06, K-E Johansson.
Värdeklass IV i fågeliventeringen.



Norsmyrans östra del omger Norstjärnen och Korssjöbäcken som rinner mot söder. Den västra delen sluttar ner mot tjärnen och är ett mosaikartat område med flera fastmarksholmar. Myren utgörs till stor del av *öppna kärr* som delvis är differentierade i *strängflarkkärr* med vattenfyllda flarkgölar. Vid tjärnen finns *blöta gungflyn* och vassar. SV om tjärnen finns skogskärrspartier samt små ytor med öppen mosse. Norsmyran sitter ihop med Sjutjärnsflon på Jämtlandssidan. Sjutjärnsflon ligger på andra sidan vattendelaren och sluttar mot NV.

Vegetation och flora: Den centrala delen vid tjärnen har en intermediär vegetation med bl a myggblomster, gräsull, ängsnycklar samt mossorna Scorpidium scorpidoies och Sphagnum warnstorfii.

Påverkan: Myren saknar allvarliga ingrepp.


Bedömning: Medelstort ostört våtmarksområde med representativa myrtyper. Värdet höjs ytterligare av läget i ett naturskogsområde.

Källa: Dynesius, M. och Simonsson, P. Fågelmyrar i Västernorrlands län. Rapport 1980:13 från länsstyrelsen i Härnösand.

Olsson, H. 1974, Jämtgaveln, en naturvårdsundersökning.

Myr vid Tvåtjärnarna. nr 181

Värdeklass II
Geokod 18G 0C 2C1D
Areal 80 ha
Flygbild 1989
Höh 465 m
VMI-nr 18G 0C01
Naturvårdsobjekt N60 106
Fältbesökt. 1974, H Olsson




Ett våtmarksområde med en mosaik av ordinära myrtyper som glest trädbevuxen *blandmyr* och *mosse,* risrika *skogskärr* och öppet *strängflark-kärr.*

I huvudsak fattig vegetation med vida starr och risbevuxna partier. Vid tjärnen finns enstaka mygg-blomster.

Området förefaller helt ostört.

Bedömning: Våtmarkerna vid Tvåtjärnarna är av mycket högt bevarandevärde pga ostördheten.

Källa: Olsson, H. 1974. Jämtgaveln. Opublicerad rapport från Länstyrelsen i Västernorrlands län. Härnösand.



Nr 1

17F 1E 01 (4043) KLASS 3
ÅSMYRAN OCH HÅSTMYRAN 16 KM SO HAVERÖ KA

Myrkomplex, 51 ha (50 ha våtm), 390 m ö h. Flygb. -87.
Storomr AA.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
7 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Sträng, 40 % av delobjektytan.

Element 2: Flark, 60 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
15 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
8 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
18 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 2

17F 1E 02 (4015) KLASS 4
KÖLAMYRAN 14 KM SO HAVERÖ

Obestämbar myr, 80 ha (80 ha våtm), 345 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning, väg.

Nr 3

17F 2B 01 (1846) KLASS 3
FLOARNA OCH KROKTJÄRN 8 KM S HAVERÖ KA

Myrkomplex, 95 ha (63 ha våtm), 265 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Åsrygg i anslutning, sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Sjöstrand
15 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från vattenreglering.

Element 1: Golv, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
25 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Element 4: Göl, 1 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, skogsbevuxet.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Nr 4

17F 2C 01 (3820) KLASS 3
AVAFLON 5 KM S HAVERÖ KA

Myrkomplex, 68 ha (58 ha våtm), 290 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Drumlin i anslutning.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
16 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Göl, 15 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
17 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 60 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 3: Topogent kärr
23 ha, fördelat på 5 ytor, skogsbevuxet. Stark lokal påverkan från dikning, väg.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 5

17F 2C 02 (4930) KLASS 2
BREDMYRAN 5 KM S HAVERÖ KA

Myrkomplex, 105 ha (88 ha våtm), 280 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
23 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 80 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
22 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 3: Topogent kärr
40 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet. Stark lokal påverkan från dikning, väg.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta med ristuvor.
Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog. Fastmatta.

Delobj. 4: Tjärn
6 ha, fördelat på 3 ytor.

Nr 6

17F 2D 01 (1047) KLASS 3
ÅSMYRAN 11 KM SO HAVERÖ KA

Myrkomplex, 75 ha (73 ha våtm), 335 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
16 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Hölja, 60 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Sträng, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Kärrfönster, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 2: Obestämbar myr
23 ha, skogsbevuxet. Stark generell påverkan från dikning, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
11 ha, öppet. Svag lokal påverkan från vinterväg. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
18 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Nr 7

17F 2D 02 (3335) KLASS 2
VÅTMARKER VID SOTÅN 8 KM SO HAVERÖ KA

Våtmarkskomplex, 225 ha (190 ha våtm), 305 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Sjö ansluter till högst 24%, slingrande vattendrag.

Delobj. 1: Mad vid vattendrag
25 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Delobj. 2: Tjärn
13 ha, fördelat på 4 ytor.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
27 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Delobj. 4: Sumpskog
50 ha, fördelat på 7 ytor. Svag lokal påverkan från anslutande väg, vinterväg.

Delobj. 5: Blandmyr av mosaiktyp
45 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande väg, vinterväg.

Nr 8

17F 2D 03 (4440) KLASS 4
RÖTTMYRAN 8 KM SO HAVERÖ KA

Myrkomplex, 50 ha (46 ha våtm), 310 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Orört. Ingår i naturvårdsplan. Sjö ansluter till högst 24%.

Nr 9

17F 2D 04 (4502) KLASS 3
DÖVELTJÄRNEN 5,5 KM SSO HAVERÖ KA

Bevuxen sjö, 3 ha (2 ha våtm), 285 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Omitologiska värden.

Delobj. 1: Bevuxen sjö
2 ha, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Gungfly, öppet. Lösbotten.

Nr 10

17F 2E 01 (0235) KLASS 3
HÄSTMYRAN 15 KM SO HAVERÖ KA

Myrkomplex, 30 ha (30 ha våtm), 380 m ö h. Flygb. -87.
Storomr AA.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
6 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 70 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
7 ha, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
14 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, väg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Mjukmatta.

Nr 11

17F 2E 02 (2935) KLASS 2
HÅFLON 13 KM SO HAVERÖ KA

Våtmarkskomplex, 105 ha (97 ha våtm), 295 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Åsrygg i anslutning.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
12 ha, öppet. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 40 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 25 % av delobjektytan.

Element 4: Göl, 5 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Mad vid vattendrag
15 ha, öppet. Geovetenskapliga värden.

Element 1: Gungfly, 60 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 35 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Bäck, 5 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
16 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, vintervåg.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
35 ha, fördelat på 5 ytor, skogsbevuxet. Stark lokal påverkan från avverkning, dikning, väg.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mindre fläckar, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 5: Limnogen strandsumpskog
6 ha, fördelat på 2 ytor. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 90 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog. Mjukmatta.

Element 2: Bäck, 10 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 6: Tjärn
6 ha, fördelat på 3 ytor.

Nr 12

17F 2F 01 (2439) KLASS 3
STORFLON N LILLBERGET 12 KM SSV ÖSTAVALL

Myrkomplex, 60 ha (60 ha våtm), 415 m ö h. Flygb. -87.
Storomr Al.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Omitologiska värden.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
15 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Flark, 75 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 2: Sträng, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Mindre fläckar, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 2: Tuva, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Kantzon, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
25 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från avverkning, svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, (otydl.), 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 13

17F 2G 01 (2008) KLASS 1
HÄXTJÄRNSFLON OCH BRATTMYRAN 12 KM S ÖSTAVALL

Myrkomplex, 135 ha (127 ha våtm), 400 m ö h. Flygb. -87. Fält -90. Storomr Al.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
10 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Flark, 60 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av oligotrof typ.

Element 3: Flarkgöl, 20 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Element 1, underelem. 1: Källa, 1 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, blandskog. Källkärr av intermediär Warnstorfiatyp.

Element 2: Gungfly. Lösbottenkärr av intermediär typ.

Element 3: Gungfly, 25 % av delobjektytan. Öppet lösbottenkärr.

Element 4: Bäckdråg, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Mjukmatta.

Delobj. 3: Tjärn
5 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Kantzon vid tjärn. Egentliga vassar saknas.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
9 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 5: Topogent kärr
25 ha, fördelat på 6 ytor, öppet. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vitmosstyp.

Element 2: Bäckdråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Lösbottenkärr av rik mossfattig typ.

Delobj. 6: Blandmyr av mosaiktyp
30 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, väg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Fastm. kärr av starr-ört-Campylium-Scorp.var.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 3: Sträng, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 7: Topogent kärr
25 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning, väg, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, barrskog. Tallkärr av fattig vitmosstyp.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, barrskog. Tallkärr av klotstarrtyp.

Element 3: Bäck, 2 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Element 3, underelem. 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 5 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, barrskog. Tallkärr av intermediär vitmosstyp.

Delobj. 8: Sträng-flarkkärr
15 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Sträng, (otydl.), 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 80 % av delobjektytan. Lösbotten.

Nr 14

17F 2G 02 (4549) KLASS 3
MYR VID BÄVERTJÄRNARNA 9 KM S ÖSTAVALL

Myrkomplex, 85 ha (68 ha våtm), 340 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, vinterväg.

Element 1: Golv, 68 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 3: Sträng, 2 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
18 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Sträng, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
18 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, vinterväg.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
15 ha, fördelat på 3 ytor. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 5: Tjärn
3 ha, fördelat på 3 ytor.

Nr 15

17F 2I 01 (4025) KLASS 3
HÅBBERSMYRAN 13 KM SO ÖSTAVALL

Myrkomplex, 80 ha (70 ha våtm), 345 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
35 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning, vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Kärrfönster, 10 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 2: Topogent kärr
14 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 3: Topogent kärr
18 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från vintervåg.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Kantzon, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 16

17F 2J 01 (4222) KLASS 2
N LÖVÅSMYRAN 17 KM SO ÖSTAVALL

Myrkomplex, 100 ha (100 ha våtm), 435 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Sluttande mosse
13 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 2: Hölja, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Kantzon, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 2: Sluttande mosse
35 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vintervåg.

Element 1: Mosseplan, (tydliga), 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Dråg, (tydliga), 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, väg.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Bäckdråg, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Mjukmatta.

Delobj. 4: Soligent kärr
10 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 3: Sträng, (tydliga), 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 4: Flark, 15 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 5: Sumpskog
12 ha, fördelat på 3 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 17

17F 2J 02 (4724) KLASS 2
LAPPMYRAN 19 KM SO ÖSTAVALL

Myrkomplex, 105 ha (103 ha våtm), 405 m ö h. Flygb. -87.
Storomr AK.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
32 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Kantzon, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
10 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Gungfly, 25 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 3: Flark, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 4: Sumpskog
25 ha, fördelat på 4 ytor.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 5: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vintervåg.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mindre fläckar, 8 % av delobjektytan. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Bäck, 2 % av delobjektytan.

Nr 18

17F 3A 01 (2028) KLASS 2
FAGERFLON 10 KM V HAVERÖ KA

Myrkomplex, 85 ha (82 ha våtm), 340 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
16 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vintervåg.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 16 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
25 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande väg, vintervåg. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 5 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från vintervåg.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Limnogen strandsumpskog
12 ha, fördelat på 2 ytor. Svag lokal påverkan från avverkning.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 90 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Bäck, 10 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Nr 19

17F 3B 01 (1223) KLASS 4
MYR VID LÅNGTJÄRNEN 6 KM SV HAVERÖ KA

Myrkomplex, 93 ha (80 ha våtm), 280 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Starkt lokalt påverkat av dikning, väg. Åsrygg i anslutning.

Nr 20

17F 3B 02 (3030) KLASS 3
ENSTERFLON 4 KM V HAVERÖ KA

Myrkomplex, 50 ha (46 ha våtm), 275 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Svagt lokalt påverkat av anslutande hyggen, anslutande väg.

Element: Sträng.

Delobj. 1: Strängblandmyr
20 ha, öppet.

Element: Kantzon. Risvegetation. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 2: Topogent kärr
19 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, anslutande väg.

Element: Golv. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 3: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Nr 21

17F 3B 03 (1545) KLASS 2
RÖRMYRAN 5 KM SV HAVERÖ KA

Myrkomplex, 110 ha (105 ha våtm), 275 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
18 ha, fördelat på 5 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 75 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 3: Bäckdråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
13 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, (tydliga), 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Hölja, (tydliga), 30 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
19 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
33 ha, fördelat på 8 ytor, skogsbevuxet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Topogent kärr
18 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Nr 22

17F 3B 04 (3849) KLASS 3
BULLFLON 2,5 KM V HAVERÖ KA

Svagt välvd mosse, 16 ha (16 ha våtm), 280 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
14 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Lagg, 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Nr 23

17F 3B 05 (4837) KLASS 3
GÅRDFLON 3 KM V HAVERÖ KA

Strängblandmyr, 25 ha (24 ha våtm), 285 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Strängblandmyr
21 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, anslutande väg.

Nr 24

17F 3B 06 (4823) KLASS 3
MYR VID LOMTJÄRNEN 5 KM V HAVERÖ KA

Myrkomplex, 36 ha (33 ha våtm), 270 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
18 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Göl, 10 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Element 4: Lagg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Vegetation utmed sjöstrand, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Mjukmatta.

Nr 25

17F 3F 01 (1730) KLASS 3
MYRAR N MALSJÖN 9 KM SV ÖSTAVALL

Våtmarkskomplex, 108 ha (90 ha våtm), 375 m ö h.
Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 79 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 2: Kantzon, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Källa, 1 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
35 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Tjärn
13 ha, fördelat på 5 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Gungfly, 30 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 4: Sumpskog
15 ha, mosaikartad fördelning.

Element 1: Mindre fläckar, 98 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 2: Bäck, 2 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Nr 26

17F 3G 01 (4545) KLASS 2
FINNSJÖMYRAN 4 KM S ÖSTAVALL

Myrkomplex, 70 ha (68 ha våtm), 270 m ö h. Flygb. -87.
Storomr AF.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Blockhav i eller i anslutning.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
14 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Flark, 70 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 2: Flarkgöl, 10 % av delobjektytan.

Element 3: Sträng, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
15 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från väg. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
5 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 5: Sumpskog
15 ha, fördelat på 6 ytor.

Element 1: Mindre fläckar, skogbevuxet, blandskog.

Nr 27

17F 3G 02 (1040) KLASS 3
SVEDBÄCKSFLON M FL 8 KM S ÖSTAVALL

Myrkomplex, 140 ha (110 ha våtm), 330 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Sluttande mosse
16 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, 58 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 2: Hölja, 30 % av delobjektytan, öppet, fastmatta.

Element 3: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 4: Höljegöl, 2 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr
15 ha, mosaikartad fördelning, glest trädtäckt. Svag generell påverkan från anslutande hyggen, svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Mindre fläckar, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Sträng-flarkkärr
18 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 50 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 3: Göl, 20 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Element 4: Kantzon, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Topogent kärr
28 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från väg, vinterväg.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Sumpskog
20 ha, fördelat på 5 ytor. Stark lokal påverkan från avverkning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 35 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Vegetation utmed mindre vattendrag, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 6: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Gungfly, 35 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta. Diffus strängbildning.

Nr 28

17F 3H 01 (3505) KLASS 2
FLARKMYRAN 6 KM S ÖSTAVALL

Våtmarkskomplex, 122 ha (117 ha våtm), 270 m ö h. Flygb. -87. Fält -90. Storomr AF.
Det: Stefan Grundström.
Äldre dammanläggning i våtmarken.

Delobj. 1: Sluttande mosse
10 ha, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Lagg, 10 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mad vid vattendrag
27 ha, öppet.

Element 1: Kantzon utmed å, 95 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 2: Bäck, 5 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ 5 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Tuva, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
40 ha, fördelat på 5 ytor. Svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, > 25 % krontäckning. Tallkärr av fattig vitmosstyp.

Delobj. 5: Strängblandmyr
8 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Flark, 40 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Mjukmattekärr, starr-S. papillosum var.

Element 3: Flark, 30 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av oligotrof typ.

Delobj. 6: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Mindre fläckar, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Nr 29

17F 3I 01 (3948) KLASS 2
LOMMYRAN 13 KM OSO ÖSTAVALL

Kärrkomplex, 90 ha (80 ha våtm), 380 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström. Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
13 ha, fördelat på 5 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, (otydl.), 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Flark, (otydl.), 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Lösbotten.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr 12 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Sträng, (tydliga), 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 60 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 3: Flarkgöl, 20 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Topogent kärr
25 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, vinterväg.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 6 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 30

17F 3I 02 (3330) KLASS 3
KORSMYRAN 12 KM SO ÖSTAVALL

Myrkomplex, 130 ha (112 ha våtm), 345 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
12 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, vinterväg.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 55 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Flarkgöl, 15 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr
18 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 2: Kantzon, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
25 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Limnogen strandsumpskog
20 ha, fördelat på 3 ytor. Svag lokal påverkan från avverkning.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Lösbotten.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Element 3: Bäck, 10 % av delobjektytan.

Delobj. 5: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning, vinterväg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Kantzon, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 31

17F 3I 03 (4613) KLASS 3
MYRAR NV HÅLLSJÖN 9 KM SO ÖSTAVALL

Våtmarkskomplex, 100 ha (75 ha våtm), 350 m ö h.
Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Blandmyr av mosaiktyp
9 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Mosseplan, (otydl.), 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, (otydl.), 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Sträng, (otydl.), 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 6 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Gungfly, 30 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 2: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
25 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
18 ha, fördelat på 6 ytor.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 5: Tjärn
6 ha, fördelat på 6 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.
Våtmarken är en sänkt sjö.

Nr 32

17F 3J 01 (3725) KLASS 2
HÄTTOMYRAN 15 KM OSO ÖSTAVALL

Myrkomplex, 65 ha (65 ha våtm), 405 m ö h. Flygb. -87.
Storomr AG. Det: Stefan Grundström. Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
12 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, (tydliga), 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, (tydliga), 60 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 3: Flarkgöl, 20 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
13 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande väg, vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, öppet.

Element 3: Göl, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Topogent kärr
8 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Dråg, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 20 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 4: Topogent kärr
28 ha, fördelat på 6 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 33

17F 4A 01 (0535) KLASS 3
MYRAR VID AKLASTJÄRNEN 9 KM V HAVERÖ KA

Kärrkomplex, 62 ha (55 ha våtm), 295 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Orört. Mosaikartad fördelning av våtmarkstyper.

Element: Flarkgöl.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
25 ha, fördelat på 5 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 80 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, öppet.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 2: Tuva, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Flark, 10 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 3: Topogent kärr
8 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Kantzon, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta med ristuvor.

Nr 34

17F 4A 02 (4047) KLASS 3
LILLFLON 9 KM V HAVERÖ KA

Myrkomplex, 23 ha (23 ha våtm), 300 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr 5 ha, öppet.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Flarkgöl, 10 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 2: Topogent kärr
14 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
3 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Nr 35

17F 4B 01 (3002) KLASS 3
STORFLON 8 KM V HAVERÖ KA

Myrkomplex, 36 ha (36 ha våtm), 295 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
17 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 60 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 3: Kantzon, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Bäck, 5 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
5 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Nr 36

17F 4C 01 (4715) KLASS 3
MYR N MOSJÖN 5 KM N HAVERÖ KA

Myrkomplex, 65 ha (55 ha våtm), 290 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström. Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
22 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, glest trädtäckt.
Stark lokal påverkan från väg, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Flark, 80 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
15 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Göl, 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
16 ha, fördelat på 8 ytor, skogsbevuxet.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Bäck, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Nr 37

17F 4D 01 (1215) KLASS 4
SUNDSMYRAN 5 KM O HAVERÖ KA

Obestämbar myr, 65 ha (63 ha våtm), 260 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning, väg. Nedlagda odlingar i våtmarken.

Nr 38

17F 4H 01 (4010) KLASS 2
STORFLON 3 KM Ö ÖSTAVALL

Myrkomplex, 93 ha (88 ha våtm), 430 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
25 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
20 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 4: Topogent kärr
5 ha, öppet.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 2: Mindre fläckar, 15 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Flarkgöl, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 5: Topogent kärr
8 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet.
Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 6: Tjärn
8 ha.

Element 1: Kantzon, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 39

17F 4I 01 (1146) KLASS 1
STORMYRARNA 12 KM O ÖSTAVALL

Kärrkomplex, 260 ha (225 ha våtm), 390 m ö h. Flygb. -87.
Storomr AG.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns, öppen yta större än 1000 m diam..

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
55 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Sträng, (tydliga), 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Sträng, (tydliga), 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Flark, 60 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 4: Flarkgöl, 25 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr
25 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 3: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
70 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 4: Topogent kärr
30 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 2: Tuva, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Kantzon, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 4: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 5: Flark, 9 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 6: Källa, 1 % av delobjektytan.

Delobj. 5: Strand vid vattendrag
7 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Mjukmatta.

Element 2: Bäck, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 6: Topogent kärr
20 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 2: Tuva, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Göl, 10 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 7: Sumpskog
30 ha, fördelat på 7 ytor. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 40

17F 4I 02 (2414) KLASS 3
LADBILLEN 9 KM O ÖSTAVALL

Våtmarkskomplex, 104 ha (88 ha våtm), 325 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Nedlagda odlingar i våtmarken, hölador, spänger.

Delobj. 1: Mad vid vattendrag
20 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, väg.

Element 1: Kantzon utmed å, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 2: Bäck, 10 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr
40 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, väg.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Flark, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Sumpskog
20 ha, fördelat på 5 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Kantzon utmed å, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 80 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 41

17F 4I 03 (2744) KLASS 2
MYR VID BYGGNINGSTJÄRNEN 11 KM O ÖSTAVALL

Myrkomplex, 50 ha (48 ha våtm), 395 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
9 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Flark, 60 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 2: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
15 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, (tydliga), 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Dråg, (tydliga), 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Lagg, (tydliga), 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
7 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 5: Tjärn
3 ha.

Element 1: Gungfly, 20 % av delobjektytan. Lösbotten.

Nr 42

17F 4J 01 (2510) KLASS 3
MYR VID ABBORRTJÄRNARNA 13 KM O ÖSTAVALL

Myrkomplex, 56 ha (48 ha våtm), 400 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Tjärn
6 ha, fördelat på 2 ytor. Svag generell påverkan från dikning.

Delobj. 2: Topogent kärr
23 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, väg, vinterväg.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Golv, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Flark, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
9 ha, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, (otydl.), glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
14 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Flark, 20 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Nr 43

17F 4J 02 (4108) KLASS 1
DJUPTJÄRNSMYRAN OCH LOKMYRAN 13 KM O ÖSTAVALL

Våtmarkskomplex, 190 ha (170 ha våtm), 390 m ö h. Flygb. -87. Fält -90.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
32 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 1, underelem. 1: Hölja, 5 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Fastmattemosse av tuvull-S. balticumtyp.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 3: Mindre fläckar, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Dråg, 10 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
18 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Dråg, 5 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Delobj. 3: Sumpskog
50 ha, fördelat på 4 ytor.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 15 % av delobjektytan, > 25 % krontäckning, barrskog. Sumpgranskog av ört-starrtyp.

Element 2: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, barrskog. Tallmosse av ristyp.

Element 3: Golv, > 25 % krontäckning, barrskog. Sumpgranskog av ristyp.

Delobj. 4: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Flark, 5 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 5: Topogent kärr
28 ha, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Element 1, underelem. 1: Flark, 10 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av intermediär typ.

Element 2: Sträng, (otydl.), 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 6: Topogent kärr
23 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Fastmattekärr av starr-ört-brunmosstyp.

Element 2: Sträng, 5 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3, underelem. 1: Källa, 1 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, blandskog. Källkärr av intermediär Warnstorfiatyp.

Element 4: Flark, 5 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av intermediär typ.

Delobj. 7: Tjärn
5 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Gungfly, 25 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, blandskog. Mjukmattekärr, kallgräs-vitmoss variant.

Element 1, underelem. 1: Källa, 1 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Källkärr av Philonotis-typ.

Nr 44

17F 5A 01 (3027) KLASS 3
LADUMYRAN OCH ÖVERTURINGEN 14 KM SO HAVERÖ KA

Myrkomplex, 50 ha (48 ha våtm), 275 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Nedlagda odlingar i våtmarken.

Delobj. 1: Obestämbar myr
12 ha, glest trädtäckt. Stark generell påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
17 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
8 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 98 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Göl, 2 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Nr 45

17F 5B 01 (2545) KLASS 2
PORSMYRAN 9 KM N HAVERÖ KA

Myrkomplex, 167 ha (135 ha våtm), 285 m ö h. Flygb. -87. Storomr AD.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
25 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, (tydliga), 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Sträng, (tydliga), 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Hölja, (tydliga), 25 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Element 4: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
32 ha, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 80 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 3: Topogent kärr
18 ha, fördelat på 8 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 94 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Källa, 1 % av delobjektytan.

Delobj. 4: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, väg, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Vegetation utmed mindre vattendrag, 10 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 5: Sumpskog
25 ha, fördelat på 6 ytor. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 6: Tjärn
18 ha, fördelat på 6 ytor. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Gungfly, 10 % av delobjektytan. Lösbotten.

Nr 46

17F 5B 02 (0733) KLASS 3
VÅTMARKER VID FÄNINGSÅN 8 KM N HAVERÖ KA

Våtmarkskomplex, 32 ha (30 ha våtm), 265 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Slingrande vattendrag.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
7 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Lagg, 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Mad vid vattendrag
6 ha, öppet. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, (tydliga), 80 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Mjukmatta.

Element 2: Bäck, 20 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Nr 47

17F 5B 03 (2312) KLASS 3
VÅTMARKER VID GILLÅN OCH LÅNSTERÅN 10 KM NV HAVERÖ KA

Våtmarkskomplex, 46 ha (40 ha våtm), 260 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Meandring, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Mad vid vattendrag
22 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från väg, svag generell påverkan från vattenreglering.

Element 1: Kantzon utmed å, 90 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 2: Bäck, 10 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Nr 48

17F 5C 01 (1038) KLASS 3
RISMYRAN OCH MESSUMYRAN 7 KM N HAVERÖ KA

Våtmarkskomplex, 205 ha (200 ha våtm), 330 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Sumpskog
110 ha, fördelat på 8 ytor. Svag generell påverkan från avverkning, stark lokal påverkan från dikning, väg.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Risvegetation. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Mjukmatta.

Delobj. 2: Limnogen strandsumpskog
20 ha, fördelat på 2 ytor. Stark lokal påverkan från dikning, väg, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 95 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Mjukmatta.

Element 2: Bäck, 5 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
15 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, (otydl.), glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
30 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Nr 49

17F 5D 01 (4932) KLASS 3
HAMMERMYRAN 12 KM NNO HAVERÖ KA

Våtmarkskomplex, 75 ha (64 ha våtm), 260 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Tjärn
4 ha.

Delobj. 2: Soligent kärr
5 ha, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Dråg, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 9 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Göl, 1 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 4: Topogent kärr
24 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 97 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Bäck, 3 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 5: Sumpskog
18 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Nr 50

17F 5E 01 (4833) KLASS 4
NÄSVALLSMYRAN 16 KM NO HAVERÖ KA

Våtmarkskomplex, 65 ha (60 ha våtm), 245 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Sumpskog
17 ha, fördelat på 5 ytor. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från vattenreglering.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
18 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från vattenreglering.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Vegetationsrikt vatten
17 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Stark generell påverkan från vattenreglering.

Element 1: Gungfly. Lösbotten.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
4 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 51

17F 5F 01 (4449) KLASS 2
SMÅLÅSFLON 13 KM VSV ÅNGE STN

Sluttande mosse, 36 ha (36 ha våtm), 300 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Sluttande mosse
30 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, (tydliga), 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Sträng, (tydliga), 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Hölja, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 4: Dråg, (tydliga), 15 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 5: Kantzon, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
4 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande väg. Botaniska värden.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Nr 52

17F 5I 01 (0620) KLASS 3
RÅTJÄRNFLON 9 KM S ÅNGE STN

Våtmarkskomplex, 70 ha (69 ha våtm), 340 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
10 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Kantzon, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
12 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 45 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Sträng, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
23 ha, fördelat på 5 ytor.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 3: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 5: Topogent kärr
5 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Dråg. Mjukmatta.

Delobj. 6: Tjärn
2 ha.

Element 1: Gungfly, 50 % av delobjektytan.

Nr 53

17F 5I 02 (2420) KLASS 3
STORMYRAN VID GÖRANSÅSEN 7 KM S ÅNGE STN

Våtmarkskomplex, 32 ha (32 ha våtm), 335 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
14 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Sträng, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 65 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 3: Kantzon, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Sumpskog
13 ha, fördelat på 3 ytor. Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 70 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 54

17F 5J 01 (2701) KLASS 2
HÅBÄCKSMYRORNA 7 KM S ÅNGE STN

Kärrkomplex, 48 ha (45 ha våtm), 360 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
19 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från väg, svag lokal påverkan från vintervåg.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 20 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 2: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
3 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 2: Flark, 70 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 9: Sträng, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Tjärn
4 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Gungfly, 30 % av delobjektytan.

Delobj. 4: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Kantzon, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 55

17F 6A 01 (2535) KLASS 3
VÅTMARKER VID GILLÅN 16 KM NV HAVERÖ KA

Våtmarkskomplex, 325 ha (260 ha våtm), 280 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Området har översilats.

Delobj. 1: Sumpskog
50 ha, mosaikartad fördelning. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Kantzon utmed å, 80 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Kantzon, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 3: Bäck, 5 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Strand vid vattendrag
27 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Kantzon utmed å, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Mjukmatta.

Element 2: Bäck, 10 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Sträng-flarkkärr
23 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Sträng, (tydliga), 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, (tydliga), 80 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
60 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, väg.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 5: Topogent kärr
40 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Nr 56

17F 6B 01 (0713) KLASS 2
VÅTMARKER VID LÄNSTERÅN 13 KM NV HAVERÖ KA

Våtmarkskomplex, 62 ha (57 ha våtm), 290 m ö h. Flygb. -87. Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Sumpskog
20 ha, mosaikartad fördelning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
25 ha, mosaikartad fördelning, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Strand vid vattendrag
4 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Örtdominerad vegetation. Mjukmatta.

Element 2: Bäck, 10 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
4 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Göl, 5 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Nr 57

17F 6B 02 (0325) KLASS 2
MYR V BUBERGET 12 KM NNV HAVERÖ KA

Våtmarkskomplex, 65 ha (64 ha våtm), 290 m ö h. Flygb. -87. Storomr AD.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Limnogen strandsumpskog
10 ha. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 95 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Bäck, 5 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Sumpskog
10 ha, fördelat på 3 ytor. Svag lokal påverkan från vintervåg.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
18 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Sträng, 9 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Göl, 1 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 4: Sträng-flarkkärr
5 ha, glest trädtäckt. Botaniska värden.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 80 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 5: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 58

17F 6B 03 (1046) KLASS 3
FLAKAMYRAN 12 KM N HAVERÖ KA

Våtmarkskomplex, 50 ha (48 ha våtm), 450 m ö h. Flygb. -87. Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Soligent kärr
7 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
28 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, väg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Kantzon, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
5 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 98 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Mjukmatta.

Element 2: Bäck, 2 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 4: Sumpskog
7 ha, fördelat på 2 ytor. Stark lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 98 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Bäck, 2 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Nr 59

17F 6C 01 (1319) KLASS 1
STORFLÖTTEN 12 KM N HAVERÖ KA

Myrkomplex, 250 ha (225 ha våtm), 525 m ö h. Flygb. -87. Storomr AE.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns, omitologiska värden, terrängföljande våtmark.

Delobj. 1: Strängblandmyr
20 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Sträng, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Flark, 25 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 4: Flark, 25 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 5: Flarkgöl, 20 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Obestämbar myr
110 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark generell påverkan från dikning.

Delobj. 3: Topogent kärr
28 ha, fördelat på 7 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
20 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, (otydl.), 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Sträng, (otydl.), 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 5: Topogent kärr
25 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 6: Strängblandmyr
7 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Flark, 30 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 2: Flarkgöl, 40 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Element 3: Sträng, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 60

17F 6C 02 (2005) KLASS 3
MYR V STORFLÖTTEN 12 KM N HAVERÖ KA

Myrkomplex, 70 ha (65 ha våtm), 515 m ö h. Flygb. -87. Storomr AE.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Terrängföljande våtmark.

Delobj. 1: Blandmyr av mosaiktyp
30 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag generell påverkan från anslutande hyggen, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, (otydl.), 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, (otydl.), 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
9 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
25 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet. Svag generell påverkan från anslutande hyggen, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta med ristuvor.

Nr 61

17F 6C 03 (3513) KLASS 3
MYR VID ÖRASJÖTJÄRNEN 15 KM N HAVERÖ KA

Myrkomplex, 45 ha (40 ha våtm), 470 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
18 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, (otydl.), 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Kärrfönster, (otydl.), 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mindre fläckar, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 3: Sumpskog
5 ha, fördelat på 4 ytor.

Element 1: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 75 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Bäck, 5 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Nr 62

17F 6D 01 (2935) KLASS 3
FELÅSMYRAN 15 KM NNO HAVERÖ KA

Kärrkomplex, 57 ha (54 ha våtm), 260 m ö h. Flygb. -87. Storomr AC.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från väg, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Tuva, glest trädtäckt, blandskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Dråg, (tydliga), 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Sjöstrand
7 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Mjukmatta.

Element 2: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
5 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog.

Nr 63

17F 6D 02 (3020) KLASS 3
TJÄRUSJÖTJÄRNEN 15 KM NNO HAVERÖ KA

Våtmarkskomplex, 70 ha (50 ha våtm), 255 m ö h. Flygb. -87. Storomr AC.
Det: Stefan Grundström.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Sjöstrand
28 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Gungfly, 95 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 2: Bäck, 5 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog. Risvegetation. Fastmatta med ristuvor.

Element: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
7 ha, glest trädtäckt.

Nr 64

17F 6E 01 (1333) KLASS 4
MYR VID BYBERGET 17 KM NO HAVERÖ KA

Våtmarkskomplex, 90 ha (80 ha våtm), 245 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Obestämbar myr
40 ha, glest trädtäckt. Stark generell påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning, stark lokal påverkan från väg.

Delobj. 2: Sumpskog
22 ha. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning, vattenreglering.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Vegetationsrikt vatten
14 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Stark generell påverkan från vattenreglering.

Element 1: Gungfly. Lösbotten.

Nr 65

17F 6F 01 (0303) KLASS 3
VÅTMARKER VID BOVIKARNA 17 KM V ÅNGE STN

Våtmarkskomplex, 40 ha (38 ha våtm), 245 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Sumpskog
20 ha, fördelat på 2 ytor. Svag lokal påverkan från avverkning, vinterväg.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 70 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från vattenreglering, vinterväg.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
9 ha, öppet. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 35 % av delobjektytan. Mjukmatta-lösbotten.

Nr 66

17F 6F 02 (4609) KLASS 2
BOFLON 16 KM V ÅNGE STN

Topogent kärr, 22 ha (22 ha våtm), 425 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
17 ha, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från intervåg. Botaniska värden.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Göl, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Sumpskog
5 ha. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, lövskog. Fastmatta.

Nr 67

17F 6G 01 (3742) KLASS 2
GRANMYRAN 8 KM V ÅNGE STN

Kärrkomplex, 18 ha (18 ha våtm), 220 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
6 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från intervåg.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
6 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande väg, intervåg.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Tuva, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation.

Delobj. 3: Sumpskog
5 ha, fördelat på 3 ytor. Svag lokal påverkan från intervåg. Botaniska värden.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Nr 68

17F 6G 02 (4207) KLASS 3
MYR VID TORSTJÄRNEN 11 KM V ÅNGE STN

Våtmarkskomplex, 12 ha (11 ha våtm), 270 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
3 ha, öppet. Svag lokal påverkan från intervåg.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Göl, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr
4 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 3: Sumpskog
4 ha, fördelat på 2 ytor. Svag lokal påverkan från intervåg.

Element 1: Kantzon, skogbevuxet, blandskog.

Nr 69

17F 6H 01 (4608) KLASS 3
SLÖJAN M FL 6 KM V ÅNGE

Våtmarkskomplex, 28 ha (26 ha våtm), 190 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Spänger.

Delobj. 1: Sumpskog
18 ha, fördelat på 6 ytor. Svag lokal påverkan från intervåg.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
4 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från intervåg.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mindre fläckar, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Strand vid vattendrag
3 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från intervåg.

Element 1: Kantzon utmed å, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Bäck, 10 % av delobjektytan.

Nr 70

17F 6J 01 (0338) Klass 3
SÖNNER-SJULMYRAN 8 KM SO ÅNGE STN

14 ha, 365 m ö h. Flygb -87.

Öppna fastmatttekärr, skogskärr
Intermediär Förekomst av myrstarr.
Påverkan av väg.

Källa: Fältbesökt av Per Simonsson 1979.

Nr 71

17F 6J 02 (1240) Klass 3
SJULMYRAN 7 KM SO ÅNGE STN

10 ha, 365 m ö h. Flygb -87.

Glest trädbevuxna kärr, skogskärr.
Intermediär-rik vegetation. Gräsull, enstaka blodnycklar.
Delvis kraftigt stört av diken.

Källa: Fältbesökt av Per Simonsson 1979.

Nr 72

17F 7B 01 (4545) KLASS 3
ÄLGEBERGSMYRAN 21 KM N HAVERÖ KA

Myrkomplex, 77 ha (73 ha våtm), 445 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
34 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från väg, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Göl, 5 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 79 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Bäckdråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 3: Källa, 1 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Limnogen strandsumpskog
15 ha.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 90 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Bäck, 10 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Nr 73

17F 7B 02 (4032) KLASS 3
MYR VID LÄNSTERSJÖN 21 KM N HAVERÖ KA

Myrkomplex, 110 ha (100 ha våtm), 410 m ö h. Flygb. -87.
Storomr AB.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
45 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Kärrfönster, 20 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 2: Sumpskog
25 ha, fördelat på 5 ytor.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
16 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, (tydliga), 20 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 4: Mad vid vattendrag
7 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Mjukmatta.

Element 2: Bäck, 10 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Nr 74

17F 7B 03 (2535) KLASS 3
MYR VID SKARPABBORRTJÄRN 19 KM N HAVERÖ KA

Myrkomplex, 68 ha (60 ha våtm), 420 m ö h. Flygb. -87.
Storomr AB.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
23 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, (tydliga), 30 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
16 ha, mosaikartad fördelning, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 3: Sumpskog
15 ha, mosaikartad fördelning.

Element 1: Golv, 98 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Bäck, 2 % av delobjektytan.

Nr 75

17F 7B 04 (3307) KLASS 4
STORFLON VID LÄNSTERHÖJDEN 20 KM N HAVERÖ KA

Myrkomplex, 75 ha (75 ha våtm), 520 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning.

Nr 76

17F 7B 05 (1010) KLASS 3
LÅNSTERBUFLON 18 KM N HAVERÖ KA

Myrkomplex, 35 ha (35 ha våtm), 490 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
16 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
10 ha, öppet.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Bäckdråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Vegetation utmed mindre vattendrag, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Nr 77

17F 7C 01 (2222) KLASS 2
STORMYRAN VID STAFTJÄRNARNA 19 KM N HAVERÖ KA

Myrkomplex, 120 ha (110 ha våtm), 440 m ö h. Flygb. -87.
Fält -90.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Tjärn
9 ha, fördelat på 4 ytor.

Element 1: Gungfly. Mjukmattekärr, kallgräs-vitmoss variant.

Delobj. 2: Topogent kärr
14 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 4-10 % krontäckning, barrskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vitmosstyp.

Element 1, underelem. 1: Källa, 1 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Källkärr av intermediär Warnstorfiatyp.

Element 2: Golv, 1-3 % krontäckning, barrskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
30 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, barrskog. Tallmosse av ristyp.

Element 3: Göl, 2 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Element 4: Dråg, 8 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Delobj. 4: Topogent kärr
45 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, skogsbevuxet. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, 11-25 % krontäckning, barrskog. Tallkärr av klotstarrtyp.

Element 2: Golv, 11-25 % krontäckning, barrskog. Barrblandsumpskog av ört-starrtyp.

Nr 78

17F 7C 02 (3735) KLASS 4
STORFLON 20 KM N HAVERÖ KA

Obestämbar myr, 130 ha (120 ha våtm), 500 m ö h.
Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning, anslutande väg.

Nr 79

17F 7C 03 (2505) KLASS 4
MYR VID BÄVERTJÄRNEN 18 KM N HAVERÖ KA

Myrkomplex, 36 ha (32 ha våtm), 465 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Orört. vinterväg.

Nr 80

17F 7D 01 (3743) KLASS 3
GILLERFLON 21 KM NNO HAVERÖ KA

Myrkomplex, 33 ha (33 ha våtm), 475 m ö h. Flygb. -87.
Fält -90.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Strångblandmyr
6 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Sträng, 40 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, barrskog. Tallmosse av ristyp.

Element 2: Flark, 60 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Fastmattekärr av tuvull-vitmosstyp.

Delobj. 2: Topogent kärr
10 ha, öppet.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Mjukmattekärr, kallgräs-vitmoss variant.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Tuva, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 3: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Kantzon, 11-25 % krontäckning, barrskog. Tallkärr av klotstarrtyp.

Nr 81

17F 7D 02 (3815) KLASS 3
VÅTMARKER VID FLÄRKTJÄRNEN 21 KM N HAVERÖ KA

Våtmarkskomplex, 40 ha (30 ha våtm), 310 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Slingrande vattendrag.

Delobj. 1: Mad vid vattendrag
15 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från bro, kraftledning.

Element 1: Kantzon utmed å, 90 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 2: Bäck, 10 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Kantzon utmed å, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Tjärn
8 ha.

Nr 82

17F 7E 01 (4525) KLASS 3
ÖSTERFLON 23 KM NO HAVERÖ KA

Myrkomplex, 70 ha (67 ha våtm), 520 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Obestämbar myr
16 ha, glest trädtäckt. Stark generell påverkan från dikning, svag lokal påverkan från vinterväg.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
15 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning, vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
17 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från avverkning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 83

17F 7E 02 (4722) KLASS 3
NORRMYRAN 23 KM NO HAVERÖ KA

Myrkomplex, 53 ha (46 ha våtm), 485 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
22 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från avverkning, vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 8 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Göl, 2 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Topogent kärr
18 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från avverkning, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Tjärn
7 ha. Svag lokal påverkan från dikning.

Nr 84

17F 7E 03 (4805) KLASS 3
ÖSTGÅRDSFLON 22 KM NO HAVERÖ KA

Myrkomplex, 40 ha (38 ha våtm), 520 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Flark, 20 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 2: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från avverkning, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Tjärn
3 ha. Svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Gungfly, 70 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Nr 85

17F 7E 04 (2126) KLASS 3
MYR S KÖLVALLEN 21 KM NO HAVERÖ KA

Topogent kärr, 3 ha (3 ha våtm), 475 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
3 ha, glest trädtäckt. Botaniska värden.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Kantzon, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Nr 86

17F 7F 01 (3716) KLASS 3
N RÖDMYRAN 16 KM V ÅNGE STN

Våtmarkskomplex, 15 ha (15 ha våtm), 365 m ö h. Flygb. -87.
Storomr AH.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Förekomst av tagelstarr.

Delobj. 1: Sumpskog
6 ha. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
4 ha, öppet. Botaniska värden.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 10 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
5 ha, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Källa: Besökt av Per Simonsson 1979.

Nr 87

17F 7F 02 (3020) KLASS 3
S RÖDMYRAN 16 KM V ÅNGE STN

Våtmarkskomplex, 28 ha (26 ha våtm), 365 m ö h. Flygb. -87. Storomr AH.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Limnogen strandsumpskog
4 ha. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 95 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Bäck, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Stark lokal påverkan från väg, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
10 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Tjärn
4 ha.

Element 1: Gungfly, 60 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Nr 88

17F 7G 01 (2320) KLASS 3
FLIGGMYRAN 11 KM V ÅNGE STN

Kärrkomplex, 14 ha (13 ha våtm), 290 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
8 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
4 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet. Stark lokal påverkan från anslutande väg, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Nr 89

17F 7G 02 (1126) KLASS 3
MÅNGSMYRAN 10 KM V ÅNGE STN

Kärrkomplex, 17 ha (15 ha våtm), 280 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
3 ha, fördelat på 5 ytor, skogsbevuxet.

Element 1: Kantzon, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Nr 90

17F 7H 01 (2348) KLASS 1
FÄLLÅSMYRAN 4 KM NV ÅNGE STN

Våtmarkskomplex, 60 ha (60 ha våtm), 250 m ö h. Flygb. -87. Fält -90.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården.
Botaniska värden.

Delobj. 1: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 1-3 % krontäckning, barrskog. Fastmattekärr, starr-ört-S.warnstorfii var.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
25 ha, öppet.

Element 1: Golv, 11-25 % krontäckning, barrskog. Tallkärr av brunmossrik typ.

Element 2: Golv, 11-25 % krontäckning, barrskog. Tallkärr av intermediär vitmosstyp.

Delobj. 3: Sumpskog
12 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Golv, > 25 % krontäckning, barrskog. Tallkärr av brunmossrik typ.

Nr 91

17F 7I 01 (3314) KLASS 2
KLIMPMYRAN 4 KM N ÅNGE STN

Våtmarkskomplex, 18 ha (18 ha våtm), 270 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
5 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Göl, 10 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Topogent kärr
6 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från interväg.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
7 ha. Svag lokal påverkan från interväg. Botaniska värden.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Nr 92

17F 7I 02 (3738) KLASS 2
BYNÄSMYRAN 4,5 KM NNO ÅNGE STN

Våtmarkskomplex, 45 ha (38 ha våtm), 170 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården.

Delobj. 1: Topogent kärr
6 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från interväg.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Sumpskog
23 ha, fördelat på 3 ytor. Svag lokal påverkan från interväg. Botaniska värden.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 3: Sumpskog
5 ha. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, lövskog.

Nr 93

17F 7I 03 (4628) KLASS 2
BOLTJÄRNMYRAN 5 KM N ÅNGE STN

Våtmarkskomplex, 24 ha (24 ha våtm), 190 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården.

Delobj. 1: Topogent kärr
15 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning, anslutande väg, interväg. Botaniska värden.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 2: Sumpskog
7 ha, fördelat på 5 ytor. Svag lokal påverkan från kraftledning, anslutande väg, interväg.

Element 1: Kantzon, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Nr 94

17F 7I 04 (3500) Klass 3
TJÄRNMYRAN 4 KM NV ÅNGE STN

40 ha, 260 m ö h. Flygb -87.

Sumpskog. strandskog, skogskärr.
Högörtvegetation, intermediärt-rikt.
Delvis stört av vägar och diken.

Källa: Besökt av Stefan Grundström 1990 (hastigt i ena kanten).

Nr 95

17F 7I 05 (2046) KLASS 3
MYR O FLASKBERGET 3 KM NO ÅNGE STN

Våtmarkskomplex, 20 ha (20 ha våtm), 145 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården.

Delobj. 1: Topogent kärr
10 ha, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 2: Sumpskog
10 ha, fördelat på 3 ytor. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande väg, interväg.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 70 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 96

17F 7J 01 (3327) KLASS 3
BREDMYRAN 7 KM NO ÅNGE STN

Våtmarkskomplex, 28 ha (28 ha våtm), 160 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården. Förekomst av huvudstarr.

Delobj. 1: Sumpskog
18 ha, fördelat på 2 ytor. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från interväg.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.
Källa: Medelpads flora.
Nr 97

17F 7J 02 (3711) KLASS 3
RISMYRAN 6 KM NO ÅNGE STN

Våtmarkskomplex, 18 ha (16 ha våtm), 175 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården.

Delobj. 1: Topogent kärr
7 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 2: Sumpskog
9 ha. Svag lokal påverkan från avverkning, interväg.

Element 1: Kantzon, skogbevuxet, barrskog.

Nr 98

17F 7J 03 (4819) KLASS 2
GRANBODAMYRAN 7 KM NO ÅNGE STN

Våtmarkskomplex, 8 ha (8 ha våtm), 200 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården.

Delobj. 1: Topogent kärr
5 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen. Botaniska värden.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 2: Sumpskog
2 ha. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog.

Nr 99

17F 8A 01 (2544) KLASS 3
MYR VID BLEKSJÖN 25 KM N HAVERÖ KA

Myrkomplex, 145 ha (80 ha våtm), 405 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Sluttande mosse
30 ha, fördelat på 8 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, (tydliga), 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Soligent kärr
15 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Strand vid vattendrag
18 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, väg.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 35 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Mjukmatta.

Element 2: Vegetation utmed sjöstrand, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Bäck, 5 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 4: Sumpskog
14 ha, fördelat på 2 ytor. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 45 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Bäck, 5 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Element 3: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Nr 100

17F 8B 01 (1515) KLASS 2
FLARKMYRAN VID STUGUSJÖN 24 KM N HAVERÖ KA

Våtmarkskomplex, 100 ha (93 ha våtm), 405 m ö h.
Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Svagt lokalt påverkat av dikning, väg. Sjö ansluter till högst 24%.

Element: Kantzon, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 1: Excentrisk mosse
13 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, (otydl.), 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Hölja, (otydl.), 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning, väg.

Element 1: Golv, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
30 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, väg.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 4: Mad vid vattendrag
35 ha, öppet.

Element 1: Kantzon utmed å, 80 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 2: Bäck, 20 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 5: Sluttande mosse
6 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Nr 101

17F 8B 02 (2440) KLASS 2
OCKSJÖFLON 24 KM N HAVERÖ KA

Myrkomplex, 63 ha (63 ha våtm), 415 m ö h. Flygb. -87.
Storomr AJ.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
16 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Sträng, (tydliga), 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Flark, 40 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 4: Flarkgöl, 5 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Topogent kärr 11 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Strång, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
18 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Kantzon, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
12 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Nr 102

17F 8B 03 (1549) KLASS 2
VÅTMARKER VID STORTJÄRNEN 23 KM N HAVERÖ KA

Våtmarkskomplex, 108 ha (100 ha våtm), 405 m ö h. Flygb. -87. Fält -90. Storomr AJ.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
27 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Tallmosse av ristyp.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Soligent kärr
27 ha, mosaikartad fördelning, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 88 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Element 2: Flark, 9 % av delobjektytan, öppet. Lösbottenkärr av oligotrof typ.

Element 3: Källa, 1 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Element 4: Strång, 5 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vitmosstyp.

Delobj. 3: Strand vid vattendrag
7 ha, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 40 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Tallkärr.

Element 2: Bäck, 20 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Element 3: Vegetation utmed mindre vattendrag, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog. Mjukmatta.

Element 4: Gungfly, 5 % av delobjektytan. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Delobj. 4: Sumpskog
23 ha, mosaikartad fördelning. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, > 25 % krontäckning, barrskog. Sumpgranskog av örtstarrtyp.

Nr 103

17F 8D 01 (0440) KLASS 3
JAMTMYRORNA 22 KM N HAVERÖ KA

Myrkomplex, 42 ha (41 ha våtm), 460 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
25 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, väg, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Göl, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
9 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 9 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Göl, 1 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Topogent kärr
8 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från vinterväg. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, öppet. Mjukmatta.

Nr 104

17F 8D 02 (0032) KLASS 4
MYR V JAMTMYRAN 22 KM N HAVERÖ KA

Topogent kärr, 6 ha (6 ha våtm), 450 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Strång-flarkkärr
6 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Strång, (tydliga), 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, (tydliga), 50 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 3: Kantzon, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Nr 105

17F 8E 01 (2010) KLASS 3
FLASKFLON 25 KM NNO HAVERÖ KA

Våtmarkskomplex, 88 ha (81 ha våtm), 400 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Soligent kärr
7 ha, glest trädtäckt. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 2: Sumpskog
17 ha, fördelat på 3 ytor. Stark lokal påverkan från avverkning.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Bäck, 5 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Limnogen strandsumpskog
9 ha. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Element 3: Bäck, 5 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 4: Obestämbar myr
17 ha, glest trädtäckt. Stark generell påverkan från dikning, stark lokal påverkan från väg.

Delobj. 5: Tjärn
11 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Gungfly, 30 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 6: Topogent kärr
12 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 7: Mosse av nordlig typ
5 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Nr 106

17F 8E 02 (1628) Klass 3
MYR VID NÄBBTJÄRNEN 22 KM NV ÅNGE STN

4 ha, 385 m ö h. Flygb -87.

Öppet kärr, blandmyr, tjärn.
Intermediär vegetation.
Påverkan från väg.

Källa: Fältbesökt av Per Simonsson 1979.

Nr 107

17F 8F 01 (1216) Klass 3
MYR VID MEJERSTJÄRNEN 17 KM NV ÅNGE STN

30 ha, 325 m ö h. Flygb -87.

Strängflarkkärr, öppet kärr, tallmosse, skogskärr, tjärn. Intermediär vegetation. Förekomst av gräsull, kärrull och björnbrodd. Naturskogsområde.

Källa: Fältbesökt av Per Simonsson 1979.

Nr 108

17F 8F 02 (2043) Klass 3
OXMYRAN 15 KM NV ÅNGE STN

18 ha, 405 m ö h. Flygb -87.

Öppet kärr, skogskärr, blandmyr.
Intermediär vegetation. Förekomst av kärrull, björnbrodd.
Naturskogsområde

Källa: Fältbesökt av Per Simonsson 1979.

Nr 109

17F 8H 01 (2727) KLASS 3
MYR VID BLECKTJÄRNEN 9 KM NV ÅNGE STN

Våtmarkskomplex, 19 ha (18 ha våtm), 325 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
8 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Sumpskog
8 ha, fördelat på 3 ytor. Svag lokal påverkan från avverkning, vinterväg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 3: Tjärn
3 ha.

Element 1: Gungfly, 40 % av delobjektytan, öppet.

Nr 110

17F 8H 02 (3120) KLASS 3
LÅNGMARKSMYRAN 10 KM NV ÅNGE STN

Våtmarkskomplex, 11 ha (11 ha våtm), 330 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
8 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande väg, vinterväg.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Sumpskog
3 ha. Svag lokal påverkan från avverkning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, lövskog.

Nr 111

17F 8H 03 (3413) KLASS 3
MYR VID LILLTJÄRNSBÄCKEN 11 KM NV ÅNGE ST

Kärrkomplex, 8 ha (8 ha våtm), 325 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
4 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
4 ha, öppet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 2: Dråg, 40 % av delobjektytan. Lösbotten.

Nr 112

17F 8H 04 (2142) Klass 3
MYR VID KULLENS FÄBOD 8 KM N ÅNGE STN

0,1 ha, 305 m ö h. Flygb -83.

Källkärr med källdunört, trådblad och brudsporre.

Källa: Fältbesökt av Per Simonsson.

Nr 113

17F 8I 01 (1023) KLASS 1
HALSTA OCH STORMYRAN 6 KM N ÅNGE STN

Våtmarkskomplex, 92 ha (90 ha våtm), 205 m ö h. Flygb. -87.
Fält -90.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården.

Delobj. 1: Topogent kärr
26 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning, vinterväg.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Fastmattekärr, starr-ört-S.warnstorfii var.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 2: Limnogen strandsumpskog
10 ha. Svag lokal påverkan från kraftledning. Botaniska värden, slingrande vattendrag, spänger.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 70 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, blandskog. Granbjörkkärr.

Element 2: Kantzon utmed å, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog.

Element 3: Bäck, 10 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Topogent kärr
35 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från kraftledning, stark lokal påverkan från väg, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, barrskog. Tallkärr av brunmossrik typ.

Element 2: Tuva, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Sumpskog
17 ha. Stark lokal påverkan från väg, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, > 25 % krontäckning, barrskog. Sumpgranskog av ört-starrtyp.

Nr 114

17F 8I 02 (1540) KLASS 1
LOMBÄCK OCH STORMYRAN 7 KM N ÅNGE STN

Våtmarkskomplex, 83 ha (78 ha våtm), 200 m ö h. Flygb. -87.
Fält -90.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården.

Delobj. 1: Topogent kärr
24 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Fastmattekärr av starr-ört-brunmosstyp.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 3: Tuva, 10 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Delobj. 2: Sumpskog
35 ha, fördelat på 5 ytor. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning, vinterväg. Botaniska värden.

Element 1: Golv, 11-25 % krontäckning, barrskog. Tallkärr av intermediär vitmosstyp.

Element 2: Golv, > 25 % krontäckning, barrskog. Sumptallskog av ristyp.

Delobj. 3: Limnogen strandsumpskog
8 ha. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Kantzon utmed å, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 45 % av delobjektytan, > 25 % krontäckning, blandskog. Sumpblandskog av örttyp.

Element 3: Bäck, 10 % av delobjektytan.

Nr 115

17F 8I 03 (3120) Klass 3

MYR N TALLÅSBERGET 8 KM N ÅNGE STN

10 ha, 230 m ö h. Flygb -87.

Skogskärr, sumpskog, bäck.
Rikkärr med brudsporre, tvåblad och sumpnycklar.
Påverkan från avverkning, kraftledning och skogsbilväg.

Källa: Florainventerat 1975, Rolf Lidberg.

Nr 116

17F 8J 01 (0109) KLASS 2
VAMMEN 7 KM NO ÅNGE STN

Våtmarkskomplex, 38 ha (35 ha våtm), 200 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården.

Delobj. 1: Tjärn
4 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Gungfly, 50 % av delobjektytan. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 2: Sumpskog
15 ha, fördelat på 3 ytor. Svag lokal påverkan från anslutande väg, vinterväg.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog.

Element 2: Golv, 55 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 4: Topogent kärr
6 ha, öppet.

Element 1: Bäckdråg, 75 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 2: Kantzon, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Nr 117

17F 8J 02 (1025) KLASS 1
HALMMYRAN 8 KM NO ÅNGE STN

Våtmarkskomplex, 30 ha (30 ha våtm), 250 m ö h. Flygb. -87. Fält -90.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården. Litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Topogent kärr
7 ha, öppet.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, barrskog. Tallkärr av brunmossnik typ.

Element 1, underelem. 1: Tuva, 5 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Element 3: Flark, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 2: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 3: Sumpskog
15 ha, fördelat på 3 ytor. Botaniska värden.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, > 25 % krontäckning, barrskog. Tallkärr av brunmossnik typ.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 118

17F 8J 04 (1045) KLASS 3
Ö HUSMYRAN 10 KM NO ÅNGE STN

Våtmarkskomplex, 11 ha (11 ha våtm), 275 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården.

Delobj. 1: Topogent kärr
6 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 2: Sumpskog
5 ha, fördelat på 3 ytor. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Kantzon, skogbevuxet, barrskog.

Nr 119

17F 9H 01 (0531) KLASS 2
STORMYRAN VID LÅNGMARKBERGET 12 KM NNV ÅNGE

Myrkomplex, 15 ha (15 ha våtm), 495 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
10 ha, öppet. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
5 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, vinterväg.

Element 1: Kantzon, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Nr 120

17F 9H 02 (0237) KLASS 3
VÅTMARKER VID FLIGGET 11 KM NNV ÅNGE STN

Våtmarkskomplex, 17 ha (17 ha våtm), 470 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Sumpskog
11 ha, fördelat på 5 ytor.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
5 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Fastmatta.

Nr 121

17F 9H 03 (1040) KLASS 3
HANS OCH PERSFLIGGEMYRAN 12 KM NNV ÅNGE STN

Myrkomplex, 18 ha (18 ha våtm), 485 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
9 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, vinterväg.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Bäckdråg, 20 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Soligent kärr
4 ha, glest trädtäckt. Svag generell påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
4 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog.

Nr 122

17F 9I 02 (3248) KLASS 2
GUBBY OCH STORMYRAN 14 KM N ÅNGE STN

Myrkomplex, 20 ha (20 ha våtm), 420 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
14 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, kraftledning. Botaniska värden.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 2: Kantzon, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Fastmatta.

Element 3: Bäckdråg, 20 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
5 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Tuva, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 123

17F 9J 01 (3132) KLASS 1
BYSÄTTERMYRAN 15 KM NNO ÅNGE STN

Våtmarkskomplex, 44 ha (43 ha våtm), 310 m ö h. Flygb. -87. Fält -90.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
8 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 20 % av delobjektytan. Mjukmattekärr, starr-Scorp. scorpioides-var.

Element 2: Golv, 80 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Delobj. 2: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, 11-25 % krontäckning, barrskog. Tallmosse av tuvulltyp.

Element 2: Golv, 4-10 % krontäckning, barrskog. Tallkärr av brunmossrik typ.

Delobj. 3: Limnogen strandsumpskog
10 ha. Svag lokal påverkan från väg. Botaniska värden.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 50 % av delobjektytan, > 25 % krontäckning, blandskog. Sumpblandskog av örttyp.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, (tydliga), 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Bäck, 10 % av delobjektytan.

Nr 124

17F 9J 02 (1212) KLASS 3
KORPMYRAN 12 KM NNO ÅNGE STN

Kärrkomplex, 26 ha (26 ha våtm), 340 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
6 ha, öppet.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
18 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 125

17F 9J 03 (0202) KLASS 4
GRÄSMYRAN 11 KM N ÅNGE STN

Obestämbar myr, 42 ha (42 ha våtm), 320 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning, kraftledning.

Nr 126

17F 9J 04 (0002) KLASS 3
MYR N GRÄSMYRAN 12 KM N ÅNGE STN

Topogent kärr, 8 ha (8 ha våtm), 330 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
2 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
6 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning, vintervåg.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Nr 127

17G 0E 01 (4607) KLASS 3
KALVMYRAN OCH BJÖRNMYRAN 11 KM O NAGGEN

Myrkomplex, 52 ha (50 ha våtm), 465 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
8 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
17 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Flarkgöl, 5 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Topogent kärr
18 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande väg. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Flark, 10 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 4: Sumpskog
5 ha.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, skogbevuxet, blandskog.

Nr 128

17G 0E 02 (4414) KLASS 2
LEKMYRAN 12 KM O NAGGEN

Myrkomplex, 90 ha (82 ha våtm), 480 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
24 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 4: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
14 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 3: Kantzon, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Soligent kärr
22 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 3: Bäckdråg, 10 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 4: Sumpskog
14 ha, mosaikartad fördelning.

Element 1: Mindre fläckar, skogbevuxet, blandskog.

Nr 129

17G 0E 03 (3302) KLASS 3
MYRAR VID NOTTJÄRNEN 11 KM OSO NAGGEN

Våtmarkskomplex, 95 ha (75 ha våtm), 440 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Bäckdråg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Tuva, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
9 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 4: Göl, 10 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Sumpskog
18 ha, fördelat på 5 ytor.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 35 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 4: Topogent kärr
22 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Tjärn
11 ha.

Nr 130

17G 1C 01 (4015) KLASS 1
STORMYRAN S HÅNGSTAÖRN 2 KM NNO NAGGEN

Kärrkomplex, 205 ha (200 ha våtm), 385 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Ornitologiska värden, torvkoncessionsansökan finns.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
18 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från väg, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
30 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, vinterväg.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
35 ha, fördelat på 7 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från väg, svag lokal påverkan från vattenreglering.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Kantzon, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från vattenreglering.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 5: Sträng-flarkkärr
30 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från vattenreglering. Botaniska värden.

Element 1: Flark, 80 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 2: Sträng, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 6: Sträng-flarkkärr
30 ha, fördelat på 8 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från avverkning.

Element 1: Flark, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 2: Sträng, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Tuva, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Delobj. 7: Strand vid vattendrag
17 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från väg, vinterväg.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Bäck, 5 % av delobjektytan.

Nr 131

17G 1C 02 (1646) KLASS 4
SUNDSMYRAN OCH LOMSJÖMYRAN 5 KM O NAGGEN

Kärrkomplex, 52 ha (50 ha våtm), 380 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Starkt lokalt påverkat av dikning.

Nr 132

17G 1D 01 (2427) KLASS 3
MYR VID KVARNTJÄRNARNA 8 KM O NAGGEN

Myrkomplex, 47 ha (45 ha våtm), 410 m ö h. Flygb. -87.
Storomr AM.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
15 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 3: Göl, 5 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Topogent kärr
20 ha, mosaikartad fördelning, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mindre fläckar, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
8 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Dråg, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Nr 133

17G 1D 02 (1536) KLASS 2
PORSOMYRAN 9 KM Ö NAGGEN

Myrkomplex, 65 ha (63 ha våtm), 400 m ö h. Flygb. -87. Storomr AM.
Det: Stefan Grundström.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
9 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Hölja, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
5 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Flarkgöl, 10 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Topogent kärr
25 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
10 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Kantzon utmed å, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 5: Topogent kärr
11 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 2: Kantzon, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Tuva, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Nr 134

17G 1D 03 (0732) KLASS 2
MYR S ÖVER OCH STENSJÖN 9 KM Ö NAGGEN

Myrkomplex, 135 ha (125 ha våtm), 400 m ö h. Flygb. -87. Fält -90. Storomr AM.
Det: Stefan Grundström.
Moränrygg i anslutning, sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Topogent kärr
38 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande väg. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 3: Tuva, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
37 ha, fördelat på 8 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 4-10 % krontäckning, barrskog. Tallkärr av intermediär vitmosstyp.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
12 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 1, underelem. 1: Hölja, 5 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Fastmattemosse av tuvull-S. balticumtyp.

Delobj. 4: Sumpskog
17 ha, fördelat på 6 ytor.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, > 25 % krontäckning, barrskog. Sumpgranskog av ristyp.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 20 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, barrskog. Granbjörkkärr av fattig vitmosstyp.

Delobj. 5: Strand vid vattendrag
10 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Gungfly, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Öppet sumpkärr.

Element 2: Bäck, 5 % av delobjektytan.

Element 3: Gungfly, 50 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Element 2: Gungfly, 25 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av intermediär typ.

Element 3: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Nr 135

17G 1D 04 (3601) KLASS 4
VIKÖRSMYRAN 6 KM ONO NAGGEN

Myrkomplex, 65 ha (55 ha våtm), 380 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Generellt påverkat av anslutande hyggen, dikning, vattenreglering.

Nr 136

17G 1D 05 (3820) KLASS 3
MYRAR VID RÄVÅSBÄCKEN 8 KM O NAGGEN

Myrkomplex, 74 ha (68 ha våtm), 380 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Limnogen strandsumpskog
12 ha. Svag lokal påverkan från dikning, väg. Området har slåtterhävdats.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 90 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Bäck, 10 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
12 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
30 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen,. stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 137

17G 1E 01 (1820) KLASS 3
KOSOMYRAN OCH LÄMPTJÄRNEN 12 KM Ö NAGGEN

Myrkomplex, 140 ha (118 ha våtm), 410 m ö h. Flygb. -87. Storomr AM.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
15 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 2: Tjärn
12 ha, fördelat på 4 ytor.

Element 1: Gungfly, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Delobj. 3: Soligent kärr
12 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 38 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Källa, 2 % av delobjektytan.

Delobj. 4: Topogent kärr
12 ha, öppet. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 5: Strand vid vattendrag
10 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 30 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Vegetation utmed mindre vattendrag, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Mjukmatta.

Delobj. 6: Topogent kärr
37 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 7: Blandmyr av mosaiktyp
13 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Nr 138

17G 1E 02 (0233) KLASS 1
STORMYRAN 2 KM S STORULVSJÖN

Myrkomplex, 90 ha (85 ha våtm), 430 m ö h. Flygb. -87. Storomr A0.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i myrskyddsplan för Sverige, riksintresse för naturvården. Naturskog i eller i anslutning, våtmarken är en sänkt sjö, sluttar i terrasser.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
10 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 60 % av delobjektytan. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Flarkgöl, 20 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
12 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 60 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 3: Flarkgöl, 10 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
6 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
25 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 5: Mosse av nordlig typ
17 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 3: Hölja, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 6: Topogent kärr
17 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 7: Tjärn
1 ha. Svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Gungfly.

Nr 139

17G 1E 03 (0440) KLASS 2
MYR S STORULVSJÖTJÄRNEN

Myrkomplex, 76 ha (63 ha våtm), 415 m ö h. Flygb. -87. Storomr A0. Det: Stefan Grundström. Riksintresse för naturvården. Naturreservat. Naturskog i eller i anslutning.

Delobj. 1: Sumpskog
8 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 2: Sollgent kärr
20 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 28 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Källa, 2 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
7 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
16 ha, mosaikartad fördelning, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Mad vid vattendrag
5 ha, öppet.

Element 1: Kantzon utmed å, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Lösbotten.

Element 2: Bäck, 20 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Nr 140

17G 1E 04 (4903) KLASS 2
ABBORRTJÄRNEN, FLATTJÄRNEN MFL 11 KM O NAGGEN

Myrkomplex, 325 ha (245 ha våtm), 410 m ö h. Flygb. -87. Det: Stefan Grundström. Ingår i naturvårdsplan. Dödislandskap, isälvsbildning i anslutning.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
12 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
30 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Sträng, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
95 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande väg.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 5: Topogent kärr
30 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Mjukmatta.

Element 3: Vegetation utmed mindre vattendrag, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 6: Tjärn
25 ha, fördelat på 4 ytor.

Element 1: Gungfly, 30 % av delobjektytan.

Delobj. 7: Strand vid vattendrag
10 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 35 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Mjukmatta.

Element 3: Bäck, 5 % av delobjektytan.

Nr 141

17G 2A 01 (3818) KLASS 3
LORTAMYRAN 10 KM NV NAGGEN

Våtmarkskomplex, 135 ha (105 ha våtm), 400 m ö h.
Flygb. -87. Storomr AK.
Det: Stefan Grundström.
Nedlagda odlingar i våtmarken, våtmarken är en sänkt sjö.

Delobj. 1: Bevuxen sjö
8 ha, öppet. Svag generell påverkan från vattenreglering.

Element 1: Öar.

Delobj. 2: Topogent kärr
45 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, väg.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
20 ha, fördelat på 2 ytor. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 4: Strand vid vattendrag
6 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vattenreglering.

Element 1: Kantzon utmed å, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 2: Kantzon utmed å, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Bäck, 10 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 5: Mosse av nordlig typ
8 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, (tydliga), 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Lagg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 6: Topogent kärr
11 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Nr 142

17G 2A 02 (2347) KLASS 2
ÖRSMYRORNA 7 KM NV NAGGEN

Myrkomplex, 240 ha (220 ha våtm), 400 m ö h. Flygb. -87.
Storomr AK.
Det: Stefan Grundström.
Slingrande vattendrag.

Delobj. 1: Mad vid vattendrag
15 ha, öppet.

Element 1: Bäck, 20 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Element 2: Kantzon utmed å, 80 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 2: Topogent kärr
35 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
44 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, vinterväg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Sträng-flarkkärr
10 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Flark, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Lösbotten.

Element 2: Sträng, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 5: Mosse av nordlig typ
25 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 6: Sumpskog
14 ha. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Mindre fläckar, 70 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 7: Obestämbar myr
60 ha, glest trädtäckt. Stark generell påverkan från dikning, stark lokal påverkan från väg.

Nr 143

17G 2B 01 (0425) KLASS 3
GUMSTJÄRNEN OCH RÖJMYRAN 4 KM NV NAGGEN

Myrkomplex, 72 ha (66 ha våtm), 420 m ö h. Flygb. -87. Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Bäckdråg, 10 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 2: Topogent kärr
23 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Mjukmatta.

Element 2: Kantzon, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
13 ha, fördelat på 4 ytor. Svag lokal påverkan från anslutande väg, vinterväg.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Kantzon vid tjärn, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
5 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 5: Tjärn
3 ha.

Nr 144

17G 2C 01 (2245) KLASS 1
RÖJTJÄRNSMYRAN M FL 6 OCH 9 KM NO NAGGEN

Våtmarkskomplex, 540 ha (480 ha våtm), 385 m ö h. Flygb. -87. Storomr AL. Det: Stefan Grundström. Riksintresse för naturvården. Ornitologiska värden, våtmarken är en sänkt sjö, slingrande vattendrag.

Delobj. 1: Bevuxen sjö
60 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 2: Kantzon, 20 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Tjärn
15 ha, fördelat på 3 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
80 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, (tydliga), 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, (tydliga), 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Hölja, (tydliga), 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 4: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 5: Lagg, (tydliga), 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
110 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från väg, vinterväg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Mjukmatta.

Delobj. 5: Sumpskog
65 ha, fördelat på 9 eller fler ytor. Svag lokal påverkan från avverkning, dikning, vinterväg.

Element 1: Kantzon utmed å, (tydliga), 35 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 6: Topogent kärr
35 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning. Botaniska värden, diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 7: Topogent kärr
45 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 3: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 8: Obestämbar myr
15 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.

Delobj. 9: Blandmyr av mosaiktyp
50 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Tuva, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Nr 145

17G 2C 02 (1042) KLASS 3
BASTUBACKSMYRAN 6 KM NO NAGGEN

Myrkomplex, 35 ha (35 ha våtm), 380 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Sluttande mosse
18 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, (tydliga), 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Hölja, (tydliga), 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 3: Lagg, (tydliga), 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
8 ha, öppet.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Gungfly, 30 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 3: Topogent kärr
6 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 146

17G 2D 01 (4914) KLASS 3
RYTEHO 10 KM NO NAGGEN

Myrkomplex, 160 ha (155 ha våtm), 385 m ö h. Flygb. -87.
Storomr AL.
Det: Stefan Grundström.
Sjö ansluter till högst 24%, torvkoncessionsansökan finns.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
35 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning, vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 3: Sträng, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från vinterväg. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Bäckdråg, 15 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 3: Topogent kärr
50 ha, skogsbevuxet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från vinterväg. Nedlagda odlingar i våtmarken.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
10 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Topogent kärr
6 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, blandskog. Mjukmatta.

Delobj. 6: Sumpskog
30 ha, fördelat på 3 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 3: Kantzon utmed å, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Mjukmatta.

Nr 147

17G 2E 01 (4507) KLASS 2
S JÄRVTJÄRNMYRAN 13 KM NO NAGGEN

Myrkomplex, 85 ha (80 ha våtm), 375 m ö h. Flygb. -87.
Storomr AN.
Det: Stefan Grundström.
Litteratur om objektet finns, torvkoncessionsansökan finns.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
17 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Lagg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 2: Sumpskog
20 ha, fördelat på 5 ytor. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Tjärn
4 ha.

Element 1: Gungfly, 20 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 4: Topogent kärr
22 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 5: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 5 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Nr 148

17G 2E 02 (0627) KLASS 4
MYRAR VID VATTUTJÄRNARNA 14 KM ONO NAGGEN

Myrkomplex, 62 ha (60 ha våtm), 420 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Mycket starkt generellt påverkat av avverkning, dikning. Åsrygg i anslutning, tillstånd för torvtäkt har givits.

Nr 149

17G 2E 03 (4141) klass 3
SVENSKMYRAN 17 KM NO NAGGEN

30 ha, 375 m ö h. Flygbild -87.

Öppet kärr, skogskärr, strandskog.
Intermediär-rik vegetation. Förekomst av myggblomster och ängsnycklar.
Påverkan från vägar, diken och avverkningar.

Källa: Florainventerat av Rolf Lidberg m fl, 1975.

Nr 150

17G 2F 01 (0434) KLASS 2
STORMYRAN VID SAXEN 17 KM SV STÖDE KA

Myrkomplex, 80 ha (76 ha våtm), 410 m ö h. Flygb. -88.
Det: Stefan Grundström.
Nedlagda odlingar i våtmarken, tillstånd för torvtäkt har givits.

Delobj. 1: Topogent kärr
25 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
8 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse
6 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 3: Lagg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
18 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Mosseplan, 55 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Tuva, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 5: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 6: Obestämbart kärr
3 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Stark generell påverkan från dikning.

Delobj. 7: Tjärn
2 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Gungfly, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Lösbotten.

Nr 151

17G 2F 02 (0711) KLASS 3
BRÄNNMYRAN M FL 18 KM SV STÖDE KA

Kärrkomplex, 115 ha (110 ha våtm), 420 m ö h. Flygb. -88.
Det: Stefan Grundström.
Dödislandskap.

Delobj. 1: Topogent kärr
30 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning, väg.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
48 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
12 ha, fördelat på 6 ytor.

Element 1: Mindre fläckar, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Strand vid vattendrag
10 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Kantzon utmed å, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 2: Bäck, 10 % av delobjektytan.

Nr 152

17G 2G 01 (4206) KLASS 3
STORMY OCH MICKELSMYRAN 13 KM SV STÖDE KA

Våtmarkskomplex, 140 ha (125 ha våtm), 280 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
14 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
35 ha, mosaikartad fördelning, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
45 ha, fördelat på 4 ytor. Stark lokal påverkan från avverkning, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
8 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 5: Obestämbar myr
12 ha, glest trädtäckt. Stark generell påverkan från dikning.

Nr 153

17G 3A 01 (3445) KLASS 1
GÄLLSJÖMYRORNA M FL 12 KM NNV NAGGEN

Våtmarkskomplex, 300 ha (250 ha våtm), 375 m ö h. Flygb. -87. Fält -90.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
65 ha, fördelat på 6 ytor, öppet. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 18 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Mjukmattekärr, starr-S. papillosum var.

Element 2: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Lösbottenkärr av intermediär typ.

Element 3: Golv, 1-3 % krontäckning, barrskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vitmosstyp.

Element 4: Göl, 2 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Topogent kärr
85 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från avverkning, svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, barrskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vitmosstyp.

Element 2: Dråg, 8 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 3: Göl, 2 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Sumpskog
30 ha, fördelat på 5 ytor.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, > 25 % krontäckning, barrskog. Sumptallskog av ristyp.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, barrskog. Tallkärr av klotstarrtyp.

Element 3: Mosseplan, 11-25 % krontäckning, barrskog. Tallmosse av ristyp.

Element 4: Vegetation utmed mindre vattendrag, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 4: Mad vid vattendrag
25 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Slingrande vattendrag.

Element 1: Kantzon utmed å, 90 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, blandskog. Öppet sumpkärr.

Element 2: Bäck, 10 % av delobjektytan.

Delobj. 5: Sträng-flarkkärr
15 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Flark, 60 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av intermediär typ.

Element 2: Sträng, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Flarkgöl, 10 % av delobjektytan.

Delobj. 6: Tjärn
19 ha, fördelat på 4 ytor.

Nr 154

17G 3C 01 (0147) KLASS 3
RATELAKS 9 KM NO NAGGEN

Kärrkomplex, 50 ha (50 ha våtm), 385 m ö h. Flygb. -87. Storomr AL.
Det: Stefan Grundström.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
18 ha, öppet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Gungfly, 10 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 2: Topogent kärr
18 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Mjukmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
12 ha, fördelat på 4 ytor. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Mindre fläckar, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Nr 155

17G 3D 01 (0848) KLASS 1
N JÄRVTJÄRNMYRAN 13 KM NO NAGGEN

Våtmarkskomplex, 145 ha (130 ha våtm), 370 m ö h.
Flygb. -87. Storomr AN.
Det: Stefan Grundström.
Litteratur om objektet finns, torvkoncessionsansökan finns.

Delobj. 1: Topogent kärr
35 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Kantzon, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Sumpskog
55 ha, fördelat på 7 ytor. Svag lokal påverkan från vinterväg. Botaniska värden.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 5 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 3: Tuva, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Delobj. 4: Topogent kärr
17 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Gungfly, 80 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 20 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 5: Tjärn
5 ha, fördelat på 3 ytor.

Nr 156

17G 3E 01 (2727) Klass 3
LÖVÅSMYRAN 17 KM NO NAGGEN

27 ha, 330 m ö h. Flygb. -88.

Öppet kärr, skogskärr, blandmyr, sumpskog, bäck, källa. Förekomst av källdunört och gräsull.

Källa: Florainventerat 1975, Rolf Lidberg m fl.

Nr 157

17G 4A 01 (0424) KLASS 3
MYRAR SV TRÖGTJÄRNEN 15 KM NV NAGGEN

Våtmarkskomplex, 160 ha (135 ha våtm), 375 m ö h.
Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
25 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från vinterväg. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Göl, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr
50 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, väg.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Limnogen strandsumpskog
20 ha. Svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Mjukmatta.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
15 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Golv, 55 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 5: Tjärn
4 ha. Svag generell påverkan från dikning.

Nr 158

17G 4C 01 (0142) KLASS 2
VIMYRORNA 14 KM NNO NAGGEN

Kärrkomplex, 140 ha (125 ha våtm), 350 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Litteratur om objektet finns, torvkoncessionsansökan finns.

Delobj. 1: Topogent kärr
60 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, vinterväg.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Tuva, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Strand vid vattendrag
5 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Kantzon utmed å, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Mjukmatta.

Element 2: Bäck, 10 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Topogent kärr
35 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, vinterväg.

Element 1: Kantzon, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 4: Sumpskog
18 ha, fördelat på 4 ytor. Svag lokal påverkan från dikning. Botaniska värden.

Element 1: Kantzon utmed å, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 159

17G 4C 02 (2633) Klass 3
MYR VID ALDERÄNGSÅN 15 KM N NAGGEN

115 ha, 310 m ö h. Flygb -88

Skogskärr, strandkärr.
Förekomst av gräsull och fjällskäva.

Källa: Florainventerat av Rolf Lidberg m fl 1975.

Nr 160

17G 7E 01 (2043) KLASS 2
BYGGMYRAN 8 KM NO TORP KA

Våtmarkskomplex, 47 ha (46 ha våtm), 245 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Sumpskog
10 ha, fördelat på 2 ytor. Svag lokal påverkan från dikning, stark lokal påverkan från anslutande väg, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
16 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, vinterväg.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Göl, 10 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Topogent kärr
14 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Nr 161

17G 8A 01 (0401) Klass 3
MYR 2 KM S NEDERTJÄRN 6 KM NV BORGSJÖ K:A

2,5 ha, 200 m ö h. Flygb -88.

Trädbevuxet rikkärr med gräsull, brudsporre, tvåblad och sumpnycklar.

Källa: Florainventerat av Rolf Lidberg m fl, 1971.

Nr 162

17G 7A 3E Klass 2
LÖNNTJÄRNEN

Se sid 45

Nr 163

17G 8A 03 (3347) Klass 3
NYBODMYRAN 7 KM N BORGSJÖ K:A

10 ha, 340 m ö h. Flygb -88.
Öppet kärr, skogskärr.
Rikkärr med kransrams och brudsporre.

Källa: Fältbesökt av Per Simonsson 1978.

Nr 164

17G 8A 04 (4208) Klass 3
ENSILLREMYRAN 7 KM N BORGSJÖ K:A

25 ha, 330 m ö h. Flygb -88.

Öppna kärr, skogskärr.
Intermediära kärr med sumpnycklar och björnbrodd.
Påverkan av skogsbilväg och kraftledning.

Källa: Fältbesökt av Per Simonsson 1978.

Nr 165

17G 8B 01 (0444) Klass 3
LÖVSJÖMYRAN 4 KM N BORGSJÖ K:A

35 ha, 295 m ö h. Flygb -88.

Skogskärr, sumpskog.
Rikkärrspartier med sumpnycklar och gräsull.
Kraftig påverkan från dikningar i S delen.

Källa: Fältbesökt av Per Simonsson 1978.

Nr 166

17G 8B 02 (1043) Klass 3
MYR VID SÅGBERGET 6 KM NO BORGSJÖ K:A

8 ha, 435 m ö h. Flygb -88.

Intermediärt-rikt kärr.

Källa: Besökt av Per Simonsson 1978.

Nr 167

17G 8D 01 (3530) Klass 3
PRÄSTMYRAN 14 KM NO BORGSJÖ K:A

7 ha, 370 m ö h. Flygb -88.

Blandmyr, skogskärr, förekomst av skrattram. Påverkan från dike och skogsbilväg.

Källa: Florainventerat av Rolf Lidberg m fl.

Nr 168

17G 8E 01 (2441) KLASS 3
SESSELMYRAN M FL 12 KM NNO TORP KA

Myrkomplex, 110 ha (85 ha våtm), 400 m ö h. Flygb. -87. Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Blandmyr av mosaiktyp
9 ha, öppet.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Tuva, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
12 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Sträng, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Hölja, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
5 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Bäckdråg, 15 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 2: Golv, 85 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
27 ha, fördelat på 8 ytor. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, väg.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 5: Topogent kärr
27 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Nr 169

17G 8F 01 (4903) KLASS 2
TRÄTMYRTJÄRNEN 15 KM N TORPSHAMMAR

Myrkomplex, 98 ha (90 ha våtm), 395 m ö h. Flygb. -86. Det: Stefan Grundström. Ingår i naturvårdsplan. Våtmarken är en sänkt sjö.

Delobj. 1: Topogent kärr
19 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 2: Kantzon, 20 % av delobjektytan. Fastmatta.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
7 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 70 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
20 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
35 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 5: Tjärn
4 ha, fördelat på 3 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Gungfly, 20 % av delobjektytan.

Nr 170

17G 8H 01 (3618) KLASS 2
MYRAR VID HIÅN 17 KM NO TORPSHAMMAR

Våtmarkskomplex, 82 ha (74 ha våtm), 250 m ö h. Flygb. -86. Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Dråg, 70 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 2: Göl, 5 % av delobjektytan.

Element 3: Kantzon, 25 % av delobjektytan. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
32 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
20 ha, fördelat på 4 ytor. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 2: Mindre fläckar, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Strand vid vattendrag
10 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande väg, vinterväg.

Element 1: Kantzon utmed å, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Kantzon utmed å, 15 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Mjukmatta.

Element 3: Bäck, 10 % av delobjektytan.

Nr 171

18G 0A 01 (2545) KLASS 3
MYRAR N VÄRSJÖN 16 KM N BORGSJÖ KA

Kärrkomplex, 75 ha (60 ha våtm), 400 m ö h. Flygb. -89.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården. Åsrygg i anslutning, naturskog i eller i anslutning, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, öppet. Svag lokal påverkan från väg. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
35 ha, mosaikartad fördelning, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Tjärn
6 ha, fördelat på 8 ytor.

Nr 172

18G 0B 01 (1213) KLASS 1
VÄRSJÖMYRAN 14 KM N BORGSJÖ KA

Myrkomplex, 105 ha (90 ha våtm), 410 m ö h. Flygb. -89.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården.
Naturskog i eller i anslutning, sluttar i terrasser.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
20 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Flarkgöl, 10 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr
14 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Göl, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
35 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från anslutande väg, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 4: Sumpskog
10 ha, mosaikartad fördelning. Botaniska värden.

Element 1: Mindre fläckar, 95 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 2: Källa, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog.

Nr 173

18G 0B 02 (2317) KLASS 1
NYBYGGEMYRAN-AVAMYRAN 16 KM N BORGSJÖ KA

Myrkomplex, 140 ha (115 ha våtm), 430 m ö h. Flygb. -89.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården.
Naturskog i eller i anslutning, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
8 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 70 % av delobjektytan. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Flarkgöl, 10 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Dråg, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
30 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Hölja, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 3: Höljegöl, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 4: Topogent kärr
50 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Sjöstrand
5 ha, öppet.

Element 1: Gungfly. Lösbotten.

Delobj. 6: Mad vid vattendrag
5 ha, öppet.

Element 1: Kantzon utmed å, 90 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 2: Bäck, 10 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Nr 174

18G 0B 03 (3030) KLASS 2
SVARTTJÄRNFLON 17 KM N BORGSJÖ KA

Myrkomplex, 105 ha (84 ha våtm), 450 m ö h. Flygb. -89. Storomr AP.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården. Naturskog i eller i anslutning.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
25 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vintervåg.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
30 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vintervåg.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 4: Tjärn
13 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Gungfly, 10 % av delobjektytan.

Nr 175

18G 0B 04 (0037) KLASS 3
OXMYRAN-STORMYRAN 15 KM NNO BORGSJÖ KA

Kärrkomplex, 60 ha (58 ha våtm), 450 m ö h. Flygb. -89.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
12 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 70 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 3: Flarkgöl, 10 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr
18 ha, öppet.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.
Källa: Dynesius och Simonsson, Fågelmyrar i Västernorrlands län.

Nr 176

18G 0B 05 (1640) KLASS 3
RUSBASTUMYRAN 16 KM NNO BORGSJÖ KA

Myrkomplex, 43 ha (42 ha våtm), 490 m ö h. Flygb. -89.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
17 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Sträng, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
18 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Lösbotten.

Element 3: Flarkgöl, 15 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
5 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Källa: Dynesius och Simonsson, Fågelmyrar i Västernorrlands län.

Nr 177

18G 0B 06 (0524) KLASS 3
FINNMYRAN 14 KM N BORGSJÖ KA

Myrkomplex, 50 ha (48 ha våtm), 450 m ö h. Flygb. -89.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
24 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet, mjukmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet, mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, vinterväg. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

***Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp** 12 ha, glest trädtäckt.*

Element 1: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Nr 178

18G 0B 07 (3916) Klass 3
MYR N NYBYGGESJÖN 17 KM N BORGSJÖ K:A

7 ha, 450 m ö h. Flygb -89.

Skogskärr, tallmossar, gungflykärr.
Ingen allvarlig påverkan. Förekomst av brudsporre och tvåblad.
Ingår i naturreservat.

Källa: Landskapsflora i Medelpad, Rolf Lidberg m fl.

Nr 179

18G 0B 4B Klass 2
NORSMYRAN

se sid 48

Nr 180

18G 0B 09 (1248) Klass 3
MYR VID LILLOXSJÖTJÄRN 15 KM N BORGSJÖ K:A

10 ha, 460 m ö h. Flygb -89.

Tjärn, blandmyr, strängflarkkärr med terrasser.
Svag påverkan från vägen.

Källa: Olsson, H, 1974. Jämtgaveln, en naturvårdsundersökning

Nr 181

18G 0C 01 (2103) KLASS 2
MYR VID TVÅTJÄRNARNA 17 KM NNO BORGSJÖ KA

Myrkomplex, 80 ha (65 ha våtm), 465 m ö h. Flygb. -89.
Det: Stefan Grundström. Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
15 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

***Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp** 8 ha, glest trädtäckt.*

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Kantzon, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Sträng-flarkkärr
15 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Nr 182


18G OD 01 (0425) Klass 3
STOR KASSJÖMYRAN 22 KM NO BORGSJÖ K:A

37 ha, 300 m ö h. Flygb 89.

Strängflarkkärr, öppet kärr, skogskärr.
Lokal påverkan från väg och diken.


Källa: Mats Dynesius och Per Simonsson. Fåglar i Västernorrlands län.

SUNDSVALLS KOMMUN



Bengtmyran-Billmyran m fl. nr 4

Värdeklass I
Geokod 16H 9F 1A2C
Areal 125 ha
Flygbild 1986
Höh 140 m
VMI-nr 16H 9FO1
Naturvårdsobjekt N81 286
Fältbesökt 1990-07, S Grundström.



Våtmarksområdet består av Bengtsmyran, Billmyran, Lomtjärnsmyran och Stor-Lommyran med sumpskogsytor mellan myrarna. Området är mosaikartat och de olika våtmarkstyperna flyter ofta över i varandra på ett diffust sätt. Två tjärnar finns i våtmarken och ett flertal fastmarksholmar. Bäcken som avvattnar området rinner i den östra kanten av myrområdet. De våtmarkstyper som förekommer är *blandskogskärr, tallkärr, gransumpskog, tallmosse, öppen mosse, öppet fastmattekärr* och *mjukmattegungflyn* vid tjärnarna.

Vegetation: Vegetationen är i huvudsak fattig men intermediära stråk förekommer. Vanliga arter i de öppna kärrytorna är t ex blåtåtel, trådstarr, tuvull och pors. Mosseytorna är av ris/fuscumtyp mestadels. I skogskärren och sumpskogen finns förutom tall, gran och glasbjörk även en del gråal. Vissa stråk är av lågörttyp och enstaka partier även av högörttyp med bl a hultbräken, kärrfibbla och skogsnäva. Bottenskiktet är genomgående vitmossdominerat.


Fauna: Häckande smålom i båda tjärnarna.

Påverkan: Området saknar allvarliga ingrepp. En del av sumpskogen verkar dock genomhuggen och en del angränsande ytor är helt avverkade och består idag av ung lövskog. Smärre partier av sumpskogen är påtagligt rika på både lågor och döda träd.

Bedömning: Våtmarksområdet är synnerligen mosaikartat och mångformigt med främst ett flertal olika typer av skogskärr och sumpskog som värdefullt inslag. Förekomsten av tjärnar, öppna kärrytor och bäckmiljön förhöjer också mångformigheten. Området är ovanligt opåverkat av rationellt skogsbruk trots det stora inslaget av skogbevuxen våtmark.

Älgmyren. nr 5

Värdeklass II
Geokod 16h 9G 3E5J
Areal 46 ha
Flygbild 1986
Höh 80 m
VMI-nr 16H 9G01
Naturvårdsobjekt N81 058
1990-07, S Grundström.



Älgmyren är ett våtmarkskomplex bestående av en *svagt välvd mosse, skogskärr* och *sumpskog* av både lövrik och grandominerad typ samt små öppna-halvöppna kärrytor. Myren avvattnas via mindre bäckar i västra och östra delen ner till Armsjön.

Vegetation och flora: Kärrvegetationen är intermediär med bladvass, blåtåtel och vitag, som vanliga arter och mer enstaka även brunag och

dytåg. Det botaniskt mest intressanta är förekomsten av skogsknipprot i sumpskogen.

Påverkan: Tidigare fanns skogsknipprot inom ett större område men tyvärr avverkades stora delar av denna skog under 80-talet. En del av sumpskogen är också dikespåverkad.


Bedömning: Ett medelstort våtmarkskomplex där det största värdet ligger i den örtrika sumpskogen med den i regionen sällsynta skogsknipproten. Den ostörda välvda mossen samt rika kärrpartier bidrar till bevarandevärdet.

Källa: Guvå, L. 1972. Naturvårdsinventering i Västernorrlands län.

Öhrling, H. Vägen ut i Sundvalls natur

Gässmyran. nr 10

Värdeklass II
Geokod 17G 0F 3D0F
Areal 105 ha varav 45 i Medelpad
Flygbild 1988
Höh 395-400 m
VMI-nr 17G 0FO1
Naturvårdsobjekt N81 187
Fältbesökt 1981, L Norman (Hälsingesidan).



Gässmyran består på Medelpadssidan av *glest tallbevuxna mossar, öppna kärr och skogskärr* som omger Gässtjärnen. Vid bäcken finns blöta högstarrkärr och videkärr. Myren övergår på Hälsingesidan i ett stort öppet kärr och glest skogbevuxna mossar.

Myren har ett högt skyddsvärde i fågelinventeringen på Hälsingesidan. Vid inventeringen konstaterades bl a 1 par sångsvan och 1 par trana.

Inga allvarliga störningar finns men myren är lokalt påverkad av skyddsdikningar och markberedningar i samband med avverkningar.

Bedömning: Gässmyran har ett mycket högt skyddsvärde ur ornitologisk synpunkt och är totalt lite störd.

Källa: Ståhl, P. Skyddsvärda myrar i Gävleborgs län. Rapport 1985:2 från länsstyrelsen i Gävle.

Myrar vid Väster-Ulvsjöån. nr 12

Värdeklass II
Geokod 17G 1G 1A0D
Areal 130 ha
Flygbild 1988
Höh 373-390 m
VMI-nr 17G 1GO1
Naturvårdsobjekt N81 287



Brännmyran, Rössemyran, Hajsomyran och Sjöängsmyran är utbildade längs Väster-Ulvsjöån och sluttar svagt-måttligt ner mot ån. Våtmarksområdet är mosaikartat och består av *öppna-glest trädbevuxna fastmattekärr* och *blandmyrar, skogskärr, sumpskog* samt *strandkärr* och *strandskogar.*

Fauna: Förekomst av utter längs ån 1990,91 och 92.

Påverkan: Några diken finns i kanterna. Öster om myrområdet finns gamla myrodlingar på båda sidor sjön. Ett översilningsdike har grävts från Morotisbäcken ut över Rössemyran. Flera körvägar finns på myrområdet.

Bedömning: Våtmarksområdet är mosaikartat och saknar allvarliga ingrepp. Området hyser ordinära myrtyper men de blöta strandkärren samt sumpskogsytorna kan vara av intresse.

Stor-Lomsjömyran mfl. nr 13

Värdeklass I
Geokod 17G 1H 2D2F
Areal 175 ha
Flygbild 1986
Höh 340-370 m
VMI-nr 17G 1HO1
Naturvårdsobjekt N81 190
Fältbesökt 1979-05, O Elofsson (Stor- och Lill-Lomsjömyran).
1989, S Grundström.



Våtmarksobjektet består av Stor- och Lill-Lomsjömyran, Kallasmyran och Långmyran. Myrarna omger Lill-Lomsjöåsen som är en liten bergknalle med branta syd- och nordsluttningar. Området avvattnas dels direkt ut i StorLomsjöbäcken och dels via Pitebäcken och sjön ut i Stor-Lomsjöbäcken. Myrarna omges av gammal skog till stor del men i söder finns större hyggen. Stor-Lomsjömyran domineras av svagt sluttande *öppna kärr* som delvis är differentierade i *strängflarkkärr*. Lill-Lomsjömyran domineras av en *öppen mosse*. Kallasmyran och Långmyran utgörs mest av tallmossar. I kanter och längs bäckarna finns även *skogskärr* och en hel del *sumpskog*.

Vegetation och flora: *Kallasmyran* utgörs av en tallbevuxen mosse med kärrdråg på sidorna. Mot öster finns ett glest trädtäckt högstarrkärr som sluttar ned mot bäcken. I norra delen finns ett parti lövrik sumpskog.

Lill-Lomsjömyran utgörs av en svagt välvd och öppen mosse som är diffust strukturerad med en delvis tydlig lagg. Ljung, kråkris och tuvul dominerar fältskiktet och Sphagnum fuscum bottenskiktet. Den västra delen består av en tallbevuxen rismyr av blandmyrtyp. I NV hörnet finns ett rikare skogskärr där bl a sumpnycklar, dvärglummer och nålstarr växer. Tjärnen omges av starrdominerade mjukmattekärr.

Stor-Lomsjömyran domineras av ett öppet intermediärt kärr med omväxlande fastmattor, ristuvor och lösbottnar. Karaktärsarter i bottenskiktet är bl a Sphagnum subfulvum, S warnstorfii och Campylium stellatum. I fältskiktet förkeommer bl a sump-nycklar och kärrull. Skogskärren i kanterna och vid bäckarna är mestadels av fattig risyp med diffusa övergångar mot blandmyr och tallmosse. Rikare blandskogkärr förekommer bl a öster om Stor-Lomsjöbäcken samt vid bäcken nedanför Lill-Lomsjön. Gransumpskogar finns främst på sluttningarna ner mot Stor-Lomsjöbäcken.

Fauna: Vid Stor-Lomsjöbäcken fanns spår efter bäver (1989). Ett stort område låg under vatten med mycket döda granar som följd. Lågt skyddsvärde ur ornitologisk synpunkt, värdeklass IV.

Påverkan: Skogsbilvägar påverkar både östra och västra kanten av Lill-Lomsjömyran. Flera jakttorn samt stigar finns på myrarna.


Bedömning: Våtmarkskomplexet är variationsrikt med främst den öppna svagt välvda mossen (Lillomsjömyran), det stora intermediära kärret (Stor-Lomsjömyran) samt de rätt stora ytorna med blandskogskärr och sumpskog som värdefullaste delar. Våtmarkerna är opåverkade av allvarliga ingrepp och omgivningen består till stor del av gammal skog vilket ger området något av en "vildmarkskaraktär".

Källa: Dynesius, M. och Simonsson P. Fågelmyrar i Västernorrlands län. Rapport 1980:13 från länsstyrelsen i Härnösand.

Bohlin, E. 1983. "Iggesundsmyrar". Opubl rapport.

Björkbäcksmyran m fl. nr 14

Värdeklass I
Geokod 17G 1H 1B3F
Areal 170 ha
Flygbild 1986
Höh 350-360 m
VMI-nr 17G 1HO2
Naturvårdsobjekt N81 191
Fältbesökt 1981, K Due och M Muhr.



Björkbäcksmyran m fl ligger på en vattendelare och avvattnas både mot norr ner mot Burbäcken och mot söder till Styggbäcken som rinner ut i Ulvsjöån. Till myrkomplexet räknas här också Pålsmyran och Burbäcksmyran på norra sidan Burbäcken samt småmyrarna väster om Styggbäcken.

Myrområdet är variationsrikt och bitvis mosaikartat med flera fastmarksholmar. I myrområdet återfinns några mossepartier, bl a en *öppen mosse*. Det finns många varianter av *öppna-glest trädbevuxna kärr* och blandmyrar men också *skogskärr* och *sumpskog*.

Vegetation och flora: Påls- och Byrbäcksmyran består till stor del av rika fastmattekärr av Sphagnum subfulvum-brunmosstyp med blåtåtel och tuvsäv i fältskiktet. I den östra utlöparen finns skogsdungar med ett buskskikt av en och ett flertal rikkärrsarter förekommer, bl a sumpnycklar och tvåblad.

Söder om Burbäcken finns ett blandskogskärr mellan talrika fastmarksholmar. På södra Björkbäcksmyran växer en frodig sumpskog med dominerande gran och björk. Denna sumpskog är artrik med ett flertal örter, bl a Kung Karls spira.

Väster om Styggbäcken finns ett öppet intermediärt kärr med övergångar mot blandmyr. De SO delarna av Björkbäcksmyran utgörs av en tallmosse av ordinär ristyp med öppna mosseytor i NV.

Påverkan: Ett ca 900 långt dike som växt igen sträcker sig från mitten ner mot Styggbäcken. På flera ställen har avverkningar gjorts ända ut mot myren och i NO kanten finns korta diken som gjorts i samband med avverkningarna.

Bedömning: Myrkomplexet är mycket mångformigt. De värdefullaste delområdena torde vara rikkärren på norra sidan Burbäcken, de mångformiga strandkärren längs bäcken samt den artrika sumpskogen öster om Styggbäcken. Området är huvudsakligen hydrologiskt ostört.

Källa: Due,k. & Muhr, M. 1982. Tretton myrar i Västernorrlands län, rapport 1983:1. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Vitmossamyran. nr 19

Värdeklass II
Geonummer 17G 9H 2C1D
Areal 47 ha
Flygbild 1986
Höh 320 m
VMI-nr 17G 9H01
Naturvårdsobjekt N81 188
Fältbesökt, 1990-09, S Grundström.



Centralt i myren ligger en *svagt välvd mosse* med kantskog och lagg. För övrigt finns små öppna kärr och betydande ytor med talldominerade *skogskärr* och *gransumpskog*.

Mossen är av ordinär ristyp med lågvuxen tall. Av myrarter som indikerar intermediära närings-

förhållanden finns tex vitstarr, Sphagnum subnitens, Sph warnstorfii och Loeskypnum badium.


I sumpskogen finns bitvis naturskogsförhållanden med förekomst av högstubbar och lågor. Nordbräken, majbräken,, kärrfibbla, linnéa och tussilago är väl spridda i sumpskogen.

Myren och sumpskogen är hydrologiskt helt ostörda. Både sumpskogen och en stor del av omgivande skog är opåverkad av modernt skogsbruk.

Bedömning: Vitmossamyren är av mycket högt bevarandevärde främst pga raritetsvärde (väl utvecklad välvd mosse med tydlig lagg) men också den ostörda sumpskogen bidrar till det höga värdet.

Långmyran 12 km SSV Attmars K:a. nr 21

Värdeklass II-III
Geokod 17H 0B 0E4A
Areal 78 ha
Flygbild 1986
Höh 185 m
VMI-nr 17H 0BO1
Naturvårdsobjekt N81 192
Fältbesökt1990-07, S Grundström.



Våtmarksområdet är långsträckt och ligger delvis i mosaik med fastmark. *Skogskärr* och *sumpskog* av lite olika typ dominerar men även små *öppna kärr* förekommer liksom diffusa blandmyrar och små tallmossar. Endast den västra delen har fältbesökts.


Vegetation: Trädskiktet består till stor del av tall men även gran- och lövdominans förekommer. Skogskärren och sumpskogsytorna är heterogena men mestadels av fattig ristyp. I västra kanten finns lite rikare trädbevuxna kärr med bl a brakved, blodrot, knagglestarr och älgört som vanliga arter. De öppna kärren är fattiga till intermediäa med t ex trådstarr, tuvull och tuvsäv som viktiga arter samt Sphagnum angustifolium och S subfulvum bland mossorna.

Påverkan: Viss påverkan i form av avverkningar och körskador vid kraftledningarna som passerar våtmarken. För övrigt finns spår efter plockhuggning och rensning i en del av sumpskogen. Små partier av sumpskogen i västra delen har dock en tydlig naturskogsprägel med mycket lågor och äldre träd. Öppna kärrytor i östra kanten har våtmarkskalkats.

Bedömning: Ett rätt så stort och lite påverkat våtmarksområde med mycket skogbevuxen myr och sumpskog. Små intermediära kärrytor och fina gran-lövssumpskogar med naturskogskvaliteter.

Stormyran-Njurunda. nr 22

Värdeklass I
Geokod 17H 0G 0D9A
Areal 60 ha
Flygbild 1987
Höh 85-95 m
VMI-nr 17H 0GO1
Naturvårdsobjekt NR81 003
Fältbesökt 1978-06, P-Å Gidlund.



Stormyran ligger ca 5 km söder om Njurunda strax söder om Böleberget. Myren är till största delen utbildad som en *koncentrisk mosse* som är välvd och sluttar något mot väster resp öster. Mossen består av ett *mosseplan* med *välutvecklade höljor och gölsystem* samt *kantskog* och *laggkärr*. (Myren avvattnas i öster, väster och sydväst av tre


bäckar). De närmaste omgivningarna utgörs av barrskogar, huvudsakligen blåbärsgranskog.

Vegetation och flora: Mosseplanet domineras av ris/fuscum-samhällen utbildad som tuvor eller smala strängar. Höljorna är av mjuk-fastmattetyp med dominans av främst tuvull, tuvsäv, kallgräs och ställvis vitag. De välutvecklade gölarna är i stort sett vegetationslösa medan andra sämre utvecklade gölar har en gles vegetation av bla Sphagnum cuspidatum.

Trädförekomsten i den centrala delen är sporadisk men ökar successivt mot kanterna.Trädskiktet består nästan uteslutande av tall.

Laggkärren är välutvecklade i norr och söder och är diffusa för övrigt. Olika typer av mjuk- och fastmattesamhällen dominerar med en fattig-intermediär vegetation. Små partier med strängkärr förekommer. I fältskiktet är t ex flaskstarr, tuvsäv och blåtåtel vanliga och i bottenskiktet Sphagnum papillosum och Sph majus. Av något rikindikerande arter förekommer t ex nålstarr, dvärglummer, och Scorpidium revolvens. Längs myrkanten finns i allmänhet en buskridå av bindvide, glasbjörk och gråal.

Fauna: Värdeklass II i fågelinventeringen med bl a smålom, kricka och storspov.



Påverkan: I V kanten finns spår av små torvtäkter.


Bedömning: Stormyran är morfologiskt mycket intressant p g a att den är en koncentriskt uppbyggd mosse med ett mycket välutvecklat gölsystem. Stormyran har i detta avseende få motsvarigheter i Norrland. Myren saknar helt allvarliga ingrepp. Stormyran har också ett mycket högt ornitologiskt skyddsvärde.

Källa: Arnström, T. m fl. Fem myrar i Västernorrlands län. Vegetationsinriktad naturinventering. Rapport 1979:9 från länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Dynesius, M. och Simonsson, P. Fågelmyrar i Väster-norrlands län. Rapport 1980:13 från länsstyrelsen i Härnösand.

Telångsmyran. nr 23

Värdeklass II
Geokod 17H 0G 0A3H
Areal 30 ha
Flygbild 1987
Höh 100 m
VMI-nr 17H 0GO2
Naturvårdsobjekt N81 288
Fältbesökt 1990-07, S Grundström (ej sumpskogen i Ö delen).



Telångsmyran är belägen strax väster om E4:an söder om Njurunda. Myren sluttar svagt mot öster och avvattnas till Gårdsjön. En *svagt välvd mosse* med ett brett laggkärr dominerar myren. I östra delen övergår myren i *gransumpskog* och i östra kanten finns en smal bård med tallsumpskog.


Mossen är glest tallbevuxen och trädskiktet tätnar mot kanterna. Markvegetationen är av ordinär rismossetyp med mindre stråk av mjukmattemosse. Laggkärren är fattigt- till intermediärt med tuvull, blåtåtel, bladvass och trådstarr som rikliga arter. I kantzoner mot fastmarken förekommer klibbal sparsamt.

En stor kraftledning skär rakt över myren i nordsydlig riktning. Myren förefaller för övrigt vara i huvudsak ostörd.

Bedömning: Lite påverkad och relativt stor kustmyr. Välutvecklad välvd mosse med i huvudsak geomorfologiskt värde.

Gästa-Stormyran. nr 24

Värdeklass II
Geokod 17H 0G 1A0D
Areal 35 ha
Flygbild 1986
Höh 75 m
VMI-nr 17H 0G03
Naturvårdsobjekr N81 289
Fältbesökt. 1990-07, S Grundström.



Myren är långsträckt och utgörs av olika typer av kärr. Ett *öppet kärr* med diffusa strängar dominerar men även ett *blandskogskärr* och ett mindre *soligent kärr* finns.

I trädskiktet dominerar tall, glasbjörk, sälg, klibbal och gran och buskskiktet utgörs främst av pors, en, rönn, brakved, bindvide och svartvide. Fältskiktet tyder på en svagt intermediära förhållanden med bla bladvass, ängsull, tuvsäv och blåtåtel som vanliga arter.


Skogskärret är örtrikt med bla hultbräken, slåtterblomma, olvon och Jungfru Marie nycklar.

Gästa-Stormyran förefaller hydrologiskt helt ostört och saknar andra allvarliga ingrepp.

Bedömning: Medelstort kustnära våtmarkskomplex som saknar ingrepp och är tämligen mångformigt.

Gömyran. nr 27

Värdeklass II
Geokod 17H 0H 4D3A
Areal 20 ha
Flygbild 1986
Höh 15 m
VMI-nr 17H 0H02
Naturvårdsobjekt N81 062
Fältbesökt. 1972, L Guvå




Gömyren är en kustnära myr som utgörs av ett *öppet kärr* och ett *skogskärr*. Från myren finns uppgifter på ängsnycklar och sumpnycklar vilket tyder på minst intermediära förhållanden.

Förefaller helt ostört

Bedömning: Liten-medelstor kustnära myr med ringa påverkan och botaniskt värde.

Bodvallstjärn. nr 28

Värdeklass II
Geokod 17H 0H 3B3J
Areal 10 ha våtmark
Flygbild 1986
Höh 20 m
VMI-nr 17H 0H03
Naturvårdsobjekt N81 051
Fältbesökt: R Lidberg m fl., Medelpads flora.




Runt Bodvallstjärnen finns strandskog och gungflykärr. Här växer slokstarr på den nordligaste platsen i landet samt knottblomster, en sällsynt och hotad orkidee.

Bedömning: Litet våtmarksområde med mycket höga botaniska raritetsvärden.

Juni-Stormyran. nr 31

Värdeklass I
Geokod 17H 0I 3D3D
Areal Ca 40 ha
Flygbild 1986
Höh 20 m
VMI-nr 17H 0IO3
Naturvårdsobjekt N81 135
Fältbesökt 1990-07, S Grundström.



Juni-Stormyrans västra del är ett *öppet kärr* mest av fastmattetyp. I mitten och längst i söder finns små *tjärnar* som omges av gungflyn och öster om den stora fastmarksholmen en *svagt välvd mosse* med tydliga laggkärr. Små ytor med *blandskogskärr* förekommer fläckvis mot kanterna, främst i de norra delen.

Vegetation och flora: Kärren är intermediära med riklig förekomst av snip, gräsull och dytåg. I bottenskiktet förekommer Sphagnum warnstorfii och S subfulvum allmänt och vid tjärnarna även Scorpidium scorpioides. Mossen är av vanlig ristyp med ett glest och lågvuxet trädskikt av tall. Kantzonerna har en heterogen vegetation med bl a gråal, klibbal, gran och tall och blandningar av ris- och ört/starr-samhällen i fältskiktet.


Fauna: Häckning av smålom konstaterat 1980.

Påverkan: Myren förefaller att vara ostörd av diken, vägar och dyl. Mindre hyggen ansluter på flera ställen.

Bedömning: Juni-Stormyran är en rätt så stor kustmyr som är lite påverkad, Den är intressant som en myr i ett tidigt utvecklingsstadium med både kärr och svagt välvd mosse. Vegetationen är intermediär och representativ för Medelpadskusten med en tämligen artrik kärlväxtflora.

Grönviksmyran. nr 32

Värdeklass I
Geokod 17H 0I 2E5C
Areal Ca 20 ha
Flygbild 1986
Höh 15 m
VMI-nr 17H 0IO4
Naturvårdsobjekt N81 016, NR81 055
Fältbesökt 1969, R Lidberg m fl.
Landskapsflora i Medelpad.
1990-07, S Grundström.



Grönviksmyran ligger nära havet ute på Björkön 13 km öster om Njurunda ka. Den långsmala myren sluttar svagt mot söder och i dess södra ände finns en liten tjärn. Större delen utgörs av ett *öppet kärr*. Små lövdungar förekommer och i södra delen finns ett större område med *gransumpskog*.

Vegetation och flora: Enstaka lågvuxna tallar förekommer ute på myren och i kantzonerna finns både tall och björk. I lövdungarna och i sumpskogen finns även gråal och klibbal. Vegetationen är intermediär med dominans av bladvass men även pors, blåtåtel och ljung är rikliga i kärret. Ängsnycklar, myggblomster och brunag är funna. Av mossorna dominerar främst Sphagnum papillosum och av mer krävande arter märks bl a S warnstorfi och S subfulvum. I sumpskogen finns en mosaik av starr- högört- och fräkendominas.


Fauna: Två tranor observerades vid fältbesöket.

Påverkan: Myren förefaller i sin helhet ostörd men sumpskogen bär vissa spår av huggning.

Bedömning: Grönviksmyran är en förhållandevis stor kustmyr som är lite påverkad. Den är ett bra exempel på en myr i ett tidigt utvecklingsskede nära havsstranden. Tämligen rik flora med inslag av för regionen ovanliga arter.

Myr NNO Grönviksmyran. nr 33

Värdeklass II
Geokod 17H 0I 3E1H
Areal 15 ha
Flygbild 1986
Höh 25 m
VMI-nr 17H 0I05
Naturvårdobjekt N81 081
Fältbesökt. 1975, R Lidberg.
1990-07, S Grundström



Myren består av en långsmal *tallmosse* i söder samt ett stråk mot norr med öppen-glest tallbevuxna *fastmattekärr*. Mot NV går en smal zon med lövrik *sumpskog* som ställvis är mycket blöt.


Mossen är av vanlig ris-fuscum typ. Kärret är intermediärt med bla trådstarr, ängsull, hirstarr, dytåg och snip som vanliga arter och mer sparsamt ängsnycklar. I bottenskiktet märks bla Sphagnum subsecundum, Sph. subfulvum och Sph. papillosum. Sumpskogen har ett trädskikt med bla tall, gran, björk, gråal och klibbal. Olika starrarter samt vattenklöver är vanliga i det heterogena fältskiktet.

Mot öster finns ett nytt hygge. Våtmarkerna förefaller helt ostörda.

Bedömning: Litet våtmarksområde med för denna trakt representativ vegetation. Området är ostört och mångformigt med främst den blöta och lövrika sumpskogen som värdefull del.

Myrar på Brämön. nr 34

Värdeklass I
Geokod 17H 0J 0E0A
Areal ca 40 ha
Flygbild 1987
Höh 10-70 m
VMI-nr 17H 0J01
Naturvårdsobjekt N81 054
Fältbesökt. R Lidberg m fl, Medelpads flora
H Öhrling, 1987.



På Brämön finns ett 30-tal småmyrar. Myrarna i östra och norra delarna är mest botaniskt intressanta. *Öppna kärr* och *skogskärr* samt lövrika *sumpskogar* dominerar. Även små *blandmyrar* med mosseytor förekommer.

Ett flertal orkideearter är funna, bl a ängsnycklar, sumpnycklar, blodnycklar, myggblomster och skogsknipprot. Av övriga intressanta rikkärrsarter finns bl a tagelstarr, trådfräken, smalfräken, brunag. Tidigare fanns knottblomster i sumpskog på ön

men den är ej återfunnen de senaste decennierna. Myrarna förefaller hydrologiskt ostörda men vissa sumpskogar är påverkade av skogsbruk.


Bedömning Våtmarkerna på Brämön är av högsta skyddsvärde pga den rika floran av extremriktyp och ostördheten.

Källa: Guvå, L. 1972. Naturvårdsinventering i Västernorrlands län.

Öhrling, H. Vägen ut i Sundsvalls natur.

Måckelmyran. nr 36

Värdeklass I
Geokod 17H 1G 0E6F
Areal 65 ha
Flygbild 1986
Höh 65 m
VMI-nr 17H 1GO1
Naturvårdsobjekt NR 81 056
Fältbesökt 1974, Bo Leijon.
1979-06, K-E Olsson.



Måckelmyran ligger i en plan sänka mellan ett antal mindre berg. Myren är relativt väl avgränsad från omgivande fastmark och avvattnas åt flera håll. Större delen upptas av en *välvd koncentrisk mosse*, en mindre *excentrisk mosse* samt ett mellanliggande *gölrikt parti*. De omkringliggande kärren är dels *smala laggkärr*, dels större komplex av *öppna och trädbevuxna rikkärr*.

Vegetation och flora: Mossen domineras av risvegetation med främst ljung, kråkbär, hjortron och tuvull som viktiga arter. Sphagnum fuscum men ställvis också S.angustifolium och S. rubellum dominerar bottenskiktet. Renlavar är ett vanligt inslag på ristuvorna. I de talrika höljorna förekommer dels fastmattevegetation där främst tuvull och tuvsäv dominerar och dels förekommer mjukmattor där kallgräs och dystarr är rikliga. De allra blötaste partierna på mossen saknar annan vegetation än alger. Delar av gölområdet har ett svagt kärrinslag med förekomst av bl a vattenklöver. Mossen är mestadels mycket glest bevuxen med låga tallar men mot kanterna finns en mer högrest tallskog.

I både västra och östra kanten finns kärrområden som till stor del har en rik vegetation. Dessa partier är alltifrån helt öppna till tätt skogbevuxna. Tall är oftast det dominerande trädslaget men blandskog förekommer också. Även blöthetsgraden varierar alltifrån ganska torra risdominerade tallkärr till mycket blöta kärr. Av rik- och tom extremmrikindikerande arter finns i dessa kärr bl a gräsull, knottblomster, tvåblad, sumpnycklar, grönstarr, kärrsälting och kärrknipprot. Ett flertal krävande brunmossor finns bl a den sällsynta Catoscopium nigritum.

Fauna: Värdeklass II i fågelinventeringen med häckande smålom som exklusivaste inslag. Tidigare har trana häckat på myren. Intressant är också att ruda lär finnas i gölarna.

Påverkan: Myren ser ut att sakna allvarliga ingrepp.


Bedömning: Mångformigheten på Måckelmyran är stor med ett flertal myr- och vegetationstyper representerade. Här förenas nordliga och sydliga myrelement som strängkärr och koncentrisk mosse. Som högmosse har myren få motsvarigheter i Norrland. Sällsynta inslag finns både vad det gäller faunan och floran är mycket artrik med flera mindre vanliga kärlväxter och bladmossor. Myren är helt opåverkad av allvarliga ingrepp. Sammantaget gör detta Måckelmyren till en av de mest skyddsvärda myrarna i länet.

Källa: Leijon, Bo. Måckelmyran, Naturinventering i Sundsvalls kommun. Rapport 1977:4 från länsstyrelsen i Härnösand.

Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyr i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Myr NO Ässjötjärnen. nr 37

Värdeklass II
Geokod 17H 1H 0C3J
Areal 19 ha
Flygbild 1986
Höh 25 m
VMI-nr 17H 1H01
Naturvårdsobjekt N81 084
Fältbesökt. P Simonsson



Myren består av *öppet kärr* vid tjärnen med diffusa strängar samt en lövrik sumpskog.


Från myren finns uppgifter på brunag och småsileshår.

Påverkan: Myren förefaller ostörd.

Bedömning: Liten-medelstor kustnära myr med visst botaniskt värde.

Stor-Fängsjömyran. nr 50

Värdeklass II
Geokod 17H 6B 4A4F
Areal 50 ha
Flygbild 1986
Höh 275 m
VMI-nr 17H 6B01
Naturvårdsobjekt N81 290




Den centrala delen utgörs av en *excentrisk mosse* med ett öppet mosseplan, tydliga strängar och höljor samt lagg och kantskog. En mindre strängad mosse finns också liksom ett öppet kärr och längs kanterna risrika *skogskärr.*

Myren förefaller helt ostörd.

Bedömning: Myrens mycket höga bevarandevärde består i den väl utvecklade mossen med excentriskt formade strängar. Myren har i detta avseende få motsvarigheter i regionen.

Stormyran-Börkelsjön. nr 55

Värdeklass II
Geokod 17H 8B 1E7A
Areal 50 ha
Flygbild 1986
Höh 235-265 m
VMI-nr 17H 8BO1
Naturvårdsobjekt N81 193
Fältbesökt 1989-10, S Grundström.



Stormyran är en långsmal myr som ligger S om Börkelån. Den sluttar i sin helhet svagt mot öster medan vissa partier i myren sluttar rätt kraftigt mot NO. Myren består egentligen av en *storskalig blandmyr* där stråk av trädbevuxna rismyrar alternerar med stråk av öppna-halvöppna kärr.

Vegetation och flora: Vid Börkelsjöns utlopp finns ett parti med strand- kärr av högstarrtyp som är öppna närmast ån men glest trädbevuxna längre mot kanterna. Mycket döda träd står i denna del p g a en bäverdammning. De trädbevuxna myrarna består dels av tallmossar, dels av starr-

dominerade tallkärr. De öppnare kärren är till stor del soligena med intermediär vegetation. Bladvass uppträder ställvis och av andra intermediärt indikerande växter finns t ex skavfräken.


Fauna: Spår efter bäver längs ån.

Påverkan: En kraftledning skär rakt över myren och körskador finns i anslutning till denna. Delar av myren har avverkats under ledningen.

Bedömning: Stormyran har ett lite ovanligt utseende p g a den välutvecklade mosaiken av öppna och trädbevuxna myrstråk. Soligena kärr med så pass stor lutning är ovanligt i regionen. Intermediär vegetation med förekomst av bl a skavfräken.

Flakamomyran. nr 56

Värdeklass II
Geokod 17H 8B 4D4D
Areal Ca 70 ha
Flygbild 1986
Höh 255-280 m
VMI-nr 17H 8BO2
Naturvårdsobjekt N81 291
Fältbesökt 1989-10, S Grundström.



Flakamomyran ligger i en svag NO-sluttning mer mot Indalsälven. Myren avvattnas via småbäckar direkt ut i älven. Området är mosaikartat med *trädbevuxna rismyrar, sumpskogar* och *små öppna kärr* tillsammans med fastmarksskogar som till stor del har naturskogskaraktär.


Vegetation och flora: Tallmossar upptar en stor del och dessa är av vanlig fuscumtyp med ljung och tuvull som dominanter. Ett stort antal torrträd står på mossarna. Tallkärren är främst av klotstarrtyp och i allmänhet ganska tätt trädtäckta. Halvöppna kärr med hög-starrvegetation förekommer sparsamt liksom helt öppna kärrytor. Mellan myrarna finns på flera ställen fuktiga gransumpskogar av främst blåbär-vitmosstyp.

Påverkan: Avverkningar har gjorts under kraftledningen och betydande körskador finns i anslutning till denna.

Bedömning: Relativt lite påverkat våtmarksområde med representativa myr- och sumpskogstyper. Området hyser ovanligt stora arealer med sumpskog och trädbevuxen myr som ligger i mosaik med naturskog.

Kväcklingen. nr 62

Värdeklass II-III
Geokod 18G 0I 3D4F
Areal 45 ha
Flygbild 1989
Höh 180 m
VMI-nr 18G 0IO1
Naturvårdsobjekt N81 103
Fältbesökt 1978-06, B Sundberg (endast sjön).



Kväcklingen är en sänkt sjö som idag består av *högstarrvassar.* Den omges av jordbruksmark som delvis är igenväxande med busksnår. Väster om sjön ligger Slåttmyran vars centrala del är ett *öppet-glest skogbevuxet kärr.* Mellan sjön och myren finns ett parti med *lövrik sumpskog.*

Värdeklass I i fågeliventeringen med bl a trana, kricka och tofsvipa.

Sjön har troligen nyttjats som någon form av


dammäng tidigare. P g a sänkningen är den i ett igenväxande skede idag och kommer troligen att försämras som fågellokal. Omgivningen är delvis kraftigt dikespåverkad. Slåttmyran är svagt påverkad av vinterkörvägar.

Bedömning: Områdets främsta värde ligger i den sänkta sjön som blivit en utmärkt fågelsjö men värdet kommer troligen inte att bestå på sikt p g a succesiv igenväxning.

Källa: Dynesius, M. och Simonsson, P. Fågelmyrar i Västernorrlands län. Rapport 1980:13 från länsstyrelsen i Härnösand.

Eriksmyrorna. nr 64

Värdeklass II
Geokod 18G 2G 3D5G
Areal 50 ha
Flygbild
Höh 400-440 m
VMI-nr 18G 2GO1
Naturvårdsobjekt N81 125, 126
Fältbesökt R Lidberg mfl.
Landskapsflora i Medelpad.



Eriksmyrorna ligger strax väster om naturreservatet Lovik-Storflon. Myren sluttar svagt-måttligt mot väster. Centralt i myren ligger ett *öppet fastmattekärr*. Detta omges av en *tallmosse* i öster, ett *soligent trädbevuxet kärr* i norr och plana *skogskärr* och *sumpskogsytor* för övrigt. Väster om myren ligger ett större sumpskogsområde på Höglandsåsens västsluttning.


Fattigkärr med bla odonvide. I det lövrika sumpskogsområdet växer bla lappranunkel och tolta.

Myren saknar allvarlig påverkan. Den östra kanten påverkas lokalt av en skogsbilväg. En kraftledning skär i kanten av sumpskogen.

Bedömning: Eriksmyrorna är höjdlägesmyr med i huvudsak fattig vegetation. Det höga bevarandevärdet ligger i orördheten och den botaniskt intressanta sumpskogen.

Lovik-Storflon. nr 65

Värdeklass I
Geokod 18G 2H 3A5F
Areal 206 ha myr
Flygbild 1989
Höh 425-450 m
VMI-nr 18G 2HO1
Naturvårdsobjekt N81 095
Naturreservat sedan 1985.
Fältbesökt 1978-06, B Sundberg.
Värdeklass III i fågelinventeringen.



Området är flackt med större och mindre fastmarksholmar i ett vitt och förgrenat myrsystem. Myrarna ligger på en vattendelare och avvattnas åt tre olika håll. Några mindre tjärnar finns på myrarna. *Öppna fastmattekärr, öppna-glest tallbevuxna mossar* och risrika *skogskärr* dominerar Lovik-Storflon. Den omgivande skogsmarken är av naturskogskaraktär och helt grandominerad.

Genomgående mycket fattig vitmossdominerad kärr-och mossevegetation. Bl a tuvull, tuvsäv, olika ris och ställvis en del högstarr-arter är vanliga i fältskiktet.

Området är i sin helhet ostört av både dikningar, vägar och modernt skogsbruk.


Bedömning: Ett högt beläget myr- och naturskogsområde vars stora värde ligger i ostördheten, storleken och den intressanta mosaiken av myr och naturskog. Ordinära myrtyper som är representativa för regionen.

Källa: Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Simonsson, P 1979. Urskogar och naturskogar i västernorrlands län. rapport 1979:11. Länsstyrelsen i Västernorrland län, Härnösand.

Skarpmyran, Långmyran, Björntjärnen. nr 68

Värdeklass II
Geokod 18G 3J 0B9I
Areal 25 ha
Flygbild 1989
Höh 260-310 m
VMI-nr 18G 3JO1
Naturvårdsobjekt N81 127,129,130
Florainventerat R Lidberg mfl,
Landskapsflora i Medelpad.



Objektet består av tre småmyrar nedanför Vihällsbergets södra sluttning. Skarpmyran utgörs av glest trädbevuxen *blandmyr*, en liten *tjärn* samt *sumpskog* i kanterna. Långmyran utgörs av ett *öppet mjukmattekärr*. Den lilla myren vid Björntjärnen består av ett *skogbevuxet kärr.*

Rikkärr med förekomst av tvåblad (Skarpmyran), myggblomster och ängsnycklar (Långmyran) samt trindstarr (Björntjärnen).

Större vattenödla i Björntjärnen.

En ny skogsbilväg går i kanten av Långmyran och Skarpmyran och har troligen en lokal hydrologisk påverkan. Ett äldre dike finns på västra delen av Skarpmyran.

Bedömning: Myrarna förefaller att åtminstone fläckvis ha en rik vegetation med några ovanliga rikkärrsarter. Pga detta har området ett mycket högt bevarandevärde.

Stor-Finnmyran 7 km O Liden k:a. nr 73

Värdeklass I
Geokod 18H 1B 1D0A
Areal 38 ha
Flygbild 1986
Höh 380 m
VMI-nr 18H 1BO1
Naturvårdsobjekt NR 81 166
Fältbesökt 1990-09, S Grundström.



Stor-Finnmyran sluttar något mot norr och större delen utgörs av en svagt *excentriskt mosse* med strängar, höljor och kantskog i söder. I väster samt i ett mindre parti i öster vidtar talldominerade *skogskärr* och *blandmyrar.*

Vegetation och flora: Mossen är i den centrala delen mycket glest tallbevuxen med en stor andel döda träd. Strängarna är ris/Sphagnum fuscum-


dominerade medan höljorna är både av mjukmattetyp och av lösbottentyp. Mjukmattorna domineras främst av tuvull och tuvsäv medan lösbottnarna i huvudsak saknar högre vegetation. Små inslag av kärrvegetation förekommer i mossens norra del. Även tallkärren och blandmyren är av fattig typ med ris, klotstarr, trådstarr och tuvull som vanliga arter. Myrens bottenskikt är helt dominerat av vitmossarter.

Påverkan: Myrens omgivningar är i stor utsträckning avverkade och består i dag av plant- och ungskog. Ingen hydrologisk påverkan har dock noterats.

Bedömning: Myren har ett högt raritetsvärde p g a den excentriska mossen med välutvecklade strukturer. Myren är dessutom ovanligt lite störd och hyser för regionen representativa vegetationstyper.

Myrar vid Stor-Abborrtjärn. nr 78

Värdeklass II
Geokod 18H 3B 1C5F
Areal 50 ha våtmark
Flygbild 1986
Höh 260 m
VMI-nr 18H 3BO1
Naturvårdsobjekt N81 101
Fältbesökt 1978-06, M Dynesius.



Myrarna ligger i mosaik med fastmarksholmar på en udde i sjön Kvarnbaljen. Den areellt dominerande myrtypen är öppen-glest tallbevuxna *strängade mossar*. Mellan mossarna och vid en del kanter uppträder större partier med *risrika skogskärr* alt *blandmyrar*. Mot sjökanten finns *öppna kärr* som mest är av mjukmattetyp.

Värdeklass II i fågelinventeringen med bl a trana, storspov och tofsvipa.


Myrarna saknar allvarlig påverkan.

Bedömning: Området utgör en värdefull skogsmyrmosaik med ett rikt fågelliv.

Källa: Dynesius, M. och Simonsson, P. Fågelmyrar i Västernorrlands län. Rapport 1980:13 från länsstyrelsen i Härnösand.

Storsvedmyran m fl. nr 79

Värdeklass II
Geokod 18H 3D 3A5A
Areal 110 ha
Flygbild 1986
Höh 347-380 m
VMI-nr 18H 3C01
Naturvårdsobjekt N81 195,
del av N62 026



Myrområdet består av myrar söder och väster om Lill-Tjärusjön. Området är flikigt och mosaikartat med ett flertal fastmarksholmar. Området närmast sjön domineras av *öppna mjukmattekärr*. För öv-


rigt upptas stora ytor av *sumpskog, tallmossar och risrika skogskärr.*

Den västra delen påverkas lokalt av vägen och av en del diken.

Bedömning: Myrområdet hyser representativa myrtyper och utgör en värdefull skogs-myr-sjömosaik med de blöta kärren som värdefullaste delområde. Våtmarkerna är i sin helhet lite påverkade och utgör en liten del av ett mycket stort myrområde.

Nybyggarsmyran. nr 81

Värdeklass II
Geokod 18H 3D 4B5F
Areal ca 170 ha
Flygbild 1986
Höh 360-390 m
VMI-nr 18H 3D01
Naturvårdsobjekt N81 100
Fältbesökt. 1978-06, P Simonsson och M Dynesius.
1989-10, S Grundström.



Myren ligger mellan Stor-Tjärusjön och Vialampitjärnen och omges till stor del av tallskog. Myren hänger i hop med Stentjärnsmyrorna i söder men det inventerade området avgränsas här av den skogsbilväg som skär av dessa myrar från varanda. Myren ligger på en vattendelare och avvattnas dels åt SO till Laxsjöån, dels åt NV till Stor-Tjärusjön.

Den centrala delen är en öppen och blöt myrvidd som domineras av ett *sträng-flarkkärr* med ställvis mycket stora *flarkgölar.* Mot kanterna övergår detta i *öppna mjuk-fastmattekärr och öppna mossar.* Strängkärret övergår mot SO ett bäckdråg.

Glest bevuxna *tallmossor* förekommer också samt rätt stora ytor med dikespåverkade *skogskärr* och *sumpskog*. De senare ligger i NV. Delen ovanför Vialampitjärnen består dels av ett öppet ostrukturerat kärr, dels av ett heterogent parti närmast tjärnen med bl a *soligena kärrytor.*

Vegetation och Flora: Den centrala delen har en fattig till intermediär vegetation med dystarr, tuvsäv, blåtåtel och ljung som vanliga dominanter. Det soligena kärret har en något rikare vegetation med bl a bladvassdungar och flera krävande brunmossarter. De trädbevuxna delarna är främst talldominerade men även blandskogskärr förekommer.

Fauna: Värdeklass II i fågelinventeringen. Gräsand, dalripa, trana, tofsvipa(1), grönbena (5 par), storspov (4), gulärla (2) och sävsparv (2 par).

Påverkan: Den NV delen är kraftigt dikespåverkad liksom den angränsande södra delen upp mot Finnkäringkälen. En tydlig påverkan från vägen finns i den södra delen. Körskador från terrängfordon förekommer i begränsad omfattning.


Bedömning: De centrala ostörda partierna ger myren ett högt bevarandevärde. Här finns en stor myrvidd som bitvis är mycket blöt med välutbildade sträng-flarkkärr, stora flarkgölar och tjärnar. Denna del har ett mycket högt skyddsvärde ur ornitologisk synpunkt.

Källa: Dynesius, M. och Simonsson, P. Fågelmyrar i Västernorrlands län. Rapport 1980:13 från länstyrelsen i Härnösand.



Trattmyran. nr 82

Värdeklass II
Geokod 18H 4C 0E6G
Areal Ca 110 ha
Flygbild 1986
Höh 345-355 m
VMI-nr 18H 4CO1
Naturvårdsobjekt N81 194
Fältbesökt 1989-10, S Grundström.



Trattmyran ligger mellan Stor- och Lill-Tjärusjön och avgränsas mot väster av en ny skogsbilväg som skär av myren från Kallkällmyrorna längre västerut. Området är i huvudsak flackt och omfattar några större skogsholmar och tjärnar. Genom myren rinner en större bäck. Centralt i myren ligger en *strängad mosse* med stora mjukmattehöljor. Runt om ligger flera *glest tallbevuxna mossar*. Vid sjöarna och längs bäcken finns *öppna strandkärr* av främst mjukmattetyp. Fläckvis uppträder också risdominerade kärr med gles trädtäckning samt en del större ytor med mer slutna *skogskärr*.

Vegetation och flora: Vegetationen är genomgående mycket fattig med tuvull, kallgräs, olika ris och vitmossor som dominanter. Längs bäcken uppträder högstarr-samhällen som är risfria närmast ån men övergår i videkärr mot fastmarkskanten. Trädskiktet domineras helt av tall. I det dikade området har tallmossarna övergått i mer fastmarksartade torvmoar.


Fauna: En bäverdamm har byggts i bäcken.

Påverkan: Myren är tydligt dikespåverkad i SO delen. Den nya skogsbilvägen har en lokal påverkan.

Bedömning: Trattmyren är representativ för regionen med avseende på myr- och vegetationstyper. Myren är hydrologiskt störd i vissa delar men huvuddelen är opåverkad av ingrepp. De värdefullaste delområdena torde vara de blöta strandkärren samt den stora blöta mossen. Hela området med naturskogsholmar, sjöarna, bäcken och de olika myrtyperna bildar en värdefull helhet.

Kallkällmyrorna. nr 83

Värdeklass II
Geokod 18H 4CO5
Areal Ca 60 ha
Flygbild 1986
Höh 350-370 m
VMI-nr 18H 4CO2
Naturvårdsobjekt Del av N81 194




Myrområdet består av Hosjöback-Storflon och Kallkällmyrorna. Den östra delen lutar ner mot SO till Trattmyran. En ny skogsbilväg har skurit av dessa myrar från varandra. Den nordvästra delen är planare och en mindre del lutar mot norr till Hosjön. Myrarna är mestadels en mosaik av *öppna fastmattekärr, risrika skogskärr* och *tallmossar*. I västra delen finns en öppen mosse med strängar och höljor.

Endast lokalt påverkat av vägen i östra delen.

Bedömning: Området är mycket mosaikartat, lite påverkat och utgör en del av ett mycket stort våtmarksområde.

Myrar vid Tjäresjöån. nr 84

Värdeklass II
Geokod 18H 4C 2C9J
Areal 85 ha
Flygbild 1986
Höh 347-355 m
VMI-nr 18H 4CO3
Naturvårdsobjekt N81 203




Myrarna närmast ån finns *öppna mjukmattekärr* som ställvis är videbevuxna. Längre upp uppträder *glest trädbevuxna kärr* och mindre *mosseytor*.

Påverkan av vägen i norra kanten och troligen har området dämts över tidigare.

Bedömning: Det mycket höga värdet ligger i de blöta översvämningskärren som kan hysa ett rikt fågelliv. Myrarna är för övrigt lite påverkade med ordinära myrtyper. Myren ligger i ett mycket stort våtmarksområde.

Myrar NO Stor-Tjäresjön. nr 85

Värdeklass II
Geokod 18H 4C 2E2D
Areal 95 ha
Flygbild 1986
Höh 347-370 m
VMI-nr 18H 4CO4
Naturvårdsobjekt N81 203



Myrområdet sluttar svagt ner mot sjön. *Risrika skogskärr* och *tallmossar* dominerar men några *öppna fastmattekärr* förekommer. Ett flertal fastmarksholmar ligger i mosaik med myrarna och några mindre bäckar har sin upprinning i norra kanten.


I mellersta partiet samt i NV kanten finns dikespåverkan.

Bedömning: Representativt myrområde som är lokalt påverkat. Myrtyperna är ordinära. Det kan finnas källor i norra kanten. Området är värdefullt som en del i ett mycket omfattande våtmarksområde kring Stor-Tjäresjön.



N Gussjöhöjd-Storflon. nr 92

Värdeklass II
Geokod 18H 6B 0B4E
Areal 150 ha
Flygbild 1986
Höh 385-415 m
VMI-nr 18H 6B01
Naturvårdsobjekt N81 105
Fältbesökt. 1978, A Johansson.
1990, S Grundström.




Myren sluttar svagt mot NV och avvattnas till Sundåsbäcken på Jämtlandssidan. Den centrala delen utgörs av en *blandmyr* med ett stort *mjukmattekärr* i mitten. Flera små *tallmossar* och en *öppen mosse* förekommer liksom *skogskärr* i kanterna. Omgivningen utgörs av en mager tallskog.

Extremt fattig vegetation med dominans av ris, flarkstarr, kallgräs, klotstarr och tuvull samt vitmossor i bottenskiktet.

Värdeklass III i fågelinventeringen.

Lokal dikespåverkan i en del av skogskärren i kanterna.

Bedömning: Myren är stor, representativ för regionen och huvudsakligen ostörd. Den stora öppna kärrytan har ett högt ornitologiskt skyddsvärde.



Nr 1

16F 8F 01 (4423) Klass 3
HÄLSINGMYRAN 11 KM S NJURUNDA K:A

10 ha, 235 m ö h. Flygb -86.

Ingår i naturvårdsplan.
Koncentrisk mosse. Ornitologiskt skyddsvärd.

Nr 2

16H 8H 01 (4020) KLASS 3
STORMOSSEN 3 KM O ARMSJÖN

Myrkomplex, 15 ha (15 ha våtm), 35 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
8 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 2: Kantzon, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
2 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 3: Sumpskog
4 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Mindre fläckar, skogbevuxet, blandskog.

Nr 3

16F 9D 01 (3114) Klass 3
BODMYRAN 15 KM S ATTMARS K:A

15 ha, 200 m ö h. Flygb -86.

Ingår i naturvårdsplan.
Rikkärr med sumpnycklar och ängsnycklar.
Störd av vägar och diken.

Källa: Guvå 1972.

Nr 4

16H 9F 01 (0202) KLASS 2
BENGTSMYRAN M FL 6 KM V ARMSJÖN

Myrkomplex, 135 ha (125 ha våtm), 140 m ö h. Flygb. -86.
Fält -90.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
15 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Sträng, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Hölja, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
5 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 3: Sumpskog
27 ha, fördelat på 7 ytor. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, barrskog. Tallmosse av tuvulltyp.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, barrskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, > 25 % krontäckning, barrskog. Sumpgranskog av örf-starrtyp.

Delobj. 4: Topogent kärr
34 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, vintervåg.

Element 1: Golv, > 25 % krontäckning, blandskog. Sumpblandskog av örttyp.

Delobj. 5: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 7 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vitmosstyp.

Element 2: Bäckdråg, 15 % av delobjektytan. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 6: Tjärn
4 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1, underelem. 1: Gungfly, 10 % av delobjektytan. Mjukmattekärr, starr-S. papillosum var.

Nr 5

16H 9G 01 (3549) KLASS 2
ÄLGMYRAN 2 KM NO ARMSJÖN

Myrkomplex, 46 ha (46 ha våtm), 80 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
25 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Lagg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 4: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 2: Topogent kärr
6 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
12 ha, fördelat på 3 ytor. Botaniska värden.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 6

16H 9G 02 (4343) KLASS 3
SAXMYRAN 2 KM NO ARMSJÖN

Myrkomplex, 12 ha (12 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
5 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
4 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
2 ha.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Nr 7

16H 9G 03 (4937) KLASS 3
STORSLÄTTMYRAN 2 KM NNO ARMSJÖN

Myrkomplex, 22 ha (22 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
5 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
9 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Nr 8

16H 9G 04 (4207) KLASS 3
KAVELBROMYRAN 1 KM N ARMSJÖN

Myrkomplex, 26 ha (26 ha våtm), 100 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Sluttande mosse
9 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 3: Lagg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning, väg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
4 ha, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Nr 9

16H 9H 01 (1002) KLASS 3
MYR VID NEDERTJÄRN 1 KM O ARMSJÖN

Våtmarkskomplex, 14 ha (13 ha våtm), 60 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Mad vid vattendrag
6 ha, öppet.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 75 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 2: Mindre fläckar, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Bäck, 10 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Sumpskog
6 ha.

Element 1: Kantzon, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 10

17G 0F 3D Klass 2
GÄSSMYRAN

Se sid 99

Nr 11

17G 1F 01 (3839) KLASS 3
RIGMYRAN OCH TOBAKSMYRAN 17 KM SV STÖDE KA

Kärrkomplex, 65 ha (62 ha våtm), 400 m ö h. Flygb. -88.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
17 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från vintervåg. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 3: Göl, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr
22 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Strand vid vattendrag
6 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Kantzon utmed å, 40 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 2: Kantzon utmed å, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Bäck, 10 % av delobjektytan.

Delobj. 4: Sumpskog
6 ha, fördelat på 5 ytor.

Element 1: Mindre fläckar, skogbevuxet, lövskog.

Nr 12

17G 1G 01 (1A03) KLASS 2
MYRAR VID VÄSTER OCH ULVSJÖÅN 19 KM SV STÖDE

Kärrkomplex, 150 ha (135 ha våtm), 380 m ö h. Flygb. -88.
Det: Stefan Grundström.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
20 ha, mosaikartad fördelning, öppet. Svag lokal påverkan från vintervåg.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
50 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, vintervåg.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
30 ha, fördelat på 9 eller fler ytor. Svag lokal påverkan från vintervåg.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
15 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 5: Strand vid vattendrag
12 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 2: Kantzon utmed å, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 3: Kantzon utmed å, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Mjukmatta.

Nr 13

17G 1H 01 (2235) KLASS 1
STOR OCH LOMSJÖMYRAN M FL 15 KM S STÖDE KA

Myrkomplex, 175 ha (172 ha våtm), 355 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
9 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Lagg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
12 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Lagg, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
60 ha, fördelat på 8 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vintervåg.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
45 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Tuva, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Delobj. 5: Mad vid vattendrag
5 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Kantzon utmed å, 80 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 2: Bäck, 20 % av delobjektytan.

Delobj. 6: Sumpskog
30 ha, fördelat på 7 ytor.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 3: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 14

17G 1H 02 (1315) KLASS 1
BJÖRKBÄCKSMYRAN M FL 16 KM S STÖDE KA

Myrkomplex, 200 ha (190 ha våtm), 355 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Topogent kärr
48 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, öppet.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 3: Tuva, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
62 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
13 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Lagg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
8 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 2: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 5: Sumpskog
15 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 6: Blandmyr av mosaiktyp
25 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 7: Strand vid vattendrag
7 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 60 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Bäck, 10 % av delobjektytan.

Nr 15

17G 1I 01 (0037) Klass 3
KAVELBROMYRAN 18 KM S STÖDE K:A

20 ha, 365 m ö h. Flygb -88.

Förekomst av Kung Karls spira.

Källa: Medelpads flora.

Nr 16

17G 7H 01 (0025) KLASS 3
SVANAMYRAN 12 KM NO TORPSHAMMAR

Myrkomplex, 63 ha (62 ha våtm), 400 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande väg, vinterväg.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande väg, vinterväg.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Tuva, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
30 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 3: Göl, 5 % av delobjektytan.

Nr 17

17G 8H 02 (0532) KLASS 3
MYR VID HÄLLSKREVESJÖN 16 KM NO TORPSHAMMAR

Myrkomplex, 71 ha (70 ha våtm), 335 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Blandmyr av mosaiktyp
35 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vintervåg.

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Tuva, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
12 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag generell påverkan från vintervåg.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Sträng, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Hölja, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Sträng-flarkkärr
10 ha, öppet.

Element 2: Flark, 60 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 3: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
6 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från vintervåg.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Källa: Dynesius och Simonsson. Fågelmyrar i Västernorrlands län.

Nr 18

17G 8H 03 (3039) KLASS 4
DANSARMYRTJÄRN 18 KM NO TORPSHAMMAR

Obestämbar myr, 40 ha (40 ha våtm), 270 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning.

Nr 19

17G 9H 01 (2123) KLASS 2
VITMOSSAMYRAN 21 KM NNO TORPSHAMMAR

Myrkomplex, 47 ha (47 ha våtm), 320 m ö h. Flygb. -86.
Fält -90.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
17 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Tallmosse av nstyp.

Element 2: Hölja, 30 % av delobjektytan. Fastmattemosse av tuvull-S. balticumtyp.

Element 3: Lagg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmattekärr, starr-S. fallax variant.

Element 4: Mosseplan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Delobj. 2: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 4-10 % krontäckning, barrskog. Tallkärr av intermediär vitmosstyp.

Element 2: Mosseplan, 11-25 % krontäckning, barrskog. Tallmosse av tuvulltyp.

Delobj. 3: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vitmosstyp.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 4: Sumpskog
6 ha, fördelat på 4 ytor.

Element 1: Golv, > 25 % krontäckning, barrskog. Sumpgranskog av högörttyp.

Nr 20

17G 9H 02 (3530) KLASS 4
ANUNDGÅRDSMYRAN 23 KM NO TORPSHAMMAR

Obestämbar myr, 65 ha (65 ha våtm), 240 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning, väg.

Nr 21

17H 0B 01 (0440) KLASS 2
LÅNGMYRAN 12 KM SSV ATTMAR KA

Våtmarkskomplex, 80 ha (78 ha våtm), 185 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
32 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning, anslutande väg.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
30 ha, fördelat på 8 ytor. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, kraftledning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Mindre fläckar, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Nr 22

17H 0G 01 (0930) KLASS 1
STORMYRAN-NJURUNDA 6 KM S NJURUNDA KA

Koncentrisk mosse, 55 ha (55 ha våtm), 90 m ö h.
Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården.
Litteratur om objektet finns, ornitologiska värden.

Delobj. 1: Koncentrisk mosse
48 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Hölja, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Lösbotten.

Element 4: Kantzon, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 5: Lagg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Element 6: Höljegöl, 10 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Sumpskog
6 ha, fördelat på 4 ytor.

Element 1: Mindre fläckar, skogbevuxet, blandskog.

Nr 23

17H 0G 02 (0009) KLASS 2
TELÅNGSMYRAN 7 KM S NJURUNDA KA

Myrkomplex, 30 ha (30 ha våtm), 90 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
13 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 28 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Sträng, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Hölja, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 4: Höljegöl, 2 % av delobjektytan.

Element 5: Lagg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
5 ha, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
10 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Kantzon, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 2: Mindre fläckar, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Nr 24

17H 0G 03 (1003) KLASS 2
GÄSTA-STORMYRAN 6 KM S NJURUNDA KA

Kärrkomplex, 35 ha (33 ha våtm), 75 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
14 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 2: Kantzon, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Flarkgöl, 10 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog.

Delobj. 3: Sumpskog
9 ha, fördelat på 5 ytor.

Nr 25

17H 0G 04 (0940) KLASS 3
LOMYRAN M FL 7 KM S NJURUNDA KA

Våtmarkskomplex, 45 ha (45 ha våtm), 80 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Sumpskog
18 ha, mosaikartad fördelning. Stark lokal påverkan från avverkning.

Element 1: Mindre fläckar, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Mindre fläckar, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
15 ha, mosaikartad fördelning, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, stark lokal påverkan från anslutande annan täkt.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 3: Sollgent kärr
10 ha, mosaikartad fördelning, öppet.

Element 1: Mindre fläckar, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Bäckdråg, 18 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 3: Källa, 2 % av delobjektytan.

Nr 26

17H 0H 01 (4349) Klass 3
MYR Ö BERGBODARNA 6 KM O NJURUNDA K:A

8 ha, 20 m ö h. Flygb -86.

Öppet kärr, blandskogskärr, sumpskog.
Vitag, ängsnycklar, myggblomster.
Täkt norr om myren.

Källa: Landskapsflora i Medelpad.

Nr 27

17H 0H 02 (4330) KLASS 2
GÖMYRAN 7 KM O NJURUNDA KA

Kärrkomplex, 20 ha (20 ha våtm), 15 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Förekomst av ängsnycklar.

Delobj. 1: Topogent kärr
12 ha, öppet. Botaniska värden.

Element 1: Gungfly, 90 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 2: Kantzon, 10 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
8 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Mindre fläckar, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Nr 28

17H 0H 3B Klass 2
BODVALLSTJÄRN

Se sid 104

Nr 29

17H 0I 01 (4703) KLASS 3
SJÖMYRAN 9 KM O NJURUNDA KA

Våtmarkskomplex, 23 ha (22 ha våtm), 10 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
6 ha, mosaikartad fördelning, öppet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Mjukmatta.

Element 2: Mindre fläckar, 40 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Sumpskog
15 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv, skogbevuxet, lövskog.

Nr 30

17H 0I 02 (4325) KLASS 3
MYR N LÖRANSVÄGEN 11 KM O NJURUNDA KA

Våtmarkskomplex, 9 ha (9 ha våtm), 30 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
5 ha, öppet.

Element 1: Golv, öppet, lövskog. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 2: Sumpskog
3 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 31

17H 0I 03 (3333) KLASS 1
JUNI-STORMYRAN 12 KM O NJURUNDA KA

Myrkomplex, 42 ha (35 ha våtm), 25 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Ornitologiska värden.

Delobj. 1: Topogent kärr
22 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 2: Kantzon, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
6 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, 65 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 2: Lagg, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 3: Kantzon, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 3: Sumpskog
5 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Mindre fläckar, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 4: Tjärn
3 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Gungfly, 20 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 2: Öar, 10 % av delobjektytan. Lösbotten.

Nr 32

17H 0I 04 (2542) KLASS 1
GRÖNVIKSMYRAN 13 KM O NJURUNDA KA

Topogent kärr, 18 ha (16 ha våtm), 20 m ö h. Flygb. -86. Fält -90.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
15 ha, öppet. Botaniska värden.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastm.kärr av tuvsåv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Element 2: Kantzon, 15 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Tallkärr av intermediär vitmosstyp.

Delobj. 2: Tjärn
2 ha.

Element 1: Golv, > 25 % krontäckning, barrskog. Sumpgranskog av örf-starrtyp.

Nr 33

17H 0I 05 (3148) KLASS 3
MYR NNO GRÖNVIKSMYRAN 13 KM O NJURUNDA KA

Våtmarkskomplex, 15 ha (15 ha våtm), 25 m ö h. Flygb. -86. Fält -90.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
8 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Mjukmattekärr, starr-S. papillosum var.

Element 2: Kantzon, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
3 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, 11-25 % krontäckning, barrskog. Tallmosse av ristyp.

***Delobj. 3: Sumpskog** 4 ha, fördelat på 2 ytor.*

Element 1: Golv, > 25 % krontäckning, blandskog. Sumpblandskog av örttyp.

Nr 34

17H0J0E Klass 1
MYRAR PÅ BRÄMÖN

Se sid 106

Nr 35

17H 1C 01 (1147) Klass 3
MYR VID RUDTJÄRNEN 6 KM S ATTMARS K:A

5 ha, 125 m ö h. Flygb -86.

Förekomst av klibbal.

Källa: Medelpads flora.

Nr 36

17H 1G 01 (0646) KLASS 1
MÅCKELMYRAN 3 KM SO NJURUNDA KA

Myrkomplex, 65 ha (65 ha våtm), 65 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården. Litteratur om objektet finns.

***Delobj. 1: Koncentrisk mosse** 38 ha, öppet.*

Element 1: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 2: Lagg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 3: Kantzon, 8 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 4: Hölja, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 5: Hölja, 5 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 6: Höljegöl, 7 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Dråg, 50 % av delobjektytan. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Element 2: Dråg, 50 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 3: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, lövskog. Mjukmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
10 ha, fördelat på 3 ytor. Botaniska värden.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 37

17H 1H 01 (0329) KLASS 2
MYR VID ÅSSJÖTJÄRNEN 6 KM O NJURUNDA KA

Våtmarkskomplex, 19 ha (17 ha våtm), 25 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Tjärn
1 ha.

Delobj. 2: Topogent kärr
9 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Botaniska värden, diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan. Mjukmatta-lösbotten.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan. Fastmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
8 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Nr 38

17H 2F 01 (2727) KLASS 3
MYR VID TALLSTUGÅN 7 KM NV NJURUNDA KA

Myrkomplex, 13 ha (13 ha våtm), 150 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
5 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 2: Sumpskog
5 ha. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
2 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Mindre fläckar, glest trädtäckt, blandskog., Fastmatta.

Nr 39

17H 2G 01 (2143) Klass 3
MYR VID BÅDARNA 6 KM N NJURUNDA K:A

4 ha, 35 m ö h. Flygb -86.

Öppet kärr, lövrik sumpskog.
Förekomst av brunag, myggblomster och småsileshår.

Källa: Medelpeds flora.

Nr 40

17H 3F 01 (0939) KLASS 3
MYR VID SVARTJÄRNEN 9 KM NNV NJURUNDA KA

Våtmarkskomplex, 13 ha (11 ha våtm), 130 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Tjärn
2 ha. Svag lokal påverkan från kraftledning, vinterväg.

Delobj. 2: Sumpskog
4 ha, fördelat på 5 ytor.

Element 1: Mindre fläckar, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
6 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Förekomst av myggblomster och björnbrodd.

Källa: Landskapsflora i Medelpad.

Nr 41

17H 3H 01 (4109) KLASS 3
SLÄTTMYRAN 8 KM S ALNÖ KA

Kärrkomplex, 8 ha (8 ha våtm), 50 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.
Rikkärr med ängsnyckler, gräsull och dytåg.
Delobj. 1: Topogent kärr
5 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Sumpskog
3 ha, fördelat på 3 ytor. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, lövskog.
Källa: Landskapsflora i Medelpad.

Nr 42
17H 3H 02 (4220) KLASS 4
DJUPMYRAN 9 KM S ALNÖ KA

Topogent kärr, 6 ha (6 ha våtm), 60 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
6 ha, öppet. Diffus strängbildning.
Intermediärt kärr med bl a myggblomster.
Element 1: Golv, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.
Källa: Landskapsflora i Medelpad.
Nr 43

17H 4C 01 (1034) KLASS 3
STOR-BODMYRAN 5 KM N MATFORS

Myrkomplex, 53 ha (52 ha våtm), 250 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
21 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning, vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 68 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 4: Göl, 2 % av delobjektytan.

Element 5: Kantzon, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
5 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
24 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 44

17H 4F 01 (4211) Klass 3
RÖDMYRAN 3 KM N SUNDSVALL STN

4 ha, 100 m ö h. Flygb -86.

Glest skogbevuxet kärr, lövrik sumpskog.
Ängsnycklar och myggblomster.

Källa: Landskapsflora i Medelpad.

Nr 45

17H 4H 01 (3107) KLASS 3
MYRAR N HOVBERGET 5 KM S ALNÖ KA

Våtmarkskomplex, 16 ha (16 ha våtm), 105 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
9 ha, fördelat på 5 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 2: Sumpskog
6 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv, skogbevuxet, lövskog.

Nr 46

17H 5A 01 (1532) KLASS 4
STORMYRAN-LEKMYRAN 19 KM SV INDAL

Myrkomplex, 60 ha (60 ha våtm), 330 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.
Starkt lokalt påverkat av anslutande hyggen, dikning.

Nr 47

17H 5C 01 (1300) KLASS 3
LJUSÅSMYRAN 10 KM V SÄTTNA KA

Myrkomplex, 42 ha (40 ha våtm), 275 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
8 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
8 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Flarkgöl, 5 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Element 3: Bäckdråg, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 4: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 48

17H 5C 02 (0402) KLASS 3
VINSTERMYRAN 10 KM VSV SÄTTNA KA

Myrkomplex, 40 ha (40 ha våtm), 265 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 5 ytor, skogsbevuxet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Göl, 10 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
11 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Sträng, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
5 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 4: Topogent kärr
8 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 3: Tuva, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Nr 49

17H 5C 03 (3225) KLASS 3
MYR VID OXÖGAT 7 KM V SÄTTNA KA

Våtmarkskomplex, 35 ha (34 ha våtm), 240 m ö h. Flygb. -86. Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 15 % av delobjektytan. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Bäck, 5 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Göl, 15 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Sumpskog
12 ha, fördelat på 3 ytor. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 3: Vegetation utmed mindre vattendrag, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 50

17H 6B 01 (4404) KLASS 2
STOR-FÄNGSJÖMYRAN 13 KM SV INDAL

Myrkomplex, 50 ha (50 ha våtm), 275 m ö h. Flygb. -86. Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Excentrisk mosse
18 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 18 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 3: Hölja, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 4: Kantzon, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 5: Lagg, 2 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 2: Sluttande mosse
6 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

***Delobj. 3: Topogent kärr** 7 ha, öppet.*

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 3: Göl, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 4: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Kantzon, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Göl, 5 % av delobjektytan.

Nr 51

17H 6B 02 (4045) KLASS 3
HOLMMYRAN 10 KM SV INDAL

Topogent kärr, 34 ha (33 ha våtm), 250 m ö h. Flygb. -86. Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
22 ha, öppet.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Bäckdråg, 10 % av delobjektytan. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
3 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
5 ha.

Element 1: Kantzon, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Nr 52

17H 7A 01 (2235) KLASS 3
MYRAR VID KVISSLAVATTNET 13 KM V INDAL

Våtmarkskomplex, 60 ha (50 ha våtm), 275 m ö h. Flygb. -86. Det: Stefan Grundström. Åsrygg i anslutning.

Delobj. 1: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta. Diffus strängbildning.

Element 2: Bäckdråg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Vegetation utmed sjöstrand, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
5 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Inslag av backkärr, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
15 ha, fördelat på 7 ytor.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 5: Tjärn
7 ha, fördelat på 3 ytor.

Nr 53

17H 7C 01 (4037) KLASS 3
LÅNGMYRAN 4 KM SV INDAL

Kärrkomplex, 52 ha (51 ha våtm), 200 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
17 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
16 ha, fördelat på 4 ytor. Stark lokal påverkan från avverkning, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 54

17H 7E 01 Klass 3
MYR VID MELLANTJÄRNEN 9 KM O INDAL

10 ha, 185 m ö h. Flygb -86.

Intermediärt kärr.

Källa: Besökt av Per Simonsson 1979.

Nr 55

17H 8B 01 (1740) KLASS 2
STORMYRAN-BÖRKELSJÖN 7 KM V INDAL

Myrkomplex, 50 ha (50 ha våtm), 250 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Bäver förekommer.

Delobj. 1: Topogent kärr
6 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 25 % av delobjektytan. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
15 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Vegetation utmed mindre vattendrag, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
12 ha, fördelat på 4 ytor.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog.

Nr 56

17H 8B 02 (4433) KLASS 2
FLAKAMOMYRAN 8 KM VNV INDAL

Myrkomplex, 90 ha (78 ha våtm), 260 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.
Naturskog I eller i anslutning.

Delobj. 1: Sumpskog
30 ha, mosaikartad fördelning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
25 ha, mosaikartad fördelning, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, vinterväg.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
10 ha, mosaikartad fördelning, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Delobj. 4: Topogent kärr
6 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Fastmatta.

Nr 57

17H 8B 03 (3722) KLASS 3
STARRMYRAN 9 KM V INDAL

Myrkomplex, 30 ha (26 ha våtm), 280 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
9 ha, öppet. Svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 15 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 3: Kantzon, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
14 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 58

17H 8D 01 (4132) KLASS 3
STORMYRAN-LÖVÅSEN 3 KM NO INDAL

Myrkomplex, 55 ha (55 ha våtm), 245 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
9 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Sträng, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 4: Lagg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
5 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, öppet, barrskog.

Delobj. 3: Limnogen strandsumpskog
6 ha.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 90 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Bäck, 10 % av delobjektytan.

Delobj. 4: Topogent kärr
25 ha, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från väg, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 5: Topogent kärr
8 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mindre fläckar, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Nr 59

17H 8E 01 (0214) KLASS 3
LOMLÄRKEN M FL 5 KM O INDAL

Myrkomplex, 42 ha (41 ha våtm), 210 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
14 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Göl, 10 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Element 3: Dråg, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
5 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
18 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 60

17H 8E 02 (1030) KLASS 3
NORSMYRAN 5 KM O INDAL

Våtmarkskomplex, 45 ha (42 ha våtm), 200 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Sumpskog
21 ha, fördelat på 2 ytor. Svag lokal påverkan från dikning, väg.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 80 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
21 ha, mosaikartad fördelning, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, väg.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
3 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Mindre fläckar, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Nr 61

18G 0G 01 (4604) KLASS 3
KRÅKMYRAN 3 KM N GIMÅFORS

Svagt välvd mosse, 30 ha (30 ha våtm), 205 m ö h. Flygb. -89.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
30 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, 65 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 2: Lagg, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Kantzon, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Nr 62

18G 0I 01 (3435) KLASS 2
KVÄCKLINGEN-SLÄTTMYRAN 13 KM S JÄRKVISSLE

Våtmarkskomplex, 48 ha (43 ha våtm), 180 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Omitologiska värden, våtmarken är en sänkt sjö.

Delobj. 1: Bevuxen sjö
12 ha, öppet. Svag generell påverkan från dikning. Åkermark ansluter.

Element 1: Gungfly, 60 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr
12 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning, vinterväg.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 2: Kantzon, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
9 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Mjukmatta.

Element 2: Kantzon, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 3: Vegetation utmed mindre vattendrag, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 4: Obestämbar myr
10 ha, glest trädtäckt. Stark generell påverkan från dikning. Åkermark ansluter.

Nr 63

18G 1I 01 (0604) KLASS 3
OFLOMYRAN 11 KM S JÄRKVISSLE

Myrkomplex, 68 ha (60 ha våtm), 185 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Tjärn 11 ha.

Element 1: Gungfly, 30 % av delobjektytan. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 2: Topogent kärr
25 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
16 ha, fördelat på 3 ytor. Svag lokal påverkan från dikning, vinterväg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Strand vid vattendrag
5 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Mjukmatta.

Element 2: Bäck, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 5: Mosse av nordlig typ
4 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, öppet, barrskog.

Nr 64

18G 2G 01 (3536) KLASS 2
ERIKSMYRORNA 12 KM V JÄRKVISSLE

Våtmarkskomplex, 52 ha (50 ha våtm), 425 m ö h. Flygb. -89.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
14 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
6 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
18 ha, fördelat på 3 ytor. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Nr 65

18G 2H 01 (3505) KLASS 1
LOVIK-STORFLON M FL 9 KM V JÄRKVISSLE

Myrkomplex, 310 ha (240 ha våtm), 440 m ö h. Flygb. -89.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Naturreservat. Naturskog i eller i anslutning.

Delobj. 1: Topogent kärr
60 ha, fördelat på 7 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Bäckdråg, 5 % av delobjektytan. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 2: Topogent kärr
100 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
60 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, öppet.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Kantzon, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 4: Göl, 5 % av delobjektytan.

Nr 66

18G 2H 02 (2525) Klass 3
MYR VID LÖVÅSTJÄRNARNA 8 KM V JÄRKVISSLE

20 ha, 390 m ö h. Flygb -89.

Rikkärr med gungflyn och gölsystem.

Källa: Landskapsflora i Medelpad.

Nr 67

18G 2H 03 (4322) KLASS 3
DRAGARFLON-STORFLON 7 KM V JÄRKVISSLE

Kärrkomplex, 87 ha (85 ha våtm), 425 m ö h. Flygb. -89.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
12 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
10 ha, öppet. Svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
33 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
28 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Bäckdråg, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 68

18G 3J 0B Klass 2
SKARPMYRAN, LÅNGMYRAN,
BJÖRNTJÄRNEN

Se sid 111

Nr 69

18G 4J 01 (3220) KLASS 3
STORFLON-ÅNGSJÖN 7 KM NNO JÄRKVISSLE

Myrkomplex, 115 ha (108 ha våtm), 350 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Blandmyr av mosaiktyp
9 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 2: Sluttande mosse
20 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Hölja, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
12 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
45 ha, skogsbevuxet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 70

18G 5J 01 (1944) Klass 3
STRUPFLON-BOMYRAN 12 KM N JÄRKVISSLE

40 ha, 345 m ö h. Flygb -89.

Tallmosse, öppet kärr, skogskärr, strandkärr, tjärnar. Skogssnäppa och trana.

Källa: Dynesius och Simonsson. Fågelmyrar i Västernorrlands län.
Nr 71

18G 5J 02 (3238) Klass 3
STORMYRAN Ö VITHÖJDEN 13 KM N JÄRKVISSLE

10 ha, 340 m ö h. Flygb -89.

Öppet kärr, blandmyr, tjärn.
Skogssnäppa.

Källa: Dynesius och Simonsson. Fågelmyrar i Västernorrlands län.

Nr 72

18H 0B 01 (4030) KLASS 3
MYR VID SVARTTJÄRNEN 8 KM O LIDENS KA

Myrkomplex, 75 ha (73 ha våtm), 375 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
18 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning, vintervåg.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Kärrfönster, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
37 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning, vintervåg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Sträng, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Mindre fläckar, 95 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Göl, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 4: Tjärn
3 ha.

Element 1: Gungfly, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Lösbotten.

Nr 73

18H 1B 01 (1030) KLASS 1
STOR-FINNMYRAN 7 KM O LIDENS KA

Myrkomplex, 40 ha (38 ha våtm), 380 m ö h. Flygb. -86. Fält -90. Storomr BA.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården.

Delobj. 1: Excentrisk mosse
20 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Sträng, 15 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmattemosse av tuvull-S. balticumtyp.

Element 4: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Lösbottenkärr av oligotrof typ.

Element 5: Hölja. Fastm.kärr,tuvsäv-S.papillosum-compactumtyp.

Element 6: Kantzon, 10 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 7: Lagg, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
8 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, barrskog. Tallmosse av ristyp.

Element 2: Golv, 45 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Tallkärr av klotstarrtyp.

Element 3: Tuva, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från avverkning.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 74

18H 1B 02 (0030) KLASS 3
MYR S STORFINNMYRAN 7 KM O LIDENS KA

Myrkomplex, 40 ha (40 ha våtm), 400 m ö h. Flygb. -86. Storomr BA.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
22 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Tuva, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
14 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Nr 75

18H 2B 01 (2010) KLASS 3
BODACK-STORMYRAN 9 KM NO LIDENS KA

Myrkomplex, 60 ha (60 ha våtm), 315 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Sluttande mosse
22 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 2: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 3: Hölja, 20 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
14 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
8 ha, öppet.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Dråg, 28 % av delobjektytan. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Källa, 2 % av delobjektytan.

Delobj. 5: Sumpskog
5 ha, fördelat på 3 ytor. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Nr 76

18H 2B 02 (0610) KLASS 3
SKÄLSJÖMYRAN 8 KM NO LIDENS KA

Myrkomplex, 55 ha (52 ha våtm), 310 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.
Åsrygg i anslutning, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Sluttande mosse
12 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Sträng, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Hölja, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 4: Kantzon, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 5: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
7 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vintervåg.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Lagg, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
8 ha, öppet. Svag lokal påverkan från vintervåg.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Bäckdråg, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 4: Sumpskog
20 ha, fördelat på 3 ytor. Svag lokal påverkan från vintervåg.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Nr 77

18H 2C 04 (4912) KLASS 3
LADMYRAN 9 KM V STOR-LAXSJÖN

Myrkomplex, 218 ha (202 ha våtm), 355 m ö h. Flygb. -86.
Storomr BB.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Sluttande mosse
17 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Sträng, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Hölja, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 4: Göl, 5 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
60 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 2: Kantzon, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
70 ha, fördelat på 8 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
35 ha, fördelat på 7 ytor. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 3: Vegetation utmed mindre vattendrag, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 5: Sträng-flarkkärr
6 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Sträng, (otydl.), 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Flark, 70 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Nr 78

18H 3B 01 (1424) KLASS 2
MYRAR VID STOR-ABBORRTJÄRN 14 KM NNO LIDENS KA

Myrkomplex, 75 ha (55 ha våtm), 260 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Ornitologiska värden, sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 5 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 2: Vegetation utmed sjöstrand, 40 % av delobjektytan. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
20 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 2: Hölja, 45 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Kantzon, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 4: Göl, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Tjärn
8 ha, fördelat på 3 ytor.

Nr 79

18H 3C 01 (3549) KLASS 2
STORSVEDMYRAN M FL 6 KM VNV STOR-LAXSJÖN

Myrkomplex, 190 ha (150 ha våtm), 350 m ö h. Flygb. -86.
Storomr BC.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Området planeras kalkas, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
85 ha, mosaikartad fördelning, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, anslutande väg.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
35 ha, mosaikartad fördelning, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Sträng, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
25 ha, mosaikartad fördelning.

Element 1: Mindre fläckar, 80 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Göl, 20 % av delobjektytan.

Element 3: Mindre fläckar, 20 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 5: Topogent kärr
40 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, vintervåg.

Element 1: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Vegetation utmed sjöstrand, 70 % av delobjektytan. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Flarkgöl, 5 % av delobjektytan.

Nr 80

18H 3C 02 (4024) KLASS 4
RÖDMYRAN-LAPPÅSMYRAN 8 KM V STOR-LAXSJÖN

Obestämbar myr, 160 ha (150 ha våtm), 400 m ö h.
Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning, anslutande väg.

Nr 81

18H 3D 01 (4516) KLASS 2
NYBYGGARSMYRAN 5 KM NV STOR-LAXSJÖN

Myrkomplex, 187 ha (170 ha våtm), 370 m ö h. Flygb. -86. Storomr BE.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Ornitologiska värden.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
18 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Flark, 30 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 2: Sträng, 20 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Flarkgöl, 20 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Element 4: Golv, 30 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 2: Topogent kärr
47 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Bäckdråg, 20 % av delobjektytan. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
10 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Delobj. 4: Topogent kärr
27 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från avverkning, dikning.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Kantzon, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 5: Topogent kärr
32 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 6: Sumpskog
24 ha, fördelat på 4 ytor. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog.

Nr 82

18H 4C 01 (0646) KLASS 2
TRATTMYRAN 7 KM NV STOR-LAXSJÖN

Myrkomplex, 135 ha (123 ha våtm), 350 m ö h. Flygb. -86. Storomr BC.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
14 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan.

Element 3: Flarkgöl, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 4: Mad vid vattendrag
13 ha, öppet.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 2: Kantzon, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Bäck, 10 % av delobjektytan.

Delobj. 5: Sluttande mosse
20 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 2: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 3: Hölja, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 4: Hölja, 10 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 6: Mosse av nordlig typ
17 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Sträng, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Hölja, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 7: Blandmyr av mosaiktyp
25 ha, glest trädtäckt. Svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Göl, 10 % av delobjektytan.

Nr 83

18H 4C 02 (1030) KLASS 2
KALLKÄLLMYRORNA M FL 8 KM NV STOR-LAXSJÖN

Myrkomplex, 120 ha (95 ha våtm), 360 m ö h. Flygb. -86. Storomr BC.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Sluttande mosse
12 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 2: Hölja, 50 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 4: Göl, 10 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 7 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta. Inslag av backkärr.

Element 2: Dråg, 18 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 3: Källa, 2 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Topogent kärr
30 ha, mosaikartad fördelning, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
30 ha, mosaikartad fördelning, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan. Fastmatta-mjukmatta.

Nr 84

18H 4C 03 (2230) KLASS 2
MYR VID TJÄRESJÖÅN 10 KM NV STOR-LAXSJÖN

Kärrkomplex, 110 ha (100 ha våtm), 350 m ö h. Flygb. -86. Storomr BC.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Mad vid vattendrag
40 ha, öppet. Svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Kantzon utmed å, 80 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 3: Bäck, 10 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr
9 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flarkgöl, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Topogent kärr
45 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 85

18H 4C 04 (2939) KLASS 2
MYR NO STOR-TJÄRESJÖN 7 KM NV STOR-LAXSJÖ

Myrkomplex, 82 ha (72 ha våtm), 355 m ö h. Flygb. -86. Storomr BC.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
13 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
24 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 55 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Tuva, 10 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
20 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Sumpskog
7 ha.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog.

Nr 86

18H 4C 05 (4312) KLASS 3
STOR-KONTMYRAN 12 KM NV STOR-LAXSJÖN

Myrkomplex, 130 ha (113 ha våtm), 355 m ö h. Flygb. -86. Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
25 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Obestämbar myr
55 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark generell påverkan från dikning.

Nr 87

18H 4D 01 (1024) KLASS 3
SMÅTJÄRNSMYRORNA 5 KM NV STOR-LAXSJÖN

Myrkomplex, 85 ha (73 ha våtm), 400 m ö h. Flygb. -86. Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
16 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Gungfly, 35 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
12 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan.

Element 3: Tuva, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
8 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 4: Topogent kärr
34 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag generell påverkan från dikning, stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Tjärn
4 ha, fördelat på 3 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Nr 88

18H 5B 01 (2322) KLASS 3
S GUSSJÖHÖJD-STORFLON 3 KM O STOR-GUSSJÖN

Myrkomplex, 60 ha (59 ha våtm), 345 m ö h. Flygb. -86. Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Blandmyr av mosaiktyp
11 ha, öppet.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
9 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 88 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 3: Göl, 2 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Topogent kärr
3 ha, öppet.

Element 1: Gungfly.

Delobj. 4: Limnogen strandsumpskog
6 ha, fördelat på 3 ytor. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande väg.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 90 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Bäck, 10 % av delobjektytan.

Delobj. 5: Blandmyr av mosaiktyp
18 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 6: Mosse av nordlig typ
8 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog.

Nr 89

18H 5B 02 (4533) KLASS 4
LILL-FÄSTMANFLON 4 KM O STOR-GUSSJÖN

Myrkomplex, 63 ha (62 ha våtm), 400 m ö h. Flygb. -86. Storomr BD.
Det: Stefan Grundström.
Starkt lokalt påverkat av anslutande hyggen, dikning, anslutande väg.

Nr 90

18H 5C 01 (2824) Klass 3
FARFARSMYRAN 13 KM NV STOR-LAXSJÖN

15 ha, 370 m ö h. Flygb -86.

Blandmyr, skogskärr.
Värdeklarr II i fågelinvent med bl a tofsvipa och skogssnäppa.

Källa: Dynesius och Simonsson. Fågelmyrar i Västernorrlands län.

Nr 91

18H 5C 02 (1040) KLASS 3
RENMYRAN-HÄLLMYRAN 10 KM O STOR-GUSSJÖN

Myrkomplex, 95 ha (84 ha våtm), 350 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Strång-flarkkärr
6 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Flark, 85 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 2: Flarkgöl, 5 % av delobjektytan.

Element 3: Strång, 10 % av delobjektytan. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Soligent kärr
10 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 93 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 2: Göl, 5 % av delobjektytan.

Element 3: Källa, 2 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Topogent kärr
45 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mindre fläckar, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 4: Vegetation utmed mindre vattendrag, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
9 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Strång, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 5: Topogent kärr
7 ha, öppet.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 30 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Nr 92

18H 6B 01 (0415) KLASS 2
N GUSSJÖHÖJD-STORFLON 3 KM O STOR-GUSSJÖN

Myrkomplex, 165 ha (152 ha våtm), 405 m ö h. Flygb. -86. Fält -90.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
65 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från avverkning, svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Göl, 1 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
35 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Strång, 10 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 3: Hölja, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmattekärr, kallgräs-vitmoss variant.

Element 4: Hölja. Fastmattemosse av tuvull-S. balticumtyp.

Element 5: Tuva, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 6: Kantzon, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
21 ha, öppet.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan. Mjukmattekärr, starr-S. fallax variant.

Element 2: Golv. Mjukmattekärr, kallgräs-vitmoss variant.

Element 3: Tuva, 5 % av delobjektytan.

Element 4: Dråg, 15 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
25 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Fastmattemosse av tuvull-S. balticumtyp.

Element 2: Tuva, 20 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 3: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 4: Golv. Mjukmattekärr, kallgräs-vitmoss variant.

Element 5: Mosseplan, 11-25 % krontäckning, barrskog. Tallmosse av ristyp.

Element 6: Golv, 4-10 % krontäckning, barrskog. Tallkärr av klotstarrtyp.

Nr 93

18H 6B 02 (1035) KLASS 3
STOR-FÄSTMANFLON M FL 5 KM O STOR-GUSSJÖN

Myrkomplex, 130 ha (115 ha våtm), 375 m ö h. Flygb. -86. Fält -90. Storomr BD.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Sluttande mosse
30 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Sträng, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 3: Hölja, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmattemosse av tuvull-S. balticumtyp.

Delobj. 2: Sollgent kärr
14 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 23 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 3: Källa, 2 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
7 ha, öppet.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 15 % av delobjektytan.

Element 3: Sträng, 15 % av delobjektytan.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
12 ha, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 2: Hölja, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 5: Topogent kärr
22 ha, glest trädtäckt. Stark generell påverkan från dikning. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Lösbotten.

Delobj. 6: Topogent kärr
28 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 94

18H 6B 03 (1842) KLASS 3
BÄNKMYRAN 6 KM O STOR-GUSSJÖN

Myrkomplex, 85 ha (80 ha våtm), 360 m ö h. Flygb. -86. Storomr BD.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Sollgent kärr
15 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 17 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 3: Tuva, 3 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
4 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flarkgöl, 55 % av delobjektytan.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
9 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
18 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.


Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Tuva, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.


Delobj. 5: Topogent kärr
27 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

TIMRÅ KOMMUN



Flärkmyran. nr 1

Värdeklass II
Geokod 17H 5I 4C3H
Areal 15 ha
Flygbild 1988
Höh 65 m
VMI-nr 17H 5I01
Naturvårdsobjekt N62 014
Fältbesökt 1991-08, S Grundström.
1993-07, L Sturesson mfl.



Flärkmyran är en plan myr som helt domineras av en *tallmosse* med relativt tätt trädskikt. Myren har en svag tendens till välvning men saknar riktiga laggkärr. Runt om och främst då i östra delen finns *sumpskog*.

Mossen är av ordinär ristyp med rik förekomst av skvattram vilket är ovanligt vid kusten. Sumpskogen är lövrik och högörtdominerad. Klibbal är ställvis dominerande men även glasbjörk, tall, gran och viden är vanliga.


En del av sumpskogen är avverkad och består av en ganska ung lövskog. Ingen hydrologisk påverkan finns.

Bedömning: Flärkmyran är ett vackert exempel på en tallmosse med svag välvning och har ett visst raritetsvärde. Myren är förhållandevis stor för att vara i denna trakt och den är hydrologiskt ostörd.

Källa: Sturesson, L. 1994. Naturinventering i Tynderö. Rapport från Länstyrelsen i Västernorrlands län.

Bärängskärret. nr 2

Värdeklass II
Geokod 17H 5J 2B0G
Areal 5 ha
Flygbild 1986
Höh 15 m
VMI-nr 17H 5J01
Naturvårdsobjekt N62 015
Fältbesökt 1991-08, S Grundström.
1993-07, L Sturesson mfl.



Myren som är ett i huvudsak *öppet kärr* omger Bärängstjärnen som numer är en liten vattensamling. Myren ligger i ett gammalt odlingslandskap och de skogskärr av lövrika sumpskogar som omger myren är igenväxta gamla ängar och betesmarker.

Skogsbården är gråal och glasbjörks-dominerad och örtrik. Enstaka exemplar av knottblomster (hotkategori 2) brukar ses årligen i lövskogen. Själva kärret hyser allt från lösbottengungfly till fastmattor. Intermediär till rik flora med bla kärrsälting och snip som vanliga arter. Av exklusivare inslag finns tagelstarr och mossorna Helodium blandowii och Sphagnum teres.


Myren är påverkad av tidigare markanvändning, främst slåtter och bete men förefaller att vara hydrologiskt ganska ostörd.

Bedömning: Liten kustvåtmark med mycket höga botaniska bevarandevärden.

Källa: Sturesson, L. 1994. Naturinventering i Tynderö. Rapport från Länstyrelsen i Västernorrlands län.

Hammermyran. nr 3

Värdeklass II
Geokod 17H 6I 3B2A
Areal 55 ha
Flygbild 1986
Höh 110 m
VMI-nr 17H 6I01
Naturvårdsobjekt N62 011
Fältbesökt, 1991-06, S Grundström.
R Lidberg mfl. Medelpads flora.



Hammermyran ligger i utkanten av det kalkrika Söråkerlandet. Myren är i huvudsak plan och avvattnas i mestadels mot söder via Gasabäcken. Den östra delen består av ett *öppet kärr* som i kanterna övergår i *buskrika kärr* och *skogskärr.* Mot väst och nordväst tätnar trädskiktet och skogskärr samt *sumpskog* blir dominerande. Den V delen utgörs av en *tallmosse* som har en svag tendens till välvning.

Vegetation och flora: Våtmarken har en fattig till intermediär vegetation. Träd- och buskskiktet i de öppnare delarna domineras av glasbjörk och dvärgbjörk. Skogskärren och sumpskogen har ett heterogent trädskikt med inslag av glasbjörk, gran gråal, klibbal, sälg och viden.

Fältskiktet är ställvis artrikt i kärren med allmän förekomst av intermediära arter som snip och hirsstarr samt enstaka fynd av sumpnycklar samt sumpröksvamp (Bovista paludosa). Mycket varierat fältskikt i sumpskogen och skogskärren med fynd av gräset glesgröe.

Tallmossen har rätt så hög krontäckning med markvegetation av vanlig ris/tuvull-typ.

Bottenskiktet är vitmossedominerat i hela våtmarken med bla Sphagnum subsecundum, S fallax och S girgensonii som vanliga arter. I den kraftigt störda delen närmast tippen finns en märklig myrvegetation där bla vägtåg är vanlig.


Fauna: Häckande trana 1991.

Påverkan: Den östra delen är kraftigt påverkad av Gasabäckstippen. Ett läckage av bor-haltigt lakvatten på 70-talet visar sig ännu i form av döda träd och buskar. Hyggena på norra sidan stör inte våtmarken nämnvärt. Sumpskogen ger delvis ett orört intryck med förekomsten av lågor och äldre träd. Smärre partier av sumpskogen har avverkats.

Bedömning: Hammermyran är det största sammanhängande våtmarksområdet i trakten. Myren är mångformig med avseende på våtmarks- och vegetations-typer och hyser en rätt stor yta med opåverkad sumpskog/skogskärr och flera sällsynta arter. Den kraftiga påverkan som tippen trots allt utgör ger dock myren ett svagare bevarandevärde.

Stormyran-Storsjön. nr 9

Värdeklass II
Geokod 17H 7J 3B5A
Areal 30 ha
Flygbild 1986
Höh 65 m
VMI-nr 17H 7J01
Naturvårdsobjekt N62 016
Fältbesökt. 1979-08, P Simonsson. 1992, S Grundström.



Strormyran är beläget på en halvö i Storsjön 8km öst om Hässjö k:a. Myren domineras helt av en

svagt välvd mosse som är ganska tätt bevuxen med låga tallar. Större och mindre ytor med mossehöljor förekommer. På några ställen finns en antydan till lagg men mest övergår mossen på ett diffust sätt i omgivande fastmark eller i blandsumpskog som ställvis omger myren. I väster och öster övergår mossen direkt i en smal strandäng.


Vegetation och Flora: Av ordinär rismossetyp med främst ljung, tuvull och Sphagnum fuscum som dominanter. Höljorna är omväxlande av mjukmatte- och lösbottentyp med bl a tranbär, tuvull, rundsileshår och Sphagnum balticum som vanliga arter.

Påverkan: Myren är hydrologiskt ostörd och saknar andra allvarliga ingrepp.

Bedömning: Stormyran är en medelstor ostörd mosse i kustnära miljö. Den befinner sig i ett intressant utvecklingsstadium med ett svagt välvt mosseplan och höljor. Bevarandevärdena är i första hand vetenskapliga.

Edsta-Stormyran. nr 11

Värdeklass II
Geokod 18H 0F 2E7B
Areal 60 ha
Flygbild 1986
Höh 215-230 m
VMI-nr 18H 0F01
Naturvårdsobjekt N62 058
Fältbesökt 1989-10, S Grundström.



Edsta-Stormyran ligger i ett myrfattigt bergsområde mellan Ljustorpsåns och Mjällåns dalgångar. Myren är plan-svagt sluttande mot öster. Myren avvattnas mot SO via Kolningsbäcken till Mjällån.

Öppna kärr upptar en stor del av myrytan. Kärren är främst av mjukmattetyp men även fastmattor och små lösbottenytor förekommer. I östra delen finns en *tallmosse* som delvis är svagt strukturerad i strängar och höljor.

Den västra delen har ej besökts men verkar bestå av trädbevuxna kärr i mosaik med öppna kärrstråk och små mosseytor.


Myren har en genomgående fattig vegetation. Dominerande arter i kärren är främst tuvsäv, tuvull och en högstarrhybrid. I bottenskiktet dominerar främst Sphagnum balticum och Sphagnum papillosum. Mossen är mest en vanlig ris/Sphagnum fuscum-typ men även tuvull/S balticum-dominans förekommer.

Myren saknar allvarlig påverkan.

Bedömning: Edsta-Stormyran hyser rätt stora och blöta myrytor i ett område som annas är våtmarksfattigt. Myren är helt opåverkad av dikning och andra synliga ingrepp. Myr- och vegetationstyperna är representativa för regionen.

Korstjärnmyran. nr 12

Värdeklass II
Geokod 18H 1F 4C0F
Areal 100 ha
Flygbild 1986
Höh 85 m
VMI-nr 18H 1F01
Naturvårdsobjekt. N62 022
Fältbesökt. 1979-06, K Ekström.



Korstjärnmyren ligger på en vattendelare och avvattnas både mot norr och söder. Myren är en mosaik av *tallmossar, blandmyrar,* risrika *skogskärr* och *öppna kärr.* I västra delen ligger flera tjärnar med gungflyn runt om.

Värdeklass III i fågelinventeringen med bla häckande ljungpipare.


Skogsbilvägen skär av en del av tillrinningen från både öster och väster men detta är troligen en marginell påverkan.

Bedömning: Ett relativt stort och ostört våtmarksområde med högt ornitologiskt bevarandevärde. Representativa våtmarkstyper med troligen fattig vegetation.

Källa: Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Bredsjö-Stormyran m fl. nr 13

Värdeklass II
Geokod 18H 2C 3D0A
Areal 170 ha
Flygbild 1986
Höh 325-355 m
VMI-nr 18H 2C01, 03
Naturvårdsobjekt. Ingår i NR 62 030
Fältbesökt. 1983, M Muhr.
1993, S Grundström, S Uppsäll.



Myrområdet ligger öster om Stor-Öratjärnen på en vattendelare. Våtmarkerna lutar svagt mot sjön och ner mot Ådalsån i norr. Mitt på myren finns en öppen *strängad mosse* och ett *sluttande öppet kärr*. Den västra delen är en mosaik av *tallkärr, tallmossar* och tuvade *blandmyrar* samt fastmarksholmar. I öster och norr finns små kärrytor, *skogskärr* och *gransumpskog*. I anslutning till Ådalsån finns *strandkärr*.

Vegetation: Fattig kärrvegetation och risvegetation med lågvuxen tall dominerar. Den *strängade* mossen har stora mjukmattehöljor med kallgräs och tuvull som vanliga arter och en omgivande lagg är högstarrdominerad. Trådstarr, tuvull, blåtåtel, tuvsäv och vattenklöver är vanliga i kärren och i östra delen finns svagt intermediära partier där bl a dvärglummer växer. I ett urskogsområde längs en bäck finns bl a vedsvampen ullticka samt rikligt med spindelblomster.


Påverkan: I östra kanten finns några diken som delvis vuxit igen. De delar som avvattnas ner mot Stor-Öratjärnen förefaller dock vara helt hydrologiskt ostörda. I östra delen har flera kärrytor våtmarkskalkats.

Bedömning: Myrområdet är tämligen stort och i huvudsak hydrologiskt opåverkat av dikningar och vägbyggen. Myren är representativ med avseende på vegetation och våtmarkstyper förutom den stora strängade mossen och det sluttande öppna kärret som båda har ett visst raritetsvärde. En stor del av omgivningen är ostörd av modernt skogsbruk och förutom urskogen längs bäcken finns i östra delen flera intressanta naturskogspartier.

Vitmossamyran. nr 14

Värdeklass I
Geokod 18H 2C 1C7G
Areal 100 ha
Flygbild 1986
Höh 335-350 m
VMI-nr 18H 2C02
Naturvårdsobjekt Ingår i NR62 030.
Fältbesökt. 1990, S Grundström.
1993, S Grundström, S Upsäll.

Den södra delen av Vitmossamyran sluttar svagt mot SV och avvattnas till Björnåsbäcken. Den norra delen är mera plan och avvattnas via Stor-öratjärnen ut i samma bäck. Myrens sydvästra del



består av en stor *strängad mosse* med strängar och höljor som ställvis övergår i blandmyr.

Den norra delen samt den sydöstra delen är mer heterogen med en mosaik av *blandmyrar, tallmossar, öppet mjukmattekärr,* samt *sumpskog* och *tallkärr* vid kanterna.

Vegetation och Flora: Fattig kärrvegetation och rismossevegetation med lågvuxen tall dominerar de öppnare delarna. På den öppna mossen finns dessutom mjukmattor med tuvull- och kallgräsdominans samt små kärrfönster med ett intermediärt inslag. Av det senare märks bland annat mossorna Loeskypnum badium, Warnstorfia sarmentosa och Sphagnum warnstorfii.


Mot kanterna vidtar ris/fräken-dominerad gransumpskog och klotstarrtallkärr.

Påverkan: Myren är i sin helhet hydrologiskt ostörd med ett litet äldre dike i mittersta delen som enda ingrepp. Omgivningarna samt en del av kantsumpskogen är ställvis hårt avverkningspåverkat.

Bedömning: Myrkomplexet är stort, variationsrikt och hydrologiskt så gott som ostört. Myr- och vegetationstyperna är representativa för regionen med undantag för den stora mossen med välutbildade sträng- och höljestrukturer som ger myren ett raritetsvärde.

Myrar i Fageråsen. nr 15

Värdeklass II-III
Geokod 18H 3D 1C1C
Areal 120 ha
Flygbild 1986
Höh 320-360 m
VMI-nr 18H 3C01, 3D03.
Naturvårdsobjekt N62 026
Naturreservat.
Fältbesökt. 1991, S Grundström, S Uppsäll.



Fageråsen är en utpräglad skogs-myrmosaik med smala myrstråk, bäckar, skogsholmar och en tjärn, Abborrtjärn. De våtmarkstyper som förekommer är *strängad mosse, blandmyr, skogskärr, sumpskog* och små öppna kärrytor. Den strängade mossen är delvis en övergångstyp mot blandmyr med några tydligt terrasserade flarkgölar.

Vegetation: Fattig vegetation genomgående med dominans av ris-tuvull-vitmoss samhällen. Sparsamt förekommer högstarrarter samt örtrika skogstyper vid bäckarna. De hotade arterna ringlav och liten barkplattbagge förekommer sparsamt i skogsvåtmarkskomplexet.


Påverkan: Området är helt ostört av modernt skogsbruk vilket är unikt för regionen. Stora delar av våtmarkerna, både öppna och trädbevuxna har tyvärr utsatts för kalkning vid två tillfällen.

Bedömning: Fageråsen-myrarna har ett mycket högt bevarandevärde främs pga mosaiken våtmark-naturskog. Raritetsvärdet i form av terrassgölar och hotade arter bidrar också.

Källa: Simonsson, P. Urskogar och naturskogar i Västernorrlands län, rapport 1979:11. Länstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Stentjärnsmyrorna-Staffansmyrorna. nr 16

Värdeklass II
Geokod 18H 3D 2C4E
Areal ca 420 ha
Flygbild 1986
Höh 325-390 m
VMI-nr 18H 3D02, 03
Naturvårdsobjekt N62 018
Fältbesökt. 1979-07, K Ekström. 1981, K Due och M Muhr.
1991-06, S Grundström och S Uppsäll (Staffansmyrorna).



Det stora våtmarkskomplexet sluttar svagt mot söder och avvattnas genom Stentjärnsbäcken som rinner centralt i området. Till objektet räknas här också den del av Göransmyran som rinner mot Stentjärnsbäcken.

En stor del av ytan upptas av *skogskärr, tallmossar och barrsumpskog* som delvis ligger i mosaik med fastmark. Längs bäcken finns en heterogen *strandskog*. De myrtyper som finns är *öppna kärr* som delvis är soligena, mosaikartade *blandmyrar,* en mindre *strängblandmyr* och en *strängad mosse.*

Vegetation och Flora: I huvudsak är vegetationen fattig med dominans av främst ris, klotstarr, taggstarr, trådstarr, tuvull och vitmossor. Längs bäcken finns rikare växtsamhällen med stort örtinslag och en blandning av gran och björk i trädskiktet.

Ett mindre rikkärr med källor finns i den östra delen av Staffansmyrorna. Detta domineras av främst bladvass och blåtåtel. Här finns en rik brunmossflora med krävande arter som Sphagnum teres, Warnstorfia sarmentosa och Campylium stellatum.

I närheten av detta kärr finns små sumpskogsytor med rik flora. Några av de arter som förekommer är spindelblomster, repestarr, ögonpyrola samt mossan Helodium blandowii.

Vid en källa i centrala delen av Staffansmyran växer krävande mossor såsom Philonotis seriata och Scorpidium cossonii.

Fauna: Värdeklass III i fågelinventeringen med en ordinär myrfågelfauna där ljungpipare är det intressantaste inslaget (minst tre häckande par i juni 91). Bäver-dämningar längs bäcken.

Påverkan: Lokala skador av dikning i östra kanten och av vägen i västra delen. Den kraftigaste påverkan härrör från den våtmarkskalkning som gjorts av hela Ådalsåns vattensystem. I större delen av kärren och längs bäckzonen är bottenskiktet helt utslaget eller kraftigt påverkat. Även smärre mossepartier har kalkats.

Bedömning: Ett mycket stort sammanhängande myr- och sumpskogsområde med i huvudsak fattig men representativ våtmarksvegetation. Högt skyddsvärde ur fågelsynpunkt. Den kraftigaste påverkan som kalkningen medfört på vegetationen drar ned värdeomdömet. De värdefullaste delområdena är rikkärret och källorna på Staffansmyrorna, delar av strandskogen, de rika sumpskogsytorna samt strängblandmyren.

Nr 1

17H 5I 01 (4406) KLASS 2
FLÄRKMYRAN 3 KM NV TYNDERÖ KA

Våtmarkskomplex, 10 ha (10 ha våtm), 65 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
4 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan.

Delobj. 2: Sumpskog
6 ha. Svag lokal påverkan från avverkning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Nr 2

17H 5J 01 (2010) KLASS 2
BÄRÅNGSKÄRRET 3 KM O TYNDERÖ KA

Våtmarkskomplex, 5 ha (5 ha våtm), 15 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
3 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning. Botaniska värden.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Bäckdråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Flarkgöl, 10 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Sumpskog
2 ha. Stark lokal påverkan från dikning, anslutande väg.

Element 1: Kantzon.

Nr 3

17H 6I 01 (3010) KLASS 2
HAMMERMYRAN 6 KM N TYNDERÖ KA

Våtmarkskomplex, 52 ha (51 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
8 ha, öppet. Stark lokal påverkan från anslutande soptipp.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
6 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från vintervåg.

Element 1: Mosseplan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 4: Sumpskog
25 ha, fördelat på 3 ytor. Svag lokal påverkan från dikning, vintervåg. Botaniska värden.

Element 1: Golv, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 4

17H 6I 02 (3612) KLASS 3
TALLMYRAN 7 KM N TYNDERÖ KA

Våtmarkskomplex, 11 ha (11 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
2 ha, öppet. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 2: Topogent kärr
3 ha, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 3: Sumpskog
5 ha.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 5

17H 6I 03 (3707) KLASS 3
MOSSAMYRAN 7 KM N TYNDERÖ KA

Våtmarkskomplex, 8 ha (8 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
3 ha, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 2: Sumpskog
5 ha.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Kantzon, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta med ristuvor.

Nr 6

17H 7I 01 (1343) KLASS 3
BACKETJÄRN 7 KM OSO HÄSSJÖ KA

Våtmarkskomplex, 10 ha (9 ha våtm), 75 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Tjärn
4 ha.

Element 1: Gungfly, 50 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 2: Kantzon, 20 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Sumpskog
6 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Nr 7

17H 7I 02 (4920) KLASS 3
STORMYRAN 4 KM O HÄSSJÖ KA

Myrkomplex, 17 ha (17 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Blandmyr av mosaiktyp
13 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
4 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Kantzon, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Nr 8

17H 7I 03 (4018) KLASS 3
STORBLEKMYRAN 3 KM O HÄSSJÖ KA

Myrkomplex, 11 ha (11 ha våtm), 120 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Blandmyr av mosaiktyp
7 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
4 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet.

Element 1: Kantzon, skogbevuxet, barrskog.

Nr 9

17H 7J 01 (3510) KLASS 2
STORMYRAN-STORSJÖN 7 KM O HÄSSJÖ KA

Svagt välvd mosse, 23 ha (23 ha våtm), 65 m ö h.
Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
18 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 55 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Randskog, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 4: Höljegöl, 5 % av delobjektytan.

Element 5: Lagg, 5 % av delobjektytan. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Sumpskog
5 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Kantzon, skogbevuxet, blandskog.

Nr 10

17H 7J 02 (1326) KLASS 3
DALJETJÄRN 9 KM O HÄSSJÖ KA

Våtmarkskomplex, 10 ha (9 ha våtm), 65 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
5 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Göl, 10 % av delobjektytan.

Element 4: Gungfly, 20 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 2: Sumpskog
5 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 2: Kantzon, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 11

18H 0F 2E *Klass 2*
EDSTA-STORMYRAN

Se sid 143

Nr 12

18H 1F 4C *Klass 2*
KORSTJÄRNMYRAN

Se sid 143

Nr 13

18H 2C 01 (3030) KLASS 2
BREDSJÖ-STORMYRAN 8 KM V STOR-LAXSJÖN

Myrkomplex, 82 ha (80 ha våtm), 350 m ö h. Flygb. -86.
Storomr BB.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården.

Delobj. 1: Sluttande mosse
16 ha, öppet.

Element 1: Strång, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 2: Hölja, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Kantzon, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Soligent kärr
13 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
25 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Blandmyr av mosaiktyp
14 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Nr 14

18H 2C 02 (1726) KLASS 1
VITMOSSAMYRAN 8 KM V STOR-LAXSJÖN

Myrkomplex, 150 ha (146 ha våtm), 350 m ö h. Flygb. -86.
Fält -90.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården.

Delobj. 1: Sluttande mosse
18 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Strång, 30 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Hölja, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmattemosse av tuvull-S. balticumtyp.

Element 3: Hölja. Mjukmattekärr, kallgräs-vitmoss variant.

Element 4: Kärrfönster, 1-3 % krontäckning, barrskog. Mjukm.kärr av starr-vitmoss-brunmosstyp.

Element 5: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
22 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 4-10 % krontäckning, barrskog. Tallkärr av klotstarrtyp.

Element 2: Tuva, 4-10 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 3: Mosseplan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Tallmosse av tuvulltyp.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
25 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 2: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2, underelem. 1: Mosseplan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 3: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 4: Kantzon, 10 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Tallkärr av klotstarrtyp.

Delobj. 4: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Mjukmattekärr, starr-S. papillosum var.

Element 2: Golv, 1-3 % krontäckning, barrskog. Fastmattekärr av tuvull-vitmosstyp.

Element 3: Bäckdråg, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 5: Sumpskog
15 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 40 % av delobjektytan, > 25 % krontäckning, barrskog. Sumpgranskog av ristyp.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 6: Blandmyr av mosaiktyp
20 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 7: Topogent kärr
25 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 4-10 % krontäckning, barrskog. Tallkärr av klotstarrtyp.

Nr 15

18H 2C 03 (3845) KLASS 2
MYR VID GÄDDBÄCKSDAMMET 6 KM V STOR-LAXSJÖN

Myrkomplex, 102 ha (88 ha våtm), 310 m ö h. Flygb. -86. Storomr BB.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Soligent kärr
10 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mindre fläckar, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
35 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
10 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Topogent kärr
8 ha, öppet. Stark lokal påverkan från anslutande hyggen, svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 5: Blandmyr av mosaiktyp
11 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 43 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Källa, 2 % av delobjektytan, öppet.

Nr 16

18H 3D 02 (2424) KLASS 2
STENTJÄRNSMYRORNA 3 KM V STOR-LAXSJÖN

Myrkomplex, 400 ha (365 ha våtm), 375 m ö h. Flygb. -86. Storomr BE.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Strängblandmyr
20 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 2: Flark, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Flarkgöl, 5 % av delobjektytan.

Element 4: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
30 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Tuva, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Delobj. 3: Sumpskog
50 ha, fördelat på 3 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
135 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag generell påverkan från dikning, stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 5: Topogent kärr
17 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Flarkgöl, 10 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 6: Blandmyr av mosaiktyp
25 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 3: Kantzon, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 7: Topogent kärr
17 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 8: Sluttande mosse
12 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 9: Topogent kärr
30 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Tuva, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

18H 3D 03 (0023) KLASS 2
STAFFANSMYRORNA M FL 3 KM V STOR-LAXSJÖN

Myrkomplex, 315 ha (280 ha våtm), 350 m ö h. Flygb. -86. Fält -91. Storomr BE.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Höjdskillnad större än 100 m.

Delobj. 1: Sluttande mosse
20 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Kantzon, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
36 ha, fördelat på 7 ytor, öppet. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vitmosstyp.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Element 2, underelem. 1: Källa, 1 % av delobjektytan. Källkärr av intermediär Warnstorfiatyp.

Element 3: Flarkgöl, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Topogent kärr
18 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, barrskog. Tallkärr av fattig vitmosstyp.

Delobj. 4: Sumpskog
13 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 80 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Bäck, 5 % av delobjektytan.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 5: Blandmyr av mosaiktyp
7 ha, öppet.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 3: Sträng, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog.


Delobj. 6: Topogent kärr
85 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, barrskog. Tallkärr av klotstarrtyp.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.


Delobj. 7: Soligent kärr
85 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt.

HÄRNÖSANDS KOMMUN



Degermyran. nr 1

Värdeklass II
Geokod 17I 8A 0A9A
Areal 33 ha
Flygbild 1987
Höh 120 m
VMI-nr 17I 8A01
Naturvårdsobjekt N80 004
Fältbesökt 1971-07, Jan W. Mascher.



Litet myrkomplex beläget mellan E4:an och havet NV om Häggdånger. Myren avvattnas åt NO ner i Kammartjärnen. Större delen upptas av ett öppet *topogent kärr* med ett mindre centralt beläget parti med *sträng-flarkkärr*. Mindre partier med *blandmyr* och *sumpskog* förekommer också i de perifiera delarna. Centralt i myren ligger Degermyr*tjärnen* omgiven av gungfly och mjukmattor.

Vegetation och flora: Den V delen av kärret utgörs av en mosaik av mjukmattor och lösbottnar med ett växtsamhälle dominerat av pors, blåtåtel, tuvsäv och vitag. Mot O finns mer utbildade strängar bevuxna med pors, ljung samt fyra till fem meter höga tallar. Mellan strängarna växer flaskstarr och pors i blöta mjukmattor. Tjärnen omges av mjukmattor och lösbottnar där dystarr dominerar. Här förekommer också rikligt med strandlummer, myggblomster, småsileshål och brunag som indikerar rikare miljö. I tjärnen finns flytbladsvegetation av vit näckros och gäddnate samt dy- och vattenbläddra. Mossepartierna domineras av ljung.

Påverkan: Myren är hydrologiskt opåverkad och den enda påverkan som finns är de anslutande hyggena i O som stör landskapsbilden.

Bedömning: Hydrologiskt ostörd myr med gungflypartier som hyser en för kustnära myrar karaktäristisk dybottenflora.

Källa: Mascher, J. W. 1990. Ångermanlands flora. SBT-redaktionen, Lund.

Nr 1

17I 8A 01 (1000) KLASS 2
DEGERMYRAN 4 KM NV HÄGGDÅNGER KA

Myrkomplex, 35 ha (33 ha våtm), 120 m ö h. Flygb. -78.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Botaniska värden, diffus strångbildning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan. Mjukmatta-lösbotten.

Element 2: Gungfly, 15 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
5 ha, öppet.

Element 1: Flark, 70 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 2: Sträng, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Sträng, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
5 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 4: Sumpskog
6 ha, fördelat på 5 ytor.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, skogbevuxet.

Element 2: Mindre fläckar, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Nr 2

18H 2I 01 (2820) KLASS 3
STARRMYRAN VÅLMYRAN 9 KM O VIKSJÖ KYRKA

Våtmarkskomplex, 53 ha (52 ha våtm), 300 m ö h. Flygb. -87.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
17 ha, öppet.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Göl, 2 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Element 4: Gungfly, 8 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
9 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 30 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
21 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, anslutande dikning.

Element 1: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 40 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
5 ha.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Nr 3

18H 4E 01 (0639) KLASS 3
STOR-VÄLLINGMYRAN HÅLMYRAN OCH STENMYRAN 11 KM NV VIKSJÖ KYRKA

Myrkomplex, 343 ha (272 ha våtm), 375 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Flikiga kantzoner, litteratur om objektet finns, området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Topogent kärr
75 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag generell påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning. Äldre hässjor eller rester.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Slukhål, 1 % av delobjektytan, öppet, lövskog.

Element 3: Flark, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Lösbotten.

Element 4: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Element 5: Flarkgöl, 5 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Element 6: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Soligent kärr
15 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
69 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt. Svag generell påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 25 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
99 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag generell påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 54 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Vegetation utmed mindre vattendrag, 4 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 5: Bäck, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Element 6: Slukhål, 1 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 5: Tjärn
4 ha.

Delobj. 6: Sumpskog
14 ha.

Nr 4

17H 8J 01 (1323) Klass 3
VITMYRTJÄRNSMYRAN 9 KM NO HÄSSJÖ K:A

10 ha, 105 m ö h. Flygb -86.

Ingår i naturvårdsplan.
Välvd högmosse.

Nr 5

17 I 7A 01 (1805) Klass 3
MYR RUNT SVARTTJÄRNEN 3 KM SV HÄGGDÅNGERS K:A

9 ha, 60 m ö h. Flygb -87.

Ingår i naturvårdsplan.
Välvd högmosse, gungflypartier med myggblomster och brunag.

Nr 6

17I 6A 01 (4915) Klass 3
MYR STRAX N OM SANDSTENSFJÄRDEN 4 KM SV HÄGGDÅNGERS K:A

5 ha, 35 m ö h. Flygb -87.

Ingår i naturvårdsplan.
Förekomst av ängsnycklar.

Nr 7

17I 7B 01 (0709) Klass 3
LITEN MYR N SVENSKÄR 4 KM SO HÄGGDÅNGER K:A

2 ha, 35 m ö h. Flygb -87.

Ingår i naturvårdsplan.
Myr med god näringstillgång. Förekomst av brunag.

Nr 8

17I 8C 01 (2704) Klass 3
MYR 1 KM S BRATTÅS 5 KM S HÄRNÖSAND

2 ha, 50 m ö h. Flygb -87.

Ingår i naturvårdsplan.
Skalgruspåverkad myr med ängsnycklar.

Nr 9

17I 9C 01 (1728) Klass 3
SPECKSTATJÄRN 4 KM SO HÄRNÖSANDS CENTRUM

5 ha, 45 m ö h. Flygb -87.

Ingår i naturvårdsplan.
Igenväxt sjö, intressant tagellokal.

Nr 10

18H 1H 01 (4207) Klass 3
MYR 1,5 KM O NORDANÅ 5 KM SO VIKSJÖ K:A

10 ha, 175 m ö h. Flygb -86.

Ingår i naturvårdsplan.
Kärr i diabasstråk med förekomst av brunag, myggblomster, ängsnycklar och gräsull.

Källa: Fältbesökt 1978 av Per Simonsson.

Nr 11


18I 2D 01 (0339) Klass 3
BREDMYRAN 1,5 KM NO HEMSÖ K:A

12 ha, 60 m ö h. Flygb -86.

Ingår i naturvårdsplan.
Koncentrisk mosse.


Källa: Fältbesökt 1979 av Per Simonsson.

KRAMFORS KOMMUN



Hallsviksravinens myrar. nr 4

Värdeklass I
Geokod 18I 6G 1D7C
Areal 3 ha
Flygbild 1987
Höh 50 m
VMI-nr 18I 6G01
Naturvårdsobjekt NR 82 046
Fältbesökt 1977, Jan Lundqvist;
1991, Jan W. Mascher;
1992-07, Ruben Fryleskog.



Objektet utgörs av två små myrar inom Halsviksravinens naturreservat, beläget öster om Nordingrå i Höga kusten. Den södra, belägen V om Ängesberget, utgörs av svagt sluttande *kärr* med ett gungflyområde i SO. I den mellersta delen är kärret plant och lågtuvat medan större och högre tuvor samt gles träd- och buskvegetation präglar den nordvästra och norra delen.

Vegetation och flora: Träd- och buskvegetationen består av gråal, klibbal, glasbjörk, brakved, videarter samt en, tall och gran i liten omfattning. Myrens vegetation återspeglar inverkan av näringsrika vittringsprodukter från områdets diabasberggrund. Ängsnycklar, gräsull samt mossorna Sphagnum warnstorfii, Tomentypnum nitens och Paludella squarrosa visar på detta. Myren hyser också ett mindre bestånd av knottblomster.

Bedömning: Myrens höga värde betingas av förekomsten av det hotklassade, hotkategori 2, knottblomstret.

Källa: Mascher, J. W. 1992. Florafynd under ångermanländska botanikdagar. Natur i norr 11(1)49-53. Umeå 1992.


Lundqvist, J. A. G. 1978. Vegetation och flora i Halsviksravinens naturreservat. Svensk botanisk tidskrift 71:335-362. Stockholm 1978.

Länsstyrelsen Västernorrlands län 1983. Skötselplan för Halsviksravinens naturreservat. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Löfroth, M. 1993. Knottblomster, status och utbredning i Sverige. Svensk botanisk tidskrift 87:133-146. Lund.

Stor-Degermyran. nr 5

Värdeklass II
Geokod 18I 9E 2C1B
Areal 56 ha
Flygbild 1987
Höh 200 m
VMI-nr 18I 9E01
Naturvårdsobjekt N82 257



Mindre myrkomplex beläget fem km norr om Ullångersfjärden. Myren avvattnas huvudssakligen åt S ner i Råbäcken men också till en mindre del åt N ner i Stor-Vamsjön. Myren domineras av en *svagt välvd mosse* med två centralt belägna plan åtskilda av ett laggstråk. Mosseplanen är glest tallbevuxna och avgränsas av laggstråk, större partier med *blandmyr* och en *tjärn* i söder. I SO finns blandmyr med bitvis tydligt utbildade mossesträngar. I norr finns ett område med något som närmast kan karaktäriseras som en tallbevuxen blandmyr. Mellan dessa element finns mindre ytor med *topogena kärr* insprängda. *Sumpskog* förekommer också på ett flertal ytor i anslutning till fastmark.

Påverkan: Myren är helt opåverkad sånär som på några små anslutande hyggen.

Bedömning: Tämligen variationsrikt och helt ostört myrkomplex beläget i en myrfattig del av länet. Myren innehåller en svagt välvd mossse, en i dessa trakter ovanlig myrtyp.

Nr 1

18H 4H 01 (4007) KLASS 3
KULLMYRAN, LUTMYR-STORMYRAN 11 KM N VIKSJÖ KYRKA

Myrkomplex, 74 ha (65 ha våtm), 415 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Litteratur om objektet finns, terrängföljande våtmark.

Delobj. 1: Topogent kärr
31 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen. Rest av tjärn.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 2: Gungfly, 7 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Göl, 3 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
14 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
20 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 2

18H 7E 01 (0848) KLASS 3
SKARPABBORRTJÄRNSMYRAN 20 KM SO GRANINGEBRUK

Myrkomplex, 52 ha (46 ha våtm), 403 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
9 ha, öppet.

Element 1: Golv, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
37 ha, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Sträng, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 4: Hölja, 25 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Tjärn
6 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Gungfly, 25 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Nr 3

18H 9F 02 (0315) KLASS 3
STOR-JANSMYRAN 20 KM NV BOLLSTABRUK

Myrkomplex, 30 ha (29 ha våtm), 290 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr 5 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
19 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande dikning.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
6 ha, fördelat på 2 ytor. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 4: Tjärn 1 ha, fördelat på 2 ytor.

Nr 4

18I 6G 01 (1733) KLASS 1
HALLSVIKSRAVINENS MYRAR 7 KM O NORDINGRÅ

Topogent kärr, 3 ha (3 ha våtm), 50 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Naturreservat.

Delobj. 1: Topogent kärr
3 ha, glest trädtäckt. Botaniska värden.

Nr 5

18I 9E 01 (2122) KLASS 2
STOR-DEGERMYRAN 6 KM N ULLÅNGER

Myrkomplex, 64 ha (56 ha våtm), 200 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
9 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Fastmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
16 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Lagg, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp 17 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, öppet. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 5: Golv, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
14 ha, fördelat på 5 ytor.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog.

Nr 6

18H 5G 01 (4831) Klass 3
TORPMYRAN 17 KM V KRAMFORS

15 ha, 270 m ö h. Flygb -86.

Ingår i naturvårdsplan.
Rikkärr med arter som ängsnycklar, hårstarr och tagelstarr.

Källa: Fältbesökt 1971 av Ruben Fryleskog och J W Mascher.

Nr 7

18I 3D 01 (1931) Klass 3
MYR VID HAMNTJÄRNEN 11 KM O HÖGSJÖ K:A

5 ha, 75 m ö h. Flygb -86.

Ingår i naturvårdsplan.
Myr vid liten tjärn som hyser bl a ängsnycklar.

Källa: Ståhl 1978, Östra Nora i Höga Kusten.

Nr 8

18I 3E 01 (3126) Klass 3
STORMYRAN 2 KM SV BERGHAMNS KAPELL

4 ha, 55 m ö h. Flygb -86.

Ingår i naturvårdsplan.
Örtrik myr med förekomst av bl a hårstarr, trindstarr och gräsull.
Källa: Guvå 1971, Mascher Ångermanlands flora 1990, Sthål 1978.

Nr 9

18I 4E 01 (0117) Klass 3
STORMYRAN 2,5 KM NV BERGHAMNS KAPELL

6 ha, 30 m ö h. Flygb -86.

Ingår i naturvårdsplan.
Våt myr med gungfly och förekomst av bl a brunag, myggblomster, ängsnycklar och gräsull.

Källa: Sthål 1978, Guvå 1971.

Nr 10

18I 7B 01 (3636) Klass 3
MYR N VÄSTER-STRINNEBODARNA 4 KM NO BJÄRTRÅ

2 ha, 165 m ö h. Flygb -86.

Liten botaniskt intressant myr med förekomst av spädstarr, repestarr, dvärghäxört och glesgröe.

Källa: Guvå 1971, Mascher 1990, Ångermanlands flora.

Nr 11

18I 7H 01 (3402) Klass 3
PÅLMYRAN 2 KM V MJÄLLOM

5 ha, 75 m ö h. Flygb -86.

Svagt välvd mosse av botaniskt intresse.

Källa: Björkbäck 1970.

Nr 12

18I 7H 02 (4714) Klass 3
VILLMYRAN 2 KM NV NORRFÄLLSVIKEN

7 ha, 30 m ö h. Flygb -86.

Skalgruspåverkat rikkärr med förekomst av hårstarr, tvåblad, blodnycklar och Scorpidium cossoni.

Källa: Björkbäck 1970, Mascher 1990, Ångermanlands flora.

Nr 13

18I 7H 03 (4034) Klass 3
STORMYRAN 1 KM NO NORRFÄLLSVIKEN

10 ha, 10 m ö h. Flygb -86.

Utvecklingshistoriskt intressant myr nära havet.

Källa: Björkbäck 1970, Guvå 1971.

Nr 14

19I 0C 01 (4135) Klass 3
LITEN MYR 1 KM VSV SANNA 22 KM SV SIDENSJÖ

1 ha, 260 m ö h.

Ingår i naturvårdsplan.
Rikkärr med bl a ängsnycklar och gräsull.

Källa: Mascher 1990, Ångermanlands flora.


Nr 15

19I 1D 01 (1221) Klass 3
KVAVELBROMYRAN 18 KM SV SIDENSJÖ

Ingår i naturvårdsplan.
Rikkärr med bl a gräsull, ängsnycklar och myggblomster.

Källa: Mascher 1990, Ångermanlands flora.

SOLLEFTEÅ KOMMUN



Långmyran - Storhällmyran. nr 3

Värdeklass II
Geokod 18H 5F 4D5D
Areal 167 ha
Flygbild 1986
Höh 340 m
VMI-nr 18H 5F01
Naturvårdsobjekt N83 090
Fältbesökt 1978-06, Tomas Rydkvist.



Långmyran-Storhällmyran utgör ett långsträckt myrkomplex beläget i en NV-SO gående dalstråk. Centralt genom hela området rinner Långmyrbäcken som avvattar myren åt söder. Myren domineras av *blandmyr* samt till mindre del av *topogena kärr*, av både fast- och mjukmattetyp, och *nordliga mossar*. De senare är både tallbevuxna och av öppnare slag och belägna mot fastmarken, i områdets S del. Här förekommer också ett flertal mindre *sumpskogspartier*. Långmyrbäcken kantas av en smalare bård av strandskog med mycket löv samt av på sina ställen täta videsnår. En liten *tjärn* finns också i området. Eventuellt finns också en källa i områdets S del.

Fauna: Värderklass III i myrfågelinventeringen med arter som trana, grönbena, gulärla och videsparv.


Påverkan: Långmyrans norra delar är dikad och objektet har avgränsats mot dessa diken i norr. Förutom angränsande hyggen är myren i övrigt opåverkad.

Bedömning: Variationsrikt myrkomplex med ej så tydligt utbildade myrtyper. Bäcken med strandskog och videsnår bidrar till mångformighet. Området är dessutom i stort opåverkat och hyser också ett visst ornitologiskt värde.

Källa: Simonsson, P & Dynesius M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Mörttjärnsmyran S Graninge bruk. nr 7

Värdeklass II
Geokod 18H 7B 2B7J
Areal 114 ha
Flygbild 1986
Höh 345 m
VMI-nr 18H 7B01
Naturvårdsobjekt N83 207
Fältbesökt 1992, Sören Uppsäll.



Långsträckt myrkomplex beläget i NV-SO orienterad dalsträckning utefter jämtlandsgränsen. Tre mindre *tjärnar* finns inom området som mot söder

avvattnas ner i Häbbersjön på jämtlandssidan och mot norr genom biflöden till Malmån. Områdets centrala del domineras av öppna *topogena kärr* av mjuk-fastmattetyp som flankeras av *nordlig mosse*. I norr finns ett flertal större fastmarksryggar åtskilda av mindre *sumpskogsbårder*. Områdets södra del utgörs av partier med *blandmyr* omgivna av *skogskärr* med inslag av mindre delar sumpskog.

Vegetation och flora: Vegetationen inom hela området utgörs uteslutande av fattiga växtsamhällen. Av stort intresse är den bitvis rikliga förekomsten av varglav på talltorrakor i mossepartierna.


Påverkan: Spår efter myrslåtter, i form av hässjestörar, finns i områdets norra del. I södra delen ligger en kolbotten i mycket nära ansluttning till myren. Spår av äldre dimentionsavverkningar finns på fastmarksholmar men även sparsamt i kanterna på objektet. Höjdryggen som avgränsar området i öster är till större delen avverkad efter 1986.

Bedömning: Mörttjärnsmyrans stora värde består av de stora öppna kärren som ansluter till flera mindre tjärnar. Myren är dessutom helt hydrologiskt opåverkat, i en omgivning där de flesta av myrarna är utdikade. Den rikliga förekomsten av varglav stärker värdet. På anslutande fastmark finns dessutom lövrika brandpåverkade naturskogar

Mörttjärnsmyran Ö
Graninge bruk. nr 15

Värdeklass I
Geokod 18H 8D 4D6H
Areal 254 ha
Flygbild 1986
Höh 275 m
VMI-nr 18H 8D01
Naturvårdsobjekt N83 003
Fältbesökt 1971, Mascher, Mo, Fryleskog & Lidberg;
1978-06 och 1979-06, Tomas Rydkvist;
1983, K Due & M Muhr;
1992, Sören Uppsäll.

Mörttjärnsmyran utgör ett större NV-SO orienterat myrkomplex. Den sydöstra delen utgörs av en stor öppen myrvidd som via *Mörttjärnarna*



dräneras åt sydost ner i Gravattensjön. Myrvidden domineras av två större partier med *nordlig mosse*, en strängad mosse i norr och en tunga med plan och höljor i söder. Dessa åtskiljs av ett *strängflarkkärr* som fungerar som dråg för de båda tidigare. I myrviddens norra och södra del förekommer också partier med *blandmyr*. Områdets centrala del som utgör vattendelare intas av en mosaik av fastmark, *skogskärr* och *sumpskog*. Områdets norra del dräneras åt samma väderstreck av Knäsjöbäcken. Här utgörs de öppna delarna av *topogena kärr* och strandkärr utefter bäcken.

Vegetation och flora: Mossarnas plan och strängar karaktäriseras av Sphagnum fuscum och lägre ris så som kråkris, odon m fl. Höljornas vegetation utgörs av vitmossemjukmattor med kallgräs och dystarr i fältskiktet. De tallbevuxna skogskärren domineras av fattiga vegetationstyper. De öppna kärren utgörs av intermediera mjuk- och fastmattor med S. papillosum och ett fältskikt med trådstarr, flaskstarr och blåtåtel. Mindre partier med rikare näringstillgång förekommer också där arter som björnbrodd, ängsnycklar, myggblomster och dvärgbläddra växer. Vid en källa i södra delen växer bl a fjälldunört samt mossorna Philonotis fontana samt Bryum pseudotriquetrum. I sumpskogen och på fastmarksholmar och ryggar förekommer flera ovanligare vedsvampar sparsamt, bl a nordlig anisticka.

Fauna: Värdeklass II i myrfågelinventeringen

med arter som trana, enkelbeckasin, storspov, tofsvipa, gluttsnäppa, grönbena m fl.

Påverkan: De partier som ansluter till det stråk som vattendelaren utgör är kraftigt dikade. Där återfinns öppnare myrområden som beskogats genom dikningen samt sumpskogar, vilka även gallrats. Genom hela området men framförallt i södra delen löper tydliga körspår efter militära terrängfordon. Vid Knätjärnarna i områdets norra del finns rester av en gammal lada och på fastmarksryggar i sumpskogen ligger minst en större kolbotten.

Bedömning: Myren stora värde utgörs av dess mångformighet. Här bidrar framför allt södra delens stora öppna myrvidd med sin variation av väl avgränsade myrtyper och tjärnar. Myrens ornitologiska värden bidrar också till helheten.


Källa: Due, K & Muhr, M. 1983. Tretton myrar i Västernorrlands län, en botanisk inventering, rapport 1983:1. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Stormyran 20 km NV Bollstabruk. nr 19

Värdeklass II
Geokod 18H 9F 1B8F
Areal 113 ha
Flygbild 1986
Höh 270 m
VMI-nr 18H 9F01
Naturvårdsobjekt N83 319
Fältbesökt 1979-06, Kurt Holmqvist; 1992-09, Sören Uppsäll.

Stormyran upptar en platå mellan omgivande skogshöjder. Myren dräneras åt norr via tillflöden till Vallån samt åt öster via Stormyrbäcken. Större delen av myren upptas av en öppen myrvidd där *topogena kärr* dominerar med avbrott av ett *strängflarkkärr*. Den NO delen, samt en mindre del på V sidan, intas av en *nordlig mosse* som i vissa delar uppvisar tydlig strängstruktur. I söder vidtar *sumpskog* med inslag av *skogskärr* och fastmark. Här



finns också en *tjärn* samt en äldre bäverdamm.

Vegetation och flora: Mosseytorna domineras av Sphagnum fuscum och rissamhällen med vitmossemjukmattor i höljorna där annars dystarr dominerar fältskiktet. Kärren utgörs av huvudsakligen fastmattor där tuvull, tuvsäv och trådstarr är karaktärsarter. Strängflarkkärrets strängar är fastmattor med trådstarr och blåtåtel. Dessa har också ett busk- och trädskikt bestående av enbuskar och ca tre meter höga tallar. Flarkarna utgörs av lösbottnar där ovanstående arter samt ängsull och vattenklöver även kommer in. Sumpskogen utgörs av såväl barr- som lövdominerade partier.

Fauna: Värdeklass IV i myrfågelinventeringen med arter som grönbena och enkelbeckasin. Bosättning av bäver finns i området vid Stormyrtjärtnen.


Påverkan: Myrens norra men framför allt södra och östra delar är dikade. Det är främst sumpskog och skogskärr som berörs av denna dikning. Avverkning av dämningspåverkad skog har gjorts i anslutning till en äldre bäverdamm vid Stormyrbäcken. Ute på de öppna delarna finns tydliga körskador från militära bandfordon samt kvarlämnade konstruktioner för målskjutning.

Bedömning: Medelstor myr där den relativt stora öppna myrvidden visar en karaktäristisk uppbyggnad och är i stort opåverkad. Sumpskogsdelarna är dikningspåverade och till viss del bäverdämda men bidrar till myrkomplexets mångformighet.

Källa: Simonsson, P. & Dynesius, 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Stor-Runmyran. nr 22

Värdeklass I
Geokod 19G 2H 2C6J
Areal 90 ha
Flygbild 1986
Höh 310 m
VMI-nr 19G 2H02
Naturvårdsobjekt N83 080
Fältbesökt 1978-07, Per Simonsson;
1993-08, Sören Uppsäll.



Stor-Runmyran ligger nära jämtlandsgränsen och avvattnas åt öster av Runån som här tar sin början i ett flertal mindre flöden. Ån som meandrar genom myren kantas på båda sidor av öppna *strandkärr* och här finns också dungar med *skogskärr/ sumpskog*. I dessa finns en källa på sydsidan av ån. Söder om ån i öster breder öppna *topogena kärr* ut sig mellan ett par fastmarksholmar. Här finns omväxlande fastmattor och mjukmattor. Mot fastmarken och väster om den åsrygg som skär området i nord-sydlig riktning dominerar skogskärr med inslag av mindre partier sumpskog. Längst i S mot fastmarken finns ett sumpskogsparti som bitvis är mycket blött med träden stående på socklar. Längst i norr, ut från fastmarken, sträcker sig en *nordlig mosse*, med strängar och höljor i dess centrala parti.

Vegetation och flora: Området domineras helt av rika vegetationstyper. Mycket rika fast- och mjukmattor med dominans av Sphagnum subnitens och S. warnstorfii eller brunmossdominerat bottenskikt upptar de öppna topogena kärren. I fältskiktet som domineras av tuvsäv och blåtåtel eller flask- och dystarr återfinns även ängsnycklar, brudsporre och ställvis rikligt av sumpnycklar. Campylium stellatum dominerar stora delar av mjukmattorna tillsammans med Scorpidium cossonii, S. scorpidioides och Pseudocalliergon trifarium. Skogskärren utgörs delvis av fattiga men bitvis mycket rika vegetationstyper. Det senare finns strax S om ån där fältskiktet är mycket örtrikt. I botten dominerar S. warnstorfii tillsammans med S. teres och Tomentypnum nitens. Här återfinns även arter som Thuidium recognitum och Hamatocaulis vernicosus. Källan invid strandkärret domineras helt av hundratals myrbräckor som vid blomningen färgar marken gul. I botten



Myrbräcka

dominerar Paludella squarrosa tillsammans med Tomentypnum nitens, Bryum weigelii, Calliergon giganteum, Conocephalum conicum mfl. Strandkärren längs ån domineras helt av täta videsnår av lapp- och grönvide. Sumpskogen längst i söder är av ört-starrtyp. Här förekommer bl a vitsippa, repestarr, Calliergon giganteum och Campylium protensum.


Fauna: Trana och enkelbeckasin har noterats vid fältbesök.

Påverkan: I myrens västliga delar finns en del diken, speciellt söder om ån där det också finns spår av en gammal myrodlig. En damm finns i Runån precis öster om myren och på strandkärren finns fem ängslador som vittnar om att strandkärren utnyttjats för fodertäkt.

Bedömning: Variationsrik myr som till övervägande delen är opåverkad. Nämnas kan bl a det breda strandkärret längs den meandrande ån. Det höga värdet motiveras också till stor del av den mycket artrika vegetationen med förekomst av flera ovanligare arter.

Runåmyran, Sjötjärnsmyran. nr 23

Värdeklass II
Geokod 19G 2I 1C1J
Areal 153 ha
Flygbild 1986
Höh 255 m
VMI-nr 19G 2I01
Naturvårdsobjekt N83 320




Långsträckt våtmarksområde beläget i NV-SO riktning, invid Sörsjön. Denna är en del av Runåns-Finnåns vattensystem som avvattnar området åt sydost. Längst i nordväst dominerar videbevuxna *strandkärr* längs Runån och invid Sörsjöns strand. Vid utloppet i sjön finns starrbevuxna gungflypartier invid mindre laguner. Norr om ån finns öppna *topogena kärr* samt *skogskärr*. De topogena kärrens centrala delar domineras av mjukmattor som mot kanterna övergår i fastmattor. Både norr och söder om utloppet i Sörsjön finns större partier med *sumpskog*. Kälån rinner ner i sjön från söder och öster därom vidtar skogskärr och ett större parti *nordlig mosse*. Längst i sydost finns bredare dråg med topogena kärr skilda åt av tungor med skogskärr.

Påverkan: Utmed områdets södra del finns spår efter en vinterväg. Strandkärren längs ån och sjön är troligen påverkade av dämning. Ett par ängslador vittnar också om tidigare slåtter.

Bedömning: Bortsätt från eventuell tidigare dämningspåverkan är området i stort hydrologiskt opåverkat. Området är tämligen variationsrikt med olika våtmarkstyper och med stor kontakt med sjöar och vattendrag.

Prästflon. nr 27

Värdeklass I
Geokod 19G 3G 0E0E
Areal 52 ha
Flygbild 1989
Höh 390 m
VMI-nr 19G 3G01
Naturvårdsobjekt N83 008
Fältbesökt 1980-06, Mikael Ohlson.



Prästflon ligger någon km från jämtlandsgränsen sydost om Stensjö by i Edsele socken. Myren ligger i nära anslutning till Rödmossaflon (objekt 3G03) och myrarna i Stensjöflokomplexet (objekt 3G04). Prästflon som till största delen utgörs av kärr, sluttar svagt åt söder/sydost och avvattnas i denna riktning av Prästflobäcken ner i Runån. De södra och västra delarna upptas av öppna *topogena kärr* där fastmattor dominerar. Mindre delar med mjukmattor och lösbottnar förekommer också samt ett par källor. I norr och i sydost finns lövdominerade *skogskärr* som upptar myrens perifiera delar. Ett parti med *sumpskog* finns också i öster mot fastmarken, genom vilket Prästflobäcken rinner. I denna del finns ytterligare ett par källor. Prästflon utgör sedan 1986 naturreservat och ligger inom riksintresseområdet "Stensjö-Gideåbergs rikkärrområde".

Vegetation och flora: Övervägande delen av Prästflon utgörs av medelrikkärr där de östra delarna har en mycket rik flora, vilken indikerar extremrikkärr. Myrbräcka (hotklass 4) är vanligt förekommande över hela myren. Andra intressanta arter som förekommer är tagelstarr, blodnycklar, ängsnycklar, sumpnycklar och finbräken. Bland mossorna kan nämnas Sphagnum teres, Sphagnum contortum, Calliergon giganteum, Helodium blandowii, Palustriella commutatum och Tomentypnum nitens.

Påverkan: Myren är i stort hydrologiskt opåverkad. Tidigare utnyttjades den för slåtter och som betesmark för nötkreatur och hästar. Sedan myrslåtter och bete upphört har en kraftig igenväxning av myrens södra delar ägt rum.

Bedömning: Prästflons höga värde betingas av dess orördhet samt framför allt dess rika kärlväxtflora med länets största förekomst av myrbräcka. Riksintresse, Naturreservat, Myrskyddsplan.

Källa: Länsstyrelsen Västernorrlands län 1986. Skötselplan för Prästflons naturreservat. Länsstyrelsen Västernorrlands län, Härnösand.


Mascher, J. W. 1990. Ångermanlands flora. SBT-redaktionen, Lund.

Ohlson, M. 1982. Prästflon - en botanisk inventering, rapport 1982:6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Runflon. nr 28

Värdeklass II
Geokod 19G 3G 0C9H
Areal 86 ha
Flygbild 1989
Höh 400 m
VMI-nr 19G 3G02
Naturvårdsobjekt N83 185
Fältbesökt 1982-06, Marie Muhr & Kerstin Kustås.

Runflon är belägen ett par km öster om jämtlandsgränsen strax söder om Stensjö by. Myren ligger i anslutning till och har viss hydrologisk kontakt med Rödmossaflon och Stensjöflon (objekt 3G03 och 3G04). Runflon sluttar mycket svagt åt SO och avvattnas i denna riktning av Runån. *Skogskärr*, i form av glest gran- och glasbjörksbevuxna fastmattor, upptar större delen av Runflon. En



källa finns också. Öppna *topogena kärr* förekommer i mindre omfattning och utgörs även de av fastmattor. I övergången mot fastmarken i de perifiera delarna samt längs Runån i öster finns omfattande arealer med *sumpskog*. Myren ligger inom riksintresseområdet "Stensjö-Gideåbergs rikkärrområde".

Vegetation och flora: Rika till intermediära fastmattor dominerar större delen av myren. Sphagnum warnstorfii och S. angustifolium dominerar bottenskiktet över stora delar. I de rikare partierna växer arter som myrbräcka (hotklass 4), sumpnycklar, ängsnycklar, blodnycklar och Kung Karls spira. I rikare delar av sumpskogen återfinns arter som spädstarr och mossan Climacium dendroides. Bland mossorna kan också nämnas Sphagnum contortum, Calliergon cordifolium, Scorpidium scorpioides, Meesia triquetra, Hamatocaulis vernicosus, Palustriella commutatum och Tomentypnum nitens. Dessa är arter som alla indikerar artrika miljöer.

Påverkan: Ett ca 800 m långt kraftigt dike löper tvärs genom myrens centrala delar och ett mindre, ca 150 m långt, finns på annan plats. Dikena har påskyndat myrens igenväxning. Slåtter bedrevs tidigare på hela Runflon. Vintervägar finns även på ett par platser och en skogsbilväg avgränsar bitvis myren i öster.

Bedömning: Lokalt dikespåverkad myr med intermediära till rika kärr. Det höga värdet betingas av den bitvis rika moss- och kärlväxtfloran med riklig förekomst av myrbräcka. Riksintresse, Myrskyddsplan.

Källa: Muhr, M. & Kustås, K. 1982. Inventering av myrar i Stensjö-Berg området. Opublicerad rapport vid Länsstyrelsen Västernorrlands län, Härnösand.

Stensjöflon. nr 30

Värdeklass I
Geokod 19G 3G 2D6C
Areal 280 ha
Flygbild 1989
Höh 410 m
VMI-nr 19G 3G04
Naturvårdsobjekt N83 007
Fältbesökt 1979-06, Per Simonsson & Mats Dynesius,
1982-07, Marie Muhr & Kerstin Kustås;
1993-08, Sören Uppsäll.



Objektet utgörs av myrarna Stensjöflon, Sjömyran och Östansjömyran belägna strax O om Stensjö by i västra delen av Edsele socken. Myren är i huvudsak plan och avvattnas via Stensjöån-Gideån åt norr ner i Faxälven samt åt söder ner i Runån. I NV utbreder sig ett större öppet *topogent kärr* som mot kanterna övergår i videkärr. Söder därom ligger en igenväxt *tjärn* och nedan denna breder ett större parti med *sträng-flarkkärr* ut sig. Fastmattesträngar alternerar här med lösbottenflarkar och enstaka flarkgölar. Centralt i myrkomplexet ligger en stor tjärn, Stensjön. Denna kantas på V sidan av omfattande *gungflykärr*. NV om Stensjön finns stora arealer med *skogskärr* av barr/lövblandtyp. Området öster om Stensjön utgöres av en mosaik av öppna topogena kärr, skogskärr, *sumpskog* samt partier med *nordlig mosse*. Myren ligger inom riksintresseområdet "Stensjö-Gideåbergs rikkärrområde".

Vegetation och flora: Områdets vegetation är huvudsakligen av fattig typ med inslag av intermediära partier. Lokalt i NV finns videkärr med förekomst av ängsnycklar, sumpnycklar samt rikligt med Kung Karls spira. Här förekommer också kärrull, gräsull samt Sphagnum warnstorfii och S. teres i botten. Huvudstarr är även funnen här. Fläckvis i skogskärren NV Stensjön förekommer också mossorna Helodium blandowii och Tomentypnum nitens som indikerar artrikare miljöer. Sumpnycklar finns också sparsamt flerstädes inom området. Värt att notera är också gungflykärren där Sphagnum obtusum dominerar bottenskiktet över stora områden. I sumpskogen Ö Stensjön växer spädstarr sparsamt.

Fauna: Myrkomplexet har värdeklass I i myrfågelinventeringen med arter som grönbena (18 par), brushane (3 par), tofsvipa (4 par), storspov, småspov, enkelbeckasin, trana, svarthakedopping (2 par), gräsand, bläsand, kricka, vigg och knipa.

Påverkan: Sydvästra delen av Stensjöflon är lokalt kraftigt dikespåverkad och äldre numer trädbevuxna myrodlingar finns V om den sänkta och igenväxta tjärnen. Smärre perifiert belägna diken finns även annorstädes inom området och i sydväst avgränsas myren bitvis av en skogsbilväg. Stora delar av myrkomplexet har tidigare utnyttjats för slåtter som lär ha bedrivits fram till andra världskriget.

Bedömning: Stort och variationsrikt myrkomplex som dock lokalt är dikespåverkat. Det höga värdet motiveras av mångformigheten i myrtyper samt det mycket stora ornitologiska värdet. Riksintresse, Myrskyddsplan.

Källa: Muhr, M. & Kustås, K. 1982. Inventering av myrar i Stensjö-Berg området. Opublicerad rapport vid Länsstyrelsen Västernorrlands län, Härnösand.


Simonsson, P & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.



Svarthakedopping

Fjällflon. nr 31

Värdeklass II
Geokod 19G 3G 3B9G
Areal 72 ha
Flygbild 1989
Höh 425 m
VMI-nr 19G 3G05
Naturvårdsobjekt N83 321
Fältbesökt 1982-07, Marie Muhr & Kerstin Kustås; 1993-08, Sören Uppsäll.



Fjällflon är belägen strax norr om Stensjö by i västra delen av Edsele socken. Myren hänger samman med Stensjöflon (objekt 19G 3G04) i SO men är avskuren från denna av en mindre landsväg. Fjällflon har en vattendelare ungefär mitt på och de norra delarna avvattnas åt V via mindre vattendrag ner i Hälsjön samt åt NO ner mot Faxälvens vattensystem. De södra delarna ger sitt vatten åt Stensjöflon. I norra delen ligger en, till stora delar strängad, *svagt välvd mosse* med mjukmattehöljor som bitvis kantas av en mjukmattelagg. I anslutning till den strängade mossen, med mindre partier, och dominerandes myrens södra hälft med ett stort öppet parti finns *nordliga mossar*. Mitt i denna del ligger en liten *tjärn*. I den NO delen finns en igenvuxen tjärn som utgörs av gungfly. Myrens perifiera delar upptas av huvudsakligen tallbevuxna *skogskärr*. Längst upp i NV finns björkdominerade skogskärr samt mindre arealer *gransumpskog*. Myren ligger inom riksintresseområdet "Stensjö-Gideåbergs rikkärrområde".

Vegetation och flora: Myren domineras helt av fattiga vegetationstyper. Mossarnas risvegetation alternerar med mjukmattor där Sphagnum balticum dominerar tillsammans med kallgräs och dystarr i ett sparsamt fältskikt. På gungflyn i den igenväxta tjärnen utgör Sphagnum lindbergii och S. majus bottenskiktet. Skogskärren utgörs till större del av klotstarrtallkärr. Sumpskogen i NV är av ört-starrtyp.


Påverkan: Mindre diken med mycket lokal påverkan finns i periferin mot fastmarken i SO och NO. Den igenvuxna tjärnen är det p g a två äldre, nu igenvuxna diken. I SO är myren avskuren av vägen till Stensjö by. Som helhet kan dock myren sägas vara hydrologiskt intakt.

Bedömning: Myrens värde utgörs av de stora öppna mossepartierna med en svagt välvd mosse, en i regionen ovanlig myrtyp. Fjällflon är trots mindre ingrepp hydrologiskt intakt och utgör en värdefull del i det stora myrkomplexet som även utgörs av Stensjöflon. Riksintresse, Myrskyddsplan.

Källa: Muhr, M. & Kustås, K. 1982. Inventering av myrar i Stensjö-Berg området. Opublicerad rapport vid Länsstyrelsen Västernorrlands län, Härnösand.

Djupdalsmyran-Stordjupdalen. nr 32

Värdeklass I
Geokod 19G 3H 3D1F
Areal 86 ha
Flygbild 1989
Höh 330 m
VMI-nr 19G 3H01
Naturvårdsobjekt N83 010
Fältbesökt 1976, Lotta Bergström & Lennart Sohlin; 1993-08, Sören Uppsäll.



Djupdalsmyran-Stordjupdalen ligger beläget fem km SV övre Holmsta och Faxälven och kan sägas utgöras av tre delar. Den största av dessa är Djupdalsmyran som ligger utbredd på en mindre platå. Myren domineras av öppna *topogena kärr*, huvudsakligen av mjukmattetyp. Tvärs över myren rinner Bodbäcken som skär av en mindre åsrygg och rinner i SO riktning ner mot älven. De perifiera delarna utgörs av grandominerade *skogskärr* och mindre *sumpskogspartier* mot fastmarken. I NO avgränsas myren av en fastmarksås och i skogssluttningen nedan denna ligger Björkmyran på en liten terrass. Denna numer av glasbjörk igenvuxna myr kan idag sägas utgöras av sumpskog. Den branta sluttningen ner mot Djupdalsbäcken utgörs huvudsakligen av sumpskog med inslag av fastmark. Här är markvattnet mycket rörligt och ytligt och bryter flerstädes fram i källor. Längst ner i Stordjupdalen rinner bäcken. Granskogen är här och i sluttningen mycket högrest och kraftig. Djupdalsbäcken avvattnar hela sluttningen i SO riktning. Myren ligger inom riksintresseområdet "Stensjö-Gideåbergs rikkärrområde".

Vegetation och flora: Djupdalsmyrans mjukmattor upptas av rikare vegetation där flaskstarr och trådstarr dominerar med inslag av myggblomster samt ängsnycklar och brudsporre på fastmattetuvor. Bottenskiktet domineras av Scorpidium scorpidioides och här förekommer även Sphagnum contortum och Calliergon giganteum. Den glasbjörksbevuxna Björkmyran hyser Ångermanlands enda bestånd av kärrbräken och här förekommer även rikligt med tvåblad och enstaka skogsfruar. Bland mossorna kan nämnas Calliergonella cuspidata samt Brachythecium rivulare som båda indikerar artrika miljöer. Källorna i sluttningarna har en speciell vegetation med arter som bl a fjälldunört, källdunört, sumparv, kärrstjärnblomma, springkorn och lundarv. Den högvuxna gransumpskogen i sluttningen och nere i dalen utgörs av högörtvegetation med inslag av gråal och kraftiga sälgar i trädskiktet. Här växer bl a skogstry, måbär, tibast och trolldruva och det bitvis manshöga fältskiktet domineras av torta, och nordisk stormhatt. Finbräken har här också en riklig förekomst. Nardia insecta och Rhytidiadelphus subpinnatus förtjänar här att nämnas bland mossorna.

Påverkan: Större delar av Djupdalsmyran samt Björkmyran har tidigare utnyttjats för slåtter. Om detta vittnar bl a ladurester på Björkmyran. Myrslåttern upphörde här i början av 1900-talet och 1932 dikades den tidigare öppna Björkmyran för att ge produktiv skogsmark. Förutom detta saknar området betydande ingrepp och skogen står "intakt" runt myren och hyser bitvis naturskogskvaliteer.

Bedömning: Variationsrikt område med såväl öppna kärr som mycket frodiga och artrika sumpskogar. Vegetationen är av rikkärrskaraktär och har en hög artdiversitet av kärlväxter och mossor. Äldre dikespåverkan förekommer men som helhet är området lite påverkat med sumpskogar och omgivande fastmarksskogar med naturskogskvalitéer.


Källa: Berg, I. & Öhrling, H. 1988. Hotade skogsväxter i Ångermanland, rapport 1988:1. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Bergström, L. & Sohlin, L. 1980. Björkmyran-Stordjupdalen - en botanisk inventering, rapport 1980:9. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Guvå, L. 1971. Naturvårdsinventering i Västernorrlands län. Del 2 Ångermanland, Ådalen. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Holmstakälarna. nr 34

Värdeklass II
Geokod 19G 3H 0D8F
Areal 82 ha
Flygbild 1986
Höh 375 m
VMI-nr 19G 3H03
Naturvårdsobjekt N83 171
Fältbesökt 1979-07, Ruben Fryleskog & Anders Viotti.



Mindre våtmarkskomplex där de övervägande delarna är trädbevuxna. Området avvattnas åt SO via mindre bäckar ner i Runån. *Sumpskogar* och framför allt *skogskärr* dominerar och övergången mot fastmarken i norr är diffus. Delar av sumpskogen har mycket stor lövandel. Mindre partier med öppna *topogena kärr* av fastmattetyp förekommer också.

Vegetation och flora: Större delen av myren är fattig till intermediär men N delen har flera partier av rikkärrtyp. Fastmattekärren domineras av tuvsäv, tuvull och blåtåtel med trådstarr och ullsäv i blötare partier. I de rikare skogskärren förekommer också tagelstarr, trindstarr, ängsnycklar, sumpnycklar, tvåblad och Kung Karls spira.

Påverkan: I söder finns rester efter en gammal myrodling och i öster avgränsas området av ett dike mot fastmarken. I övrigt är området i stort opåverkat.


Bedömning: Stora arealer opåverkad sumpskog samt skogskärrens rikare vegetation ger myren dess värde.

Källa: Fryleskog, R. & Viotti, A. 1981. Ådalen - växter och djur, översiktlig naturinventering. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Åmyran-Storkälen. nr 35

Värdeklass I
Geokod 19G 3I 2C1D
Areal 85 ha
Flygbild 1986
Höh 260 m
VMI-nr 19G 3I01
Naturvårdsobjekt N83 172
Fältbesökt 1979-07, Ruben Fryleskog, Anders Viotti;
1991, Janolof Hermansson;
1992-09, Lars Söderström;
1992 Henrik W. Waldén.

Åmyran-Storkälen ligger i skogssluttningarna V om Yttre Holmsta ca fem km från Faxälven. Området avvattnas av Långån åt SO ner i älven. Åmyran, N om ån upptas av en tallbevuxen *nordlig mosse* genomdragen av flera mjukmattedråg. Den slingrande Långån kantas mindre arealer öppna strandkärr som längre upp övergår i *skogs-*



kärr. Lite längre upp i sluttningen finns också ett par glest lövträdsbevuxna skogskärr av fastmattetyp. Våtmarkskomplexet domineras av den med *sumpskog* bevuxna NO sluttning som sträcker sig ner mot Långån.

Vegetation och flora: Skogskärren strax söder om ån är huvudsakligen av rikkärrstyp med ett glest trädskikt dominerat av lågvuxna björkar. Här växer myrbräcka och tvåblad rikligt och ängs-, sumpnycklar och tagelstarr är också vanliga. Även guckusko förekommer. Sumpskogen upp i sluttningen, som utgörs av grov granskog med inslag av al och grova sälgar, är mycket variationsrik med en hög artdiversitet. Här växer bl a spädstarr, kransrams och skogsfru. Bland mossor som indikerar rika miljöer kan nämnas Brachythecium rivulare, Bryum weigelii, Calliergon cordifolium, C. giganteum, Callieronella cuspidata, Campylium protensum, Rhytidiadelphus subpinatus samt Lophozia ascendens. Här finns också ett flertal hotklassade knappnålslavar.

Fauna: Sumpskogen vid Storkälen hyser en värdefull molluskfauna.

Påverkan: I N och O kantas området av hyggen och i N tangeras det av en skogsbilväg. Enstaka diken finns också perifiert i Åmyrans O-kant och en vinterväg leder över mossen i norr. Ingreppen är dock av lokal och ringa inverkan. Äldre plockhuggning har skett i och i anslutning till sumpskogen.

Bedömning: Variationsrikt våtmarkskomplex med såväl fattig mossevegetation som rikkärr med bl a myrbräcka. Områdets stora värde utgörs dock av den på småbiotoper mycket variationsrika sumpskogen som representerar en ovanligt hög artdiversitet.

Källa: Berg, I. & Öhrling, H. 1988. Hotade skogsväxter i Ångermanland, rapport 1988:1. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Fryleskog, R. & Viotti, A. 1981. Ådalen - växter och djur, översiktlig naturinventering. En basrapport från Ådalskommittén, Länsstyrelsen i Västernorrland, Härnösand.


Hermansson, J. 1991. Inventering av lavar i tio sumpskogar i Västernorrlands län. Stencil. Skogsstyrelsen.

Söderström, L. 1992. Inventering av mossor i 10 sumpskogar i Västernorrlands län. Stencil. Skogsstyrelsen.

Waldén, H. W. 1992. Sumpskogen och molluskerna. Föredrag av Henrik W. Waldén vid Skogsstyrelsens sumpskogsseminarium i Sollefteå den 6-7 okt. 1992. Stencil. Skogsstyrelsen.

Nyflon. nr 36

Värdeklass I
Geokod 19G 4E 3D1B
Areal 253 ha
Flygbild 1986
Höh 345 m
VMI-nr 19G 4E03
Naturvårdsobjekt N83 004
Fältbesökt 1970, Folke Björkbäck;
1978, Per Simonsson;
1979, Ruben Fryleskog & Anders Viotti;
1982,KarinDue & Marie Muhr.



Nyflon är belägen på och strax norr om jämtlandsgränsen och sluttar svagt åt S ner mot Lillån och Hälan, vilka avvattnar myren. Nyflon ingår i en större myrmosaik och övergår åt norr och öster i "Myr längs Lövåsån" (Objekt 19G 4E02) samt åt söder och sydväst i myrar på jämtlandssidan. Myren innehåller en mängd fastmarksholmar som delar in myren i fyra större öppna partier. Stora delar domineras av *nordlig mosse* och *blandmyr*. Centralt i de öppna delarna finns *topogena kärr* av både fast- och mjukmattetyp. Mellan de många fastmarksholmarna uppträder kärren som smala dråg och här finns också ett litet *strängflarkkärr* med fastmattesträngar och lösbottenflarkar. I och i anslutning till kärren finns ett par mindre *tjärnar* och även en igenväxt sådan. I SO avgränsas myren av Lövåsån som kantas av ett *strandkärr*. Strax norr om denna finns ett parti med *skogskärr* av fastmattetyp. Längst i söder ligger ett större parti med *sumpskog* men på andra ställen i myren förekommer sumpskogen som mindre fläckar - bårder mot fastmarken.

Vegetation och flora: Vegetationen är huvudsakligen fattig med flera större mosse- och blandmyrpartier. Av kärren finns både fattiga, intermediära och rika varianter representerade. Längst upp i NV finns ett intermediärt till rikt kärr av fastmattetyp. Här finns öar-tuvor med Sphagnum fuscum på ett fastmattegolv med ett bottenskikt som domineras av krävande brun- och vitmossor så som S. warnstorfii, Loeskypnum badium och Campylium stellatum. I fältskiktet återfinns ängsnycklar och skavfräken. Den större öppna ytan i SO utgörs av ett diffust strängat mjukmattekärr med intermediär vegetation. Bottenskiktet är här variationsrikt med ett rikt inslag av mer krävande mossor och fältskiktet domineras av trådstarr. Längst i öster mot Lövåsån ligger ett, med glasbjörk och gran glest bevuxet, skogskärr som mot N övergår i ett öppnare mjukmattekärr. Vegetationen är här mycket rik. Bottenskiktet har rikligt inslag av krävande mossor som Tomentypnum nitens och Sphagnum teres samt även Calliergon giganteum och Calliergonella cuspidata. Inslaget av örter och gräs är också stort. Området hyser också en riklig förekomst av myrbräcka. Andra arter som förekommer här är kärrull, tagelstarr, blodnycklar, ängsnycklar och brudsporre. Strandkärret efter ån är starkt tuvat och övervägande öppet med bl a styltstarr och rörflen.

Fauna: Tofsvipa, storspov och grönbena är noterade i de fuktigare partierna.

Påverkan: Slåtter har bedrivits över större delen av norra Nyflon och på kärrpartierna på södra hälften av myren. Även maden efter Lövåsån har tidigare utnyttjats för slåtter om vilket rester av en ängslada vittnar. Längst i söder finns även en äldre damm och en bit uppströms denna syns en tydlig vegetationsförändring p g a tidigare dämningar. I NO avgränsas området mot ån av en liten grusväg som leder till Nykojan. Området är, trots vad som tidigare nämnts, i stort hydrologiskt opåverkat. De få diken som finns har en mycket lokal påverkan på intilliggande myrmark.

Bedömning: Variationsrikt myrmosaik med en gradient från fattiga till mycket rika växtsamhällen. Myren är mycket lite påverkad men bär spår av äldre tiders utnyttjande i form av slåtter. Botaniskt intressant.


Källa: Björkbäck, F. 1970. TELMA (IBP) Preliminär förteckning över särskilt skyddsvärda myrar i Västernorrlands län. Stencil vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Due, K. & Muhr, M. 1982. Nio myrar i Ångermanland. Opubliserad rapport vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Fryleskog, R. & Viotti, A. 1981. Ådalen - växter och djur, översiklig naturinventering. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Guvå, L. 1971. Naturinventering I Västernorrlands län. Del 2 Ångermanland, Ådalen. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.


Mascher, J. W. 1990. Ångermanlands flora. SBT-redaktionen, Lund.



Tagelstarr

Myr längs Lövåsån. nr 37

Värdeklass I
Geokod 19G 4E 3E9E
Areal 232 ha
Flygbild 1989
Höh 340 m
VMI-nr 19G 4E04
Naturvårdsobjekt N83 004, N83 005
Fältbesökt 1970, Folke Björkbäck;
1979, R Fryleskog & A Viotti;
1982, K Due & M Muhr.



Myren har en N-S utsträckning och är belägen i en flack dalgång som sträcker sig över jämtlandsgränsen. Myrytorna sträcker sig ner till Lövåsån som rinner fram i dalbottnen. Ån avvattnar också myrkomplexet ner i Hälan - biflöde till Indalsälven. Myren fortsätter nerströms Lövåsån och norr om densamma i Nyflon (Objekt 19G 4E01). Väster om ån utgörs myren till större delen av *blandmyr* med mossetungor omväxlande med kärrstråk. Längst i norr ligger flera större fastmarksholmar i blandmyren och här finns också ett mindre stråk med *sträng-flarkkärr*. På östra sidan ån finns lika-

ledes stora områden med blandmyr men här finns också flera större partier med *topogena kärr* och ett välutbildat strängflarkkärr. Längst i söder finns också ett större område med *nordlig mosse* med plan, strängar och stora höljor. Längs ån som rinner i dalbottnen sträcker sig *strandkärr* och lite längre upp kantas dessa på flera ställen av *skogskärr. Sumpskog* förekommer också i övergången mot fastmark, utmed bäckdråg och som små dungar utefter ån.

Vegetation och flora: Myrens västra del har en övervägande fattig vegetation medan den öster om Lövåsån uppvisar intermediära till rika växtsamhällen. Rikkärrssamhällen dominerar här i de topogena kärren och i delar av blandmyrpartierna. Här finns fast- och mjukmattor med bottenskikt av brunmossor som Warnstorfia sarmentosa och Campylium stellatum. Här återfinns också bla Scorpidium scorpidioides, Calliergon giganteum, Calliergonella cuspidata och Tomentypnum nitens. Fältskiktet domineras i allmänhet av trådstarr, tuvsäv och blåtåtel. Ängsnycklar, sumpnycklar och blodnycklar har även noterats. Maderna efter ån är starkt tuvade och övervägande öppna med bl a styltstarr och rörflen. Andra arter som förekommer är björnbrodd och tagelstarr som fläckvis förekommer rikligt. Bland mossorna skall här Hamatocaulis vernicosus nämnas.

Påverkan: Strandkärren efter Lövåsån har tidigare utnyttjats för slåtter om vilket rester av en ängslada vittnar. Längst i söder finns även en äldre damm och en bit uppströms denna syns en tydlig vegetationsförändring p g a tidigare dämningar. En mindre igenvuxen myrodling ligger också strax O om ån. Väster om densamma avgränsas området i S av en liten grusväg som leder till Nykojan. I söder finns ett längre dike som mynnar i ån men som har en mycket lokal påverkan på intilliggande myrmark. Områdets norra hälft omges av hyggen och de större fastmarksholmarna är också avverkade.

Bedömning: Myren är mångformig med ett flertal välutvecklade myrtyper. Betydande delar av myren uppvisar också rika växtsamhällen med flera krävande arter. Ett flertal kulturspår vittnar om äldre tiders utnyttjande men myren är trots detta i stort hydrologiskt opåverkad.

Källa: Björkbäck, F. 1970. TELMA (IBP). Preliminär förteckning över särskilt skyddsvärda myrar i Västernorrlands län. Stencil vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.


Due, K. & Muhr, M. 1982. Nio myrar i Ångermanland. Opublicerad rapport vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Guvå, L. 1971. Naturinventering i Västernorrlands län. Del 2 Ångermanland, Ådalen. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Fryleskog, R. & Viotti, A. 1981. Ådalen - växter och djur, översiklig naturinventering. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Gideåbergsmyrarna. nr 41

Värdeklass I
Geokod 19G 4H 0C7G
Areal 58 ha
Flygbild 1989
Höh 275 m
VMI-nr 19G 4H01
Naturvårdsobjekt N83009
Fältbesökt 1970, Folke Björkbäck; 1973, Jan Lundqvist; 1991-07, Jan W. Mascher.



Gideåbergsmyrarna ligger SV om byn Gideåberg ca fem km från Faxälven. Området utgörs av tre mindre myrar, Rävlarna, Småmyrarna och Mellanmyren, åtskiljda av skogspartier. Myrarna avvattnas åt NO ner i Faxälven av flera mindre bäckar. Rävlarna, längst i NV, utgörs av ett vackert struk-

turerat *sträng-flarkkärr* med fastmattesträngar som dämmer lösbottenflarkar och enstaka flarkgölar. Småmyrorna upptas i mitten av ett mindre öppet *topogent kärr* av fastmattetyp omgivet av *skogskärr*. Mellanmyren, längst i SO, utgörs endast av en liten öppen yta med topogent fastmattekärr. De öppna myrpartierna omsluts av *sumpskog*. Flera källor finns också inom området. Myren ligger inom riksintresseområdet "Stensjö-Gideåbergs rikkärrområde" och utgör sedan 1968 naturreservat.

Vegetation och flora: Gideåbergsmyrarna har länge varit kända för sina extremrikkärr. Områdets myckenhet och artrikedom av orkidéer har gett det en särställning bland botanister. Här förekommer skogsnycklar, sumpnycklar, brudsporre, tvåblad samt trådfräken, myrstarr, tagelstarr och myrbräcka i skogskärren och de öppna kärren. På Rävlarna växer brunag och myggblomster i flarkarna och ängsnycklar på strängarna. I sumpskogspartierna kan man hitta arter som kransrams, glesgröe, guckusko, skogsfru och norna. Bland mossorna kan nämnas Rhytidiadelphus subpinnatus, Brachythecium rivulare, Calliergonella cuspidata, Calliergon cordifolium och C. giganteum.

Påverkan: Delar av myren har dikats, redan i början av 1900-talet, och en igenväxning av vissa delar har skett sedan slåttern upphörde i slutet av förra seklet. Vissa delar av Mellanmyren röjs regelbundet, som ett led i reservatsskötseln, för att gynna den slåtterpräglade floran.

Bedömning: Gideåbergsmyrarna med sina extremrikkärr och rika sumpskogar hyser en mycket stor artrikedom av kärlväxter med ett flertal ovanligare arter. Myrarna är en tydlig representant för västra Ångermanlands kalkgynnade kärr- och sumpskogsflora. Området innehåller också ett vackert strukturerat strängflarkkärr. Naturreservat, Riksintresse, Myrskyddsplan.

Källa: Bergvall, F. 1953. Orkidémyrarna i Gideåberg. I Natur i Ångermanland och Medelpad. Red. Elofson, O & Curry-Lindahl, K. Uppsala.

Björkbäck, F. 1970. TELMA (IBP). Preliminär förteckning över särskilt skyddsvärda myrar i Y län. Stencil vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Guvå, L. 1971. Naturvårdsinventering i Västernorrlands län. Del 2 Ångermanland, Ådalen. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Lundqvist, J. A. G. 1973. Växter på Gideåbergsmyrarna. Manuskript vid Länsstyrelsen Västernorrlands län, Härnösand.


Lundqvist, J. 1987. Beskrivning till jordartskarta över Västernorrlands län och förutvarande Fjällsjö k:n. Sveriges geologiska undersökningar, SER ca, avhandlingar och uppsatser i A4, nr 55. Uppsala.

Mascher, J. W. 1990. Ångermanlands flora. SBT-redaktionen, Lund.

Mascher, J. W. 1992. Florafynd under ångermanländska botanikdagar. Natur i norr 11(1)49-53. Umeå 1992.

Återmyran. nr 49

Värdeklass I
Geokod 19G 5I 3E2I
Areal 166 ha
Flygbild 1986
Höh 200 m
VMI-nr 19G 5I01
Naturvårdsobjekt N83 018
Fältbesökt 1982-07, Karin Due & Marie Muhr.



Större myrkomplex i en bredare NV-SO orienterad dalsänka. Myren är i stort helt plan och avvattnas av Gammbodbäcken som rinner mitt genom myren ner i Gröningen och Gröningsån söder därom. Myren domineras helt av stora partier av *nordlig mosse* som ligger på ömse sidor om bäcken. Mosseplanen genomkorsas av kärrdråg och vissa delar har en sträng- och höljeuppbyggnad. Mot fastmarken i väster finns också en smal lagg. I myrens norra och södra del finns *topogena kärr* i form av dråg men även större ytor. Gammbodbäcken kan-

tas av en smalare zon med *strandkärr* som till större delar är trädbevuxen men även uppvisar öppna partier. I anslutning till fastmarken finns också några mindre partier med *sumpskog*.

Vegetation och flora: Både tallbevuxna och öppna mosseplan förekommer. Stora delar av dessa plan har ett bottenskikt dominerat av renlavar. I de delar av mossen som har en sträng- höljeuppbyggnad hyser strängarna en ristuvevegetation av Sphagnum fuscum-typ. Höljorna är av mjukmattetyp och har visst inslag av kärrvegetation. Dessa delar utgör gränsfall mot blandmyr. Kärren är av fattig, intermediär men också av rikare typ. De fattigare typerna domineras ställvis av Sphagnum angustifolium, taggstarr och tuvull. De rikare kärren karaktäriseras av yppig brunmossflora med arter som Warnstorfia sarmentosa, Loeskypnum badium, Scorpidium revolvens och Scorpidium scorpioides samt vitmossan Sphagnum teres. Myren innehåller också arter som ängsnycklar, myggblomster samt lapp- och niprör (hotkatagori 4).

Fauna: Bäver har dämt och arbetat i Gammbodbäcken.


Påverkan: Otydliga spår av äldre vinterväg löper över myren och på ett ställe finns ett par diken i gränsen mot fastmarken. Trots detta kan myren sägas vara hydrologiskt helt opåverkad. Däremot omges större delar av kalhyggen. I nordvästra delen finns spår efter en liten, äldre torvtäkt. Ett torvtäktstillstånd som gäller fram till 94-12-31 finns på myren men någon verksamhet har ej påbörjats.

Bedömning: Stort och tydligt avgränsat myrkomplex som domineras av stora mossepartier. På sina ställen är dessa, hydrologiskt sett, på gränsen till blandmyr. Stor amplitud i näringsstatus vilket har betydelse för myrens artrika vit- och brunmossflora. Hydrologiskt opåverkad men hyggen omger större delen. Myren ligger i anslutning objekt 19G 5J01 och utgör tillsammans med detta samt objekt 19G 6J01 ett ekologiskt sammanhängande våtmarksområde.

Källa: Due, K. & Muhr, M. 1982. Tretton myrar i Västrenorrlands län, rapport 1983:1. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Myr NV Frättentjärnen. nr 50


Värdeklass I
Geokod 19G 5J 4A2J
Areal 123 ha
Flygbild 1986
Höh 200 m
VMI-nr 19G 5J01
Naturvårdsobjekt N83 018
Fältbesökt 1993-08, Sören Uppsäll.



Större våtmarkskomplex i anslutning till, och endast åtskillt av en fastmarksrygg från, Återmyran (19G 5I01). Området sluttar svagt åt söder och avvattnas av Nordsjöbäcken som rinner genom området ner i Gröningsån, som tangerar i söder. Stora mer eller mindre öppna partier med *nordlig mosse* dominerar, främst i den västra delen. Längre åt öster finns öppna *topogena kärr* med både lösbottnar och fastmattepartier. De nordvästra och östra delarna domineras av *skogskärr* med inslag av *sumpskogspartier* och fastmarksholmar. Nordsjöbäcken och framför allt Gröningsån i söder kantas av *strandkärr*. Runt Frättentjärn, som utgör ett sel i ån, finns gungflypartier.

Vegetation och flora: Lösbottenkärren är rika med ett mossfattigt bottenskikt där Scorpidium scorpidioides och levermossan Odontoschisma elongatum är de vanligaste arterna tillsammans med dy- och dvärgbläddra. Tuvsäv och sjöfräken dominerar fältskiktet med sparsam förekomst av ullsäv. Här finns även fastmattetuvor med Sphagnum subfulvum tillsammans med tuvsäv och trådstarr. Myggblomster och ängsnycklar fö-

rekommer också sparsamt. I avrinningsdråg återfinns även kärrull. Skogskärren är bitvis intermediära-rika. Talldominerade skogskärr med bladvass i botten samt brunmossrika tallkärr förekommer. I de senare dominerar S. fuscum och S. angustifolium tillsammans med S. warnstorfii och Tomentypnum nitens. Gran/björkkärr som successivt övergår i sumpskog finns i Ö. Här dominerar antingen S. riparium eller S. girgensohnii tillsammana med S. Wulfianum som bitvis växer rikligt på trädsocklar. Grönvide förekommer rikligt. Annars är det kärrfräken som dominerar fältskiktet där även arter som repestarr och fjällskråp förekommer sparsamt. Strandkärren är kraftigt tuvade med domi-



Fjällskåp

nans av blåtåtel, trådstarr, klubbstarr och knaggelstarr. Scorpidium scorpidioides förekommer sparsamt i botten. Gungflyna runt Frättentjärnen är starr- och bladvassbevuxna. Delar av mosseplanens bottenskikt domineras av renlavar.


Fauna: Tranor och sångsvan har noterats vid fältbesök.

Påverkan: En del körspår förekommer, främst i den NO delen, men har obetydlig inverkan och området är i stort hydrologiskt opåverkat. I väster är fastmarken avverkad mot myren. Ett torvtäcktstillstånd som gäller fram till 94-12-31 finns på myren men någon verksamhet har ej påbörjats.

Bedömning: Variationsrikt och ostört våtmarkskomplex med både fattiga och rikare vegetationstyper. Intressantare skogskärr/sumpskogs partier samt strandkärr förekommer. Ornitologiskt värde. Myren ligger i anslutning objekt 19G 5I01 samt objekt 19G 6J01 och utgör tillsammans med dessa ett ekologiskt sammanhängande våtmarksområde.

Salsjömyran. nr 51

Värdeklass II
Geokod 19G 5J 3D0J
Areal 79 ha
Flygbild 1986
Höh 215 m
VMI-nr 19G 5J02
Naturvårdsobjekt N83 322



Långsträckt myrkomplex orienterat i NV-SO riktning. Myren avvattnas åt NV via Skravelbäcken ner i Gröningsån samt till en mycket liten del åt SO. *Topogena kärr* dominerar myren. Dessa är av både mjuk- och fastmattetyp och bitvis kan en otydlig strängbildning skönjas. Från fastmarkskanterna löper tungor av *nordlig mosse* ut i myren. Mellan dessa ligger kärrdråg. I myrens norra hälft omväxlar *skogskärr* med dessa båda tidigare nämnda myrtyper. Här ligger också en mindre *tjärn* omgiven av gungfly. Från tjärnen rinner Skravelbäcken vars stränder är påverkade av bäverns verk. Myren gränsar i V mot brandpräglad skog med naturskogskaraktär.

Påverkan: Myren är helt opåverkad.

Bedömning: Helt opåverkat mindre myrkomplex dominerat av öppna topogena kärr samt med gungflyinramad tjärn.

Bitarflon, Hällbergflon, Rävelmyran. nr 52

Värdeklass II
Geokod 19G 6D 3B0H
Areal 151 ha
Flygbild 1986
Höh 510 m
VMI-nr 19G 6D01
Naturvårdsobjekt N83 323




Myrkomplex högt beläget på jämtlandsgränsen. Myren är terrängföljande och sträcker ut sig i långa tarmar i dalgångarna mellan de skogsklädda bergen. Myren avvattnas via mindre bäckar i samtliga väderstråck. I dalbottnarnas centrala delar finns *topogena kärr*, huvudsakligen av fastmattetyp med dråg dominerade av mjukmattor. På flera ställen finns också *sträng-flarkkärr* med fastmattesträngar och lösbottenflarkar. Flarkgölar förekommer också rikligt. Resterade delar utgörs av *blandmyr*, då främst de högre och perifiert belägna delarna. En liten *tjärn* och ett flertal mindre gölar finns också inom området. Myren är i stort opåverkad.

Bedömning: Terrängföljande hydrologiskt intakt myrkomplex. Myren innehåller också ett strängflarkkärr med rikligt förekommande flarkgölar.

Utanedesflon. nr 55

Värdeklass II
Geokod 19G 6J 0B1I
Areal 60 ha
Flygbild 1986
Höh 205 m
VMI-nr 19G 6J01
Naturvårdsobjekt N83 324




Mindre myrkomplex som sluttar svag åt SO och avvattnas ner i Gröningsån. Myren gränsar i väster mot "Myr NV Frättentjärn" (19G 5J01). Myren domineras av ett stort öppet *topogent kärr* av mjukmattetyp som upptar NV delen. Kärret dränerar via ett dråg ner i Gröningsån där mindre partier med *strandkärr* finns längs ån. Söder om den öppna kärrytan ligger ett parti med *nordlig mosse* där planen genomkorsas av kärrdråg. Mossen är till stora delar glest tallbevuxen. Den östra delen av myren är mer uppsplittrad med omväxlande tungor av mosse, *skogskärr* och däremellan kärrdråg orienterade i NV-SO riktning.

Påverkan: Myren är i stort helt opåverkad. Ett torvtäktstillstånd som gäller fram till 94-12-31 finns på myren men någon verksamhet har ej påbörjats.

Bedömning: Mindre och ostört myrkomplex. Myren ligger i anslutning objekt 19G 5J01 och utgör tillsammans med detta samt med objekt 19G 5I01 ett ekologiskt sammanhängande våtmarksområde.

Myr vid Långtjärnen. nr 57

Värdeklass II
Geokod 19G 7H 4E3C
Areal 64 ha
Flygbild 1986
Höh 275 m
VMI-nr 19G 7H01
Naturvårdsobjekt N83 096
Fältbesökt 1979-06, Mats Dynesius.



Mindre myrkomplex som sträcker sig upp i NV riktning längs Tattarsjöns östra sida. I öster, vid *Långtjärnen*, gränsar området mot Grundtjärnsflon (objekt 19G 7I03). Området avvattnas åt väster ner i Tattarsjön och via en mindre bäck norrut ner i Faxälven. Myren är avdelad i två delar av fastmarksryggar. Den östra delen domineras av öppna *topogena kärr* i anslutning till Långtjärn. Tjärnen, och en mindre tjärn strax åt väster, omges av gungfly. Mot fastmarken finns också mindre partier med *nordlig mosse* och *skogskärr*. Myrens västra del domineras av två större partier med topogent kärr och norr därom nordlig mosse. Bäcken som rinner ut från Tattarsjön kantas av skogskärr.

Vegetation och flora: Söder om Långtjärn finns lågstarrkärr med bl a ullsäv. Nordväst om Långtjärn finns blöta kärr dominerade av blåtåtel, dvärgbjörk och tuvull.

Fauna: Myrens östra del har inventerats på fåglar och utgör värdeklass II i myrfågelinventeringen. Det inventerade området sträcker sig in i objekt 19G 7I03. Arter som grönbena, gluttsnäppa, enkelbeckasin, tofsvipa, gräsand, bläsand och gulärla har noterats.

Påverkan: Längst i öster har en skogsbilväg byggts som skär av den myrtarm som förenat området med myrarna öster därom.


Bedömning: I stort opåverkat myrkomplex som tillsammans med objekt 19G 7I03 hyser skyddsvärde ur ornitologisk synpunkt.

Källa: Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Fryleskog, R. & Viotti, A. 1981. Ådalen - växter och djur, en översiktlig naturinventering. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Grundtjärnsflon. nr 60

Värdeklass I
Geokod 19G 7I 4B0B
Areal 117 ha
Flygbild 1986
Höh 280 m
VMI-nr 19G 7I03
Naturvårdsobjekt N83 016, N83 096
Fältbesökt 1979-06, Mats Dynesius; 1993-08, Sören Uppsäll.



Tämligen variationsrikt myrkomplex som sträcker sig i en cirkel runt en mindre skogsklädd bergsknalle. Även några mindre fastmarksholmar finns ute i myren. Området avvattnas i sin västra ände åt söder av Bjässtjärnbäcken. Myrens vidare delar utgörs av öppna *topogena kärr* av fast- och mjukmattetyp. I öster finns ett svagt utbildat *sträng-flarkkärr*. Mot fastmarken breder smalare partier med *skogskärr* och *nordlig mosse* ut sig. Strax SO om bergknallen finns ett fattigare källkärr. I söder rinner en bäck mellan två *tjärnar* som till stor del täcks av gungfly. I myrens norra del finns ytterligare en tjärn. Bäcken i söder kantas av en smalare bård med *strandskog*.

Vegetation och flora: Näringförhållandena är fattiga till intermediära, bitvis rika. Vegetationen i södra delen domineras av låg- och högstarrarter samt blåtåtel och bladvass. Här växer också tagelstarr. I V finns blöta mjukmattor med Scorpidium scorpidioides och dybläddra i botten samt vit- och dystarr i fältskiktet. Här finns också mindre fastmatteöar med Sphagnum subnitens, S. subsecundum, S. warnstorfii och Campyliun stellatum. Fältskiktet domineras av tuvsäv, ullsäv och trådstarr med inslag av rikkärrsarter som ängsnyckslar och björnbrodd. Av skogskärren finns både fattiga tallkärr samt gran/björkkärr. Källkärret domineras av Straminergon stramineum tillsammans med Scapania paludicola och Warnstorfia fluitans. Sträng-flarkkärrets strängar karaktäriseras av arter som blåtåtel, tuvsäv och ullsäv samt S. papillosum och S. subnitens. Flarkarna är av lösbottentyp och här växer vitstarr, vitag och dybläddra. Fattigare partier med dystarr och kallgräs finns också. Tjärnarna i söder är kraftigt igenväxt av högstarr och sjöfräken. Strandskogen utgörs av sumpskog av ört-starrtyp med ett mycket artrikt fältskikt. I botten dominerar S. girgensohnii. Även bottenskiktet är artrikt. Bl a förekommer Calliergon cordifolium, Climacium dendroides och S. wulfianum.

Fauna: Tjärnarna i söder och bäcken mellan dessa har påverkats av bäverns aktiviteter. Myren utgör värdeklass II samt III i myrfågelinventeringen med arter som gräsand, kricka, bläsand, knipa, trana, tofsvipa, enkelbeckasin, grönbena, gluttsnäppa och gulärla.

Påverkan: Sånär som på bäverns dämningar är området i stort opåverkat.


Bedömning: Variationsrikt och i stort opåverkat mindre myrkomplex med fin sumpskog längs bäcken. Såväl fattiga som rika vegetationstyper förekommer. Området har dessutom ornitologiskt värde.

Källa: Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Fryleskog, R. & Viotti, A. 1981. Ådalen - växter och djur, en översiktlig naturinventering. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Östvattenmyran. nr 62

Värdeklass II
Geokod 19G 8C 0B1H
Areal 87 ha
Flygbild 1986
Höh 365 m
VMI-nr 19G 8C01
Naturvårdsobjekt N83 325




Variationsrikt våtmarkskomplex i anslutning till Östvattnet nära jämtlandsgränsen. Områdets södra del sluttar åt väster ner mot Isbillaån vilken avvattnar direkt ner i Östvattnet. Norra delen utgörs av ett stort *strandkärr* med omfattande gungflypartier mot sjön. Längs den meandrande ån och längre upp tar fastmattor med vide- och starrvegetation vid. Ett större parti med *blandmyr* sträcker sig sedan söderut öster om ån. Ovanför i sluttningen vidtar, till stor del glest trädbevuxna, *soligena kärr* blandat med mindre *sumpskogspartier*. Även i andra delar återfinns sumpskogar i övergången mot fastmarken. Området är i stort helt opåverkat.

Bedömning: Variationsrikt och opåverkat våtmarkskomplex med stora strandkärr samt soligena kärr.

Myr mellan Stor- och Lill-Grundsjön. nr 63

Värdeklass I
Geokod 19G 8D 3D3C
Areal 137 ha
Flygbild 1986
Höh 305 m
VMI-nr 19G 8D01
Naturvårdsobjekt N83 209




Plant kärrkomplex som sträcker sig i NV-SO rikning mellan Stor- och Lill-Grundsjön vilka också avvattnar myren. Ute på myren finns ett par mindre *tjärnar* och myren ansluter också till en lite större. Den NV delen domineras helt av öppna *topogena kärr* med centrala mjukmattepartier med diffusa strukturmönster. Mot kanterna förekommer övervägande fastmattor. I den SO delen dominerar tallbevuxna *skogskärr*. Här finns också mindre *sumpskogsbårder* i övergången mot fastmarken. Myren är i stort helt opåverkad. Myren ingår i riksintresseområdet "Västra Ramsele myr- och skogsområde".

Bedömning: Hydrologiskt intakt myr med stora öppna mjukmattekärr och flera tjärnar. Området har också stor vattenkontakt mot flera sjöar. Ingår i riksintresseområde naturvård.

Myr NV Stor-Rensjön. nr 64

Värdeklass I
Geokod 19G 8D 4D5I
Areal 119 ha
Flygbild 1986
Höh 305 m
VMI-nr 19G 8D02
Naturvårdsobjekt N83 163
Fältbesökt 1979-07, Ruben Fryleskog och Anders Viotti.



Huvudsakligen plant myrkomplex som sträcker sig i NV-SO riktning mellan Stor-Grundsjön och Stor-Rensjön. Myren avvattnas i båda ändar ner i dessa sjöar. Området karakteriseras av ett tiotal *tjärnar* och ett flertal fastmarksholmar. Mellan dessa utbreder sig öppna *topogena kärr* kantade av *skogskärr* i de perifiera delarna mot fastmarken. I anslutning till en del av tjärnarna och längst i väster mot Stor-Grundsjön finns mindre gungflypartier. I söder återfinns tungor av *nordlig mosse* som sträcker sig ut från fastmarken på vissa ställen. Efter den bäck som rinner från de västligare tjärnarna ut i Stor-Rensjön finns ett mindre *strandkärr*. Myren ingår i riksintresseområdet "Västra Ramsele myr- och skogsområde".

Vegetation och flora: Myrens kantområden utgörs oftast av lågtuvade och tallbevuxna risdominerade sphagnumkärr. De öppna myrytornas fastmattor domineras av ullsäv, tuvsäv och blåtåtel

medan mjukmattorna oftast har ullsäv som dominant. Större delen av myren utgörs av intermediära kärr medan den västra delen har rikkärrkaraktär. Här växer bl a sumpnycklar och brudsporre. Längst i NV finns ett litet tallbevuxet, ängsartat sumpskogsparti där liljekonvalj dominerar. Här växer också brudsporre, guckusko och kransrams.

Fauna: Vid fältbesök noterades grönbena, enkelbeckasin, flera gluttsnäppor samt ett tranpar.


Påverkan: Myrområdet är huvudsakligen opåverkat.

Bedömning: Variationsrikt myrkomplex med stort inslag av tjärnar och fastmarksholmar. Delar har rikkärrskaraktär med arter som brudsporre och guckusko och myren har med sitt stora inslag av vatten också värde för fågellivet. Myren ingår i riksintresseområde naturvård.

Källa: Fryleskog, R. & Viotti, A. 1981. Ådalen - växter och djur, översiktlig naturinventering. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Förelmyran, Hälltegan. nr 65

Värdeklass I
Geokod 19G 8E 1B7A
Areal 134 ha
Flygbild 1986
Höh 300 m
VMI-nr 19G 8E01
Naturvårdsobjekt N83 326, ingår i 83 202



Våtmarkskomplex beläget utefter Paterån och Mellanån och mellan sjöarna Lill-Grundsjön, Stor-Rensjön och Håsjön. Utefter de meandrande åarna och mot sjöarna sträcker sig breda starr- och videbevuxna *strandkärr*. Övriga delar domineras av *skogskärr* av fastmattetyp med inslag av mindre partier med öppna mjukmattekärr. Mot fastmarken i söder och runt ett par centralt belägna fastmarksholmar finns partier med *sumpskog* av blandskogstyp. Längst i väster finns ett par mindre partier med *nordlig mosse*.


Fauna: Fiskgjuse häckar inom området.

Påverkan: Sånär som på ett dike som förbinder Lill-Grundsjön och Stor-Rensjön är området opåverkat. Diket har endast en lokal påverkan.

Bedömning: Variationsrikt våtmarkskomplex med mycket stor vattenkontakt som präglar området starkt. Området är dessutom i stort hydrologiskt intakt. Ingår i riksintresseområde naturvård.

Sjömyran. nr 66

Värdeklass II
Geokod 19G 8F 0E4G
Areal 78 ha
Flygbild 1986
Höh 235 m
VMI-nr 19G 8F01
Naturvårdsobjekt N83 327



Mindre våtmarkskomplex som sträcker sig från Valasjön upp åt NV i en dasänka. I dalbottnen ringlar Storbäcken som kantas av graminidbevuxna *strandkärr*. Vid utloppet i Valasjön finns gungfly


som sträcker sig ut i sjön. Delarna från strandkärret och upp till fastmarken utgörs av omväxlande topogena *skogskärr* och partier med *nordlig mosse*. Här finns även mindre öppna mjukmattekärr i form av dråg. Både mossar och kärr är annars mer eller mindre tallbevuxna.

Påverkan: På västra sidan gränsar området mot ett flertal hyggen och på den östra tangerar en skogsbilväg våtmarken.Hydrologin är dock intakt. På maden finns spår efter äldre tiders slåtter.

Bedömning: Hydrologiskt intakt våtmarkskomplex vars värde betingas av strandkärr och gungflypartier mot Valasjön.

Lövlunds ängskärr. nr 70

Värdeklass I
Geokod 19G 9E 2D6D
Areal 30 ha
Flygbild 1989
Höh 260 m
VMI-nr 19G 9E01
Naturvårdsobjekt N83240
Fältbesökt 1987, Ingrid Berg & Helén Öhrling.



Lövlunds ängskärr ligger i en östsluttning ner mot Lafssjön ungefär en km N Lövlundsåns utlopp i densamma. Våtmarkerna avvattnas ner i sjön, bl a av några mindre bäckar. Området utgörs av en mosaik av öppna ytor med *topogent kärr* tillsammans med *skogskärr, sumpskog* samt en mindre del fastmark. Kärren domineras av fastmattor. Våtmarken ligger inom riksintresseområdet "Västra Ramsele myr- och skogsområde".

Vegetation och flora: Området hyser rikkärrvegetation med ett mycket stort bestånd (4000-5000 exemplar) av guckusko. Dessutom växer här blodnycklar, brudsporre, skogsfru, kransrams, finbräken samt myrull.


Påverkan: Två mindre hyggen finns i samt i anslutning till våtmarken som även är dikespåverkad. Dikena har en stark men lokal påverkan.

Bedömning: Området utgör, trots ingreppen, en fin mosaik med öppnare kärrytor insprängda i sumpskogen. Starkt bidragande till områdets höga värde är dess rika vegetation med ett mycket rikt bestånd av guckusko samt förekomst av den i länet mycket sparsamt förekommande myrullen.

Källa: Berg, I. & Öhrling, H. 1988. Hotade skogsväxter i Ångermanland, rapport 1988:1. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Storflon. nr 71

Värdeklass II
Geokod 19G 9E 2A4D
Areal 91 ha
Flygbild 1986
Höh 270 m
VMI-nr 19G 9E02
Naturvårdsobjekt N83 162
Fältbesökt 1979-07, Ruben Fryleskog & Anders Viotti.



Långsträckt kärrkomplex som sträcker sig efter Vallsjönoret upp mot Vallsjön. Myren avvattnas söderut av Vallsjönoret ner i Lövlundsån. Myren karaktäriseras av flera, genom moränryggar, mer eller mindre avgränsade delar. Dessa utgörs om-

växlande av *topogena kärr* och *skogskärr*, de senare företrädesvis gränsande mot fastmarken. De nedre delarna av Vallsjönoret kantas av *strandkärr*. En liten *tjärn* finns också centralt i området.

Vegetation och flora: Vissa delar av området är tydligt påverkade av kalkhaltiga avlagringar, främst myrens norra delar. I skogskärren är det tallen som dominerar med ris i botten. De öppna kärren domineras oftast av tuvsäv med inslag av ullsäv, flaskstarr, knaggerstarr och ängsnycklar. Strandkärren har en högstarrvegetation med flask- och trådstarr. Rikkärrpartierna uppvisar arter så som myrstarr och blodnycklar.

Påverkan: Området är opåverkat sånär som på anslutande hyggen.

Bedömning: Tämligen intressant kärrkomplex främst med tanke på orördhet och botaniska värden.

Källa: Fryleskog, R. & Viotti, A. 1981. Ådalen - växter och djur, översiktlig naturinventering. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Norrtjärnsflon. nr 73

Värdeklass II
Geokod 19G 9H 1B0B
Areal 85 ha
Flygbild 1986
Höh 255 m
VMI-nr 19G 9H01
Naturvårdsobjekt N83 210




Långsträckt våtmarkskomplex beläget strax öster om Faxälven. Norrtjärnsflon sluttar svagt åt norr och avvattnas huvudsakligen i den rikningen av ett mindre vattendrag ner i älven. Ungefär mitt på myren rinner ett par bäckar in och flyter gemensamt fram genom myren till ett par gungflyomgärdade *tjärnar* i dess norra del. Bäcken kantas av starrbeväxta *strandkärr*. Mindre delar upptas här också av videbuskage. Efter myrens västra kant dominerar glest tallbevuxna *skogskärr* och *nordliga mossar*. I NO utbreder sig öppna *topogena kärr* och ett parti med *sträng-flarkkärr* med fastmatteströngar och mjukmatteflarkar. I områdets södra del omväxlar öppna topogena kärr med glest tallbevuxna mossepartier och ett större *sumpskogsparti*. Här finns också en mindre tjärn.

Påverkan: Områdets södra del kantas delvis av hyggen och i norr passerar en kraftledning över myrens kant. Hydrologiskt är Norrtjärnsflon intakt.

Bedömning: Mycket variationsrikt och hydrologiskt intakt våtmarkskomplex med bl a ett mindre parti med sträng-flarkkärr.

Per-Jansmyran. nr 74

Värdeklass I
Geokod 19H 0D 1B4E
Areal 134 ha
Flygbild 1986
Höh 260 m
VMI-nr 19H 0D01
Naturvårdsobjekt N83 211



Myrkomplex beläget mellan Stor-Aspsjön, Lill-Aspsjön och Norsjön S om Långsele. Myren är i stort helt plan och avvattnas ner i de omgivande sjöarna som i sin tur lämnar sitt vatten till Faxälven. De centrala delarna utgörs av fattiga öppna *topogena kärr* och *blandmyrar*. Partier med öppna kärr finns också i myrens N och O del. I den O samt framför allt i den V delen dominerar tallbevuxna *skogskärr* med stort inslag av fastmarksholmar. Mot fastmarken i myrens centrala del samt längst i N finns ett par mindre partier med *nordlig mosse*, bitvis med strängstruktur. Två små *tjärnar* finns också varav den S via en liten bäck leder vatten ner till Norsjön.

Påverkan: Körskador, troligen efter militära bandfordon, finns på flera ställen inom området. Speciellt kraftiga i den östra delen. Totalt sätt har dock dessa en mycket lokal hydrologisk inverkan. I övrigt är myren opåverkad.

Bedömning: Relativt opåverkad samt variationsrik myr belägen i myrfattig trakt.

Stor-Klingermyran.nr 76

Värdeklass II
Geokod 19H 0E 2A3B
Areal 121 ha
Flygbild 1986
Höh 255 m
VMI-nr 19H 0E01
Naturvårdsobjekt N83 328




Uppsplittrat myrkomlex med en mängd fastmarksholmar och med huvudsakligen trädtäckta myrtyper som diffust övergår i varandra. Området sluttar svagt åt NO. Från Stor-Hundtjärnen i väster rinner en bäck kantad av starrbevuxna *strandkärr* som mynnar i Väster-Spannsjön, till vilken hela området avvattnas. Längst i norr finns ett större parti med öppet *topogent kärr,* huvudsakligen av fastmattetyp. Centralt i området och i öster finns partier med öppen *blandmyr*. Resterande delar av myren utgörs av tallbevuxna *skogskärr*, med smärre inslag av *nordlig mosse*. Ett par mindre tjärnrester finns i myrens norra del.

Påverkan: En kraftledning löper diagonalt genom området och i anslutning till denna finns, på sina ställen kraftiga, körspår. I övrigt är myren till synes opåverkad.

Bedömning: Mosaikbetonat myrkomplex med huvudsakligen trädbevuxna myrtyper och ett flertal större fastmarksholmar.

Visjömyran. nr 77

Värdeklass II
Geokod 19H 1A 1C4C
Areal 76 ha
Flygbild 1986
Höh 170 m
VMI-nr 19H 1A01
Naturvårdsobjekt N83 329



Till större delen trädtäckt våtmarkskomplex strax väster om Helgumssjön. Området sluttar svagt åt SO och avvattnas via ett mindre vattendrag ner till Finnån. Centralt genom myren rinner Visjöbäcken som kantas av ömsom glest trädbevuxna *strandkärr*, ömsom starr- och buskbevuxna dito. Längst i sydost flyter bäcken genom en till stora delar igenvuxen *tjärn* med stora gungflypartier längs stränderna men också ute i tjärnen. Strax väster samt öster om tjärnen finns två mindre partier med glest tallbevuxen *nordlig mosse*. Förutom ett antal mindre fastmarksholmar utgörs resterande delar av området av en mosaik mellan *skogskärr* och *sumpskogar*, där de senare dominerar. En stor del av sumpskogarna är lövdominerade.


Påverkan: Alldeles norr om tjärnen finns ett dikat, lövskogsbeväxt område som troligen utgjort en myrodling. Smärre diken förekommer också sparsamt i myrens kanter men påverkan är marginell.

Bedömning: Tämligen variationsrikt våtmarkskomplex som präglas av strandkärr och sumpskog.

Helgumsjöns delta. nr 80

Värdeklass I
Geokod 19H 3A 0A4E
Areal 310 ha
Flygbild 1986
Höh 110 m
VMI-nr 19H 3A01
Naturvårdsobjekt N83 011
Fältbesökt 1975, Göran Andersson, Mikael Delang & Peter Ståhl.

Helgumsjöns delta är ett av Norrlands största insjödeltan. Det är subakvatiskt, med andra ord har det utbildats under vattnet. Deltat är mycket välutvecklat med meanderslingor, avsnörningssjöar och leveer. Landtungorna inne i älvkrökarna utgörs uppströms och längs älven av *strandskogar* som helt domineras av löv med inslag av fastmark som tidvis översvämmas. Innanför och nedströms dessa utbreder sig öppna *strandkärr* kring slingrande älvlaguner. På högre belägna öppna delar finns mindre arealer av *strandäng* samt några



partier med sumpskog som inte påverkas av älvens vatten. På tungorna inne i älvkrökarna finns några *tjärnar* som utgör restsjöar efter att älven ändrat sitt lopp.

Vegetation och flora: Områdets strukturella samt hydrologiska mångfald gör att det hyser en mycket artrik kärlväxtflora. Bland något ovanligare arter kan nämnas repestarr, rankstarr och glesgröe (hotklass 2).

Fauna: Deltat hyser ett art och individrikt fågelliv och är den rikaste flyttfågellokalen i länets inland. Ett flertal våtmarksarter, änder och vadare, häckar också inom området.


Påverkan: Kulturpåverkan har tidigare varit stark med slåtter fram till 1930-talet. Idag betas älvens västra mynningsarm där många lador ännu står kvar. En kraftledning korsar över delar av området i norr.

Bedömning: Helgumsjöns delta har mycket höga geomorfologisk-hydrologiska, ornitologiska samt även botaniska värden. Området intar en unik ställning i länet.

Källa: Andersson, G., Ståhl, P. & Delang, M. 1975. Översiktlig naturinventering av Helgumsjöns delta, rapport 1975:21. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Guvå, L. 1971. Naturvårdsinventering i Västernorrlands län. Del 2 Ångermanland, Ådalen. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.


Fryleskog, R. & Viotti, A. 1981. Ådalen - växter och djur, översiktlig naturinventering. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.



Enkelbeckasin

Björkåns utlopp i Björksjön. nr 83

Värdeklass II
Geokod 19H 3H 1D0I
Areal 42 ha
Flygbild 1986
Höh 65 m
VMI-nr 19H 3H01
Naturvårdsobjekt N83 029
Fältbesökt 1970, Lars Guvå.



Mindre våtmark vid Björkåns utlopp i Björksjön. Vattendraget har sitt utlopp i Ångermanälven. Området utgörs av *strandkärr*, *strandängar* och *strandskogar* invid ån och mot sjön. Inom området finns laguner, en liten korvsjö och andra restsjöar. Våtmarken gränsar till viss del mot brukad odlingsmark.


Fauna: Området har visst ornitologiskt värde.

Påverkan: Stora delar av den odlade marken som gränsar mot våtmarken har eller håller på att växa igen med lövsly/skog. Diken från åkermarken löper ut i våtmarken. En kraftledning går över perifiera delar av området.

Källa: Guvå, L. 1971. Naturvårdsinventering i Västernorrlands län. Del 2 Ångermanland, Ådalen. Länsstyrelksen i Västernorrlands län, Härnösand.

Tängsta-Stormyran. nr 85

Värdeklass I
Geokod 19H 4B 3B4B
Areal 65 ha
Flygbild 1986
Höh 245 m
VMI-nr 19H 4B01
Naturvårdsobjekt N83 152
Fältbesökt 1970, Folke Björkbäck; 1993-08, Sören Uppsäll.



Långsträckt, svagt S-formad, myr med nordväst-sydostlig utsträckning. Myren sluttar svagt åt SO där en liten bäck för myrens vatten vidare via mindre vattendrag ner i Ångermanälven. Myren utgörs helt av olika typer av plana kärr. De centrala delarna utgörs av öppna *topogena kärr* av både fastmatte- och mjukmattetyp. Åt öster övergår dessa i *sträng-flarkkärr* med i den östra delen höga nästan fastmarksartade tallbevuxna strängar. Här tar en liten bäck sin början och slingrar mellan de höga strängarna. Flarkarna är av mjukmatte- lösbottentyp och enstaka flarkgölar förekommer också. I SV ligger en källa intill fastmarken. Myrens båda ändar utgörs av tallbevuxna *skogskärr* samt *tallmosse*. Hela myren omges av äldre skog.

Vegetation och flora: De topogena kärrens västra delar utgörs av tuvsävdominerade fastmattor med Sphagnum balticum i botten. Mjukmattorna domineras av flaskstarr och S. jensenii eller av kallgräs, S. majus och S. papillosum. Spridda tuvor av blåtåtel och tuvsäv förekommer här. Vid källan i myrens södra kant växer Cinclidium subrotundum och Warnstorfia sarmentosa. I anslutning finns en rikare fastmatta med S. subnitens och S. warnstorfii samt trådstarr, bladvass och ullsäv. Strängflarkkärrets strängar är till större delen tallbevuxna med fältskikt av blåtåtel eller ris och S. papillosum i botten. Många strängar når upp till mossestadium med Sphagnum fuscum i botten. Flarkarna är delvis mycket blöta med flaskstarr, sjöfräken, vattenklöver och vitag samt även brunag. Bottenskiktet är svagt utbildat och utgörs av S. subnitens och S. majus.


Påverkan: Myren är odikad. Det enda ingrepp i myren är den stig som löper i södra kanten och som vintertid använts för timmertransporter. Längst upp i NV finns smärre diken i gränsen mot fastmarken men som saknare betydelse för myrens hydrologi.

Bedömning: Opåverkat större kärrkomplex med ett välstruktrerat sträng-flarkkärr och stora öppna kärrytor. Myrens närmaste omgivningar saknar större opåverkade myrar.

Källa: Björkbäck, F. 1970. TELMA (IBP). Preliminär förteckning över särskilt skyddsvärda myrar i Västernorrlands län. Stencil vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Myr N Västermosjön. nr 92

Värdeklass I
Geokod 19H 6E 3B4J
Areal 94 ha
Flygbild 1986
Höh 270 m
VMI-nr 19H 6E02
Naturvårdsobjekt N83 330



Mosaikartat myrkomplex uppsplittrat av en mängd fastmarksholmar och fastmarkstungor som löper ut i myren. Myren karaktäriseras genom detta av smala stråk och dråg. Området gränsar i väster mot Bredtjärn och i söder mot Östermosjön till vilka avvattningen sker. I väster finns ett par partier med *nordlig mosse* genomkorsade av blötare dråg. Söder om dessa finns ett fastmattedominerat, långsmalt *soligent kärr*. Här finns också ett bredare dråg med *topogent kärr*. I norr mot fastmarken rinner en bäck kantad av *strandkärr*. Här finns också en liten *tjärn*/sel. Söder om ån finns en mängd fastmarksholmar och mellan dessa omfattande partier med *skogskärr*.


Fauna: Bävern har åstakommit flera mindre dammar i bäcken i områdets norra del.

Påverka: Området är sånär som på angränsande hyggen helt opåverkat.

Bedömning: Variationsrikt och genom en mängd fastmarksholmar och ryggar mosaikartat myrkomplex. Myren är dessutom hydrologiskt opåverkad.

Myr längs Ampbäcken. nr 106

Värdeklass I
Geokod 19H 8B 3E0D
Areal 128 ha
Flygbild 1986
Höh 220 m
VMI-nr 19H 8B02
Naturvårdsobjekt N83 331




Variationsrikt våtmarkskomplex med en NV-SO orienterad amöbalikanande utsträckning. Från söder till norr genom området flyter Ampbäcken som avvattnar området ner i Vigdsjön. *Strandkärren* längs bäcken utgörs bitvis av en smal öppen bård, bitvis av en strandskogsremsa. Längst i söder och i de centrala delarna finns mindre partier med öppna *topogena kärr*, främst av mjukmattetyp. I centrum av myren finns också ett tydligt utbildat *sträng-flarkkärr* med fastmattesträngar och lösbottenflarkar. Övriga delar av området är mer eller mindre trädtäckta och utgörs av ett större parti med *skogskärr*, i NO, samt två större partier med *nordlig mosse*, i NV och SO. Skogskärren utgörs huvudsakligen av tallbevuxna risdominerade fastmattor. Längst i norr finns ett parti med *lövsumpskog* som gränsar mot odlingsmark. Området innehåller fyra *tjärnar* varav en större i nordväst.

Påverkan: Sumpskogen som gränsar mot odlingsmarken innehåller några diken men i övrigt är området tämligen opåverkat.

Bedömning: Mycket variationsrikt och i stort opåverkat våtmarkskomplex.

Drevet, Kroksjömyran. nr 108

Värdeklass II
Geokod 19H 8F 2A1J
Areal 94 ha
Flygbild 1986
Höh 315 m
VMI-nr 19H 8F01
Naturvårdsobjekt N83 332



Myrkomplex beläget ett par km V om Hermansjön. Myren sluttar svagt åt SV ner mot den intilliggande Hebbersjön till vilken avvattningen sker. De absolut östligaste delarna lämnar sitt vatten ner till Stor-Kroksjön. Myren har en NV-SO-lig utsträckning och innehåller ett par större centralt belägna fastmarksholmar samt tre *tjärnar*. Myrens västra och södra del karaktäriseras av en blandning av *nordlig mosse* och *blandmyr*. Mossarna utgörs av risbevuxna plan med fastmattehöljor och mjukmattedråg. Blandmyrpartierna domineras av fastmattegolv med mindre mosseplan samt strängar. Mellan och i anslutning till tjärnarna i myrens östra del finns ett par partier med *sträng-flarkkärr*. Här dämmer fastmattesträngar mjukmatteflarkar och enstaka flarkgölar. I anslutning till strängkärren ligger *topogena kärr*, huvudsakligen av fastmattetyp men även mjukmattor förekommer.


Påverkan: Myren är helt ostörd förutom de delar som dränerar ner i Stor-Kroksjön. Det rör sig om två små områden som våtmarkskalkats 1987 och 1988 inom ramen för kalkningsprojektet Hermansjön.

Bedömning: Mångformigt myrkomplex som, förutom två mindre delar, är helt ostört. Myren innehåller bland annat partier med sträng-flarkkärr.

Fransmyran-Omsjöflon. nr 111

Värdeklass I
Geokod 19H 9C 1D6B
Areal 440 ha
Flygbild 1980
Höh 245 m
VMI-nr 19H 9C01
Naturvårdsobjekt N83 037
Fältbesökt 1979-06, Mats Dynesius & Per Simonsson;
1993-08, Sören Uppsäll.

Fransmyran-Omsjöflon ligger NO om Näsåker och mellan de tre sjöarna Karvsjön, Ottsjön och Jansjön. Myrkomplexet utgörs även av Fräkenmyran och delar av Rävelflon. Avrinningen sker huvudsakligen åt SV ner i Ottjärnån och via Vigdan ner i Ångermanälven. En mindre del av myren avvattnas åt öster ner i Karvsjön samt åt NV. Myren har en flikig avgränsning och innehåller många stora fastmarksholmar. Södra delen utgörs av en mosaik av *skogskärr, nordlig mosse* och *mosaikblandmyr*. Små partier med *sträng-flarkkärr* förekommer också. Genom den S delen rinner Ottjärnån kantad av *strandkärr*. I anslutning till ån finns också *sumpskogspartier*. I myrens mellersta del ligger den långsträckta *Fransmyrtjärnen* omgiven av *sluttande mossar*, med strängar och fast/mjukmattehöljor. Från S leder ett mjukmattedråg som avvattnar ett större öppet *topogent kärr* ner i tjärnen. Norr om Fransmyrtjärnen ligger



ett större parti med strängflarkkärr där låga fastmattesträngar dämmer mjukmatte/lösbottenflarkar. Här uppe finns också två mindre tjärnar. Myren N del domineras annars av en mosaik av skogskärr, blandmyr och sumpskogspartier. Området utgör riksintresse för naturvården.

Vegetation och flora: Vegetationen är över lag fattig. Mossarna domineras av rissammhällen med Sphagnum fascum och hjortron eller S. angustifolium och tuvull. I höljorna växer S. balticum, S. lindbergi, tuvull och kallgräs. Kärren har vanligen


ett bottenskikt av S. fallax, S angustifolium och/eller S. papilosum. Fältskiktet domineras oftast av flaskstarr eller kallgräs. Skogskärren är vanligen tallkärr med S. angustifolim och klotstarr som dominanter. I södra delen finns partier med en intermediär vegetation under inverkan av fastmarksvatten. Här dominerar trådstarr och flaskstarr och här växer även ullsäv och enstaka ängsnycklar. Bottenskiktet domineras av S. papilosum men här kommer också arter som S. warnstorfii och S. teres in. Här finns också en källa där Straminergon stramineum dominerar tillsammans med Paludella squarrosa, Helodium blandowii, Warnstorfia sarmentosa och W. exanulata.

Fauna: Fransmyran har värdeklass II i myrfågelinventeringen med arter som trana, storspov, småspov, enkelbeckasin, ljungpipare, grönbena (7 par), skogssnäppa, fiskgjuse samt över tjugo par gulärla.

Påverkan: Myrkomplexet är hydrologiskt helt ostört. En del av de större, centralt belägna, fastmarksholmarna är avverkade och planterade med contortatall. Avverkningar på anslutande fastmark finns också. En landsväg avgränsar myren i SO.

Bedömning: Fransmyran-Omsjöflon är ett stort och mycket variationsrikt myrkomplex med många välutbildade och representativa myrtyper i vacker mosaik med fastmarksholmar. Området är hydrologiskt ostört. Stor variationsrikedom, storlek och orördhet tillsammans med ornitologiska värden motiverar områdets mycket höga värde. Riksintresse, Myrskyddsplan.


Källa: Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.



Fiskgjuse

Rävelflon. nr 113

Värdeklass I
Geokod 19H 9D 2C2E
Areal 117 ha
Flygbild 1986
Höh 250 m
VMI-nr 19H 9D01
Naturvårdsobjekt N83 213




Mosaikartat myrkomplex beläget strax S om Storsjön. Rävelflon är huvudsakligen plan och avvattnas åt N av tre små vattendrag ut i Storsjön. Myren är huvudsakligen glest trädbevuxen och innehåller ett flertal större och mindre fastmarksholmar samt en åsrgg i S. I V finns ett *strängflarkkärr* med glest lövträdsbevuxna strängar och blöta lösbottenflarkar samt enstaka flarkgölar. Myrens centrala delar utgörs av *strängblandmyr* med blandskogsbevuxna strängar i oregelbunden konfiguration inneslutande flarkar/kärrgolv av varierande fuktighetsgrad, från fastmattor till gölar. Strängarna är mycket höga, breda och tätt trädbevuxna. I N delen finns ett par plan med *nordlig mosse*. Myrens V och S delar inehåller stora partier med *skogskärr* samt även *sumpskogspartier*, båda med blandskog. I SV samt i NO finns några små *tjärnar*.

Påverkan: Några längre diken förekommer i myrens S och V del. Dessa har dock endast en svag lokal inverkan och myren är som helhet hydrologiskt intakt.

Bedömning: Rävelflon ger ett mångformigt och lite säreget intryck. Välstrukturerade sträng-flarkkärr och strängblandmyrar tillsammans med fastmarksholmar och åsryggar karaktäriserar myren.

Nyflon, Källmyrflon, Frostflon. nr 118

Värdeklass II
Geokod 20G 0B 3E3I
Areal 126 ha
Flygbild 1986
Höh 280m
VMI-nr 20G 0B01
Naturvårdsobjekt N83 092
Fältbesökt 1975, Britt-Marie Lindström & Per Simonsson.



Myrarna är belägna mellan Stor-Finnsjön och jämtlandsgränsen i länets NV spets. Området är huvudsakligen plant och avvattnas ner i ån, Frostan, som slingrar genom området och lämnar sitt vatten åt NO ner i Stor-Finnsjön. Förutom Frostan förenar sig ytterligare ett par mindre bäckar med densamma. Dessa slingrande vattendrag kantas av huvudsakligen öppna och starrbevuxna *strandkärr*. Övriga delar av myren domineras av mer eller mindre trädtäckta myrelement i form av glest tallbevuxna plan med *nordlig mosse* samt *skogskärr*. Några mindre *tjärnar* finns också på myren. Med ett par mindre partier i N samt ett större i S förekommer öppna *topogena kärr*. Dessa utgörs till större delen av betydande delar mjukmatta. Myren ligger inom riksintresseområdet "Västra Ramsele myr- och skogsområde".

Vegetation och flora: Myrområdet ligger inom de kalkpåverkade delarna av länets NV hörn och hyser en bitvis rik vegetation. Från Nyflon i S har bla noterats Scorpidium scorpioides, snip och blodnycklar.


Påverkan: Ett längre dike finns i myrens centrala del och spår efter intervägar förekommer, främst i N. I stort all omgivande fastmark är avverkad.

Bedömning: Tämligen mångformigt myrkomplex med naturligt kalkpåverkad vegetation.

Källa: Lindström, B-M. & Simonsson, P. 1977. Västra Ramsele - naturinventering i Sollefteå kommun, rapport 1977:15. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Myr NV Väster-Vallsjön. nr 119

Värdeklass II
Geokod 20G 0D 0B1E
Areal 26 ha
Flygbild 1986
Höh 275 m
VMI-nr 20G 0D01
Naturvårdsobjekt N83 084



Liten myr belägen i en konformig dalsänka som sluttar i SO riktning ner mot Väster-Vallsjön. Myren avvattnas ner i denna av den bäck som rinner centralt genom myren. *Skogskärr* dominerar myren med inslag av mindre partier blands*umpskog*. Myren belägen inom riksintresseområdet "Västra Ramsele myr- och skogsområde".


Vegetation och flora: Vegetationen är kalkpåverkad. Myren hyser en riklig förekomst av myrstarr, sumpnycklar och brudsporre.

Påverkan: En interväg passerar myren och en kraftledning passerar över densamma i söder. Förutom detta är den hydrologiskt opåverkad.

Bedömning: Myrens höga värde betingas av den rika floran med förekomst av arter som bl a myrstarr.

Sörflon. nr 120

Värdeklass II
Geokod 20G 0F 0B8C
Areal 90 ha
Flygbild 1986
Höh 338 m
VMI-nr 20G 0F01
Naturvårdsobjekt N83 333




Myrkomplex beläget på en bergsplatå mellan Lafsan i V och Orrsjön i O. Myren avvattnas i dessa båda riktningar till nyss nämnda vatten som i sin tur förenar sig med Faxälven. Längst i S upptas myren av löv- och blands*umpskog*. I övrikt dominerar en blandning av *skogskärr* och *nordliga mossar*. Några mindre partier med *öppna topogena kärr* finns också. Centralt i myrens N del ligger också en större *tjärn* samt en mindre strax S därom. Söder om tjärnarna ligger några fastmarksholmar tvärs över myren.

Påverkan: Sånär som på en kraftledning som passerar över myrens norra spets förekommer ingen påverkan.

Bedömning: Tämligen variationsrikt och helt ostört myrkomplex med representativa myrtyper.

Rödmossaflon, Bäcksmyran. nr 121

Värdeklass I
Geokod 20G 0G 3D7F
Areal 271 ha
Flygbild 1986
Höh 265 m
VMI-nr 20G 0G01
Naturvårdsobjekt N83 057
Fältbesökt 1978, Per Simonsson; 1993-08, Sören Uppsäll.




Långsträckt större myrkomplex beläget strax V om Fjällsjöälven. Området avvattnas åt NV ner i Fjällsjöälven, i N via Öster-Gatusjön samt i S via mindre vattendrag. I väster gränsar området mot Bäckssjön. I de centrala delarna samt i söder finns öppna myrvidder. Dessa utgörs i söder av *topogent kärr*, huvudsakligen mjukmattor, bitvis med diffusa fastmatteströngar. I de centrala delarna förekommer fastmattor, huvudsakligen som komponent i *mosaikblandmyr* samt ett större parti med *nordlig mosse*. Ett långsmalt stråk med lösbottnar och ett par *tjärnar* sträcker sig parallelt med Öster-Gatusjön och mynnar i den samma. I de norra samt

västra delarna förekommer omfattande arealer med *skogskärr* av fastmattetyp samt även mindre spridda partier med lövdominerad *sumpskog*, bl a längs Bäckssjöns utlopp till Öster-Gatusjön. I söder rinner ett litet vattendrag genom Nördbäckstjärnen, och kantas av *strandkärr* som bitvis är trädbevuxna, bitvis är öppna.

Vegetation och flora: Bäcksmyran i söder utgörs av lösbottnar och fastmattetuvor med rikkärrsvegetation. Lösbottnarna domineras av Scorpidium scorpidioides tillsammans med sjöfräken, tråd-, dy- och vitstarr i fältskiktet. Tuvorna domineras av Sphagnum subfulvum, S. warnstorfii och Campylium stellatum tillsammans med blåtåtel och trådstarr. I dessa rikare delar förekommer också ängsnycklar, brudsporre samt gräs- och kärrull. Kärren i övriga delar utgörs av fattiga starr-vitmossmattor. Skogskärren är fattiga gran/ björkkärr eller klotstarrdominerade tallkärr. Sumpskogen i S delen utgörs av fattig risdominerad sumpgranskog.

Fauna: Gluttsnäppa häckar inom området. I Svartbäcken som rinner genom södra delen finns flera bäverdammar.




Gluttsnäppa

Påverkan: I söder passerar en kraftledning över Rödmossaflon som här också gränsar mot dikade myrar. Myren är annars hydrologiskt opåverkad.

Bedömning: Stort och variationsrikt myrkomplex med huvudsakligen fattigkärrsvegetation. Södra delen med rika lösbottnar. Området hydrologiskt opåverkat.

Tuvmyran. nr 122

Värdeklass II
Geokod 20G 0G 3C4A
Areal 67 ha
Flygbild 1986
Höh 255 m
VMI-nr 20G 0G02
Naturvårdsobjekt N83 334



Långsträckt myrkomplex beläget i en dalsänka O om Nässjö by mellan Faxälven och Fjällsjöälven. I myrens lägsta parti rinner Älgmyr- och Tuvmyrbäcken fram och avvattnar myren åt S ner i Faxälven. Bäckarna kantas hela vägen av öppna, starr och gräsbevuxna *strandkärr*. Ovanför dessa mot fastmarken breder *nordliga mossar* ut sig. Dessa är ristuvmossar med insprängda mjukmattedråg. Stora delar av mosseplanen domineras av renlav. I sin S del sänder myren ut en utlöpare åt V och här ligger en mindre *tjärn*, Tuvmyrtjärnen. Denna kantas av *skogskärr* och öppna *topogena kärr* med mjukmattor närmast tjärnen. Tjärnen avvattnas via ett bäckdråg med mjukmattor ner mot bäcken i öster.


Fauna: Bäver förekommer i bäckarna som bitvis är dämda pga dennes verksamhet.

Påverkan: I N avgränsas myren mot Älgmyran O vägen (objekt 20G 1G02) av en skogsbilväg. Förutom detta och bäverns verk är myren hydrologiskt intakt.

Bedömning: Mindre och opåverkat myrkomplex vars intressantaste del utgörs av öppna strandkärr som sträcker sig genom hela objektets längd.

Tvärmyran. nr 127

Värdeklass I
Geokod 20G 1B 2D0A
Areal 12 ha
Flygbild 1989
Höh 275 m
VMI-nr 20G 1B01
Naturvårdsobjekt N83 045
Fältbesökt 1975, Simonsson & Lindström;
1977, Mascher, Pierre & Bergvall.



Tvärmyran är en smal och långsträckt slingrande våtmark som slutter ner mot och mynnar i Svedbergsviken i Stor-Finnsjön. Området utgörs av översilade *topogena kärr*, *skogskärr* samt *sumpskog*. Objektet ingår i riksintresseområdet "Västra Ramsele myr- och skogsområde" samt i "Myrskyddsplan för Sverige".

Vegetation och flora: Vegetationen är dels av källpåverkad kalkkärrstyp och dels av intermediär typ. Området är mycket artrikt. Här växer bland annat tagelstarr, huvudstarr, hårstarr, trådfräken, brudsporre, sumpnycklar, blodnycklar, guckusko, dvärgtätört, lappdunört och finbräken.

Påverkan: Viss dikning har förekommit inom området.


Bedömning: Myrens höga värde är framför allt knutet till den näringskrävande och artrika floran. Objektet ingår i riksintresseområde samt "Myrskyddsplan för Sverige".

Källa: Lindström, B-M. & Simosson, P. 1977. Västra Ramsele - naturinventering i Sollefteå kommun, rapport 1977:15. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Mascher, J. W. 1990. Ångermanlands flora. SBT-redaktionen, Lund.

Hackelmyran. nr 128

Värdeklass II
Geokod 20G 1B 0D1G
Areal 18 ha
Flygbild 1989
Höh 310 m
VMI-nr 20G 1B02
Naturvårdsobjekt N 83 043
Fältbesökt 1975, Lindström & Simonsson.



Litet myrkomplex som utgörs av *skogskärr* samt öppna *topogena kärr*, *blandmyrpartier* och *sumpskog*. Myren är belägen inom Ramsele rikområde. Objektet ingår i riksintresseområdet "Västra Ramsele myr- och skogsområde".

Vegetation och flora: Delar av myren har ängskärrkaraktär med en rik flora som bland annat utmärks av tagelstarr, trindstarr, guckusko, tvåblad, brudsporre, grönkulla, ängsnycklar och sumpnycklar.


Påverkan: Omgivningarna är avverkade samt även delar av sumpskogen och smärre diken finns också inom objektet.

Bedömning: Områdets höga värde betingas av den rika floran. Objektet ingår i riksintresseområde.

Källa: Lindström, B-M. & Simonsson, P. 1977. Västra Ramsele - naturinventering i Sollefteå kommun, rapport 1977:15. Länsstyrelsen Västernorrlands län, Härnösand.

Kälflon. nr 138

Värdeklass I
Geokod 20G 1F 3C8C
Areal 185 ha
Flygbild 1986
Höh 280 m
VMI-nr 20G 1F01
Naturvårdsobjekt N83215




Långsträckt större myrkomplex med en NV-SO orientering och beläget strax norr om Nässjön. Myren ligger på vattendelaren mellan Faxälven och Fjällsjöälven och gränsar i O mot Stormyran (Objekt 20G 1F02). Myren innehåller sju *tjärnar* och avvattnas åt N via Ottran ner i Fjällsjöälven samt åt S ner i Nässjön. I den NV delen finns ett större öppet parti som utgörs av *topogena kärr* med mjukmattor och lösbottnar i den centrala delen och fastmattor som tar vid mot kanterna. Här finns också flera partier med *sträng-flarkkärr* i form av dråg ner mot den centrala delen. Flarkarna är huvudsakligen av mjukmattetyp men lösbottnar och flarkgölar finns också. Öster om detta parti vidtar glest trädbevuxna *blandmyrar* uppsplittrade av en mängd fastmarksholmar. Söder därom är ligger ett par tjärnar och ett flertal fastmarksholmar och här förekommer öppna topogena kärr, mindre blandmyrpartier, *nordlig mosse* samt *skogskärr* blandat om varandra. Myrens norra del samt de fastmarken gränsande partierna i den centrala delen upptas av omfattande skogskärr, på sina ställen i mosaik med en mängd små fastmarksholmar. Mindre partier med *sumpskog* förekommer spritt huvudsakligen i anslutning till fastmarken.

Påverkan: I myrens sydöstra del förekommer en del diken men övriga delar är i stort opåverkade.

Bedömning: Stort och mycket variationsrikt myrkomplex med ett stort antal fastmarksholmar och flera tjärnar.

Arksjöflon. nr 142

Värdeklass I
Geokod 20G 1H 3A7E
Areal 211 ha
Flygbild 1986
Höh 225 m
VMI-nr 20G 1H01
Naturvårdsobjekt N83 056



Arksjöflon utgörs till större delen av kärr och är belägen strax O om Fjällsjöälven. Myren avvattnas till Fjällsjöälven dels i sydänden via Arksjön och Tvärån samt i nordänden via Storbäcken. På vattendelaren i myrens centrum återfinns partier med glest tallbevuxen *nordlig mosse*. Både N och S om vattendelaren återfinns öppna *topogena kärr* som utgörs av fastmattor, bitvis videkärr, genomdragna av mjukmattedråg. Här förekommer också några

av mjukmattedråg. Här förekommer också några mindre partier med *sträng-flarkkärr* med fastmattesträngar och mjukmatteflarkar. Myrens N och V delar upptas av omfattande arealer med *skogskärr*, bitvis blöta och lövdominerade. Två *tjärnar* finns på myren, en i N samt en i den S delen.

Påverkan: Två större kraftledningar passerar över myren. Längst i S mot Arksjön finns mindre partier med skogskärr som är kraftigt dikade och smärre körspår förekommer i andra delar. På det hela taget är myren hydrologiskt opåverkad.

Bedömning: Tämligen variationsrik myr med bl a sträng-flarkkärr samt ett par tjärnar. Området hydrologiskt opåverkat.

Storflon. nr 145


Värdeklass II
Geokod 20G 1J 0A5E
Areal 80 ha
Flygbild 1986
Höh 260 m
VMI-nr 20G 1J01
Naturvårdsobjekt N83 335
Fältbesökt 1982-07, Karin Due & Marie



Muhr.

Storflon har en nordvästlig-sydostlig utsträckning och är belägen fyra km SV Tara by. Genom myrens centrala parti går en vattendelare och N om denna sker avvattningen åt NV ner i Taraån och Ångermanälven. De södra delarna lämnar sitt vatten åt SO, även här med Ångermanälven som slutstation. På vattendelaren ligger en mindre *tjärn* omgiven av partier med *nordlig mosse* och *mosaikblandmyr*. I den S delen, främst i SO, finns öppan *topogena kärr*. Mjukmattor dominerar men även fastmattor och smärre partier med *skogskärr* förekommer. Längst i N finns *sumpskog* i anslutning till en liten bäck. Både bland- och lövdominerad sumpskog förekommer.

Vegetation och flora: Fattig vegetation förekommer på mossepartierna och i tallkärr. Karaktäristiskt för myren är annars det stora inslaget av intermediär till rik vegetation. Denna representeras bl a av kärrgolv med arter som Warnstorfia sarmentosa, Scorpidium scorpidioides, Drepanocladus aduncus, Calliergon giganteum, Calliergonella cuspidata, Sphagnum contortum och S. teres. I fältskiktet förekommer arter som tätört, björnbrodd och ängsnycklar.



Tätört


Påverkan: Myren är hydrologiskt intakt.

Bedömning: Tämligen variationsrik samt opåverkat myrkomplex. Myren hyser dessutom vissa botaniska värden.

Källa: Due, K. & Muhr, M. 1983. Nio myrar i Ångermanland. Opublicerad rapport vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Bodflon. nr 148

Värdeklass II
Geokod 20G 2C 1B6B
Areal 111 ha
Flygbild 1986
Höh 280 m
VMI-nr 20G 2C02
Naturvårdsobjekt N83 336




Långsträckt våtmarkskomplex som sträcker sig från jämtlandsgränsen ner mot Äxingen. Myren avvattnas i SO riktning av Harrbäcken ut i Äxingen. Genom den N delen rinner Harrbäcken som flankeras av öppna *topogena kärr*. Från bäcken sträcker sig också ett långsmalt parti med topogent kärr ner mot myrens S del. De topogena kärren utgörs huvudsakligen av fastmattor men mjukmattor och lösbottnar förekommer också. Spridda partier med *skogskärr* finns företrädesvis mot fastmarken i den O kanten. I NV finns ett större område med *sumpskog* men även i S förekommer mindre partier.

Påverkan: Myren är hydrologiskt opåverkad. Längst i S passerar en kraftledning över myren.

Bedömning: Opåverkat våtmarkskomplex med stora sumpskogspartier.

Sjöflon. nr 151

Värdeklass II
Geokod 20G 2F 1C3C
Areal 49 ha
Flygbild 1986
Höh 235 m
VMI-nr 20G 2F03
Naturvårdsobjekt N83 337




Sjöflon är belägen fem km rakt V om Nordankäl. I V ansluter myren till sjön Forsås-Ottringen och avvattningen sker åt O via Ottran som rinner genom myrens S del och ut i Fjällsjöälven. Myren domineras av en *excetriskt välvd mosse* med ett öppet risdominerat plan, mjukmattehöljor och dråg, kantskog samt en lagg som utgörs av lövskogsbevuxna fast- och mjukmattor. Öster om den excentriska mossen samt S om ån finns glest tallbevuxna *nordliga mossar*. Längs den slingrande Ottran ligger öppna starr och gräsbevuxna *strandkärr*.

Påverkan: Ett dike med endast svag lokal påverkan sträcker sig en bit ut på den excentriska mossen och en vinterväg passerar över den nordliga mossen strax O därom. Förutom detta är området ostört.

Bedömning: Myrens höga värde betingas av den excentriska mossen, en i denna region mycket ovanlig myrtyp.

Storflon mfl. nr 152

Värdeklass I
Geokod 20G 2G 1E8B
Areal 246 ha
Flygbild 1986
Höh 225 m
VMI-nr 20G 2G01
Naturvårdsobjekt N83055
Fältbesökt 1970, Folke Björkbäck.



Långsträckt kärrkomplex med NV-SO orientering beläget vid Nordankäl O om Fjällsjöälven. Trots sin närhet till Fjällsjöälven avvattnas myren ner i Ångermanälven via en följd av vattendrag. Slåtterbäcken rinner diagonalt genom myrens N del och kantas av *strandkärr*, bitvis skogsklädda men huvudsakligen öppna. Denna del av myren är annars till större del öppen och utgörs av *topogena kärr*. Mjukmattor dominerar här i norra delen och fastmattor genomdragna av mjukmattedråg i den södra. Där finns också en källa i fastmarkskanten och källkärr nedströms denna. På ömse sidor om bäcken finns här också två stråk med *sträng-flarkkärr* där fastmattesträngar dämmer mjukmatteflarkar. I den centrala delen sträcker sig två tungor med *nordlig mosse* från en fastmarksholme och ner mot bäcken. Myrens södra hälft utgörs av *skogskärr* samt större och mindre fastmarksholmar.

Vegetation och flora: Sträng-flarkkärrets strängar domineras av tuvsäv och blåtåtel och flarkarna av ängsull och vitstarr. I källkärret växer gräsull.


Påverkan: Två kraftledningar passerar myren och i den S delen finns spår efter ett par intervägar.

Bedömning: Tämligen varierat samt hydrologiskt opåverkat kärrkomplex, bl a med en källa med intressant vegetation.

Källa: Björkbäck, F. 1970. TELMA (IBP). Preliminär förteckning över särskilt skyddsvärda myrar i Västernorrlands län. Stencil vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Valåslåttern. nr 153

Värdeklass II
Geokod 20G 2H 1E6H
Areal 84 ha
Flygbild 1986
Höh 170 m
VMI-nr 20G 2H01
Naturvårdsobjekt N83 338



Långsträckt våtmarkskomplex beläget strax NO om byn Lillterrsjö. Myren ligger i en NV-SO orienterad dalsänka, längs Kvarnbäcken som rinner genom området. Denna utgör ett källflöde till Tarån och avvattnar myren åt SO mot Ångermanälven. Bäcken kantas efter hela sin längd av till större delen öppna starr och videbevuxna *strandkärr*. Längre upp mot fastmarken tar björkdominerade *skogskärr* över tillsammans med öppna *topogena fastmattekärr*. Smärre mosseinslag förekommer också. Flera partier med *sumpskog* finns också, främst i anslutning till fastmarken men


även ner mot bäcken. Sumpskogen utgörs av både löv- och blandskog.

Påverkan: I den V delen förekommer smärre körspår i kärren men inverkan är mycket blygsam. Strandkärren längs bäcken har tidigare slåtterhävdats.

Bedömning: Hydrologiskt intakt våtmarkskomplex med reltativt omfattande arealer strandkärr och sumpskog.

Våtmarkskomplex vid Flärken. nr 155

Värdeklass II
Geokod 20G 0C2I
Areal 185 ha
Flygbild 1986
Höh 200 m
VMI-nr 20G 3I01
Naturvårdsobjekt N83 339




Våtmarkskomplex beläget längs Röån och ovanför Flärken, NV om Tågsjöberg järnvägsstation. Från N kommer Östvattenbäcken och rinner ner i Flärken och hela området avvattnas sedan åt S via Röån. Större delar av området utgörs av *sumpskog*. Längst i NV finns ett stort sammanhängande sumpskogsparti av barr/lövblandskog och genomkorsat av ett par bäckdråg. På andra ställen finns även rena lövsumpskogar. Mindre partier med topogena *skogskärr* förekommer spritt inom området. Den SO delen karaktäriseras av partier med trädbevuxen *nordlig mosse* blandat med sumpskogspartier. Centralt placerad i området ligger Flärken, en större *tjärn*. Östvattenbäcken och den meandrande Röån kantas av öppnare *strandkärr* och strandskog.

Påverkan: Äldre diken korsar mossepartierna i SO och smärre diken finns även annorstädes inom området. Körspår förekommer i områdets NV del och större delen av den omgivande fastmarken är avverkad. I NV finns en äldre odling inspränkt i sumpskogen och efter vissa delar av vattendragen har det tidigare bedrivits slåtter.

Bedömning: Variationsrikt våtmarkskomplex med den meandrande Röån och stora tämligen intakta sumpskogspartier.

Skrapmyrorna. nr 158

Värdeklass II
Geokod 20G 8I 0D9D
Areal 118 ha
Flygbild 1986
Höh 335 m
VMI-nr 20G 8I01
Naturvårdsobjekt N83 340



Myr/fastmarksmosaik belägen V om Övra kapell, mot jämtlandsgränsen. Området innehåller ett flertal mindre *tjärnar* och avvattnas via mindre vattendrag åt sydost ner i Ruskån samt åt nordväst via Tosktjärnbäcken. Området utgörs av en mängd mindre myrytor avgränsade av skogsbevuxna


fastmarksholmar. Myrytorna ytgör en mosaik av *nordlig mosse, skogskärr* samt öppna *topogena kärr*. De senare representeras av fastmattor och blöta mjukmattedråg. Källor förekommer inom området. Ett par större partier med *sumpskog* finns också. Centralt genom området rinner en liten bäck.

Påverkan: En väg avgränsar i norr och i söder upptas fastmarken av hyggen. I SO delen finns en del större diken och här passerar också en större kraftledning.

Bedömnig: Området som helhet utgör en omväxlande myr/fastmarksmosaik med huvudsakligen intakta våtmarker samt fastmarksholmar och sumpskog med äldre skog.

Mjölkvattenmyran mfl. nr 162

Värdeklass II
Geokod 20G 9J 3C0B
Areal 162 ha
Flygbild 1986
Höh 355 m
VMI-nr 20G 9J04
Naturvårdsobjekt N83 341




Våtmarkskomplex beläget längst upp i länets NV ände. Området utgörs av Mjölkvattenmyran, ett öppet myrplan, samt av en mosaik av myrarmar och fastmarksholmar längs Mjölkvattenåns övre flöde. Myrarmarna utgörs huvudsakligen av glest tallbevuxen *blandmyr* och sluttar mer eller mindre ner mot ån som avvattnar området åt söder. Här förekommer också öppna *topogena kärr* i form av fast- och mjukmattedråg samt ett litet parti med sträng-flarkuppbyggnad. Ån/bäcken kantas av *strandkärr* men även till mindre del av *sumpskog*. På ett ställe vidgar sig strandkärren och här ligger även en mindre *tjärn*. Själva Mjölkvattenmyran utgörs av ett topogent mjukmattegolv med en smal bård av glest trädbevuxen blandmyr mot fastmarken. I den NO delen finns ett mindre parti med *sträng-flarkkärr* i anslutning till en liten tjärn.

Fauna: Bäver förekommer i ån.

Påverkan: En kraftledning passerar diagonalt över området och den angränsande fastmarken i norr utgörs av hyggen och ungskogar.


Bedömning: Tämligen stort och mosaikartat myrkomplex som är hydrologiskt intakt.



Trana

Klingerflon. nr 164

Värdeklass II
Geokod 20H 0B 2E9B
Areal 111 ha
Flygbild 1986
Höh 235 m
VMI-nr 20H 0B01
Naturvårdsobjekt N83 342




Klingerflon ligger en dryg mil SO Junsele i en N-S orienterad dalgång mellan Lövsjön i N och Ottsjön i S. Myren sluttar svagt åt S och avvattnas via den bäck som flyter genom den södra delen ner i Ottsjön. Längs bäcken sträcker sig ett parti med *avverkad sumpskog*. Centralt i N delen finns *topogena kärr* som till stora delar är utbildade som *sträng-flarkkärr* med fastmattesträngar och mjukmatte/lösbottenflarkar. Kärrgolven utgörs annars av både fast- och mjukmattor. Längre ut mot fastmarken ligger partier med *skogskärr* och huvudsakligen glest tallbevuxna *nordliga mossar*. Längs med hela V kanten mot fastmarken sträcker sig *sumpskog* och ett par mindre partier finns även annorstädes.

Påverkan: Längs med bäcken i S har tidigare funnit sumpskog, med inslag av fastmark, som nu är avverkad. Denna del innehåller körsår från skogsmaskiner och inverkan är kraftig men lokal. Övriga delar av myren är opåverkade.

Bedömning: Tämligen varierat våtmarkskomplex vars höga värde främst motiveras av de omfattande sumpskogspartierna.

Stormyran. nr 170

Värdeklass I
Geokod 20H 0F 3A9C
Areal 177 ha
Flygbild 1986
Höh 250 m
VMI-nr 20H 0F01
Naturvårdsobjekt N83 343




Stormyran ligger mellan Junsele och Myckelgensjö och strax O om Tomsjön. Myren sluttar svagt åt V och avvattnas ner i den anslutande Tomsjön som lämnar sitt vatten till Juvanåns vattensystem. Två bäckar flyter genom myren och förenas strax innan de mynnar i Tomsjön. Här utbreder sig *strandkärr* mot sjön och längs den S av bäckarna. Norra delen karaktäriseras av partier med *skogskärr* och *nordlig mosse* genomdragna av öppna *topogena kärr* i form av dråg. Dessa är ofta strängade med fastmattesträngar och mjukmatteflarkar. Annars domineras kärren av fastmattor. I NO finns ett lite större parti med *sumpskog* mot fastmarken. I myrens S arm sträcker sig ett mjukmattedominerat bäckdråg i de lägre delarna men i övrigt är det nordlig mosse som dominerar.

Påverkan: Längst upp i NV finns diken med stark men endast lokal inverkan. Övriga delar av myren är hydrologiskt intakta. Stora delar av den omgivande fastmarken är avverkad.

Bedömning: Variationsrikt större myrkomplex med sumpskog och strandkärr som intressanta myrtyper.

Storflon. nr 171

Värdeklass II
Geokod 20H 1B 0D1H
Areal 104 ha
Flygbild 1986
Höh 240 m
VMI-nr 20H 1B01
Naturvårdsobjekt N83 218




Ett topogent kärr beläget mellan Bredvattnet i V och Lövsjön i O. Myren avvattnas åt O via en liten bäck ner i Lövsjön. Myrens centrala parti utgörs av öppna *topogena kärr* där mjukmattor dominerar. Mot O vidtar ett mindre parti med *sträng-flarkkärr*. Mjukmatteflarkar dämms här av fastmattesträngar som i O är lövträdsbevuxna. Myrens nordligaste arm, som gränsar mot Antemyrorna, upptas av *nordlig mosse*. Längst i NV är myren avskuren av en skogsbilväg och här ligger också en långsmal *tjärn*. Denna del och hela västra kanten mot fastmarken upptas till större delen av *skogskärr*. I norr finns ett strängat parti med tätt lövträdsbevuxna strängar och mellanliggande fastmatteflarkar.

Påverkan: I kanten mot fastmarken längst i NV och NO samt i anslutning till utloppet finns enstaka diken men med mycket marginell påverkan. En väg skär av myren och bildar gräns i NV.

Bedömning: Relativt variationsrikt och mycket obetydlig påverkat myrkomplex med bl a ett parti med sträng-flarkkärr.

Myr runt Kustjärnen. nr 174

Värdeklass I
Geokod 20H 1C 4A3H
Areal 78 ha
Flygbild 1986
Höh 205 m
VMI-nr 20H 1C01
Naturvårdsobjekt N83 219




Våtmarkskomplex beläget invid Gösingens sydvästra strand. Myren karaktäriseras av väl avgränsade myrtyper med en centralt belägen *tjärn* från vilken ett mindre vattendrag leder ut i Gösingen dit myren avvattnas. Två större mossepartier dominerar. Öster om tjärnen finns en *koncentrisk mosse* med höljebeströtт plan, randskog och lagg. Norr om tjärnen ligger ett tallbevuxet plan med *nordlig mosse*. Mot fastmarken i söder och väster dominerar *sumpskog*, av blandskogstyp men även lövdominerad, och *skogskärr*.

Påverkan: Körspår löper över den koncentriska mossen samt längs den västra kanten men påverkan är mycket lokal och myren är i övrigt helt ostörd.

Bedömning: Huvudsakligen ostört mossekomplex med en koncentrisk mosse, en myrtyp vilken är mycket ovanlig i denna del av länet.

Porsflon, Långmyran. nr 176

Värdeklass II
Geokod 20H 1D 2D8G
Areal 169 ha
Flygbild 1986
Höh 240 m
VMI-nr 20H 1D01
Naturvårdsobjekt N83 068 (NR83 070)
Fältbesökt 1979-06, Per Simonsson & Stefan Jansson.



Kärrkomplex beläget strax O om Saxvattnet. Myren utgörs av en stor öppen myrvidd i vilken en lång fastmarkstunga sticker in från NV. I SO sänder myren iväg en lång arm. Myren sluttar svagt åt SV och avvattnas via ett par mindre vattendrag ner i Saxvattnet och Juvanån. Den öppna myrvidden domineras av *sträng-flarkkärr* som i den centrala delen är välutvecklade med fastmattesträngar och mjuk- samt lösbottenflarkar. Mot periferin blir strängflarkstrukturen otydligare och här vidtar *topogena kärr*, företrädesvis av mjukmattetyp. I S och N mot fastmarken samt i förlängningen av fastmarkstungan finns *skogskärr* samt även mindre partier med lövdominerad *sumpskog*. Myrarmen som sticker ut i SO utgörs av *blandmyr* där mjukmattedråg alternerar med fastmattor samt smärre mosseelement. Myren ligger inom riksintresseområdet "Rosjöområdet".

Vegetation och flora: De topogena kärrens fastmattor domineras av högstarrvegetation. Strängflarkkärrens strängar karaktäriseras av blåtåtel och högstarrvegetation. Flarkarna är lösbottenmjukmatteflarkar med mycket vitag, dystarr och strängstarr. Över hela myren på såväl lösbottnar som fastmattor växer lågvuxen pors.

Fauna: Värdeklass II i myrfågelinventeringen med grönbena, gluttsnäppa, 2 par storspov, 5 par enkelbeckasin samt 19 par gulärla.


Påverkan: I kanten mot fastmarken i norr och väster finns diken som endast marginellt påverkar myrens hydrologi. Myrarmen i SO kantas i sin södra dela av hyggen.

Bedömning: Myrens höga värde betingas av det välutvecklade sträng-flarkkärret samt det ornitologiska värdet. Myren ligger inom större riksintresseområde.

Källa: Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.


Ottersjömyran. nr 177

Värdeklass II
Geokod 20H 1D 1C4A
Areal 65 ha
Flygbild 1986
Höh 217 m
VMI-nr 20H 1D02
Naturvårdsobjekt N83 344



Brännmyrorna, Spångmyran. nr 179

Värdeklass I
Geokod 20H 1E 2C7H
Areal 198 ha
Flygbild 1986
Höh 255 m
VMI-nr 20H 1E02
Naturvårdsobjekt N83 071 (NR83 070)
Fältbesökt 1979-06, Per Simonsson; 1993-08, Sören Uppsäll.



Myrkomplex beläget N om Degersjön. Myren har en mycket flikig kontur och innehåller en mängd större och mindre fastmarksholmar. Området sluttar åt S och avvattnas ner i Degersjön av Kvarntjärnsbäcken som flyter genom myrens S del. Bäckens stränder kantas av *strandskog* men vissa sträckor kantas av öppna strandkärr. Flera partier i S samt ett i N utgörs av *sträng-flarkkärr* i form av dråg. Här förekommer både mjukmatte- och lösbottenflarkar dämda av fastmattesträngar som bitvis är trädbevuxna. I anslutning till sträng-flarkkärren finns också betydande partier med *topogena kärr* av både fast- och mjukmattetyp. I flikiga delar och mot fastmarken förekommer spridda partier med *blandmyr* samt *nordlig mosse*, det senare även som ett större partie i öster S om bäcken. I denna ände av myren finns också ett område med tre mindre *tjärnar* omgivna av topogena kärr. Öster därom finns ett parti med *sumpskog* och mindre partier med sumpskog finns också på ytterligare några ställen. I N samt i övriga delar förekommer omfattande arealer med *skogskärr*. I sumpskogen längst i N finns en källa. Myren ligger inom riksintresset "Rosjöområdet".

Vegetation och flora: Myren utgörs av både fattig- och rikkärrsvegetation. De topogena kärren hyser dels fattigare starr-vitmossmattor men även rikare lösbottenpartier med dominans av Scorpidium scorpidioides och vitstarr. Även sträng-flarkkärren innehåller både intermediära och rikare delar. I de senare domineras strängarna av Sphagnum papillosum, blåtåtel och trådstarr. Här förekommer även ängsnycklar, björnbrodd samt gräsull. Flarkarna vars bottenskikt är dåligt utvecklat utgörs av S. subsecundum samt med ett fältskikt av strängstarr eller vitstarr och med förekomst av kärrull och dytåg. Strandkärren och strandskogen domineras i botten av S. girgensohnii med förekomst av Calliergon cordifolium. Sumpskogen utgörs av sumpgranskog av lågörttyp. Vid källan dominerar Warnstorfia exannulata tillsammans med Paludella squarrosa, S. teras och Tomentypnum nitens. Här växer också skavfräken.

Fauna: Myren utgör värdeklass III i myrfågelinventeringen med arter som 10 par gulärla, 6 par grönbena, enkelbeckasin, 2 par gluttsnäppa samt trana.

Påverkan: Strax öster om vägen, som skär av myren och bildar gräns mot objekt 20H 1E01 i väster, finns rester efter gamla myrodlingar. Fastmarken norr om myren samt större delen av fastmarksholmarna i norr är avverkade. På ett ställe förekommer sedimentdeposition från ett dike som mynnar på myren. En vinterväg löper också norr om bäcken. Alla dessa ingrepp har dock endast en svag lokal inverkan.

Bedömning: Mycket variationsrikt myrkomplex med bitvis välutvecklade, nästan terrasserade, sträng-flarkkärr. Myren har också ornitologiskt värde och ligger inom riksintresseområde.

Källa: Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.


Mindre myrkomplex beläget SO om Junsele och mellan Ysjön och Ottersjön. Genom myrens O och S del rinner Juvanån som avvattnar myren ner i Ysjön. Ån kantas av *sumpskog* av blandskogstyp. Myrens N del domineras av ett större parti med huvudsakligen öppen *strängad mosse*. Ristuvsträngar alternerar med stora mjukmattehöljor och enstaka gölar förekommer också. Söder därom ligger ett parti med glest tallbevuxen *mosaikblandmyr* bestående av ett fastmattegolv med mossesträngar och tuvor. Längst i S samt i V finns områden med tallbevuxen *nordlig mosse*.

Påverkan: Genom den strängade mossen går ett kraftigt dike som förenar Juvanån med Ysjön. Påverkan är stor men endast lokal.

Bedömning: Mindre myrkomplex som till stor del ansluter till sjöar och vattendrag. En vackert strängad mosse ger karaktär åt myren.

Brännmyrorna (väster vägen). nr 178


Värdeklass I
Geokod 20H 1E 3A5J
Areal 103 ha
Flygbild 1986
Höh 265 m
VMI-nr 20H 1E01
Naturvårdsobjekt N83 071 (NR83 070)
Fältbesökt 1979-06, Mats Dynesius.



Myrkomplex beläget NV om Degersjön. Myren sluttar åt SO och avvattnas i denna riktning, via den del av Brännmyrorna som ligger på O sidan av den väg som avgränsar myren, ner i Dergersjön.I O gränsar myren mot "Brännmyrorna Spångmyran" (objekt 20H 1E02). Myren utgörs av breda dråg som upptas av *sträng-flarkkärr*. Fastmattesträngar dämmer här både mjukmatte- och lösbottenflarkar. Strängarna är på sina ställen trädbevuxna. Perifiera delar och kanterna mot fastmarken upptas av omväxlande *skogskärr* och glest trädbevuxna partier med *nordlig mosse*. Myren ligger inom riksintresseområdet "Rosjöområdet".

Vegetation och flora: Den nedre av de smalare delarna är högtuvad och här växer mycket blåtåtel och bladvass. Sträng-flarkkärrens flarkarna är delvis vattenfyllda med vegetation av vattenklöver och ängsull. Bladvass förekommer spritt i den S delen.

Fauna: Värdeklass III i myrfågelinventeringen med arter som 5 par gulärla, 4 par grönbena, 2 par enkelbeckasin samt gluttsnäppa.



Gulärla


Påverkan: Delar av omgivande fastmark samt fastmarksholmar i myren är avverkade. I SO är myren avskuren av en skogsbilväg som bildar gräns mot östra delen av Brännmyrorna (objekt 20H 1E02).

Bedömning: Myren hyser välutvecklade strängflarkkärr samt visst ornitologiskt värde. Myren ligger inom riksintresseområde.

Källa: Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Limnogent strandkomplex vid Ångermanälven. nr 182

Värdeklass I
Geokod 20H 2A 4D4C
Areal 47 ha
Flygbild 1986
Höh 180 m
VMI-nr 20H 2A02
Naturvårdsobjekt N83 065



Våtmarken utgörs av flera områden på både S och N sidan, samt på Moön i ett lugnvattenavsnitt, av Ångermanälven strax S om Junsele. På älvens N sida finns öppna *strandkärr* samt mindre partier med *strandängar* i anslutning till en skyddad vik. Mot huvudfåran finns här också lövdominerade *strandsumpskogar*. På Moön utgörs våtmarken av strandskog och här finns också någon liten *tjärn*, i form av en restsjö. Märrgårdsviken på älvens S sida kantas bitvis av strandkärr och här finns även mindre laguner.

Fauna: Området utgör fågelskyddsområde enl. naturvårdslagens 14:onde paragraf. Området utgör en värdefull såväl häcknings som rastlokal för främst änder och vadare.

Påverkan: Älven är reglerad vilket gör att området inte har en naturlig vattenregim. Området gränsar bitvis till åkermark och strandkärr och strandängar har tidigare utnyttjats för slåtter. En igenväxning av viden och lövträd har skett sedan dess.


Bedömning: Mycket välutbildad limnogen våtmark av en typ som är ovanlig i länet. Området hyser dessutom mycket höga ornitologiska värden. Fågelskyddsområde.

Källa: Guvå, l. 1971. Naturvårdsinventering i Västernorrlands län. Del 2 Ångermanland, Ådalen. länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Uppsäll, S. & Holmqvist, M. 1993. Program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden, rapport 1993:1. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Myr N Rängsjön. nr 188

Värdeklass II
Geokod 20H 2D 4A2J
Areal 79 ha
Flygbild 1986
Höh 240 m
VMI-nr 20H 2D01
Naturvårdsobjekt N83 346




Myren är belägen mellan Rängsjön och Mjövattnet, till vilka myren ansluter, och är i stort plan eller sluttar mycket svagt åt V. Avvattningen sker i denna riktning ner i Rängsjöbäcken och Mjövattnet som lämnar sitt vatten i Ångermanälven. I S domineras myren av en glest tallbevuxen *nordlig mosse* med inslag av mjukmattehöljor och dråg. Här rinner också Rängsjöbäcken i kanten av myren. Längst i N mot fastmarken finns också ett parti med nordlig mosse. Annars utgörs den N delen av *skogskärr* med inslag av öppna lösbottendråg samt flera *sumpskogspartier* och fastmarksholmar. En bäck rinner tvärs genom myrens centrala del och förenar sig med Rängsjöbäcken. Myren ligger inom riksintresset "Rosjöområdet" där landskapet präglas av lösa avlagringar som formats i samband med avtappningen av en issjö.

Påverkan: Myren är helt opåverkad.

Bedömning: Opåverkat myrkomplex beläget inom ett geovetenskapligt intressant område. Myren innehåller betydande arealer sumpskog.

Kläppsjömyran. nr 189

Värdeklass II
Geokod 20H 2E 1B0I
Areal 147 ha
Flygbild 1986
Höh 270 m
VMI-nr 20H 2E01
Naturvårdsobjekt N83 220 (NR83 070)



Variationsrikt myrkomplex beläget ett par km söder om Kläppsjön. Myren avvattnas dels åt V via ett litet vattendrag ner i Rängtjärnen samt åt O via en bäck ner i N Vetasjön. Myrens O del upptas i huvudsak av *topogena kärr* i form av ett mjukfastmattegolv samt ett längre blött mjukmattedråg. Myrens O del utgörs av partier med *skogskärr*, *nordlig mosse* samt *blandmyr* i mosaik med varandra. Strängade partier av de båda senare myrtyperna förekommer på flera ställen. Övergångarna mellan de olika myrtyperna är diffusa. Området innehåller dessutom ett tiotal *tjärnar* samt ett flertal fastmarksholmar. Myren ligger inom riksintresset "Rosjöområdet".

Påverkan: Myren är i stort hydrologiskt intakt men all omgivande fastmark samt flera fastmarksholmar är avvarkade.

Bedömning: Tämligen variationsrikt myrkomplex med ett stort antal tjärnar. Myren ingår i riksintresseområde.

Myr vid Petterstjärnen, Långnäsflon. nr 191

Värdeklass I
Geokod 20H 3D 2B0B
Areal 300 ha
Flygbild 1986
Höh 245 m
VMI-nr 20H 3D01
Naturvårdsobjekt N83 099, N83 129, (NR83 070)
Fältbesökt 1979-06, Per Simonsson.



Flikigt och uppsplittrat myrkomplex beläget SO om Rosjön inom ett dödislandskap. Området innehåller en mängd större och mindre fastmarksholmar. Den O delen avvattnas åt N via Kläppsjöbäcken ner i Rosjön medan den V delen avvattnas åt S via ett vattendrag ner i Mjövattnet. I V finns tre partier med *sträng-flarkkärr* som åtskilljs av partier med *nordlig mosse*. Här förekommer både lägre samt högre strängar som dämmer lösbottensamt mjukmatteflarkar. Längst i väster flyter en å/bäck som kantas av *strandkärr*. Från denna del av myren sträcker sig ett större dråg, som upptas av *topogena kärr* i form av mjuk- samt fastmattor, i NO rikning. Dråget har sin början i ett par källor belägna i kanten av det parti med nordlig mosse som upptar större delen av myrens N och V del.

Genom den östra delen flyter Kläppsjöbäcken, kantad av öppna strandkärr och strandskog. Längs bäckens N flöde samt i myrens SV del finns några mindre *tjärnar*. Längst i SO finns ett parti med en mycket välstrukturerad *strängblandmyr*. Höga tallbevuxna mossesträngar dämmer breda, blöta lösbottenflarkar eller vattenfyllda sådana. I O mot fastmarken samt även i den V delen finns ett flertal större och mindre partier med huvudsaskligen tallbeväxta *skogskärr*. Myren ligger inom riksintresset "Rosjöområdet" som utgör ett stort dödispräglat område.

Vegetation och flora: I sträng-flarkkärrens lösbottenflarkar dominerar vitag, dytåg och vitstarr. Strängarna når bitvis upp i mossestadium eller utgörs av låga högstarr-blåtåtel dominerade dito. Strandkärren i V utgörs av frodiga högstarrpartier samt smärre bladvassområden. På strängblandmyren återfinns vattenfyllda vattenklöverflarkar eller lösbottenflarkar med dytåg och dystarr mellan de höga mossesträngarna.



Dytåg

Fauna: Området utgör värdeklass III respektive IV i myrfågelinventeringen med arter som enkelbeckasin, grönbena och gluttsnäppa.


Påverkan: I områdets södra del förekommer en hel del diken på myren och i anslutning till denna. Här finns också myrodlingar i anslutning till myren. I sydväst avskärs och avgränsas myren av en landsväg.

Bedömning: Variationsrikt myrkomplex med välutvecklade sträng-flarkkärr samt strängblandmyr och visst ornitologiskt värde. Myren hyser dessutom geomorfologiska värden.

Källa: Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands lään, Härnösand.

Myr O Mjövattnet. nr 192

Värdeklass II
Geokod 20H 3D 0A7C
Areal 137 ha
Flygbild 1986
Höh 240 m
VMI-nr 20H 3D02
Naturvårdsobjekt N83 347




Myren belägen mellan Kläppsjö och Gärdselet i Ångermanälven. I V ansluter den till Mjövattnet och i S gränsar den mot objekt 20H 2D01. Myren sluttar svagt åt V och avvattnas ner i Mjövattnet via flera mindre bäckar som sammanstrålar strax innan utloppet i sjön. Bäckarna kantas av öppna starrbevuxna *strandkärr*. Myren innehåller också flera större fastmarksholmar. Den S och O delen domineras helt av glest tallbevuxna plan med *nordlig mosse*. Planen har ett lavdominerat bottenskikt och här förekommer också mjukmatte- och lösbottenhöljor. Flera mindre ytor med blandskogs- eller lövdominerad *sumpskog* förekommer i myrens NV och N del. Här finns också två små *tjärnar*. Myren ligger inom riksintresset "Rosjöområdet" där landskapet präglas av lösa avlagringar som formats i samband med avtappningen av en issjö.

Påverkan: I den allra nordostligaste delen finns ett mindre dikessystem som utövar en kraftig men lokal påverkan. I N avgränsas myren av en landsväg.

Bedömning: Bitvis mosaikartat myrkomplex beläget inom ett geovetenskapligt intressant område. Myren innehåller stora arealer sumpskog.

Tärnickflon. nr 196

Värdeklass II
Geokod 20H 4C 3D5G
Areal 156 ha
Flygbild 1986
Höh 240 m
VMI-nr 20H 4C01
Naturvårdsobjekt N83 221



Myrkomplex beläget strax O om Ångermanälven nedan Gulselet. Tärnickån flyter från O till V genom myren och avvattnar den ner i älven. Södra delen sluttar svagt ner mot ån medan den N är plan. På den senare sidan ån dominerar *skogskärr* och *blandmyr* i NO runt en mindre *tjärn*. Norr om ån finns också ett par större fastmarksholmar. Myrens södra del utgörs av tungor med *nordlig mosse* som sträcker sig från fastmarken ner mot ån. Mellan dessa ligger dråg med *topogena kärr*, både fast- och mjukmattor, samt blandmyrar ofta med sträng-flarkuppbyggnad. En stor fastmarksholme ligger strax söder om ån i väster. Ån kantas av huvudsakligen öppna vide- och starrdominerade *strandkärr* som bitvis kantas av en smal remsa lövdominerad strand/*sumpskog*.

Vegetation och flora: I en bäcksumpskog som ansluter till myren i söder växer skogsfru, köseven, lappranunkel, spädstarr och Sphagnum wulfianum.

Påverkan: På strandkärren finns rester efter åtminstone en ängslada som vittnar om tidigare slåtterhävd. En igenväxning av de öppna delarna kan noteras. I området i anslutning till tjärnen förekommer diken, med fläckvis stark men lokal påverkan. Myren är i öster avskuren av en landsväg som bildar gräns mot Båsflon i öster.


Bedömning: Variationsrikt samt tämligen ostört myrkomplex bl a med omfattande strandkärr.

Källa: Berg, I. & Öhrling, H. 1988. Hotade skogsväxter i Ångermanland, rapport 1988:1. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Fryleskog, R & Viotti, A. 1981. Ådalen - växter och djur, översiktlig naturinventering. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Stormyran. nr 197

Värdeklass I
Geokod 20H 4C 1D5D
Areal 182 ha
Flygbild 1986
Höh 255 m
VMI-nr 20H 4C02
Naturvårdsobjekt N83 100
Fältbesökt 1979-06, Mats Dynesius.



Stormyran har en flikig utsträckning och sträcker sig från Rosjön, till vilken den ansluter, upp i NV riktning. Området sluttar åt S och avvattnas ner i Rosjön. Myren innehåller ett flertal fastmarksholmar samt fyra små *tjärnar*. Den centrala delen domineras av ett större parti med *mosaikblandmyr*

med fastmattegolv, mjukmattedråg samt små mosseplan. Norr därom tar en blandning av *skogskärr* och glest tallbevuxna *nordliga mossar* vid. I S delen, i sluttning ner mot Rosjön, finns mindre partier med *sträng-flarkkärr* där fastmattesträngar dämmer mjukmatteflarkar. Här nere förekommer även blandmyr- och mossepartier. I anslutning till en liten bäck som mynnar i sjön ligger ett parti med lövdominerad *sumpskog*. Myren ligger inom riksintresset "Rosjöområdet" där landskapet präglas av lösa avlagringar som formats i samband med avtappningen av en issjö. I N gränsar myren mot skog med naturskogskaraktär.

Fauna: Myren utgör värdeklass III i myrfågelinventeringen med arter som enkelbeckasin, grönbena, gulärla och sävsparv.

Påverkan: Myren är helt opåverkad sånär som på anslutande hyggen längst ner i SV.


Bedömning: Ostört och variationsrikt myrkomplex beläget inom ett geovetenskapligt intressant område. Myren gränsar mot sjö samt mot skog av naturskogskaraktär.

Källa: Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Båsflon. nr 198

Värdeklass I
Geokod 20H 4D4A2F
Areal 257 ha
Flygbild 1986
Höh 240 m
VMI-nr 20H 4D01
Naturvårdsobjekt N83 072
Fältbesökt 1979-06, Per Simonsson;
1981-07, Karin Due & Marie Muhr.

Båsflon är belägen strax O om Ångermanälven, SO om Lillsele. Myren är till större delen plan och avvattnas huvudsakligen ner i Tärnickån. Denna flyter V ut genom den södra delen och lämnar sitt vatten i Ångermanälven. Myrens N del karaktäriseras av stora *sträng-flarkkärr* där fastmattesträngar dämmer stora mjukmatte- och lösbottenflarkar. Strax N om ån ligger ett större parti med glest tallbevuxen *nordlig mosse*. I övrigt utgörs N delen av mindre partier med *mosaikblandmyr* och nordlig mosse. Myrens S och O del har ett mosaik-



artat utseende med ett flertal större fastmarksholmar. Längst i O dominerar nordlig mosse men längre västerut vidtar en blandning av blandmyr och *topogena kärr*. De senare är huvudsakligen öppna och utgörs av mjukmattor men även fastmattor och mindre partier med *skogskärr*. Här finns också en liten *tjärn*. Tärnickån kantas bitvis av öppna *strandkärr* men mestadels av lövdominerade *strandsumpskogar*.

Vegetation och flora: Myrens vegetation är av fattig eller intermediär karaktär. I strängflarkkärret dominerar Sphagnum fallax och S. papillosum samt tråd- och flaskstarr. Av intermediära inslag kan nämnas dvärgbläddra, snip samt Campylium stellatum.

Fauna: Myren utgör värdeklass II i myrfågelinventeringen med arter som sädgås, enkelbeckasin, tofsvipa, gluttsnäppa och grönbena.

Påverkan: Längst i N finns enstaka diken med marginell inverkan och längs ån i söder finns spår efter vintervägar. Slåtter har tidigare förekommit på strandkärren samt även annorstädes där så varit lämpligt.


Bedömning: Mycket variationsrikt och huvudsakligen ostört myrkomplex med bl a stora strängflarkkärr. Myren hyser dessutom ett stort ornitologiskt värde.

Källa: Due, K. & Muhr, M. 1983. Tretton myrar i Västernorrlands län, rapport 1983:1. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Myr vid Ruske, Lillvattenmyran. nr 200

Värdeklass II
Geokod 20H 5A 4B0D
Areal 93 ha
Flygbild 1986
Höh 195 m
VMI-nr 20H 5A01
Naturvårdsobjekt N83 348




Myrkomplexet är långsträckt och beläget längsmed Ruskån och vid dess utflöde i Rusksjön. Avvattningen sker till ån och ut i sjön. Lillvattenmyran i N utgörs av ett glest tallbevuxet plan med *nordlig mosse*. Här finns också några mindre gölar. Söder därom ligger ett smalt öppet *topogent kärr* som dräneras av en litenbäck ut i ån. Längre ner mot utlopet meandrar ån kraftigt och kantas bitvis av mindre partier med öppna starrbevuxna *strandkärr*. Här finns också ett par små *tjärnar* som utgörs av restsjöar. Upp mot fastmarken vidtar partier med nordlig mosse samt en mindre yta med topogent kärr. I V gränsar myren mot en skogssluttning med naturskogskaraktär.

Påverkan: I S gränsar myren till mindre del mot åkermark. Området är annars helt opåverkat.

Bedömning: Opåverkat myrkomplex med mycket stor kontakt mot vattendrag och sjö. Myren omges helt av äldre skog.

Myr/fastmarksmosaik mellan Ö och V Kortingvattnet. nr 201


Värdeklass I
Geokod 20H 5B 2B7G
Areal 158 ha
Flygbild 1986
Höh 260 m
VMI-nr 20H 5B01
Naturvårdsobjekt N83 349
Fältbesökt 1993-08, Sören Uppsäll.



Myr/fastmarksmosaik beläget på båda sidor av vattendraget som förbinder Västra och Östra Kortingvattnet. Området sluttar ner mot detta vattendrag som avvattnar området via Östra Kortingvattnet och Kortingån ut i Ångermanälven. Södra sidan utgörs av en mosaik av mindre partier med *öppna topogena kärr*, *skogskärr* samt huvudsakligen tallbevuxna *nordliga mossar* som ligger som på trappsteg. Mellan dessa löper dråg med *sumpskog* som dränerar ner mellan en stor mängd fastmarksholmar. I V mot fastmarken finns gransumpskogspartier med flera källor. Här finns också källor i anslutning till topogena kärr. De topogena kärren utgörs huvudsakligen av mjukmatte- och lösbottendråg. Inom området finns också ett par små *tjärnar*. Norr om vattendraget dominerar skogskärr och sumpskog. Här finns längst i väster ett större öppnare parti med nordlig mosse och ett

svagt strängat mjukmattedråg. Vattendraget kantas av öppna *strandkärr*.

Vegetation och flora: Området har en fattigkärrsvegatation men med källpåverkade stråk med intermediär till rik vegetation. De topogena kärrens mjukmattor och lösbottnar utgörs huvudsakligen av brunmossdominerade dråg med ett fältskikt där trådstarr, flaskstarr, strängstarr och tuvsäv alternerar som dominanter. I delar med rörligare vatten förekommer bladvass. Bottenskiktet domineras omväxlande av Scorpidium scorpidioides, Straminergon stramineum, Warnstorfia sarmentosa och Warnstorfia exannulata. Här förekommer även arter som Sphagnum teres och Paludella squarrosa. Vid källor mot fastmarken i SV förekommer också Bryum weigelii och Philonotis fontana. Skogskärren utgörs antingen av klotstarr eller risdominerade tallkärr. Sumpskogarna är huvudsakligen sumpgranskogar av lågörttyp. Här växer bl a ögonpyrola och Sphagnum wulfianum. I sumpskogen förekommer källor med bitvis riklig förekomst av lappranunkel och fjällskråp. Strandkärren utgörs av vitmossmattor med tråd- och flaskstarr som fältskiktsdominanter.




Lappranunkel

Påverkan: Angränsande fastmark i SV samt fastmarksholmar utgörs av äldre och grovstammig samt brandpåverkad tallskog. Plockhuggning har förekommit. På en av fastmarksholmarna finns rester av en tjärdal. I SV ansluter ett mindre hygge och här skvallrar nybyggda skogsbilvägar om fortsatta avverkningar. Våtmarken är annars hydrologiskt intakt.

Bedömning: Vacker samt hydrologiskt opåverkad myr/fastmarksmosaik i anslutning till vattendrag och större sjö. Området är variationsrikt med bl a ett flertal källor. Opåverkade områden av denna typ är ovanliga i länet.

Frättenråmyran. nr 202

Värdeklass II
Geokod 20H 5C 4C5B
Areal 154 ha
Flygbild 1986
Höh 275 m
VMI-nr 20H 5C01
Naturvårdsobjekt N83 350




Långsträckt myrkomplex beläget någon km NV om byn Lillsele vid Ångermanälven. Centralt genom hela myren, som sluttar något åt S, rinner Hembäcken som avvattnar myren åt S ner i älven. Bäcken kantas av glest trädtäckta och starrbevuxna *strandkärr*. Ovanför strandkärren vidtar glest tallbevuxna plan med *nordlig mosse*, genomdragna av mjukmattedråg. Längs V kanten, mot fastmarken, finns stora områden med *sumpskog*, bitvis med inslag av *skogskärr*. Även O om bäcken i S finns flera mindre partier med sumpskog.

Påverkan: I sumpskogen längst upp i NV förekommer diken som ger en stark men lokal påverkan. Hyggen ansluter längs stora delar av myrens östkant.

Bedömning: Myrkomplex med omfattande sumpskogsarealer samt smärre strandkärr.

Stormyran-Ässan. nr 207

Värdeklass I
Geokod 20H 6C 3E4I
Areal 235 ha
Flygbild 1980
Höh 270 m
VMI-nr 20H 6C01
Naturvårdsobjekt NR83 200, N83 267
Fältbesökt 1978-06, Mats Dynesius;
1981-07, Karin Due & Marie Muhr.



Mycket flikigt större myrkomplex beläget strax V om Ångermanälven 20 km NO om Junsele. Stormyran-Ässan ingår i ett större myrkomplex tillsammans med objekt 20H 6C02-03 och 20H 7C01-02. Myren sluttar svagt åt SO och avvattnas huvudsakligen i denna riktning via en bäck och Aborrtjärnen ut i älven. De allra nordligaste delen lämnar sitt vatten till Ässan som även denna mynnar i älven. Myren domineras av ett stort och mycket vackert utbildat *sträng-flarkkärr* som löper som ett brett stråk från N till S genom myren. Här dämmer fastmattesträngar ofta mycket stora mjukmatte och lösbottenflarkar samt stora flarkgölar. Längs hela O kanten sänder myren ut långa armar som innesluter ett stort antal fastmarksholmar. Här finns i V, gränsande mot sträng-flarkkärret, öppna *topogena kärr* med såväl mjuksom fastmattor samt mindre delar med lösbotten. Längre österut domineras myrarmarna av en blandning av *skogskärr* samt *nordlig mosse*. Partier med *blandmyr* av mosaiktyp förekommer också främst med ett par lite större områden i den SO delen. Myren ingår i riksintresseområdet "Stormyran-Pellemyran".

Vegetation och flora: Myren har främst en intermediär vegetation. Sträng-flarkkärrets strängar domineras antingen av Sphgnum papillosum, S. pulchrum, tuvsäv och högstarr eller av blåtåtel och S.papillosum. Flarkarna är, då de inte är vegetationsfria, glest bevuxna med dystarr, tuvsäv, kallgräs och vattenklöver. Bitvis förekommer också dybläddra och vitag. Skogskärren är till större delen klotstarrdominerade blandskogskärr. Blandmyrpartierna utgörs huvudsakligen av fattiga S. angustifolium-mjukmattor med flaskstarr alternerade med mossepartier.

Fauna: Myren utgör värdeklass I i myrfågelinventeringen med arter som sädgås, enkelbeckasin, tofsvipa, storspov, småspov, gluttsnäppa och grönbena.

Påverkan: Stora delar av omgivande fastmark samt även fastmarksholmarna har avverkats. I och med detta finns körskador i de N delarna. Smala igenväxande diken finns också i O och S. Stora delar av myren har tidigare utnyttjats för slåtter. Om detta vittnar bl a gamla timrade lador.


Bedömning: Större myrkomplex med ett mycket stort och ett av länets vackraste sträng-flarkkärr. Myren hyser dessutom mycket höga ornitologiska värden. Riksintresse, Myrskyddsplan.

Källa: Due, K. & Muhr, M. 1983. Tretton myrar i Västernorrlands län, rapport 1983:1. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Pellemyran mfl. nr 208

Värdeklass I
Geokod 20H 6C 1C9E
Areal 415 ha
Flygbild 1980
Höh 275 m
VMI-nr 20H 6C02
Naturvårdsobjekt NR83 200, N83 266
Fältbesökt 1978-06, Per Simonsson; 1993-08, Sören Uppsäll.



Pellemyran utgörs av ett stort mosaikartat myrkomplex beläget några km NV om Gulsele och Ångermanälven. Myren ingår i ett större myrkomplex tillsammans med objekt 20H 6C01,6C03 och 20H 7C01-02. Området sluttar åt S och SO och avvattnas av Hömyrbäcken ut i älven. Karaktäristiskt för myren är den stora mängd fastmarksholmar som finns jämnt spridda över hela området och dess flikiga utsträckning. Myrens N del domineras av tydligt utbildade och mycket vackra *strängflarkkärr*. Kraftiga fastmattesträngar dämmer stora lösbottenflarkar och bitvis stora vattenfyllda flarkgölar. Strängflarkkärren sluttar tydligt och på sina ställen är de utbildade i tydliga terrasser. Här förekommer också mindre partier med öppna *topogena kärr* där mjukmattor dominerar. Mot omgivande fastmark och fastmarksholmar övergår de öppna kärren i *skogskärr* och *nordlig mosse*. Mindre partier med *sumpskog* finns på ett flertal ställen. Myrens S del domineras av en mosaik av mindre partier med nordlig mosse, skogskärr, *blandmyr* samt öppna topogena kärr belägna mellan fastmarksholmarna. Genom den södra delen rinner också Hömyrbäcken som kantas av skogskärr och *strandsumpskog*. På myren finns också ett flertal *tjärnar* de flesta i SO. Myren ingår i riksintresseområdet "Stormyran-Pellemyran".

Vegetation och flora: Sträng-flarkkärren i N uppvisar en rikare vegetation medan övriga delar domineras av fattigare vegetationstyper. Strängflarkkärrens strängar domineras av trådstarr och blåtåtel med inslag av ängsnycklar, slåtterblomma, snip och björnbrodd. I bottensiktet dominerar Sphagnum papillosum med inslag av S. warnstorfii och S. subnitens. Lösbottenflarkarna har ett glest utbildat bottenskikt av Warnstorfia exannulata, dvärg- och dybläddra. I fältskiktet dominerar vitstarr. Här förekommer även dytåg, vitag, kärrull och myggblomster. De topogena kärren är fattigare med golv som domineras av flaskstarr och S. fallax och S. angustifolium. På blandmyrpartierna i S är golven mycket fattiga, på gränsen mot mossevegetation. Här domineras fältskiktet av taggstarr och tuvsäv med ett bottenskikt av S. lindbergii, S. angustifolium och S. papillosum. Skogskärren utgörs huvudsakligen av fattiga tallkärr vanligen med dominans av klotstarr. Såväl strandskog som övriga sumpskogar domineras av sumpgranskog av lågörttyp. Här växer bl a Sphagnum wulfianum.

Fauna: Myren utgör värdeklass II i myrfågelinventeringen med arter som sädgås, kricka, enkelbeckasin, gluttsnäppa och grönbena. Bäver är också verksam i Hömyrbäcken.


Påverkan: En nybyggd (ca 1985) skogsbilväg går tvärs över myren och delar den i en nordlig och en sydlig hälft. I anslutningt till denna väg är ett flertal större fastmarksholmar avverkade. Övriga delar av myren är hydrologiskt ostörda.

Bedömning: Stort, variationsrikt och mycket mångformigt myrkomplex med en flikig utsträckning och ett stort antal större fastmarksholmar. De vackra strängflarkkärren har bitvis en terrass struktur och bidrar starkt till myrens höga värde. Detta gör också de höga ornitologiska värdena. Riksintresse, Myrskyddsplan.

Källa: Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Myr vid Abborrtjärnen. nr 209

Värdeklass II
Geokod 20H 6C 1E1H
Areal 86 ha
Flygbild 1980
Höh 270 m
VMI-nr 20H 6C03
Naturvårdsobjekt NR83 200, N83 351
Fältbesökt 1982-07, Karin Due & Marie Muhr.



Myren är belägen ett par km NV om Gulsele och gränsar mot Ångermanälven till vilken den avvattnas. Från älven sträcker sig den plana myren upp i nordvästlig riktning. Myren ingår i ett större myrkomplex tillsammans med objekt 20H 6C01-02 och 20H7C01-02. I O finns långsträckta *strandkärr* mot älven. Längre upp domineras myren av två stora öppna ytor med *nordlig mosse*. Dessa är strängade och ristuvsträngar innesluter här mjukmattehöljor. Rena mosseplan förekommer också. Mellan dessa båda mosseytor ligger ett parti med *sträng-flarkkärr*. Fastattesträngarna, som närmar sig mossestadium, dämmer mjukmatteflarkar samt även flarkgölar. Myrens kanter mot fastmarken, främst i den V delen, utgörs av *skogskärr*. Längst upp i NV samt i NO finns två mindre *tjärnar*. Myren ingår i riksintresseområdet "Stormyran-Pellemyran".

Vegetation och flora: Myren upptas huvudsakligen av en vegetation av fattigkärrstyp eller av rent ombrotrof typ. Viktiga bottenskiktsarter på myren är Sphagnum fuscum, S. angustifolium, S. balticum, S. jensenii och S. majus. Fältskiktet domineras i allmänhet av ris och hjortron utgör ofta dominant. Strandkärrens blötare delar utgörs av gungfly med S. fallax, S. riparium och S. obtusum medan de mindre blöta domineras av S. angustifolium. Fältskiktet utgörs av bl a flask-, dy- och strängstarr samt vattenklöver, sjöfräken och dvärgbjörk.

Påverkan: En kraftledning passerar även myrens SO del. Strandkärren påverkas av de vattenståndsvariationer, på en dryg meter, som orsakas av vattenregleringen i älven. Övriga delar av myren är helt opåverkade.

Bedömning: Till större delen opåverkad myr som ingår som en del i det större myrkomplexet Stormyranm-Pellemyran. Riksintresse, Myrskyddsplan.


Källa: Due, K. & Muhr, M. 1983. Nio myrar i Ångermanland. Opublicerad rapport vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Stormyran-Åkerbränna. nr 212

Värdeklass I
Geokod 20H 7A 4C6F
Areal 580 ha
Flygbild 1978
Höh 365 m
VMI-nr 20H 7A01
Naturvårdsobjekt NR83 069
Fältbesökt 1980-06, Per Simonsson & Mats Dynesius; 1984, B. Dahlén; 1984, Karin Due.


Myrområdet innefattar myrarna Stormyran, Nörd-Stormyran, Förelmyran och Rötet alla belägna strax V om Åkerbränna by i länets nordvästligaste del. Områdets N del sluttar åt SO och de södra delarna huvudsakligen åt O. Avvattningen sker till största delen via Stormyrbäcken i NO rikning ner i Ässan samt till mindre del i V riktning. Myrens S hälft domineras av ett mycket stort och två mindre väl utbildade *sträng-flarkkärr*. Fastmattesträngarna är glest bevuxna med tall och dämmer mjukmatte- och lösbottenflarkar. Vattenfyllda flarkgölar förekommer också. Som en bård runt sträng-flarkkärren samt med flera partier öster därom förekom-

mer stora arealer med *öppna topogena kärr*. Dessa utgörs främst av fastmattor men även av mjukmattor. En källa finns också i anslutning till kärren. Genom myrens centrala del löper ett stråk med fastmarksholmar i NV-SO:lig riktning. Öster om detta stråk dominerar större partier med *blandmyr* men här förekommer också ytor med *skogskärr*. Blandmyrpartierna utgörs av fastmattegolv med glest tallbevuxna strängar och mindre mosseplan. Längst i S förekommer avsnitt med glest trädbevuxen *dikad myr*. Myrens N hälft, som sänder ut två breda myrarmar i NV riktning, domineras av stora arealer med längst i N tydligt sluttande skogskärr. Myren utgör ett riksintressse.



Vegetation och flora: Vegetationen är huvudsakligen fattig till intermediär men mindre delar med rikkärr förekommer också. Strängflarkkärren hyser en intermediär till rikkärrsbetonad vegetation. Strängarna domineras av trådstarr och blåtåtel och i flarkarna växer bl a vitstarr. I sträng-flarkkärret förekommer även ängsnycklar, sumpnycklar, brudsporre, björnbrodd och myggblomster. De öppna topogena kärren domineras av högstarrvegetation. Vid källan finns en rik lever- och brunmossflora. Mossepartiernas plan domineras av Sphagnum fuscum med antingen tuvull eller ris i fältskiktet. Skogskärren utgörs av fattiga blandskogdskärr.

Fauna: Myren utgör värdeklass I i myrfågelinventeringen med arter som gräsand, dalripa, trana, enkelbeckasin, småspov, tofsvipa, ljungpipare, brushane, myrsnäppa, gluttsnäppa och grönbena.



Ljungpipare

Påverkan: Mot fastmarkskanterna i myrens O och N del förekommer diken med svag lokal påverkan. I norr finns även spår efter vintervägar och här är också angränsande fastmark till stora delar avverkad. Längst i söder finns perifiert belägna kraftigt dikade partier. Totalt sätt är dock myrens hydrologi intakt.

Bedömning: Mycket stort och mångformigt myrkomplex där stora och vackert strukturerade strängflarkkärr ger karaktär åt myren. Ett mycket stort ornitologiskt värde tillsammans med dess höga morfologiska värden bidrar till myrens mycket höga värde. Riksintresse, Myrskyddsplan.

Källa: Björkbäck, F. 1970. TELMA (IBP). Preliminär förteckning över särskilt skyddsvärda myrar i Västernorrlands län. Stencil vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Dahlén, B. 1984. Slättbränna och Mossaträsk - två fågelmyrar i Ångermanland. Artikel i Gråspetten årg. 4:4. Ångermanlands Ornitologiska förening.


Due, K. 1984. Stormyran - Åkerbränna, en botanisk inventering. Opublicerad inventering vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Guvå, L. 1971. Naturvårdsinventering i Västernorrlands län. Del 2 Ångermanland, Ådalen. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Överhömyran, Nyckelmyran. nr 217

Värdeklass II
Geokod 20H 7B 0E8A
Areal 138 ha
Flygbild 1986
Höh 360 m
VMI-nr 20H 7B02
Naturvårdsobjekt N83 352




Myren är belägen fyra km SO om byn Åkerbränna. Den ligger i en svagt utbildad dalsänka som sluttar åt SO. I denna riktning avvattnas också myren av Hömyrbäcken. Centralt genom de lägre delarna av myren går ett stråk med öppet *topogent kärr*. Detta utgörs av fastmattegolv, mjukmattedråg samt längre åt SO av ett bäckdråg. Längre upp mot fastmarken vidtar glest tallbevuxna plan med *nordlig mosse*, bitvis genomkorsade av mjukmattedråg. Längst i S finns ett stort antal fastmarksholmar och mellan dessa upptas myren av *mosaikblandmyr*. Här finns också en liten *tjärn*. Blandmyren utgörs av starrbevuxna fastmattegolv, mjukmattedråg och mindre mosseplan. Ungefär mitt på myren sänder den ut ett utskott åt O vars N del utgörs av en *strängblandmyr* med mossesträngar och fastmatteflarkar. Den S delen upptas av ett topogent kärr.

Påverkan: Myren kantas till stor del av hyggen och i V och i N finns också spår av vintervägar. De större fastmarksholmarna i S är avverkade.

Bedömning: Tämligen variationsrikt och hydrologiskt intakt myrkomplex med bl a en mindre strängblandmyr.

Sönnerstmyran. nr 219

Värdeklass I
Geokod 20H 7C 1D3D
Areal 280 ha
Flygbild 1980
Höh 270 m
VMI-nr 20H 7C01
Naturvårdsobjekt N83 353, NR83 200
Fältbesökt 1979-06, Per Simonsson; 1993-08, Sören Uppsäll.



Sönnerstmyran är belägen längsmed och N om Ässan tre km NV om Ångermanälven. Myren ingår i ett större myrkomplex tillsammans med objekt 20H 6C01-03 och 20H 7C02. Sönnerstmyran sluttar svagt, huvudsakligen åt S, ner mot Ässan som rinner åt SO ut i älven. I V sänder myren iväg två bredare myrarmar. Den södra av dessa domineras i V av en *sluttande mosse* med glest tallbevuxna plan. Längre söderut slingrar Ässan fram kantad av *strandsumpskog*. Söder om ån dominerar partier med *nordlig mosse* tillsammans med *skogskärr*. Den N myrarmen upptas längst i N av skogskärr och omfattande partier med *sumpskog*. Längre ner förekommer öppna *topogena kärr* tillsammans med skogskärr och sumpskogspartier i anslutning till fastmarksholmar. I myrens S hälft ligger flera stora fastmarksholmar

i sluttningen ner mot ån. Mellan dessa löper myrarmar ner. Den nordligaste av dessa utgörs av ett svagt utbildat *sträng-flarkkärr* där fastmattesträngar dämmer lösbottenflarkar. De övriga myrarmarna utgörs av skogskärr samt nordlig mosse. Längst i O finns också en större tjärn. Myren ingår i riksintresseområdet "Stormyran-Pellemyran".

Vegetation och flora: Myren utgörs huvudsakligen av fattiga vegetationstyper men bitvis finns intermediära till svagt rika inslag. Strängflarkkärrets strängar domineras av blåtåtel, trådstarr samt Sphagnum papillosum men här förekommer även ängsnycklar, björnbrodd samt även slakstarr. Flarkarna domineras av dy- och vitstarr med ett glest bottenskikt av dybläddra och Scorpidium scorpidioides. De öppna kärren domineras av fattigare starr-vitmossmattor. Mindre rikare partier under inverkan av rörligt vatten förekommer med arter som kärrull, dvärgbläddra och S. teres. Skogskärren domineras av tallkärr av klotstarrtyp samt fattiga gran/björkkärr av vitmosstyp. Mindre partier med rikare tallkärr med förekomst av Calliergon cordifolium och Tomentypnum nitens finns också. Sumpskogen utgörs till lika delar av gransumpskog av antingen ristyp eller lågörttyp. Här kan nämnas Calliergon cordifolium samt S. wulfianum. Även strandsumpskogen utgörs av gransumpskog av lågörttyp. Här finns bl a Calliergon cordifolium samt Climacium dendroides.

Fauna: Myren utgör värdeklass IV i myrfågelinventeringen men borde nog klassas något högre. Arter som noterats är bl a trana, enkelbeckasin och varfågel. Bäver förekommer också i Ässan.


Påverkan: Längst upp i N finns ett dikessystem med en kraftig lokal påverkan. Här har även mindre partier med sumpskog avverkats. Stora delar av myren kantas av hyggen och ungskogar och i O förekommer sedimentdeposition från diken som dragits ut i myren. Övervägande delar av myren är dock hydrologiskt intakta.

Bedömning: Stort och variationsrikt myrkomplex med ett flertalt myrtyper representerade. Myren hyser också ett visst botaniskt värde med förekomst av slakstarr. Myren utgör också en del i det stora myrkomplexet Stormyran-Pellemyran. Riksintresse, Myrskyddsplan.

Källa: Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Långmyran. nr 220

Värdeklass II
Geokod 20H 7C 1E4G
Areal 68 ha
Flygbild 1980
Höh 280 m
VMI-nr 20H 7C02
Naturvårdsobjekt NR83 200, N83 265
Fältbesökt 1979-06, Per Simonsson.



Långmyran är ett mycket långsmalt myrkomplex beläget en km NV om Ässans utlopp i Ångermanälven. Myren ingår i ett större myrkomplex tillsammans med objekt 20H 6C01-03 och 20H 7C01. Långmyran sluttar åt SO och avvattnas direkt ner i Ässan. Ungefär mitt på delas myren i en nordlig och en sydlig hälft av ett smalt parti med *sumpskog*. Längst i N finns också ett mindre område med sumpskog. Annars utgörs den N delen i V av ett blött stråk med öppet *topogent kärr* där mjukmattor dominerar. Den O delen upptas av glest tallbevuxna plan med *nordlig mosse*. Myrens S del utgörs i NV av ett *sträng-flarkkärr* där fastmattesträngar dämmer mjukmatte- och lösbottensträngar. Längst i S finns ett öppet fastmattekärr. Ett flertal mindre partier med *skogskärr* finns också, vanligen belägna mot fastmarken. Myren ingår i riksintresseområdet "Stormyran-Pellemyran".

Vegetation och flora: Mjukmattedråget i NV domineras av blåtåtel samt tuvsäv och fastmattegolven har en vegetation av högstarrtyp med bitvis

stort inslag av dvärgbjörk. Strängflarkkärrets strängar domineras av blåtåtel, trådstarr men är bitvis högre och då risrika med en och småvuxen tall. I flarkarna växer antingen vattenklöver och ängsull eller så är de vitstarrdominerade.

Fauna: Myren utgör värdeklass II i myrfågelinventeringen med arter som sädgås, enkelbeckasin, och grönbena.


Påverkan: Myrens norra del omges helt av hyggen och genom sumpskogen mitt på myren har man dragit en basväg där virket från hyggena körts ut.

Bedömning: Tämligen varierat myrkomplex med bl a strängflarkkärr. Myren har höga ornitologiska värden och utgör också en del i det stora myrkomplexet Stormyran-Pellemyran. Riksintresse, Myrskyddsplan.

Källa: Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Rävelmyran. nr 222

Värdeklass II
Geokod 20H 7D 1B9E
Areal 104 ha
Flygbild 1986
Höh 290 m
VMI-nr 20H 7D01
Naturvårdsobjekt N83 102
Fältbesökt 1979-06, Mats Dynesius.



Rävelmyren är belägen två km NV Brattsele och Ångermanälven. Myren har en NV-SO utsträckning och sluttar åt SO. Den avvattnas av Stormyrbäcken som rinner genom myrens södra del och lämnar sitt vatten i Ångermanälven. Myren domineras av två blötare armar med *sträng-flarkkärr* där fastmattesträngar dämmer mjukmatte- och lösbottenflarkar. I den S delen av den O armen övergår sträng-flarkkärren i en bitvis strängad glest trädbevuxen *blandmyr* med fast- och mjukmatteflarkar samt mindre mosseplan. Mellan de båda armarna sträcker sig ett smalt parti med *sumpskog*. I N och NO samt längs myrens V kant förekommer glest tallbevuxna plan med *nordlig mosse*, bitvis genomdragna av dråg. Längst i S utmed bäcken dominerar sumpskogar.

Vegetation och flora: Sträng-flarkkärrets strängar är framför allt bevuxna med ris och blåtåtel och i flarkarna växer vattenklöver, sumpstarr och dybläddra. Partier med högstarrkärr förekommer också. Sumpskogarna utgörs av såväl blandskogar som rena lövskogar.



Sumpstarr

Fauna: Myren utgör värdeklass IV i myrfågelinventeringen med arter som enkelbeckasin, grönbena och gluttsnäppa.


Påverkan: I NV gränsar myren mot hyggen som dikats och här går dikessystemet ut i myren. Påverkan är kraftig men endast lokal. Längst i S förekommer också ett längre dike. Bäcken längs myrens östkant är förmodligen utgrävd och rätad.

Bedömning: Mindre myrkomplex där de intressantaste delarna utgörs av sträng-flarkkärr och betydande sumpskogsarealer.

Källa: Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Nymyran. nr 223

Värdeklass I
Geokod 20H 7E 1D5E
Areal 225 ha
Flygbild 1986
Höh 290 m
VMI-nr 20H 7E01
Naturvårdsobjekt N83 354
Fältbesökt 1982-07, Karin Due & Marie Muhr.



Nymyran är belägen 30 km NV om Solberg invid en större vik av Hällbymagasinet i Ångermanälven. Myren sluttar svagt mot centrum där Risån rinner och den avvattas till ån och direkt ut i älven. I NV upptas myren till större delen av glest tallbevuxna plan med *nordlig mosse*, genomkorsade av mjukmattedråg. Här finns också öppna *topogena mjukmattekärr* och ett flertal större och mindre fastmarksholmar. Något längre åt V finns stora *sträng-flarkkärr* med långsträckta mjukmatte- och lösbottenflarkar samt några flarkgölar. Upp mot fastmarken förekommer flera mindre områden med *skogskärr*. Längst i V finns ett större öppet kärrgolv. Söder om ån breder plan med nordlig mosse ut sig. I V avbryts dessa av ett större topogent mjukmatte/lösbottenkärr med rörligt vatten. Väster därom vidtar ett område med större partier av nordlig mosse, *strängad mosse* samt *strängblandmyr*. De strängade partierna är öppna och mellan mossesträngarna återfinns mjukmattehöljor samt lösbottenflarkar och vattenfyllda flarkgölar. Ner mot Hällbymagasinet finns *dämningspåverkade strandkärr* som utgörs av gungflyn med enstaka laguner. Risån som rinner genom myren kantas även den av *strandkärr*.

Vegetation och flora: Nymyran har huvudsakligen en fattig vegetation men intermediära områden samt mindre rikkärrspartier förekommer också. Strandkärren längs ån domineras av flaskstarr och lägre glasbjörk, gråal och viden med Sphagnum angustifolium, S. russowii och S. girgensohnii i botten. Här växer även S. teres och Tomentypnum nitens. Arter som Calliergon cordifolium, Drepanocladus aduncus och Paludella squarrosa förekommer också bitvis och indikerar artrikare miljöer.

Påverkan: Ett drygt 400 m långt diken löper parallellt med Risån ut i Hällbymagasinet. Även på ytterligare ett par ställen i myrens V del förekommer enstaka diken med obetydlig påverkan. Strandkärren vid Hällbymagasinet påverkas av vattenståndsvariationerna (ca 1 m) i magasinet. Övriga delar av myren är hydrologiskt intakta. På flera områden med högstarrvegetation vittnar gamla hässjor om äldre tiders slåtter.


Bedömning: Ett mycket variationsrikt myrkomplex med ett stort antal myrtyper representerade. Myren hyser bl a omfattande arealer sträng-flarkkärr och strandkärr. Stor kontakt med öppna vatten.

Källa: Due, K. & Muhr, M. 1983. Nio myrar i Ångermanland. Opublicerad rapport vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Hommelmyran. nr 224

Värdeklass II
Geokod 20H 8A 4B7E
Areal 122 ha
Flygbild 1986
Höh 515 m
VMI-nr 20H 8A01
Naturvårdsobjekt N83 101


Hommelmyran är ett terrängföljande myrkomplex med en amöbalik utsträckning. Myren ligger högt upp på Vällingbergets sluttningar och sträcker sig in över gränsen till Västerbotten. Det vidare partiet på bergets S sluttning utgörs centralt av öppna *topogena kärr* dominerat av fastmattor. Längre upp i sluttningen ligger en *sluttande mosse* och även mindre partier med *nordlig mosse*. Mosseplanen är glest tallbevuxna och på en sluttande mosse förekommer mindre, strängade partier med mjuk- och fastmattehöljor. Ett flertal större och



mindre fastmarksholmar förekommer i de perifiera delarna. Längst i S samt i V finns områden med *blandmyr* med fastmattegolv, mjukmattedråg samt mindre mosseplan. I NO sänder myren ut en arm som till övervägande del utgörs av *soligna kärr.* Dessa är huvudsakligen öppna och domineras av fastmattor med inslag av mjukmattedråg.

Påverkan: Myren är hydrologiskt opåverkad. Hyggen ansluter till vissa delar.


Bedömning: Opåverkat terrängföljande myrkomplex högt beläget på ett skogsberg. Ett flertal myrtyper finns representerade med bl a öppna soligena kärr.



Rundsileshår

Åbromyran, Orrmyran, Tjärnmyran. nr 227

Värdeklass II
Geokod 20H 8B 0B2G
Areal 194 ha
Flygbild 1986
Höh 290 m
VMI-nr 20H 8B05
Naturvårdsobjekt N83 355




Myren är belägen längsmed Ässans övre lopp, två km NO Åkerbränna by. Området ligger i en dalsänka och sluttar från sidorna ner mot ån i mitten som avvattnar myren i SO rikning ner mot Ångermanälven. I sluttningarna ner mot ån finns ett stort antal fastmarksholmar och ryggar och mellan dessa ligger större och mindre myrytor. Dessa domineras av *blandmyrar*, *topogena kärr* samt plan med *nordlig mosse*. Blandmyrpartierna utgörs av fastmattegolv, mjukmattedråg och glest tallbevuxna mindre mosseplan. De öppna topogena kärren utgörs huvudsakligen av fastmattor men även här finns mjukmattedråg. Mot fastmarken i N finns också ett parti med fastmattedominerat *skogskärr*. Här förekommer även en mindre yta med lövdominerad *sumpskog*. Den slingrande Ässan kantas av både öppna *strandkärr* och strandsumpskog av blandskogstyp.

Påverkan: Något enda litet dike förekommer med obetydlig påverkan. Hyggen ansluter bitvis och i SO avgränsas myren mot en skogsbilväg.

Bedömning: Tämligen variationsrikt och opåverkat myrkomplex med ett långt strandkärr som sträcker sig genom hela myren.

Stormyran. nr 229


Värdeklass I
Geokod 20H 8D 0A5E
Areal 236 ha
Flygbild 1986
Höh 350 m
VMI-nr 20H 8D02
Naturvårdsobjekt N83 356



Myren ligger i en långsträckt dalsänka som sträcker sig från Västerbottensgränsen i SO riktning ner mot Ångermanälven vid Hällbymagasinet. Myren har en höjdskillnad på 70 m och centralt i de lägre delarna rinner Stormyrbäcken som avvattnar området ner i Ångermanälven. Bäcken kantas av en smalare bård med *sumpskog* och intill denna finns flera mindre partier med *sträng-flarkkärr*. Dessa utgörs av fastmattesträngar samt mjukmatte- och lösbottenflarkar. Längst i N finns ett större plant parti med öppen *blandmyr*. Denna utgörs av fastmattegolv, mjukmattedråg samt mindre mosseplan och strängar. Övriga delar av myren upptas av glest tallbevuxna plan med *nordlig mosse* i mosaik med ett stort antal mindre partier med *skogskärr*. I myrens mellersta del finns också ett trädbevuxet *soligent kärr*. Kärret domineras av glest trädbevuxna fastmattor och öppna mjukmattedråg. Ett flertal sumpskogspartier förekommer också i kanterna mot fastmarken.

Påverkan: Längst i N finns ett dike som dränerar angränsande myrodlingar ner i Stormyrbäcken. Påverkan är stark men av lokal art. Stora delar av angränsande fastmark i NV utgörs av hyggen.

Bedömning: Variationsrikt myrkomplex med en stor höjdskillnad samt förekomst av sträng-flarkkärr och stora arealer sumpskog.



Ögonpyrola

Nr 1

18H 4D 02 (4526) KLASS 3
MYR RUNT HAJSOTJÄRNARNA 19 KM NV VIKSJÖ KYRKA

Myrkomplex, 54 ha (42 ha våtm), 336 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
6 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Gungfly, 40 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
5 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
31 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 34 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Vegetation utmed mindre vattendrag, 5 % av delobjektytan, öppet. Videvegetation. Mjukmatta-lösbotten.

Element 4: Bäck, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 4: Tjärn
6 ha, fördelat på 3 ytor.

Nr 2

18H 4D 03 (4543) KLASS 3
DAMMVATTENMYRORNA 16 KM NV VIKSJÖ KYRKA

Myrkomplex, 72 ha (66 ha våtm), 325 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Flikiga kantzoner, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
8 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
40 ha, glest trädtäckt. Svag generell påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 45 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 3: Mad vid vattendrag
7 ha, öppet.

Element 1: Bäck, 25 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 75 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 4: Sumpskog
11 ha, fördelat på 9 eller fler ytor. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 5: Tjärn
2 ha, fördelat på 2 ytor.

Nr 3

18H 5F 01 (4533) KLASS 2
LÅNGMYRAN-STORHÄLLMYRAN 17 KM NNV VIKSJÖ KYRKA

Myrkomplex, 180 ha (167 ha våtm), 340 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Topogent kärr
18 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
22 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
115 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Bäck, 3 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Element 5: Vegetation utmed mindre vattendrag, 7 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Sumpskog
12 ha, fördelat på 5 ytor.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 5: Tjärn
2 ha, fördelat på 2 ytor.

Nr 4

18H 6C 01 (3742) KLASS 3
BJURTJÄRNSMYRAN 14 KM SO GRANINGE BRUK

Våtmarkskomplex, 103 ha (89 ha våtm), 288 m ö h.
Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Höjd vattennivå genom dämning, utterförekomst.

Delobj. 1: Topogent kärr
5 ha, öppet. Svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta. Diffus strängbildning.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
25 ha, mosaikartad fördelning, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Sluttande mosse
7 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande dikning.

Element 1: Sträng, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 50 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
24 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande dikning, kraftledning. Diffus strängbildning.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 4: Flark, 10 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 5: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 5: Mad vid sjö
7 ha, öppet. Stark generell påverkan från dämning, svag lokal påverkan från anslutande dikning.

Element 1: Golv, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 6: Sumpskog
18 ha, mosaikartad fördelning. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 7: Tjärn
10 ha, fördelat på 6 ytor. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Kantzon vid tjärn, 15 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Nr 5

18H 6D 01 (3738) KLASS 3
BJURSJÖMYRAN 17 KM SO GRANINGE BRUK

Myrkomplex, 74 ha (72 ha våtm), 250 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Tillstånd för torvtäkt har givits.

Delobj. 1: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Lösbotten.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
17 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, väg.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
27 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning. Diffus strängbildning.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 4: Sumpskog
13 ha, fördelat på 2 ytor. Svag lokal påverkan från dikning, väg.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Nr 6

18H 6D 02 (4323) KLASS 3
SMÅMYRORNA 15 KM SO GRANINGE BRUK

Myrkomplex, 68 ha (59 ha våtm), 265 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
17 ha, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning. Sjö ansluter till minst 25%, mindre trädklungor i öppen våtmark.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Bäck, 2 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
24 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, kraftledning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 2: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 4: Tjärn
7 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Gungfly, 45 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 5: Sumpskog
7 ha, fördelat på 7 ytor. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog.

Nr 7

19H 7B 01 (2818) KLASS 2
MÖRTTJÄRNSMYRAN 8 KM S GRANINGE BRUK

Myrkomplex, 134 ha (114 ha våtm), 345 m ö h. Flygb. -86. Fält -92.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Fäbodvall i anslutning, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
31 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp. Diffus strängbildning.

Element 2: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
27 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 4: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
21 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 4: Topogent kärr
23 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 5: Sumpskog
5 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 6: Tjärn
7 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Gungfly, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Nr 8

19H 7B 02 (4627) KLASS 4
PESSIBERGS-STORMYRAN 6 KM S GRANINGE BRUK

Obestämbar myr, 52 ha (47 ha våtm), 315 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning.

Nr 9

19H 7C 01 (2706) KLASS 4
PÄROLANMYRAN 9 KM SO GRANINGE BRUK

Myrkomplex, 118 ha (98 ha våtm), 280 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning, kraftledning, torvtäkt. Lada för torvtorkning.

Nr 10

19H 7C 02 (3027) KLASS 3
RÅMYRAN 10 KM SO GRANINGE BRUK

Myrkomplex, 63 ha (62 ha våtm), 240 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
24 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande dikning. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten. Diffus strängbildning.

Element 3: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 4: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Sumpskog
11 ha, fördelat på 4 ytor. Svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 3: Obestämbar myr
27 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark generell påverkan från dikning.

Nr 11

18H 7C 03 (4211) KLASS 4
GRÄSMYRAN-TUTMYRAN 8 KM SO GRANINGE BRUK

Myrkomplex, 110 ha (100 ha våtm), 230 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning, körspår från traktor/skogsmaskin, kraftledning.

Nr 12

18H 7D 01 (0747) KLASS 3
VÅTMARK VID GRANINGESJÖNS S ÄNDE 16 KM SO GRANINGE BRUK

Våtmarkskomplex, 36 ha (34 ha våtm), 200 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Meandring, väsentlig del ansluter till större vattendrag, sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Mad vid sjö
11 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, vattenreglering. Åkermark ansluter,

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Korvsjö, 15 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Topogent kärr
6 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning. Tidvis översvämmat kärr.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Mjukmatta.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Limnogen strandsumpskog
3 ha.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 4: Sumpskog
14 ha. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 13

18H 8A 01 (2036) KLASS 4
BOLLFLON 6 KM SV GRANINGE BRUK

Myrkomplex, 80 ha (75 ha våtm), 330 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Mycket starkt generellt påverkat av anslutande hyggen, dikning.

Nr 14

18H 8B 01 (1639) KLASS 4
MÄRRAMYRAN 5 KM S GRANINGE BRUK

Myrkomplex, 72 ha (62 ha våtm), 240 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning, kraftledning.

Nr 15

18H 8D 01 (4735) KLASS 1
MÖRTTJÄRNSMYRAN 10 KM Ö GRANINGE BRUK

Myrkomplex, 286 ha (254 ha våtm), 275 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Tillfredsställ. dokumentation finns, området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Topogent kärr
55 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, körspår från traktor/skogsmaskin, kraftledning. Zoologiska värden.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Element 3: Bäck, 3 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Element 4: Vegetation utmed mindre vattendrag, 7 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
11 ha, öppet. Zoologiska värden.

Element 1: Sträng, (otydl.), 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Flark, 65 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 3: Topogent kärr
28 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 70 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
90 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin, kraftledning. Väl utbildat strukturmönster.

Element 1: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Strång, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 25 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta-lösbotten.

Element 4: Dråg, 8 % av delobjektytan, öppet.

Element 5: Bäck, 2 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 5: Blandmyr av mosaiktyp
23 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 28 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta-lösbotten.

Element 4: Källa, 2 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 6: Tjärn
9 ha, fördelat på 4 ytor.

Element 1: Gungfly, 5 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 7: Sumpskog
38 ha, fördelat på 2 ytor. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 70 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 16

18H 8D 02 (0627) KLASS 3
GRÖSSJÖMYRAN 11 KM SO GRANINGE BRUK

Våtmarkskomplex, 63 ha (60 ha våtm), 300 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll. Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
5 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
26 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Rest av tjärn.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten. Diffus strängbildning.

Element 3: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 4: Gungfly, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten. Rest av tjärn.

Delobj. 3: Mad vid sjö
7 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Gungfly, 35 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 3: Lagun, 35 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 4: Sumpskog
22 ha, fördelat på 3 ytor. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta-mjukmatta. Diffus strängbildning.

Nr 17

18H 9D 01 (1708) KLASS 4
JÄRNMYRAN 8 KM O GRANINGE BRUK

Myrkomplex, 72 ha (65 ha våtm), 280 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll. Mycket starkt generellt påverkat av anslutande hyggen, dikning, körspår från traktor/skogsmaskin.

Nr 18

18H 9E 01 (3035) KLASS 3
MYR O STOR-NORRSJÖN 16 KM O GRANINGE BRUK

Mossekomplex, 61 ha (56 ha våtm), 240 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll. Sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
47 ha, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, väg.

Element 1: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Gungfly, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 4: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten. Diffus strängbildning.

Element 5: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 2: Sumpskog
7 ha, fördelat på 4 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 3: Tjärn
2 ha.

Nr 19

18H 9F 01 (1815) KLASS 2
STORMYRAN 20 KM NV BOLLSTABRUK

Myrkomplex, 118 ha (113 ha våtm), 270 m ö h. Flygb. -86. Fält -92. Det: Sören Uppsäll. Bäver förekommer, området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Topogent kärr
39 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, körspår från traktor/skogsmaskin. Mindre trädklungor i öppen våtmark.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
9 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande dikning, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Sträng, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vitmosstyp.

Element 2: Flark, 58 % av delobjektytan, öppet. Lösbottenkärr av oligotrof typ.

Element 3: Flarkgöl, 2 % av delobjektytan, öppet. Dvärgvassar. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Topogent kärr
13 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från avverkning, svag generell påverkan från dikning. Höjd vattennivå genom dämning.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Bäck, 8 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten. Bäver förekommer, höjd vattennivå genom dämning.

Element 3: Mindre vattenytor, 2 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
27 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, anslutande dikning, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 25 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 5: Sumpskog
28 ha, fördelat på 6 ytor. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 6: Tjärn
2 ha, fördelat på 2 ytor.

Nr 20

19G 0I 03 (4836) KLASS 3
STORFLON, LILLFLON 11 KM SV HELGUMS KYRKA

Myrkomplex, 67 ha (57 ha våtm), 395 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
12 ha, öppet.

Element 1: Golv, 79 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta. Diffus strängbildning.

Element 2: Flark, 20 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Göl, 1 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
37 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag generell påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 5: Flark, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Lösbotten.

Delobj. 3: Topogent kärr
8 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag generell påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 21

19G 0J 01 (1434) KLASS 3
STOR-JÄMTMYRAN 12 K S-SV HELGUMS KYRKA

Kärrkomplex, 74 ha (72 ha våtm), 290 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
22 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag generell påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Öar, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
21 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Flark, 55 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta-lösbotten.

Element 2: Sträng, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Sträng, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Golv, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta. Diffus strängbildning.

Delobj. 3: Topogent kärr
29 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 22

19G 2H 02 (2729) KLASS 1
STOR-RUNMYRAN 14 KM V HELGUMS KYRKA

Våtmarkskomplex, 98 ha (90 ha våtm), 310 m ö h. Flygb. -86. Fält -93.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Äldre dammanläggning i våtmarken, hölador.

Delobj. 1: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 1, underelem. 1: Öar, 30 % av delobjektytan. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp. Området har slåtterhävdats.

Element 1, underelem. 2: Golv, 45 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av rik mossfattig typ. Området har slåtterhävdats.

Element 2: Golv, 18 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Element 2, underelem. 1: Golv, 1 % av delobjektytan. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Element 2, underelem. 2: Golv, 1 % av delobjektytan. Fastmattekärr av starr-ört-brunmosstyp.

Element 3: Tuva, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmattemosse av tuvull-S. fuscumtyp.

Delobj. 2: Topogent kärr
40 ha, fördelat på 6 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning. Botaniska värden, nedlagda odlingar i våtmarken.

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Tallkärr av fattig vitmosstyp.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3, underelem. 1: Golv, 4 % av delobjektytan. Granbjörkkärr av brunmossrik typ.

Element 3, underelem. 2: Källa, 1 % av delobjektytan. Källkärr.

Element 3, underelem. 3: Golv, 7 % av delobjektytan. Sumpgranskog av ört-starrtyp.

Element 3, underelem. 4: Golv, 3 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, lövskog. Sumpbjörkskog av örttyp. Vegetationen är påverkad av ingrepp.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
9 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 10 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Mad vid vattendrag
28 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning. området har slåtterhävdats,

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, öppet. Strandsumpkärrtyp.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog. Sumpbjörkskog av örttyp.

Nr 23

19G 2I 01 (1129) KLASS 2
RUNÅMYRAN, SJÖTJÄRNMYRAN 9 KM V HELGUMS KYRKA

Våtmarkskomplex, 163 ha (153 ha våtm), 255 m ö h.
Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Hölador, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
22 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
36 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
27 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 30 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Kärrfönster, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Mad vid vattendrag
46 ha, glest trädtäckt. Svag generell påverkan från äldre dämning. Området har slåtterhävdats, restsjö.

Element 1: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Videvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Gungfly, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Lösbotten.

Delobj. 5: Sumpskog
22 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 24

19G 2I 02 (1337) KLASS 3
ANTEMYRAN 8 KM V HELGUMS KYRKA

Myrkomplex, 49 ha (47 ha våtm), 255 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Naturskog i eller i anslutning, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
11 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
13 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Bäck, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Element 4: Vegetation utmed mindre vattendrag, 4 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Videvegetation. Fastmatta. Bäver förekommer.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
23 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Hölja, 30 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 5: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Nr 25

19G 3F 01 (3732) KLASS 4
MYR 800 M S BERG 16 KM SV EDSELE

Myrkomplex, 71 ha (65 ha våtm), 380 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Mycket starkt generellt påverkat av anslutande hyggen, dikning, torvtäkt.

Nr 26

19G 3F 02 (4138) KLASS 4
STENMYRAN 15 KM SV EDSELE

Myrkomplex, 73 ha (64 ha våtm), 385 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Mycket starkt generellt påverkat av anslutande hyggen, dikning, torvtäkt.

Nr 27

19G 3G 01 (0045) KLASS 1
PRÄSTFLON 10 KM SV GIDEÅBERG

Topogent kärr, 52 ha (52 ha våtm), 390 m ö h. Flygb. -89.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Naturreservat. Området har slåtterhävdats, litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Topogent kärr
19 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Botaniska värden.

Element 1: Golv, 29 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Källa, 1 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr
22 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande dikning.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, glest trädtäckt, lövskog.

Delobj. 3: Sumpskog
9 ha, fördelat på 6 ytor.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog. Örtdominerad vegetation.

Nr 28

19G 3G 02 (1028) KLASS 2
RUNFLON 2 KM SO STENSJÖ

Myrkomplex, 88 ha (86 ha våtm), 400 m ö h. Flygb. -89. Storomr A3.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Topogent kärr
18 ha, fördelat på 5 ytor, öppet.

Element 1: Golv, öppet. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
35 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning. Botaniska värden.

Element 1: Golv, 84 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Örtdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 2: Källa, 1 % av delobjektytan.

Element 3: Vegetation utmed mindre vattendrag, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Mjukmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
30 ha, fördelat på 5 ytor. Stark lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Kantzon utmed å, 80 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Örtdominerad vegetation.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 29

19G 3G 03 (1040) KLASS 3
RÖDMOSSAFLON 2 KM SO STENSJÖ

Myrkomplex, 52 ha (50 ha våtm), 410 m ö h. Flygb. -89. Storomr A3.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Sluttande mosse
15 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 2: Hölja, 60 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Lagg, (otydl.), 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande väg.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog.

Element 2: Kantzon, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
12 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Nr 30

19G 3G 04 (2630) KLASS 1
STENSJÖFLON M FL 1 KM O STENSJÖ

Våtmarkskomplex, 308 ha (280 ha våtm), 410 m ö h. Flygb. -89. Fält -93. Storomr A3.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården. Litteratur om objektet finns, ornitologiska värden.

Delobj. 1: Tjärn
13 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1, underelem. 1: Kantzon vid tjärn, 1 % av delobjektytan. Dvärgvassar av flaskstarrtyp.

Element 1, underelem. 2: Golv, 30 % av delobjektytan. Dvärgvassar av flaskstarrtyp. Sänkt tjärn.

Delobj. 2: Topogent kärr
75 ha, fördelat på 8 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 34 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmattekärr, starr-S. fallax variant. Området har slåtterhävdats.

Element 1, underelem. 1: Tuva, 1 % av delobjektytan. Öppet fastmattekärr.

Element 1, underelem. 2: Flark, 5 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av oligotrof typ.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 3: Dråg, 9 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av rik mossfattig typ.

Element 3, underelem. 1: Tuva, 1 % av delobjektytan. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Delobj. 3: Topogent kärr
110 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, glest trädtäckt. Zoologiska värden.

Element 1: Golv, 34 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gran-björkkärr av fattig vitmosstyp.

Element 1, underelem. 1: Golv, 5 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, lövskog. Videkärr.

Element 1, underelem. 2: Källdråg, 1 % av delobjektytan. Källkärr.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Örtdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 3: Kantzon, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Sträng-flarkkärr
20 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Sträng, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vitmosstyp.

Element 1, underelem. 1: Tuva, 5 % av delobjektytan. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Flark, 45 % av delobjektytan, öppet. Lösbottenkärr av intermediär typ.

Element 2, underelem. 1: Flarkgöl, 5 % av delobjektytan. Egentliga vassar saknas. Permanent öppet vatten.

Delobj. 5: Mosse av nordlig typ
25 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 2: Sträng, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Hölja, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 6: Topogent kärr
16 ha, öppet.

Element 1: Gungfly, 40 % av delobjektytan, öppet. Mjukmattekärr, starr-S. fallax variant.

Element 2: Gungfly, 60 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 7: Sumpskog
30 ha, fördelat på 9 eller fler ytor. Svag lokal påverkan från vattenreglering.

Element 1: Kantzon vid tjärn, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Örtdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 70 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Vegetation utmed mindre vattendrag, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 31

19G 3G 05 (3717) KLASS 2
FJÄLLFLON 1 KM N STENSJÖ

Myrkomplex, 73 ha (72 ha våtm), 425 m ö h. Flygb. -89. Fält -93. Storomr A3.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
10 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 2: Sträng, 20 % av delobjektytan, öppet. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 3: Hölja, 30 % av delobjektytan, öppet. Mjukm.mosse, vitag-kallgräs-S.balticumtyp.

Element 4: Lagg, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
23 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande väg.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Tallkärr av klotstarrtyp.

Element 1, underelem. 1: Golv, 10 % av delobjektytan. Mjukmattekärr, kallgräs-vitmoss variant. Rest av tjärn.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Örtdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 2, underelem. 1: Golv, 10 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, lövskog. Gran-björkkärr av fattig vitmosstyp.

Element 2, underelem. 2: Tuva, 2 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, lövskog. Ristuvmosse av S. magellanicumtyp.

Delobj. 3: Tjärn
1 ha.

Element 1: Gungfly, 60 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
30 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 3: Hölja, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukm.mosse, vitag-kallgräs-S.balticumtyp.

Delobj. 5: Sumpskog
4 ha.

Element 1: Golv, 11-25 % krontäckning, blandskog. Sumpgranskog av ört-starrtyp.

Nr 32

19G 3H 01 (2835) KLASS 1
DJUPDALSMYREN-BJÖRKMYRAN 5 KM SV GIDEÅBERG

Våtmarkskomplex, 95 ha (86 ha våtm), 330 m ö h. Flygb. -89. Fält -93.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården. Litteratur om objektet finns, naturskog i eller i anslutning.

Delobj. 1: Topogent kärr
30 ha, öppet. Åsrygg i anslutning, botaniska värden.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 1, underelem. 1: Golv, 50 % av delobjektytan. Mjukmattekärr, starr-Scorp. scorpioides-var. Området har slåtterhävdats.

Element 1, underelem. 2: Dråg, 10 % av delobjektytan. Mjukmattekärr, starr-Scorp. scorpioides-var.

Element 1, underelem. 3: Golv, 5 % av delobjektytan. Videkärr av starrtyp.

Element 1, underelem. 4: Vegetation utmed mindre vattendrag, 5 % av delobjektytan. Strand-sumpkärrtyp.

Element 2: Golv, 28 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Element 2, underelem. 1: Tuva, 15 % av delobjektytan. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Element 3: Bäck, 2 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Örtdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Golv, 30 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, blandskog. Gran-björkkärr av fattig vitmosstyp.

Element 2: Källa, 1 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Sumpskog
40 ha, fördelat på 2 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 89 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Sumpgranskog av högörttyp.

Element 2: Källa, 1 % av delobjektytan.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog. Sumpblandskog av örttyp.

Nr 33

19G 3H 02 (1610) KLASS 3
KULTAFLON, HÅLMYRAN, GRÄSFLON 17 KM S EDSELE KYRKA

Myrkomplex, 137 ha (123 ha våtm), 415 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
17 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation. Lösbotten. Diffus strängbildning.

Delobj. 2: Topogent kärr
55 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
29 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
22 ha, fördelat på 2 ytor. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 34

19G 3H 03 (0935) KLASS 2
HOLMSTAKÅLARNA 18 KM S EDSELE KYRKA

Våtmarkskomplex, 85 ha (82 ha våtm), 375 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Nedlagda odlingar i våtmarken.

Delobj. 1: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
42 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 3: Sumpskog
27 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 35

19G 3I 01 (2424) KLASS 1
ÅMYRAN, STORKÄLEN 13 KM VNV HELGUMS KYRKA

Våtmarkskomplex, 120 ha (110 ha våtm), 255 m ö h.
Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
30 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Delobj. 2: Sumpskog
40 ha. Botaniska värden.

Nr 36

19G 4E 03 (3231) KLASS 1
NYFLON 17 KM SV EDSELE

Myrkomplex, 303 ha (253 ha våtm), 345 m ö h. Flygb. -89.
Storomr HA.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Äldre dammanläggning i våtmarken, området har slåtterhävdats.

Delobj. 1: Topogent kärr
64 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning. Botaniska värden,

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Sträng, 2 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Flark, 3 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Lösbotten.

Delobj. 2: Topogent kärr
10 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
90 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 20 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Dråg, 18 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Element 5: Bäck, 2 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten. Bäver förekommer.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
56 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Hölador.

Element 1: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 5: Mad vid vattendrag
10 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dammanläggning. hölador.

Element 1: Golv, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 6: Sumpskog
22 ha, fördelat på 6 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 7: Tjärn
3 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Gungfly, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta-lösbotten.

Nr 37

19G 4E 04 (3944) KLASS 1
MYR LÄNGS LÖVÅSÅN 15 KM SV EDSELE

Myrkomplex, 256 ha (232 ha våtm), 340 m ö h. Flygb. -89. Storomr HA.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Äldre dammanläggning i våtmarken, nedlagda odlingar i våtmarken.

Delobj. 1: Topogent kärr
29 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning. Botaniska värden.

Element 1: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
17 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Öar, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Sträng-flarkkärr
11 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande dikning.

Element 1: Sträng, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Fastmatta.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
31 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 40 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 5: Blandmyr av mosaiktyp
112 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag generell påverkan från anslutande hyggen, svag lokal påverkan från dikning. spång över vattendrag.

Element 1: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Golv, 28 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Bäckdråg, 2 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 6: Mad vid vattendrag
16 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dammanläggning. området har slåtterhävdats, hölador.

Element 1: Golv, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 7: Sumpskog
16 ha, fördelat på 6 ytor.

Element 1: Bäckdråg, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 80 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 38

19G 4F 01 (2132) KLASS 4
STORFLON 15 KM SV EDSELE KYRKA

Obestämbar myr, 114 ha (109 ha våtm), 400 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Mycket starkt generellt påverkat av torvtäkt.

Nr 39

19G 4G 01 (1904) KLASS 4
GÅRDFLON, SJÖMYRAN 14 KM SV EDSELE KYRKA

Obestämbar myr, 124 ha (117 ha våtm), 390 m ö h.
Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Mycket starkt generellt påverkat av torvtäkt.

Nr 40

19G 4G 02 (4718) KLASS 3
STORFLON 10 KM SV EDSELE KYRKA

Topogent kärr, 60 ha (58 ha våtm), 390 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
26 ha, öppet.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 22 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Element 3: Göl, 3 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Topogent kärr
32 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 41

19G 4H 01 (0826) KLASS 1
GIDEÅBERGSMYRARNA 4 KM SV GIDEÅBERG

Våtmarkskomplex, 58 ha (58 ha våtm), 275 m ö h. Flygb. -89.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Naturreservat.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
13 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 60 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Flarkgöl, 10 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr
3 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet. Botaniska värden.

Element 1: Golv, glest trädtäckt. Fastmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
26 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog.

Nr 42

19G 4J 01 (3826) KLASS 4
STORMYRAN 13 KM SO EDSELE KYRKA

Obestämbar myr, 142 ha (142 ha våtm), 140 m ö h.
Flygb. -86. Storomr HB.
Det: Sören Uppsäll.
Mycket starkt generellt påverkat av torvtäkt.

Nr 43

19G 4J 02 (2434) KLASS 4
NORRMOSSAFLON 15 KM SO EDSELE KYRKA

Obestämbar myr, 137 ha (134 ha våtm), 140 m ö h.
Flygb. -86. Storomr HB.
Det: Sören Uppsäll.
Mycket starkt generellt påverkat av torvtäkt.

Nr 44

19G 4J 03 (1144) KLASS 4
SJÖMYRAN 17 KM SO EDSELE KYRKA

Obestämbar myr, 72 ha (67 ha våtm), 140 m ö h. Flygb. -86.
Storomr HB.
Det: Sören Uppsäll.
Mycket starkt generellt påverkat av torvtäkt.

Nr 45

19G 4J 04 (3141) KLASS 3
MYR NV NORR-GAGNETSJÖN 15 KM SO EDSELE KYRKA

Våtmarkskomplex, 53 ha (52 ha våtm), 140 m ö h. Flygb. -86.
Storomr HB.
Det: Sören Uppsäll.
Tillstånd för torvtäkt har givits.

Delobj. 1: Topogent kärr
16 ha, skogsbevuxet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 75 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Mad vid vattendrag
13 ha, glest trädtäckt. Hölador, meandring.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
24 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 65 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 46

19G 5E 01 (3102) KLASS 3
LÅNGFLON, VÄSTER-STORMYRAN 18 KM VSV EDSELE KYRKA

Myrkomplex, 58 ha (58 ha våtm), 440 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
19 ha, öppet.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Element 2: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
39 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Golv, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Nr 47

19G 5E 02 (1512) KLASS 3
SÖR-STORMYRAN 17 KM VSV EDSELE KYRKA

Myrkomplex, 54 ha (53 ha våtm), 430 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
14 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Element 3: Gungfly, 5 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
39 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Nr 48

19G 5F 01 (3517) KLASS 3
GÄDDVATTENFLON, RÖRFLON, MAJMYRAN 12 KM SV EDSELE KYRKA

Myrkomplex, 85 ha (81 ha våtm), 410 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Åsrygg i anslutning, området har slåtterhävdats.

Delobj. 1: Topogent kärr
30 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
13 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Flark, 10 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
19 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 20 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
19 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Nr 49

19G 5I 01 (3348) KLASS 1
ÅTERMYRAN 9 KM SO EDSELE KYRKA

Myrkomplex, 166 ha (166 ha våtm), 200 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Tillfredsställ. dokumentation finns, sjö ansluter till högst 24%, tillstånd för torvtäkt har givits.

Delobj. 1: Topogent kärr
33 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Dråg, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Gungfly, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
99 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 3: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 5: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Strand vid vattendrag
19 ha, skogsbevuxet. Bäver förekommer.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
15 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Nr 50

19G 5J 01 (4209) KLASS 1
MYR NV FRÄTTENTJÄRNEN 10 KM OSO EDSELE KYRKA

Våtmarkskomplex, 134 ha (123 ha våtm), 200 m ö h.
Flygb. -86. Fält -93. Storomr HC.
Det: Sören Uppsäll.
Tillstånd för torvtäkt har givits.

Delobj. 1: Topogent kärr
19 ha, öppet. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet. Lösbottenkärr av rik mossfattig typ.

Element 1, underelem. 1: Tuva, 15 % av delobjektytan. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Element 1, underelem. 2: Dråg, 5 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av rik mossfattig typ.

Element 2: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vitmosstyp.

Element 3: Tuva, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Delobj. 2: Topogent kärr
24 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Golv, 5 % av delobjektytan. Tallkärr av intermediär vitmosstyp.

Element 1, underelem. 2: Golv, 15 % av delobjektytan. Tallkärr av brunmossrik typ.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Gran-björkkärr av fattig vitmosstyp.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
49 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet. Mjukm.mosse, vitag-kallgräs-S.balticumtyp.

Delobj. 4: Mad vid vattendrag
17 ha, öppet. Sel, slingrande vattendrag.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Strand-sumpkärrtyp.

Element 2: Gungfly, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 5: Sumpskog
14 ha, fördelat på 6 ytor.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Sumpblandskog av örttyp.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Nr 51

19G 5J 02 (3139) KLASS 2
SALSJÖMYRAN 13 KM OSO EDSELE KYRKA

Myrkomplex, 82 ha (79 ha våtm), 215 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Naturskog i eller i anslutning.

Delobj. 1: Topogent kärr
45 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Öar, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
14 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Bäver förekommer.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Vegetation utmed mindre vattendrag, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
20 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Tjärn
3 ha.

Element 1: Gungfly, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Nr 52

19G 6D 01 (3117) KLASS 2
BITARFLON, HÄLLBERGFLON, RÄVELMYRAN 20 KM V EDSELE KYRKA

Myrkomplex, 176 ha (151 ha våtm), 510 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Terrängföljande våtmark.

Delobj. 1: Topogent kärr
59 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 23 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Gungfly, 2 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
17 ha, fördelat på 5 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 65 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Lösbotten.

Element 3: Flarkgöl, 20 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
75 ha, fördelat på 8 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Tjärn
1 ha.

Nr 53

19G 6F 01 (2206) KLASS 3
KROKFLON 11 KM V EDSELE

Våtmarkskomplex, 64 ha (58 ha våtm), 325 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
17 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, vinterväg.

Element 1: Dråg, 65 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
27 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
14 ha, fördelat på 2 ytor. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Nr 54

19G 6I 01 (3902) KLASS 3
LADUMYRAN 3 KM V EDSELE KYRKA

Topogent kärr, 72 ha (61 ha våtm), 280 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
50 ha, öppet. Svag lokal påverkan från avverkning, anslutande hyggen, anslutande väg.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
10 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Tjärn
4 ha.

Element 1: Gungfly, 25 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Nr 55

19G 6J 01 (0118) KLASS 2
UTANEDESFLON 10 KM OSO EDSELE KYRKA

Myrkomplex, 61 ha (60 ha våtm), 205 m ö h. Flygb. -86. Storomr HC.
Det: Sören Uppsäll.
Tillstånd för torvtäkt har givits.

Delobj. 1: Topogent kärr
27 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
14 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
19 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Nr 56

19G 7D 01 (2016) KLASS 3
STORMYRAN 21 KM VNV EDSELE KYRKA

Myrkomplex, 68 ha (67 ha våtm), 435 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
32 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
7 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 65 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
28 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Nr 57

19G 7H 01 (4442) KLASS 2
MYR VID LÅNGTJÄRNEN 6 KM NNO EDSELE KYRKA

Myrkomplex, 73 ha (64 ha våtm), 275 m ö h. Flygb. -86.
Storomr HD.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
26 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Bäckdråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
17 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Vegetation utmed mindre vattendrag, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
21 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Tjärn
6 ha.

Element 1: Gungfly, 30 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Nr 58

19G 7I 01 (1014) KLASS 3
JENMYRAN 5 KM NV EDSELE KYRKA

Myrkomplex, 60 ha (53 ha våtm), 255 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Dråg, 65 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Lösbotten.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
33 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Mad vid vattendrag
10 ha, öppet. Bäver förekommer, hölador, sel, slingrande vattendrag.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Tjärn
3 ha.

Element 1: Gungfly, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Nr 59

19G 7I 02 (1448) KLASS 3
SIVERMYRAN 8 KM VNV EDSELE KYRKA

Topogent kärr, 132 ha (121 ha våtm), 260 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Topogent kärr
58 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning. Området har slåtterhävdats.

Element 1: Dråg, 84 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Bäck, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Topogent kärr
59 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 3: Tjärn
7 ha.

Element 1: Gungfly, 20 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 2: Gungfly, 20 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Nr 60

19G 7I 03 (4112) KLASS 1
GRUNDTJÄRNSFLON 7 KM NO EDSELE KYRKA

Myrkomplex, 162 ha (117 ha våtm), 280 m ö h. Flygb. -86.
Fält -93. Storomr HD.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
42 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 1, underelem. 1: Golv, 45 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av intermediär typ.

Element 1, underelem. 2: Öar, 20 % av delobjektytan. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Element 3: Tuva, 5 % av delobjektytan. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Delobj. 2: Topogent kärr
26 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Tallkärr av fattig vitmosstyp.

Element 1, underelem. 1: Källdråg, 1 % av delobjektytan. Källkärr.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog. Gran-björkkärr av fattig vitmosstyp.

Delobj. 3: Sträng-flarkkärr
11 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, öppet. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Element 2: Sträng, 20 % av delobjektytan, öppet. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Flark, 60 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3, underelem. 1: Flark, 20 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av intermediär typ.

Element 3, underelem. 2: Flark, 40 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av oligotrof typ.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
27 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmattemosse av tuvull-S. fuscumtyp.

Element 2: Mosseplan, 55 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2, underelem. 1: Hölja, 2 % av delobjektytan. Mjukmattemosse av vitag-kallgräs-S.majustyp.

Element 2, underelem. 2: Hölja, 3 % av delobjektytan. Mjukm.mosse, vitag-kallgräs-S.balticumtyp.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 5: Limnogen strandsumpskog
11 ha, fördelat på 2 ytor. Bäver förekommer, höjd vattennivå genom dämning.

Element 0: Restsjö.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, blandskog. Sumpgranskog av ört-starrtyp. Inslag av fastmark i myren.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Sumpgranskog av ristyp, skogsfräkenvariant.

Delobj. 6: Tjärn
11 ha, fördelat på 3 ytor. Bäver förekommer, höjd vattennivå genom dämning.

Element 1: Gungfly, 25 % av delobjektytan, öppet. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 1, underelem. 1: Kantzon vid tjärn, 1 % av delobjektytan. Egentliga vassar saknas.

Element 1, underelem. 2: Kantzon vid tjärn. Flytbladsvegetation av gul näckrostyp.

Element 1, underelem. 3: Restsjö, 1 % av delobjektytan. Dvärgvassar av flaskstarrtyp.

Element 2: Gungfly, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Nr 61

19G 7J 01 (1412) KLASS 3
KROKMYRAN, AFTONSMYRAN 8 KM V NÄSÅKER

Topogent kärr, 50 ha (50 ha våtm), 260 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
19 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Sträng, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
31 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 64 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Slukhål, 1 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Nr 62

19G 8C 01 (0117) KLASS 2
ÖSTVATTENMYRAN 23 KM SV RAMSELE

Våtmarkskomplex, 89 ha (87 ha våtm), 365 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Soligent kärr
16 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Öar, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
24 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Öar, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Mad vid sjö
24 ha, öppet. Meandring.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Videvegetation.

Element 3: Gungfly, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Öppna vattenytor i vassar.

Delobj. 4: Sumpskog
23 ha, fördelat på 4 ytor.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 63

19G 8D 01 (3433) KLASS 1
MYR MELLAN STOR- OCH LILL-GRUNDSJÖN 15 KM SV RAMSELE

Kärrkomplex, 149 ha (137 ha våtm), 305 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården.
Naturligt kalkpåverkad vegetation, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
81 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Gungfly, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Öar, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
40 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
16 ha, fördelat på 4 ytor.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Tjärn
6 ha, fördelat på 2 ytor.

Nr 64

19G 8D 02 (4538) KLASS 1
MYR NV STOR-RENSJÖN 16 KM SV RAMSELE

Myrkomplex, 149 ha (119 ha våtm), 305 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården.
Naturligt kalkpåverkad vegetation, litteratur om objektet finns, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
36 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Gungfly, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
52 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
13 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Mad vid vattendrag
10 ha, öppet.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Gungfly, 20 % av delobjektytan, öppet.

Element 3: Bäck, 10 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 5: Tjärn
20 ha, fördelat på 9 eller fler ytor.

Element 1: Gungfly, 5 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Nr 65

19G 8E 01 (1811) KLASS 1
FÖRELMYRAN, HÄLLTEGAN 14 KM SV RAMSELE

Våtmarkskomplex, 150 ha (134 ha våtm), 300 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Riksintresse för naturvården. Sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Topogent kärr
60 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
15 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 20 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Mad vid vattendrag
40 ha, öppet. Meandring, sel.

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Videvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
19 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Nr 66

19G 8F 01 (0446) KLASS 2
SJÖMYRAN 8 KM SSV RAMSELE

Våtmarkskomplex, 82 ha (78 ha våtm), 235 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
37 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
20 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Mad vid vattendrag
26 ha, öppet. Området har slåtterhävdats, hölador, slingrande vattendrag.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Gungfly, 5 % av delobjektytan, öppet.

Nr 67

19G 8I 01 (1721) KLASS 3
KILÅMYRAN 11 KM SV RAMSELE

Våtmarkskomplex, 80 ha (72 ha våtm), 255 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
17 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Sträng, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Flark, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 65 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
11 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Mad vid vattendrag
9 ha, öppet. Slingrande vattendrag.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Videvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 5: Bevuxen sjö
11 ha, öppet.

Element 1: Gungfly, 90 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 6: Sumpskog
10 ha. Bäver förekommer, höjd vattennivå genom dämning, mosaik med fastmark.

Element 1: Golv, 5 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Permanent öppet vatten. Bäver förekommer, sel.

Nr 68

19G 9C 01 (1905) KLASS 3
LÅNGMYRAN 22 KM V RAMSELE

Våtmarkskomplex, 63 ha (58 ha våtm), 305 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Riksintresse för naturvården. Åkermark ansluter, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Blandmyr av mosaiktyp
41 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Golv, 45 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Mad vid vattendrag
17 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Hölador, meandring, sel.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Videvegetation.

Element 3: Gungfly, 5 % av delobjektytan.

Nr 69

19G 9D 01 (0311) KLASS 3
GRUNDSJÖFLON 17 KM V RAMSELE

Myrkomplex, 95 ha (87 ha våtm), 300 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Riksintresse för naturvården. Sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Topogent kärr
14 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Gungfly, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
34 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 45 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Platåformigt välvd mosse
29 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Lagg, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
10 ha, fördelat på 5 ytor.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Nr 70

19G 9E 01 (3030) KLASS 1
LÖVLUNDS ÄNGSKÄRR 1 KM N LÖVLUND

Våtmarkskomplex, 35 ha (30 ha våtm), 260 m ö h. Flygb. -89.
Det: Stefan Grundström.

Delobj. 1: Topogent kärr
3 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element: Golv, glest trädtäckt, blandskog. Örtdominerad vegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
9 ha, mosaikartad fördelning, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Delobj. 3: Sumpskog
15 ha, mosaikartad fördelning. Stark lokal påverkan från avverkning, dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Örtdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 71

19G 9E 02 (2505) KLASS 2
STORFLON 12 KM V RAMSELE

Kärrkomplex, 98 ha (91 ha våtm), 270 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården.
Naturligt kalkpåverkad vegetation, litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Topogent kärr
24 ha, fördelat på 6 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
56 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 4: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 5: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mad vid vattendrag
11 ha, öppet. Slingrande vattendrag.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation.

Delobj. 4: Tjärn
1 ha.

Nr 72

19G 9F 01 (4436) KLASS 3
MYR V HOLMEBODARNA 4 KM VNV RAMSELE

Topogent kärr, 71 ha (66 ha våtm), 310 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Fäbodvall i anslutning.

Delobj. 1: Topogent kärr
24 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Sträng, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
42 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 4: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Tjärn
4 ha, fördelat på 2 ytor.

Nr 73

19G 9H 01 (1111) KLASS 2
NORRTJÄRNSFLON 4 KM SO RAMSELE

Våtmarkskomplex, 99 ha (85 ha våtm), 255 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
18 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
10 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Flark, 70 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
17 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, kraftledning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
17 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 5: Sumpskog
14 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv, 64 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Bäck, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 6: Mad vid vattendrag
9 ha, öppet.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Videvegetation.

Element 3: Bäck, 10 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 7: Tjärn
9 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Gungfly, 20 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Nr 74

19H 0D 01 (1515) KLASS 1
PER-JANSMYRAN 9 KM SV SOLLEFTEÅ

Myrkomplex, 145 ha (134 ha våtm), 260 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
25 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 74 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Göl, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Topogent kärr
64 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
18 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 3: Sträng, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Hölja, 25 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
27 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 5: Tjärn
1 ha, fördelat på 2 ytor.

Nr 75

19H 0D 02 (2137) KLASS 3
MYR V STOR-HUNDTJÄRNEN 7 KM SV SOLLEFTEÅ

Myrkomplex, 82 ha (70 ha våtm), 265 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Fäbodvall i anslutning, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
14 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Gungfly, 5 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Topogent kärr
45 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 4: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
10 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Flark, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Golv, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Tjärn
4 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Gungfly, 15 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Nr 76

19H 0E 01 (2402) KLASS 2
STOR-KLINGERMYRAN 6 KM SV SOLLEFTEÅ

Myrkomplex, 121 ha (94 ha våtm), 255 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
11 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, körspår från traktor/skogsmaskin, kraftledning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
56 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin, kraftledning. Rest av tjärn.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 4: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
14 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Mad vid vattendrag
14 ha, öppet. Sel, slingrande vattendrag.

Element 1: Golv, 7 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Gungfly, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Nr 77

19H 1A 01 (1422) KLASS 2
VISJÖMYRAN 6 KM S HELGUMS KYRKA

Våtmarkskomplex, 86 ha (76 ha våtm), 170 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Nedlagda odlingar i våtmarken.

Delobj. 1: Topogent kärr
10 ha, mosaikartad fördelning, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
11 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Strand vid vattendrag
13 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
32 ha, mosaikartad fördelning. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 5: Tjärn
16 ha.

Element 1: Gungfly, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Gungfly, 40 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Nr 78

19H 2A 01 (3944) KLASS 3
HUSMYRAN 3 KM NO HELGUMS KYRKA

Våtmarkskomplex, 50 ha (50 ha våtm), 145 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll. Åkermark ansluter.

Delobj. 1: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 55 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Sumpskog
35 ha. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Nr 79

19H 2I 01 (3544) KLASS 3
HÖGSMYRAN 21 KM ONO SOLLEFTEÅ

Topogent kärr, 61 ha (54 ha våtm), 185 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
14 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 58 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 2 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Topogent kärr
40 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 34 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 4: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 5: Bäck, 1 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 80

19H 3A 01 (0504) KLASS 1
HELGUMSJÖNS DELTA 2 KM N HELGUMS KYRKA

Limnogent strandkomplex, 350 ha (310 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i ängs- och hagmarksinventering, ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården. Delta.

Delobj. 1: Mad vid vattendrag
151 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, öppet. Området är beteshävdat, geovetenskapliga värden, hölador, ornitologiska värden, väsentlig del ansluter till större vattendrag, sjö ansluter till högst 24%, zoologiska värden.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Gungfly, 10 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 4: Lagun, 15 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Limnogen strandsumpskog
146 ha, fördelat på 9 eller fler ytor. Svag lokal påverkan från kraftledning. leveer utmed vattendraget, restsjö, väsentlig del ansluter till större vattendrag, sjö ansluter till högst 24%.

Element 1: Golv, 88 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 4: Korvsjö, 2 % av delobjektytan, öppet. Vassvegetation. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Strandäng
10 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Området är beteshävdat, området har slåtterhävdats, hölador.

Element 1: Golv, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
26 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 5: Tjärn
13 ha, fördelat på 4 ytor. Restsjö.

Nr 81

19H 3F 01 (4626) KLASS 3
MYRBODMYRAN 13 KM NNO SOLLEFTEÅ

Myrkomplex, 58 ha (56 ha våtm), 290 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
22 ha, glest trädtäckt. Svag generell påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
34 ha, öppet. Svag generell påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Lösbotten.

Nr 82

19H 3G 01 (4805) KLASS 3
RÅMSLE-STORMYRAN, PLANKÅSMYRAN 14 KM NNO SOLLEFTEÅ

Myrkomplex, 90 ha (88 ha våtm), 270 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Öar, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
49 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, anslutande dikning.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
13 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
13 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Sträng, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Nr 83

19H 3H 01 (1139) KLASS 2
BJÖRKÅNS UTLOPP I BJÖRKSJÖN 16 KM NO SOLLEFTEÅ

Limnogent strandkomplex, 46 ha (42 ha våtm), 65 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Åkermark ansluter, tidigare hävd genom slåtter och/eller bete, sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Mad vid sjö
32 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Gungfly, 8 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation.

Element 3: Restsjö, 12 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 2: Limnogen strandsumpskog
14 ha, fördelat på 6 ytor. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Golv, 98 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Korvsjö, 2 % av delobjektytan, öppet.

Nr 84

19H 4A 01 (1311) KLASS 3
TJÄRNMYRA 8 KM N HELGUMS KYRKA

Våtmarkskomplex, 56 ha (52 ha våtm), 140 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
18 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Sumpskog
21 ha, fördelat på 4 ytor. Stark lokal påverkan från avverkning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 3: Obestämbar myr
13 ha, öppet. Stark generell påverkan från torvtäkt.

Nr 85

19H 4B 01 (3511) KLASS 1
TÅNGSTA-STORMYRAN 13 KM S NÄSÅKER

Kärrkomplex, 65 ha (65 ha våtm), 245 m ö h. Flygb. -86. Fält -93.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Naturskog i eller i anslutning.

Delobj. 1: Topogent kärr
24 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet. Mjukmattekärr, kallgräs-vitmoss variant. Vegetationen är influerad av källvatten.

Element 1, underelem. 1: Golv, 5 % av delobjektytan. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastm.kärr,tuvsäv-S.papillosum-compactumtyp.

Element 2, underelem. 1: Tuva, 3 % av delobjektytan. Fastmattemosse av tuvull-S. fuscumtyp.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 4: Källa, 2 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
14 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vitmosstyp.

Element 1, underelem. 1: Tuva, 5 % av delobjektytan. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2, underelem. 1: Flark, 43 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av intermediär typ.

Element 2, underelem. 2: Flark, 11 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av oligotrof typ.

Element 3: Flark, 54 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta-lösbotten.

Element 4: Flarkgöl, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Topogent kärr
27 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Golv, 35 % av delobjektytan. Tallkärr.

Element 1, underelem. 2: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Tallmosse av ristyp.

Element 1, underelem. 3: Sträng, 5 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, barrskog. Sumptallskog av ristyp.

Element 2: Golv, 34 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2, underelem. 1: Flark, 3 % av delobjektytan. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 2, underelem. 2: Flark, 2 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av oligotrof typ.

Element 3: Bäckdråg, 1 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Element 4: Golv, 1 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, blandskog. Sumpblandskog av örttyp.

Nr 86

19H 4G 01 (4016) KLASS 3
STORMYRAN 18 KM NNO SOLLEFTEÅ

Myrkomplex, 56 ha (54 ha våtm), 305 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin. Rest av tjärn.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
24 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag generell påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
18 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag generell påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Nr 87

19H 5A 01 (1242) KLASS 3
MYR SO BJÖRSSJÖN 12 KM S NÄSÅKER

Myrkomplex, 102 ha (93 ha våtm), 175 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
21 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, vinterväg.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Gungfly, 20 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 2: Topogent kärr
48 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
23 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 3: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Hölja, 25 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Element 5: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Tjärn
9 ha.

Nr 88

19H 5G 01 (4832) KLASS 3
HÄLLÅS-STORMYRAN 24 KM NNO SOLLEFTEÅ

Myrkomplex, 103 ha (99 ha våtm), 280 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
27 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande järnväg.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 45 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Flark, 10 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Topogent kärr
17 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
15 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 30 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
40 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, anslutande väg.

Element 1: Golv, 58 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Sträng, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 5: Bäck, 2 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 89

19H 6A 01 (0323) KLASS 3
HOLMS-STORMYRAN 8 KM S NÄSÅKER

Myrkomplex, 86 ha (82 ha våtm), 240 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
11 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
32 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
10 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 20 % av delobjektytan, öppet. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
29 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Öar, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Nr 90

19H 6A 02 (0447) KLASS 3
TANNFLO-STORMYRAN 7 KM S NÄSÅKER

Myrkomplex, 62 ha (62 ha våtm), 185 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
17 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
22 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
12 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 20 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Strand vid vattendrag
11 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 70 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 91

19H 6E 01 (2805) KLASS 3
VÄSTER-MOSJÖMYRAN 10 KM NO RESELE KYRKA

Myrkomplex, 60 ha (56 ha våtm), 265 m ö h. Flygb. -66.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
14 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
32 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Mad vid vattendrag
12 ha, öppet. Sel,

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Bäck, 20 % av delobjektytan, öppet. Sel.

Nr 92

19H 6E 02 (3519) KLASS 1
MYR N VÄSTERMOSJÖN 12 KM NO RESELE KYRKA

Myrkomplex, 123 ha (94 ha våtm), 270 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
12 ha, öppet.

Element 1: Dråg, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
29 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Bäck, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Bäver förekommer, höjd vattennivå genom dämning.

Delobj. 3: Soligent kärr
11 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Dråg, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
25 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Strång, 5 % av delobjektytan, öppet. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 20 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 4: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 5: Mad vid vattendrag
22 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet.

Element 2: Gungfly, 15 % av delobjektytan, öppet.

Element 3: Bäck, 20 % av delobjektytan, öppet. Bäver förekommer, höjd vattennivå genom dämning, sel.

Nr 93

19H 6E 03 (4831) KLASS 3
MYR VID ÄLGGÅRDSTJÄRNANA 13 KM NO RESELE KYRKA

Våtmarkskomplex, 81 ha (70 ha våtm), 265 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 35 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
34 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 68 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 30 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 2 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Mad vid vattendrag
16 ha, öppet.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, öppet. Risvegetation.

Delobj. 4: Tjärn
7 ha, fördelat på 6 ytor.

Element 1: Gungfly, 10 % av delobjektytan.

Nr 94

19H 6E 04 (3146) KLASS 3
DÖRARLÖSMYRAN 8 KM NO RESELE KYRKA

Myrkomplex, 58 ha (58 ha våtm), 305 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strångbildning.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
17 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
28 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 30 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Nr 95

19H 6F 01 (0746) KLASS 3
MYR VID STOR-HAMPTJÄRNEN 26 KM OSO NÄSÅKER

Myrkomplex, 83 ha (71 ha våtm), 285 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
25 ha, fördelat på 6 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Flark, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 5: Golv, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
37 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 78 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Källdråg, 2 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Mad vid vattendrag
10 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Bäver förekommer, slingrande vattendrag.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet. Bäver förekommer, höjd vattennivå genom dämning.

Element 3: Bäck, 10 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 4: Tjärn
6 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Gungfly, 10 % av delobjektytan, öppet.

Nr 96

19H 6F 02 (0204) KLASS 3
BJÖRNSTOCKMYRAN 21 KM SO NÄSÅKER

Myrkomplex, 66 ha (62 ha våtm), 345 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
13 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Element 3: Öar, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
29 ha, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Öar, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Bäckdråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Obestämbar myr
20 ha, glest trädtäckt. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta. Vegetationen är påverkad av ingrepp.

Nr 97

19H 6F 03 (0714) KLASS 3
STORMYRAN, BACKSJÖMYRAN 22 KM SO NÄSÅKER

Myrkomplex, 71 ha (70 ha våtm), 325 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
27 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Dråg, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
43 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 98

19H 6F 04 (2719) KLASS 4
LILLSTUGUMYRAN 22 KM SO NÄSÅKER

Kärrkomplex, 90 ha (88 ha våtm), 360 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning.

Nr 99

19H 7A 01 (0137) KLASS 3
NÄMFORSMYRAN 3 KM S NÄSÅKER

Myrkomplex, 51 ha (49 ha våtm), 300 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Naturskog i eller i anslutning.

Delobj. 1: Topogent kärr
20 ha, öppet.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 38 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Öar, 10 % av delobjektytan, öppet. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Göl, 2 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
16 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 25 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Nr 100

19H 7D 01 (2126) KLASS 3
MYR N ÄLGMYRTJÄRNEN 13 KM O NÄSÅKER

Våtmarkskomplex, 183 ha (159 ha våtm), 300 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
41 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 2: Sollgent kärr
20 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
53 ha, fördelat på 8 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 35 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Mad vid vattendrag
32 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 97 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Mindre vattenytor, 2 % av delobjektytan, öppet.

Element 3: Bäck, 1 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 5: Limnogen strandsumpskog
13 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 6: Tjärn
5 ha, fördelat på 2 ytor.

Nr 101

19H 7E 01 (2212) KLASS 3
MYR NO STRUPBERGET 17 KM O NÄSÅKER

Våtmarkskomplex, 100 ha (91 ha våtm), 285 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
11 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
51 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 25 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Limnogen strandsumpskog
18 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Bäck, 5 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 4: Sumpskog
11 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Nr 102

19H 7E 02 (3642) KLASS 3
VITBERGS-STORMYRAN 20 KM O NÄSÅKER

Myrkomplex, 60 ha (53 ha våtm), 405 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 30 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Lösbotten.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
22 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 30 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
21 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, stark lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Tjärn
6 ha, fördelat på 5 ytor.

Element 1: Gungfly, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation.

Nr 103

19H 7F 01 (4403) KLASS 3
VITBERGS-LÅNGMYRAN, STORMYRAN 20 KM O NÄSÅKER

Myrkomplex, 102 ha (88 ha våtm), 415 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Flikiga kantzoner.

Delobj. 1: Topogent kärr
17 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
39 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
32 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 49 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Göl, 3 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Nr 104

19H 7F 02 (3447) KLASS 3
LÅNGMYRAN 26 KM O NÄSÅKER

Myrkomplex, 86 ha (86 ha våtm), 395 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Terrängföljande våtmark.

Delobj. 1: Topogent kärr
12 ha, öppet.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Topogent kärr
17 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
35 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
22 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Öar, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Nr 105

19H 8B 01 (2721) KLASS 3
MYR VID MÖCKELMYRTJÄRNEN 6 KM NO NÄSÅKER

Myrkomplex, 54 ha (51 ha våtm), 240 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
23 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 54 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 4: Bäck, 1 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
27 ha, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta. Vegetationen är påverkad av ingrepp.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Delobj. 3: Tjärn
4 ha.

Element 1: Gungfly, 20 % av delobjektytan, öppet.

Nr 106

19H 8B 02 (3043) KLASS 1
MYR LÅNGS AMPBÄCKEN 7 KM NO NÄSÅKER

Våtmarkskomplex, 14 ha (128 ha våtm), 220 m ö h.
Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
17 ha, fördelat på 5 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Tuva, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Risvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
11 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 45 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
33 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
42 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 5: Sumpskog
13 ha, fördelat på 2 ytor. Svag lokal påverkan från dikning. Åkermark ansluter.

Element 1: Golv, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 6: Strand vid vattendrag
11 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 3: Bäck, 5 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 7: Tjärn
13 ha, fördelat på 4 ytor.

Nr 107

19H 8D 01 (4235) KLASS 3
OMSJÖ-STORMYRAN 15 KM NO NÄSÅKER

Myrkomplex, 57 ha (57 ha våtm), 425 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
22 ha, öppet. Svag generell påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
35 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag generell påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 49 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Mindre vattenytor, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Nr 108

19H 8F 01 (2210) KLASS 2
DREVET, KROKSJÖMYRAN 22 KM ONO NÄSÅKER

Myrkomplex, 113 ha (94 ha våtm), 315 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
11 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
10 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 36 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 60 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Flarkgöl, 4 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
49 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 20 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
25 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Tjärn
6 ha, fördelat på 3 ytor.

Nr 109

19H 8F 03 (0820) KLASS 3
MYR O HÄBBERSJÖN 22 KM ONO NÄSÅKER

Mossekomplex, 64 ha (57 ha våtm), 320 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
11 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
47 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 88 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Mjukmatta.

Element 3: Bäck, 2 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Tjärn
3 ha.

Element 1: Gungfly, 10 % av delobjektytan, öppet.

Nr 110

19H 9A 01 (0233) KLASS 3
MYR VID STORFLOTJÄRNEN 7 KM N NÄSÅKER

Våtmarkskomplex, 55 ha (51 ha våtm), 205 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
26 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, vinterväg.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Flark, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta. Vegetationen är påverkad av ingrepp, diffus strängbildning.

Element 2: Golv, 70 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
15 ha, fördelat på 5 ytor. Svag lokal påverkan från dikning, vinterväg.

Element 1: Golv, 79 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 3: Bäck, 1 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 4: Tjärn
2 ha.

Nr 111

19H 9C 01 (2030) KLASS 1
FRANSMYRAN-OMSJÖFLON 12 KM NO NÄSÅKER

Våtmarkskomplex, 510 ha (440 ha våtm), 245 m ö h. Flygb. -80. Fält -93.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården. Mosaik med fastmark.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
24 ha, fördelat på 6 ytor, öppet. Zoologiska värden.

Element 1: Sträng, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Sträng, 5 % av delobjektytan. Mjukmattekärr, starr-S. papillosum var.

Element 1, underelem. 2: Sträng, 30 % av delobjektytan. Mjukmattekärr, starr-S. fallax variant.

Element 2: Flark, 60 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Element 2, underelem. 1: Flark, 10 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av intermediär typ.

Element 2, underelem. 2: Flark, 50 % av delobjektytan. Mjukmattekärr, kallgräs-vitmoss variant.

Element 3: Flarkgöl, 5 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
40 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 1, underelem. 1: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, barrskog. Tallmosse av tuvulltyp.

Delobj. 3: Tjärn
7 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Gungfly, 30 % av delobjektytan. Mjukm.mosse, vitag-kallgräs-S.balticumtyp.

Element 1, underelem. 1: Kantzon vid tjärn, 1 % av delobjektytan. Egentliga vassar saknas.

Element 1, underelem. 2: Kantzon vid tjärn, 10 % av delobjektytan. Flytbladsvegetation av vit näckrostyp.

Delobj. 4: Topogent kärr
38 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Gungfly, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmattekärr, kallgräs-vitmoss variant.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmattekärr, starr-S. fallax variant.

Element 3: Dråg, 40 % av delobjektytan, öppet. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Delobj. 5: Topogent kärr
150 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, anslutande väg, vinterväg. Zoologiska värden.

Element 1, underelem. 1: Golv, 30 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, blandskog. Gran-björkkärr av fattig vitmosstyp.

Element 1, underelem. 2: Golv, 70 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Tallkärr av klotstarrtyp.

Delobj. 6: Blandmyr av mosaiktyp
40 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastm.mosse av tuvull-S. angustifoliumtyp.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmattekärr, taggstarr-S.angustifolium var.

Element 3: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Delobj. 7: Sumpskog
85 ha, fördelat på 9 eller fler ytor. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, vinterväg. Gallring utförd.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog. Sumpgranskog av ristyp.

Delobj. 8: Sluttande mosse
38 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Hölja, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2, underelem. 1: Hölja, 18 % av delobjektytan. Mjukm.mosse, vitag-kallgräs-S.balticumtyp.

Element 2, underelem. 2: Hölja, 10 % av delobjektytan. Öppen fastmattemosse.

Element 2, underelem. 3: Hölja, 2 % av delobjektytan. Lösbottenmosse av mossfattig typ.

Element 3: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 3, underelem. 1: Mosseplan, 10 % av delobjektytan. Fastm.mosse av tuvull-S. angustifoliumtyp.

Element 3, underelem. 2: Mosseplan, 10 % av delobjektytan. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 4: Randskog, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Tallkärr av klotstarrtyp.

Delobj. 9: Strand vid vattendrag
10 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande väg. Slingrande vattendrag.

Element 1: Bäck, 10 % av delobjektytan.

Element 1, underelem. 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 2 % av delobjektytan. Dvärgvassar av trådstarrtyp.

Element 2: Golv, 37 % av delobjektytan, öppet. Strandsumpkärrtyp.

Element 2, underelem. 1: Källdråg, 2 % av delobjektytan. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Element 2, underelem. 2: Källa, 1 % av delobjektytan. Källkärr.

Element 3: Vegetation utmed mindre vattendrag, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt.

Nr 112

19H 9C 02 (3638) KLASS 3
KARUSJÖMYRAN, RÖDMYRAN 14 KM NO NÄSÅKER

Topogent kärr, 66 ha (57 ha våtm), 240 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
17 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet. Risvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
30 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag generell påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
10 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 20 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Nr 113

19H 9D 01 (2224) KLASS 1
RÄVELFLON 16 KM NO NÄSÅKER

Myrkomplex, 136 ha (117 ha våtm), 250 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Åsrygg i anslutning.

Delobj. 1: Topogent kärr
40 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta. Diffus strångbildning.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Golv, 5 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
13 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Flark, 30 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 3: Flark, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Flarkgöl, 5 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
16 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 25 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 4: Strängblandmyr
29 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Sträng, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element:. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Flark, 50 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Flark, 15 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 5: Flarkgöl, 5 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 5: Sumpskog
19 ha, fördelat på 5 ytor. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 6: Tjärn
3 ha, fördelat på 5 ytor.

Nr 114

19H 9E 01 (0507) KLASS 3
MYR VID RÄVELMYRBÄCKEN 18 KM NO NÄSÅKER

Topogent kärr, 70 ha (64 ha våtm), 320 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
27 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Element 2: Golv, 49 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Bäckdråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta-lösbotten.

Element 4: Mindre vattenytor, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Topogent kärr
27 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 33 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Källdråg, 2 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
10 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Nr 115

19H 9E 02 (4804) KLASS 3
TORVARNÄSMYRAN 20 KM NO NÄSÅKER

Myrkomplex, 65 ha (63 ha våtm), 240 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
24 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 42 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 30 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Element 4: Sträng, 3 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
27 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
12 ha, fördelat på 4 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Nr 116

19I 2B 02 (4911) KLASS 3
STOR-MÄRASKALLMYRAN 30 KM V BJÄSTA

Myrkomplex, 47 ha (40 ha våtm), 295 m ö h. Flygb. -92. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
8 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
15 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
11 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Tjärn
13 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Gungfly, 45 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor.

Nr 117

19I 3B 01 (0713) KLASS 3
STORMYRAN,MELLANMYRAN 30 KM V BJÄSTA

Myrkomplex, 63 ha (54 ha våtm), 315 m ö h. Flygb. -92.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
16 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
38 ha, öppet. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Öar, 30 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 118

20G 0B 01 (3448) KLASS 2
NYFLON, KÄLLMYRFLON, FROSTFLON 6 KM VSV STOR--FINNFORSEN

Myrkomplex, 136 ha (126 ha våtm), 280 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården.
Naturligt kalkpåverkad vegetation.

Delobj. 1: Topogent kärr
32 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Tuva, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
50 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 35 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
23 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 4: Mad vid vattendrag
22 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning. Slingrande vattendrag.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Risvegetation.

Element 3: Bäck, 15 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 5: Tjärn
3 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Gungfly, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation.

Nr 119

20G 0D 01 (0216) KLASS 2
MYR NV VÄSTER-VALLSJÖN 5 KM S STOR-FINNFORSEN

Topogent kärr, 26 ha (26 ha våtm), 275 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården.
Naturligt kalkpåverkad vegetation.

Delobj. 1: Topogent kärr
26 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning, vinterväg.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 120

20G 0F 01 (0813) KLASS 2
SÖRFLON 7 KM NV RAMSELE

Myrkomplex, 107 ha (90 ha våtm), 338 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
14 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
41 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
18 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
17 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 34 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Bäck, 1 % av delobjektytan, skogbevuxet.

Delobj. 5: Tjärn
12 ha, fördelat på 3 ytor.

Nr 121

20G 0G 01 (3935) KLASS 1
RÖDMOSSAFLON, BÄCKSMYRAN 6 KM N RAMSELE

Myrkomplex, 307 ha (271 ha våtm), 265 m ö h. Flygb. -86. Fält -93.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Sjö ansluter till högst 24%.

***Delobj. 1: Topogent kärr** 40 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.*

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Tuva, 5 % av delobjektytan. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp. Diffus strängbildning.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Lösbotten.

Element 3, underelem. 1: Golv, 7 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av rik mossfattig typ.

Element 3, underelem. 2: Tuva, 3 % av delobjektytan. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Delobj. 2: Topogent kärr
150 ha, fördelat på 8 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Golv, 40 % av delobjektytan. Tallkärr av fattig vitmosstyp.

Element 1, underelem. 2: Golv, 20 % av delobjektytan. Tallkärr av klotstarrtyp.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
14 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 20 % av delobjektytan, öppet. Fastmattemosse av tuvull-S. balticumtyp.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
34 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 2: Öar, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2, underelem. 1: Tuva, 10 % av delobjektytan. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2, underelem. 2: Tuva, 15 % av delobjektytan. Fastm.mosse av tuvull-S. angustifoliumtyp.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 5: Sumpskog
22 ha, fördelat på 6 ytor.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Sumpgranskog av ristyp.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 6: Strand vid vattendrag
11 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Bäver förekommer.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Strand-sumpkärrtyp.

Element 2: Golv, 23 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Gran-björkkärr av fattig vitmosstyp. Större förekomst av döda träd.

Element 3: Bäck, 7 % av delobjektytan, öppet. Höjd vattennivå genom dämning.

Delobj. 7: Tjärn
6 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1, underelem. 1: Gungfly. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 1, underelem. 2: Kantzon vid tjärn. Dvärgvassar av flaskstarrtyp.

Element 1, underelem. 3: Kantzon vid tjärn. Flytbladsvegetation av gäddnatetyp.

Nr 122

20G 0G 02 (3421) KLASS 2
TUVMYRAN 6 KM NNV RAMSELE

Myrkomplex, 72 ha (67 ha våtm), 255 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
14 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Bäckdråg, 20 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
40 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 55 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Mad vid vattendrag
13 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande väg. Bäver förekommer, höjd vattennivå genom dämning.

Element 1: Golv, 92 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Bäck, 8 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 4: Tjärn
4 ha.

Nr 123

20G 0G 03 (0838) KLASS 4
GAMM-SKIDFLON 3 KM NNV RAMSELE

Topogent kärr, 68 ha (67 ha våtm), 265 m ö h. Flygb. -86. Storomr HH.
Det: Sören Uppsäll.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning, anslutande väg. Nedlagda odlingar i våtmarken.

Nr 124

20G 0G 04 (1837) KLASS 3
LILL-SKIDFLON, SÖRBÄCKSMYRAN, HUNDPUSTEN 4 KM NNV RAMSELE

Myrkomplex, 100 ha (96 ha våtm), 270 m ö h. Flygb. -86. Storomr HH.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
23 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
46 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
27 ha, öppet. Stark generell påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 4: Tjärn
3 ha, fördelat på 2 ytor. Svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Gungfly, 20 % av delobjektytan, öppet.

Nr 125

20G 0I 01 (4328) KLASS 3
IMNÅSFLON 11 KM NO RAMSELE

Myrkomplex, 55 ha (55 ha våtm), 245 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
36 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta-lösbotten. Diffus strängbildning.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
19 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 9 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Bäck, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Nr 126

20G 0I 02 (4646) KLASS 3
ORRMYRAN, MIDSOMMARMYRAN 11 KM NO RAMSELE

Myrkomplex, 58 ha (57 ha våtm), 260 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
10 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 54 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 4: Bäck, 1 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
12 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
35 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från deposition från dike, dikning, svag lokal påverkan från vintervåg.

Element 1: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Nr 127

20G 1B 01 (2034) KLASS 1
TVÄRMYRAN-SVEDBERGSVIKEN 2 KM SO VIMMERVATTNET

Myrkomplex, 12 ha (12 ha våtm), 275 m ö h. Flygb. -89.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan. Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
2 ha, öppet.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
5 ha, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 3: Sumpskog
5 ha. Stark lokal påverkan från dikning. Botaniska värden.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, skogbevuxet, barrskog.

Nr 128

20G 1B 02 (0237) KLASS 1
HACKELMYRAN 4 KM SO VIMMERVATTNET

Myrkomplex, 18 ha (18 ha våtm), 310 m ö h. Flygb. -89.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Sumpskog
2 ha, fördelat på 4 ytor. Svag generell påverkan från avverkning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
4 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
6 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
5 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Botaniska värden.

Element 1: Bäckdråg, 70 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Nr 129

20G 1B 03 (4102) KLASS 3
SÖRFLON, NORRFLON 30 KM VNV RAMSELE

Myrkomplex, 67 ha (67 ha våtm), 290 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården.
Naturligt kalkpåverkad vegetation, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
14 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
30 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning. Nedlagda odlingar i våtmarken, sjö ansluter till minst 25%.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
23 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Öar, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 130

20G 1B 04 (4432) KLASS 3
MYR V FLÄRKEN 27 KM NV RAMSELE

Topogent kärr, 5 ha (5 ha våtm), 285 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården.
Naturligt kalkpåverkad vegetation, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Blandmyr av mosaiktyp
5 ha, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 131

20G 1C 01 (0841) KLASS 3
MYR VID TJÄRNMYRTJÄRNEN 20 KM NV RAMSELE

Blandmyr av mosaiktyp, 5 ha (5 ha våtm), 285 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården.
Naturligt kalkpåverkad vegetation, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Blandmyr av mosaiktyp
5 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Dråg, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 132

20G 1C 02 (1339) KLASS 3
MYR 500 M SV FLYBODARNA 20 KM NV RAMSELE

Topogent kärr, 4 ha (4 ha våtm), 305 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården.
Naturligt kalkpåverkad vegetation.

Delobj. 1: Topogent kärr
4 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Bäckdråg, 20 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Nr 133

20G 1C 03 (1347) KLASS 3
HARALDMYRAN 20 KM NV RAMSELE

Topogent kärr, 5 ha (5 ha våtm), 300 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården.
Naturligt kalkpåverkad vegetation.

Delobj. 1: Topogent kärr
5 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin, stark lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 134

20G 1C 04 (3531) KLASS 3
STORMYRAN 23 KM NV RAMSELE

Topogent kärr, 64 ha (60 ha våtm), 280 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården.
Naturligt kalkpåverkad vegetation.

Delobj. 1: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Tuva, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
36 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
13 ha, glest trädtäckt. Svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Nr 135

20G 1D 01 (3431) KLASS 3
LASSMYRAN 20 KM NV RAMSELE

Blandmyr av mosaiktyp, 29 ha (29 ha våtm), 250 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Åsrygg i anslutning, naturligt kalkpåverkad vegetation.

Delobj. 1: Blandmyr av mosaiktyp
29 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 59 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 4: Bäck, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Nr 136

20G 1D 02 (4540) KLASS 3
MYR S SURÅGGMYRBERGET 19 KM NV RAMSELE

Blandmyr av mosaiktyp, 12 ha (12 ha våtm), 350 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Blandmyr av mosaiktyp
12 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 137

20G 1E 01 (0634) KLASS 3
GAMMFLON 12 KM NV RAMSELE

Myrkomplex, 78 ha (72 ha våtm), 240 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
30 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Sträng, 3 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta. Diffus strängbildning.

Element 3: Golv, 22 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
25 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
17 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Tjärn
4 ha.

Nr 138

20G 1F 01 (3923) KLASS 1
KÅLFLON 12 KM NV RAMSELE

Myrkomplex, 215 ha (185 ha våtm), 280 m ö h. Flygb. -86.
Storomr HF.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
39 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
10 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Flark, 15 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 4: Flarkgöl, 15 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Topogent kärr
68 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta. Mosaik med fastmark.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta. Mosaik med fastmark.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
35 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Delobj. 5: Blandmyr av mosaiktyp
19 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Öar, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 6: Sumpskog
14 ha, fördelat på 5 ytor.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 7: Tjärn
16 ha, fördelat på 7 ytor.

Element 1: Gungfly, 10 % av delobjektytan, öppet.

Nr 139

20G 1F 02 (2942) KLASS 3
STORMYRAN 11 KM NV RAMSELE

Topogent kärr, 242 ha (200 ha våtm), 275 m ö h. Flygb. -86.
Storomr HF.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
41 ha, fördelat på 6 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
35 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Sträng, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 70 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Flark, 5 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 3: Topogent kärr
124 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta. Mosaik med fastmark.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta. Mosaik med fastmark.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Tjärn
5 ha, fördelat på 2 ytor.

Nr 140

20G 1G 01 (0208) KLASS 3
ÄLGMYRAN 8 KM NNV RAMSELE

Topogent kärr, 53 ha (50 ha våtm), 265 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
33 ha, öppet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Element 2: Golv, 5 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
17 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Nr 141

20G 1G 02 (0111) KLASS 3
ÄLGMYRAN O VÄGEN 7 KM N RAMSELE

Myrkomplex, 41 ha (40 ha våtm), 265 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
16 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Fastmatta. Vegetationen är påverkad av ingrepp.

Element 3: Restsjö, 5 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten. Rest av tjärn.

Element 4: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
14 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 14 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Bäck, 1 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
10 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Nr 142

20G 1H 01 (3804) KLASS 1
ARKSJÖFLON 11 KM NNO RAMSELE

Topogent kärr, 238 ha (211 ha våtm), 225 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
68 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Videvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
12 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 70 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
102 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin, kraftledning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Golv, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
29 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 5: Tjärn
8 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Gungfly, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation.

Nr 143

20G 1H 02 (1431) KLASS 3
TVÅRÅSLÅTTARNA 10 KM NO RAMSELE

Myrkomplex, 78 ha (68 ha våtm), 220 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
18 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Området har slåtterhävdats, hölador.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Tuva, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
26 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
12 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Kärrfönster, 10 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 4: Mad vid vattendrag
12 ha, glest trädtäckt. Bäver förekommer, höjd vattennivå genom dämning.

Element 1: Golv, 92 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Bäck, 8 % av delobjektytan, öppet.

Nr 144

20G 1H 03 (0232) KLASS 3
SVANALOKARNA 9 KM NO RAMSELE

Myrkomplex, 46 ha (44 ha våtm), 225 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från väg, vinterväg.

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 54 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 4: Bäck, 1 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
10 ha, öppet. Stark lokal påverkan från väg, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Sträng, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 55 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Flark, 20 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
22 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Nr 145

20G 1J 01 (0505) KLASS 2
STORFLON 15 KM NO RAMSELE

Myrkomplex, 86 ha (80 ha våtm), 260 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
32 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
18 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Flark, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 5: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
17 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 48 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 3: Bäck, 2 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 5: Tjärn
2 ha.

Nr 146

20G 2A 01 (2114) KLASS 3
LÅNGMYRAN 35 KM NV RAMSELE

Topogent kärr, 33 ha (33 ha våtm), 370 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården.
Naturligt kalkpåverkad vegetation.

Delobj. 1: Topogent kärr
33 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 55 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Bäckdråg, 5 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Element 4: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 147

20G 2A 02 (1833) KLASS 3
MYR V HÅVTJÄRNEN 34 KM NV RAMSELE

Blandmyr av mosaiktyp, 7 ha (7 ha våtm), 280 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården.
Naturligt kalkpåverkad vegetation.

Delobj. 1: Blandmyr av mosaiktyp
7 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Golv, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 148

20G 2C 02 (1612) KLASS 2
BODFLON 25 KM NV RAMSELE

Våtmarkskomplex, 115 ha (111 ha våtm), 280 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
37 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten. Diffus strängbildning.

Element 4: Bäck, 5 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Topogent kärr
37 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Bäckdråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
37 ha, fördelat på 4 ytor.

Element 1: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 2: Golv, 80 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 149

20G 2F 01 (2109) KLASS 3
TENKELMYRAN, ISAKFLON 16 KM NNV RAMSELE

Våtmarkskomplex, 105 ha (90 ha våtm), 235 m ö h. Flygb. -86. Storomr HI.
Det: Sören Uppsäll.
Mosaik med fastmark, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
32 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Sträng, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Flark, 35 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
30 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Mad vid vattendrag
12 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 92 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Bäck, 8 % av delobjektytan, öppet. Slingrande vattendrag.

Delobj. 4: Sumpskog
17 ha, fördelat på 3 ytor. Inslag av fastmark i myren.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 150

20G 2F 02 (3304) KLASS 3
GAMM-VÅNGELFLON, STORFLOLOKEN 17 KM NNV RAMSELE

Myrkomplex, 51 ha (51 ha våtm), 245 m ö h. Flygb. -86. Storomr HI.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
37 ha, öppet.

Element 1: Golv, 73 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Element 2: Tuva, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog. Fastmatta.

Element 4: Bäckdråg, 2 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 5: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
14 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Nr 151

20G 2F 03 (1323) KLASS 2
SJÖFLON 15 KM NNV RAMSELE

Mossekomplex, 53 ha (49 ha våtm), 235 m ö h. Flygb. -86. Storomr HI.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
18 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Excentrisk mosse
23 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Randskog, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 5: Lagg, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Mad vid vattendrag
10 ha, öppet. Slingrande vattendrag.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Bäck, 20 % av delobjektytan, öppet.

Nr 152

20G 2G 01 (1941) KLASS 1
STORFLON MFL 14 KM N RAMSELE

Kärrkomplex, 273 ha (246 ha våtm), 225 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll. Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
52 ha, fördelat på 8 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Element 3: Dråg, 19 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Källa, 1 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
17 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 65 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
149 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin, kraftledning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 4: Dråg, 9 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 5: Bäck, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
12 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Delobj. 5: Strand vid vattendrag
16 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 153

20G 2H 01 (1647) KLASS 2
VALÅSLÅTTERN 14 KM VSV JUNSELE

Våtmarkskomplex, 85 ha (84 ha våtm), 170 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
40 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 15 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Videvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Mad vid vattendrag
19 ha, öppet. Området har slåtterhävdats.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Videvegetation.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog.

Element 4: Bäck, 10 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 3: Sumpskog
25 ha, fördelat på 6 ytor.

Element 1: Golv, 54 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 45 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 3: Bäck, 1 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 154

20G 2I 01 (2341) KLASS 3
HÅLLFLON 10 KM VSV JUNSELE

Myrkomplex, 74 ha (73 ha våtm), 220 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
16 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 70 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
35 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
22 ha, öppet. Stark lokal påverkan från dikning, körspår från traktor/skogsmaskin, svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Flark, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 5: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Nr 155

20G 3I 01 (0228) KLASS 2
VÅTMARKSKOMPLEX VID FLÄRKEN 9 KM VSV JUNSELE

Våtmarkskomplex, 211 ha (185 ha våtm), 200 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
16 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
40 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Strand vid vattendrag
27 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Meandring.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Bäck, 0 % av delobjektytan.

Delobj. 4: Sumpskog
108 ha, fördelat på 7 ytor. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin. Nedlagda odlingar i våtmarken.

Element 1: Golv, 49 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 4: Bäck, 1 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 5: Tjärn
14 ha.

Nr 156

20G 5J 01 (0617) KLASS 3
MYR 1 KM SV KETTLABERGET 12 KM NV JUNSELE

Våtmarkskomplex, 26 ha (26 ha våtm), 200 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
12 ha, öppet.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 49 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Bäck, 1 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Sumpskog
14 ha. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 157

20G 7I 01 (3921) KLASS 3
MYR NV STOR-KÄRMSJÖN 25 KM NV JUNSELE

Myrkomplex, 119 ha (104 ha våtm), 300 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
29 ha, mosaikartad fördelning, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
58 ha, mosaikartad fördelning, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Mad vid vattendrag
17 ha, öppet. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin, kraftledning.

Element 1: Golv, 94 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Bäck, 6 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 4: Tjärn
6 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Gungfly, 20 % av delobjektytan, öppet.

Nr 158

20G 8I 01 (0933) KLASS 2
SKRAPMYRORNA 27 KM NV JUNSELE

Myrkomplex, 154 ha (118 ha våtm), 335 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Mosaik med fastmark.

Delobj. 1: Topogent kärr
27 ha, mosaikartad fördelning, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Golv, 64 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Källa, 1 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
14 ha, mosaikartad fördelning, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
58 ha, mosaikartad fördelning, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 20 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
19 ha, fördelat på 6 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 84 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 3: Bäck, 1 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 5: Tjärn
9 ha, fördelat på 7 ytor.

Element 1: Gungfly, 10 % av delobjektytan, öppet.

Nr 159

20G 8J 01 (4607) KLASS 3
MYR V RUSKVATTNET 30 KM NNV JUNSELE

Våtmarkskomplex, 107 ha (85 ha våtm), 305 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Topogent kärr
17 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, stark lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
37 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Mad vid sjö
19 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 69 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Gungfly, 10 % av delobjektytan, öppet.

Element 3: Bäck, 1 % av delobjektytan, öppet.

Element 4: Vegetation utmed mindre vattendrag, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Videvegetation. Bäver förekommer, höjd vattennivå genom dämning.

Delobj. 4: Sumpskog
12 ha, fördelat på 3 ytor. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Bäck, 1 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Permanent öppet vatten.

Delobj. 5: Tjärn
5 ha, fördelat på 4 ytor.

Nr 160

20G 8J 02 (0746) KLASS 3
AFTONSMYRAN 25 KM N JUNSELE

Myrkomplex, 44 ha (43 ha våtm), 400 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
19 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Bäckdråg, 5 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
24 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 3: Tjärn
1 ha.

Nr 161

20G 8J 03 (1549) KLASS 3
MIDDAGSMYRAN 30 KM N JUNSELE

Myrkomplex, 97 ha (95 ha våtm), 415 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
27 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Flark, 5 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 5: Bäckdråg, 5 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Soligent kärr
10 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Öar, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
45 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
13 ha, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Öar, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 162

20G 9J 04 (3121) KLASS 2
MJÖLKVATTENMYRAN MFL 34 KM NNV JUNSELE

Våtmarkskomplex, 185 ha (162 ha våtm), 355 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
50 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Sträng, 4 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Flark, 10 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 5: Bäck, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
86 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Golv, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 3: Mad vid vattendrag
22 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Bäver förekommer.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 4: Tjärn
4 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Gungfly, 10 % av delobjektytan, öppet.

Nr 163

20G 9J 05 (1544) KLASS 3
ORRMYRAN 31 KM N JUNSELE

Myrkomplex, 99 ha (98 ha våtm), 415 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll. Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
14 ha, öppet.

Element 1: Golv, 98 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 1 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Flark, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Soligent kärr
14 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Öar, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
41 ha, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, anslutande dikning.

Element 1: Mosseplan, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Nr 164

20H 0B 01 (3041) KLASS 2
KLINGERFLON 14 KM SO JUNSELE

Våtmarkskomplex, 115 ha (111 ha våtm), 235 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
22 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 24 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Flark, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta-lösbotten.

Element 5: Bäck, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Topogent kärr
14 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
35 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
30 ha, fördelat på 4 ytor. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 14 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 3: Bäckdråg, 1 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 5: Sumpskog
10 ha. Stark generell påverkan från avverkning, stark lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 98 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Fastmatta. Mosaik med fastmark.

Element 2: Bäck, 2 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog.

Nr 165

20H 0B 02 (0337) KLASS 3
MYR VID STORTJÄRNEN 16 KM SO JUNSELE

Myrkomplex, 92 ha (78 ha våtm), 340 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
16 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
50 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
12 ha, fördelat på 4 ytor. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Tjärn
10 ha, fördelat på 3 ytor.

Nr 166

20H 0C 01 (3535) KLASS 3
HÅLLFLON 15 KM SO JUNSELE

Myrkomplex, 104 ha (99 ha våtm), 310 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
20 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, vinterväg.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
22 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
33 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
24 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Bäck, 1 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 167

20H 0D 01 (3716) KLASS 3
STORMYRAN, S GÅRDBERGSMYRAN 18 KM SO JUNSELE

Våtmarkskomplex, 275 ha (229 ha våtm), 220 m ö h.
Flygb. -86. Fält -93.
Det: Sören Uppsäll.
Gallring utförd.

Delobj. 1: Topogent kärr
34 ha, fördelat på 8 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Golv. Gran-björkkärr av fattig vitmosstyp. Vegetationen är påverkad av ingrepp.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2, underelem. 1: Golv, 10 % av delobjektytan. Tallkärr av fattig vitmosstyp.

Element 2, underelem. 2: Golv, 10 % av delobjektytan. Tallkärr av klotstarrtyp.

Element 2, underelem. 3: Golv, 5 % av delobjektytan. Gran-björkkärr av brunmossrik typ. Vegetationen är påverkad av ingrepp.

Element 3: Dråg, 30 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
57 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 1, underelem. 2: Mosseplan, 35 % av delobjektytan. Fastm.mosse av tuvull-S. angustifoliumtyp.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
19 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2, underelem. 1: Golv, 40 % av delobjektytan. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Element 2, underelem. 2: Golv, 5 % av delobjektytan. Mjukmattekärr, starr-S. subsecundum var.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmattekärr, starr-S. fallax variant.

Delobj. 4: Strand vid vattendrag
13 ha, öppet. Stark lokal påverkan från deposition från dike, svag lokal påverkan från dikning. Bäver förekommer, området har slåtterhävdats, hölador.

Element 1: Golv, 54 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Videvegetation.

Element 1, underelem. 1: Golv, 40 % av delobjektytan. Strand-sumpkärrtyp. Området har slåtterhävdats, hölador.

Element 1, underelem. 2: Golv, 4 % av delobjektytan. Strand-sumpkärrtyp.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog.

Element 3: Bäck, 11 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 5: Sumpskog
107 ha, fördelat på 3 ytor. Stark lokal påverkan från avverkning, deposition från dike, dikning. mosaik med fastmark.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 1, underelem. 1: Golv, 5 % av delobjektytan. Sumpgranskog av ört-starrtyp.

Element 1, underelem. 2: Golv, 15 % av delobjektytan. Sumpgranskog av ört-starrtyp. Gallring utförd, vegetationen är påverkad av ingrepp.

Element 1, underelem. 3: Golv, 5 % av delobjektytan. Sumpbjörkskog av örttyp. Större förekomst av döda träd, vegetationen är påverkad av ingrepp.

Element 2: Golv, 45 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Sumpgranskog av lågörttyp.

Element 3: Bäck, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 168

20H 0D 02 (0234) KLASS 3
KLIPPARÅSMYRAN 22 KM SO JUNSELE

Myrkomplex, 88 ha (79 ha våtm), 240 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
37 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
42 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Öar, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 169

20H 0E 01 (3131) KLASS 3
KEBBEMYRAN 24 KM SO JUNSELE

Myrkomplex, 103 ha (98 ha våtm), 255 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Fornlämningsmiljö, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
19 ha, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 33 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Strång, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Flark, 15 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Element 5: Göl, 2 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
32 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Sluttande mosse
17 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 2: Strång, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 45 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Höljegöl, 10 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
12 ha, öppet. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 5: Obestämbar myr
19 ha, skogsbevuxet. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta. Vegetationen är påverkad av ingrepp.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Vegetationen är påverkad av ingrepp.

Delobj. 6: Tjärn
3 ha.

Nr 170

20H 0F 01 (4003) KLASS 1
STORMYRAN 25 KM SO JUNSELE

Myrkomplex, 188 ha (177 ha våtm), 250 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
36 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Flark, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Bäckdråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
23 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
75 ha, fördelat på 8 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Mad vid sjö
19 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Gungfly, 16 % av delobjektytan, öppet.

Element 3: Bäck, 9 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 5: Sumpskog
26 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 3: Vegetation utmed mindre vattendrag, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 171

20H 1B 01 (0237) KLASS 2
STORFLON 12 KM SO JUNSELE

Topogent kärr, 109 ha (104 ha våtm), 240 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
32 ha, öppet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
11 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Flark, 60 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
50 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande väg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
11 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Delobj. 5: Tjärn
3 ha.

Nr 172

20H 1B 02 (0942) KLASS 3
ANTEMYRORNA 11 KM SO JUNSELE

Myrkomplex, 74 ha (70 ha våtm), 235 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
26 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
44 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande dikning.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 173

20H 1B 03 (3101) KLASS 3
MYR NV LÅNGSJÖN 8 KM SSO JUNSELE

Myrkomplex, 44 ha (41 ha våtm), 225 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
19 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 35 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 2: Platåformigt välvd mosse
17 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Lagg, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Delobj. 3: Mad vid vattendrag
6 ha, öppet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Risvegetation.

Element 3: Bäck, 15 % av delobjektytan. Sel.

Nr 174

20H 1C 01 (4407) KLASS 1
MYR RUNT KUSTJÄRNEN 10 KM SO JUNSELE

Våtmarkskomplex, 84 ha (78 ha våtm), 205 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Koncentrisk mosse
22 ha, öppet. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Lagg, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Randskog, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
12 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
19 ha, fördelat på 4 ytor.

Element 1: Golv, 68 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 3: Bäck, 2 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 5: Tjärn
10 ha.

Element 1: Gungfly, 50 % av delobjektytan, öppet.

Nr 175

20H 1C 02 (3226) KLASS 3
MYR VID GRYSJÖTJÄRNEN 12 KM SO JUNSELE

Myrkomplex, 95 ha (82 ha våtm), 220 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
49 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
21 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
12 ha, fördelat på 2 ytor. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 4: Tjärn
12 ha, fördelat på 3 ytor.

Nr 176

20H 1D 01 (2937) KLASS 2
PORSDLON, LÅNGMYRAN 17 KM OSO JUNSELE

Kärrkomplex, 173 ha (169 ha våtm), 240 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården.
Litteratur om objektet finns, området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Topogent kärr
29 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan, öppet. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
82 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Sträng, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 25 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 3: Flark, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
28 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 35 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
29 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Nr 177

20H 1D 02 (1420) KLASS 2
OTTERSJÖMYRAN 17 KM SO JUNSELE

Myrkomplex, 65 ha (65 ha våtm), 217 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Väsentlig del ansluter till större vattendrag, sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
27 ha, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 28 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 45 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Höljegöl, 2 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
12 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
10 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Tuva, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
16 ha, fördelat på 4 ytor.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Nr 178

20H 1E 01 (3609) KLASS 2
BRÅNMYRORNA 19 OSO JUNSELE

Myrkomplex, 117 ha (103 ha våtm), 265 m ö h. Flygb. -86.
Storomr HG.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården.
Området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
48 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Sträng, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 45 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Flark, 30 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 4: Sträng, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
24 ha, fördelat på 5 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
31 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Nr 179

20H 1E 02 (2828) KLASS 1
BRÄNNMYRORNA, SPÅNGMYRAN 21 KM OSO JUNSELE

Myrkomplex, 235 ha (198 ha våtm), 255 m ö h. Flygb. -86. Fält -93. Storomr HG.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården. Nedlagda odlingar i våtmarken, området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Topogent kärr
38 ha, fördelat på 7 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, deposition från dike, odling i våtmarken, anslutande väg.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Element 1, underelem. 1: Golv, 40 % av delobjektytan. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 1, underelem. 2: Golv, 15 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av rik mossfattig typ.

Element 2: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2, underelem. 1: Golv, 20 % av delobjektytan. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vitmosstyp.

Element 2, underelem. 2: Golv, 10 % av delobjektytan. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Element 2, underelem. 3: Golv, 15 % av delobjektytan. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
29 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Sträng, 20 % av delobjektytan. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vitmosstyp.

Element 1, underelem. 2: Sträng, 5 % av delobjektytan. Fastmattekärr av starr-ört-brunmosstyp.

Element 2: Flark, 40 % av delobjektytan, öppet. Lösbottenkärr av rik mossfattig typ.

Element 3: Flark, 35 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 3, underelem. 1: Flark, 20 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av rik mossfattig typ.

Element 3, underelem. 2: Flarkgöl, 15 % av delobjektytan. Dvärgvassar av sjöfräkentyp. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
25 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 1, underelem. 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan. Tallmosse.

Element 1, underelem. 3: Mosseplan, 25 % av delobjektytan. Fastm.mosse av tuvull-S. angustifoliumtyp.

Element 2: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
30 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 22 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 1, underelem. 1: Hölja, 3 % av delobjektytan. Fastmattemosse av tuvull-S. balticumtyp.

Element 2: Golv, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmattekärr, taggstarr-S.angustifolium var.

Element 3: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Mjukmattekärr, starr-S. fallax variant.

Element 4: Sträng, 4 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Element 5: Flark, 5 % av delobjektytan, öppet. Lösbottenkärr av intermediär typ.

Element 5, underelem. 1: Flark, 1 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av intermediär typ.

Delobj. 5: Strand vid vattendrag
22 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Sumpgranskog av lågörttyp.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Strand-sumpkärrtyp. Större förekomst av döda träd, området har slåtterhävdats, hölador.

Element 3: Bäck, 5 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 6: Sumpskog
17 ha, fördelat på 4 ytor.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Sumpgranskog av lågörttyp.

Element 1, underelem. 1: Källa, 1 % av delobjektytan. Källkärr.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 7: Tjärn
7 ha, fördelat på 4 ytor.

Element 1: Gungfly, 20 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 8: Topogent kärr
35 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Golv, 70 % av delobjektytan. Tallkärr av klotstarrtyp.

Element 1, underelem. 2: Golv, 25 % av delobjektytan. Tallkärr av fattig vitmosstyp.

Element 1, underelem. 3: Golv, 5 % av delobjektytan. Tallkärr av brunmossrik typ.

Nr 180

20H 1E 03 (0216) KLASS 3
ELVALASSMYRAN 21 KM SO JUNSELE

Mossekomplex, 108 ha (101 ha våtm), 240 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
88 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Kärrfönster, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 5: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Strand vid vattendrag
14 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 53 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Mindre vattenytor, 5 % av delobjektytan, öppet. Sel.

Element 4: Bäck, 2 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog.

Nr 181

20H 2A 01 (0106) KLASS 3
FREDRIKSFLON 6 KM SSO JUNSELE

Våtmarkskomplex, 91 ha (86 ha våtm), 225 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
26 ha, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Tuva, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 9 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 4: Bäckdråg, 1 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Lösbotten.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
35 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
25 ha, fördelat på 5 ytor. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Nr 182

20H 2A 02 (4532) KLASS 1
LIMNOGENT STRANDKOMPLEX VID ÅNGERMANÄLVEN 1 KM S JUNSELE

Limnogent strandkomplex, 51 ha (47 ha våtm), 180 m ö h.
Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
ingår i naturvårdsplan. Djurskyddsområde. Åkermark ansluter, väsentlig del ansluter till större vattendrag.

Delobj. 1: Mad vid vattendrag
16 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag generell påverkan från vattenreglering. området har slåtterhävdats, ornitologiska värden, tidvis översvämmad, zoologiska värden.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Gungfly, 10 % av delobjektytan, öppet.

Element 3: Lagun, 5 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 2: Strandäng
9 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. området har slåtterhävdats, ornitologiska värden.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, lövskog. Gräs/starrvegetation.

Delobj. 3: Limnogen strandsumpskog
22 ha, fördelat på 4 ytor. Svag lokal påverkan från kraftledning, vattenreglering.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Tjärn
4 ha, fördelat på 6 ytor.

Element 1: Restsjö, öppet.

Nr 183

20H 2B 01 (0115) KLASS 3
MYR VID NÄCKTJÄRN 6 KM SO JUNSELE

Myrkomplex, 88 ha (75 ha våtm), 130 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande väg, vinterväg.

Element 1: Dråg, 45 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 54 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Bäck, 1 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
43 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Obestämbar myr
12 ha, skogsbevuxet. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta. Vegetationen är påverkad av ingrepp.

Element 2: Golv, 39 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Bäck, 1 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 4: Tjärn
4 ha.

Nr 184

20H 2C 01 (3414) KLASS 4
HÖCKELMYRAN 9 KM OSO JUNSELE

Obestämbar myr, 150 ha (150 ha våtm), 215 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning. Området har slåtterhävdats, nedlagda odlingar i våtmarken, litteratur om objektet finns.

Nr 185

20H 2C 02 (2539) KLASS 3
STORMYRAN 11 KM OSO JUNSELE

Myrkomplex, 377 ha (342 ha våtm), 230 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården. Litteratur om objektet finns, området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
33 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 50 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
72 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
92 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
27 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 30 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 5: Blandmyr av mosaiktyp
84 ha, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Öar, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 6: Sumpskog
34 ha, fördelat på 5 ytor. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 75 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 7: Tjärn
12 ha. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Nr 186

20H 2C 03 (4930) KLASS 3
DJUPBÄCKSFLON 10 KM V JUNSELE

Myrkomplex, 93 ha (77 ha våtm), 230 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Riksintresse för naturvården.

Delobj. 1: Topogent kärr
17 ha, öppet.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Sträng, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Sträng, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
37 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Mad vid vattendrag
13 ha, öppet. Området har slåtterhävdats, hölador.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Videvegetation.

Element 3: Bäck, 15 % av delobjektytan, öppet. Meandring.

Nr 187

20H 2C 04 (0348) KLASS 3
SAXVATTENFLON 13 KM OSO JUNSELE

Myrkomplex, 84 ha (83 ha våtm), 230 m ö h. Flygb. -83.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Topogent kärr 10 ha, öppet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Lösbotten.

Element 2: Tuva, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Göl, 10 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 24 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Bäck, 1 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
15 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp 44 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Nr 188

20H 2D 01 (4310) KLASS 2
MYR N RÅNGSJÖN 13 KM O JUNSELE

Myrkomplex, 89 ha (79 ha våtm), 240 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Riksintresse för naturvården. Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.
Geovetenskapliga värden.

Element 1: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 2: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Golv, 35 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
50 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Geovetenskapliga värden.

Element 1: Mosseplan, 78 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Bäck, 2 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten. Slingrande vattendrag.

Delobj. 3: Sumpskog
18 ha, fördelat på 3 ytor. Inslag av fastmark i myren.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Bäck, 1 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 189

20H 2E 01 (1118) KLASS 2
KLÄPPSJÖMYRAN 19 KM OSO JUNSELE

Myrkomplex, 178 ha (147 ha våtm), 270 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården. Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
27 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag generell påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Dråg, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta-lösbotten.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strångbildning.

Element 3: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
30 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Svag generell påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 29 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 4: Bäck, 1 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
37 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Svag generell påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 20 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
53 ha, fördelat på 6 ytor, öppet. Svag generell påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Sträng, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 5: Tjärn
19 ha, fördelat på 9 eller fler ytor.

Nr 190

20H 3B 01 (1134) KLASS 4
RISMYRAN, STORMYRAN 5 KM O JUNSELE

Obestämbar myr, 173 ha (141 ha våtm), 225 m ö h.
Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning, kraftledning. Nedlagda odlingar i våtmarken.

Nr 191

20H 3D 01 (3112) KLASS 1
MYR VID PETTERSTJÄRNEN, LÅNGNÄSFLON 13 KM ONO JUNSELE

Myrkomplex, 365 ha (300 ha våtm), 245 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården. Dödislandskap, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
27 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning. Geovetenskapliga värden.

Element 1: Dråg, 34 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strångbildning.

Element 2: Dråg, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 4: Källa, 1 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Lösbotten.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
22 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 7 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Flark, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Flark, 50 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 3: Topogent kärr
81 ha, fördelat på 8 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning. Geovetenskapliga värden.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
100 ha, fördelat på 8 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, körspår från traktor/skogsmaskin, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 5: Mad vid vattendrag
48 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning. Området har slåtterhävdats, hölador.

Element 1: Golv, 68 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Bäck, 7 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 6: Tjärn
9 ha, fördelat på 4 ytor.

Element 1: Gungfly, 25 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 7: Strängblandmyr
22 ha, öppet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 70 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 3: Flarkgöl, 10 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Nr 192

20H 3D 02 (0803) KLASS 2
MYR O MJÖVATTNET 12 KM O JUNSELE

Våtmarkskomplex, 157 ha (137 ha våtm), 240 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Riksintresse för naturvården. Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
88 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande väg. Geovetenskapliga värden.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 4: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mad vid vattendrag
17 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 64 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Bäck, 11 % av delobjektytan, öppet.

Element 3: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Diffus strängbildning.

Delobj. 3: Sumpskog
34 ha, fördelat på 7 ytor.

Element 1: Golv, 48 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 3: Bäckdråg, 2 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Tjärn
1 ha, fördelat på 2 ytor.

Nr 193

20H 3D 03 (4040) KLASS 3
MYR VID STJÄRNTJÄRNARNA 16 KM ONO JUNSELE

Myrkomplex, 101 ha (90 ha våtm), 275 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården. Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
30 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
17 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 25 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
46 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Sträng, 7 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 4: Flark, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 4: Tjärn
4 ha, fördelat på 5 ytor.

Nr 194

20H 3E 01 (1831) KLASS 4
MYRKULLMYRAN, GÖKMYRAN 20 KM O JUNSELE

Myrkomplex, 185 ha (168 ha våtm), 350 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Terrängföljande våtmark.

Delobj. 1: Topogent kärr
22 ha, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strångbildning.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Sträng, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 4: Göl, 5 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
53 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Obestämbar myr
94 ha, skogsbevuxet. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 4: Tjärn
4 ha, fördelat på 3 ytor.

Nr 195

20H 4B 01 (4240) KLASS 3
KULLBERGSMYRORNA 10 KM NO JUNSELE

Våtmarkskomplex, 120 ha (99 ha våtm), 245 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
16 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Dråg, 65 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta-lösbotten.

Element 2: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
54 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
29 ha, fördelat på 2 ytor. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Bäck, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Tjärn
3 ha.

Nr 196

20H 4C 01 (3536) KLASS 2
TÄRNICKFLON 13 KM NO JUNSELE

Myrkomplex, 177 ha (156 ha våtm), 240 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
25 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Dråg, 58 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Källa, 2 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
22 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande väg.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
41 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 20 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
45 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Öar, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 5: Mad vid vattendrag
22 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande väg. Området har slåtterhävdats, hölador, slingrande vattendrag.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Videvegetation.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Gräs/starrvegetation.

Delobj. 6: Tjärn
3 ha.

Element 1: Gungfly, 30 % av delobjektytan, öppet.

Nr 197

20H 4C 02 (1633) KLASS 1
STORMYRAN 12 KM NO JUNSELE

Myrkomplex, 201 ha (182 ha våtm), 255 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården.
Området omitologiskt inventerat, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
30 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Geovetenskapliga värden.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 55 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
29 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Geovetenskapliga värden.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
56 ha, fördelat på 8 ytor, glest trädtäckt. Geovetenskapliga värden.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
58 ha, fördelat på 5 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Sumpskog
10 ha.

Element 1: Golv, 98 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Bäck, 2 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog.

Delobj. 6: Tjärn
4 ha, fördelat på 4 ytor.

Nr 198

20H 4D 01 (4205) KLASS 1
BÅSFLON 15 KM NO JUNSELE

Myrkomplex, 308 ha (257 ha våtm), 240 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Tillfredsställ. dokumentation finns, omitologiska värden.

Delobj. 1: Topogent kärr
26 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Zoologiska värden.

Element 1: Golv, 47 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Göl, 3 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
45 ha, öppet. Zoologiska värden.

Element 1: Sträng, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 45 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Flark, 40 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
82 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
65 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 5: Limnogen strandsumpskog
21 ha.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Bäck, 5 % av delobjektytan, öppet, lövskog.

Delobj. 6: Mad vid vattendrag
14 ha, öppet. Området har slåtterhävdats, hölador.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Bäck, 20 % av delobjektytan, öppet. Meandring.

Delobj. 7: Tjärn
1 ha.

Nr 199

20H 4D 02 (4929) KLASS 3
GROVANSFLON 17 KM NO JUNSELE

Myrkomplex, 70 ha (70 ha våtm), 275 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
19 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, vinterväg.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
24 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Flark, 40 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
27 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 68 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Bäck, 2 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog.

Nr 200

20H 5A 01 (3318) KLASS 2
MYR VID RUSKE, LILLVATTENMYRAN 12 KM N JUNSELE

Myrkomplex, 101 ha (93 ha våtm), 195 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll. Åkermark ansluter, väsentlig del ansluter till större vattendrag, sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
69 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 79 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 4: Höljegöl, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Mad vid vattendrag
12 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Gräs/starrvegetation.

Delobj. 3: Topogent kärr
17 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Tjärn
3 ha, fördelat på 2 ytor. Restsjö.

Nr 201

20H 5B 01 (2817) KLASS 1

MYR/FASTMARKSMOSAIK MELLAN V OCH Ö KORTING-VATTNET 13 KM NNO JUNSELE

Våtmarkskomplex, 194 ha (158 ha våtm), 260 m ö h.
Flygb. -86. Fält -93.
Det: Sören Uppsäll.
Kulturhistoriska fynd, mosaik med fastmark, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
14 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, öppet. Rest av tjärn.

Element 1: Dråg, 70 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Element 1, underelem. 1: Dråg, 32 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av intermediär typ.

Element 1, underelem. 2: Dråg, 3 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av intermediär typ.

Element 1, underelem. 3: Dråg, 2 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av intermediär typ.

Element 1, underelem. 4: Källdråg, 2 % av delobjektytan. Mjukmattekärr av starr-brunmosstyp.

Element 1, underelem. 5: Källa, 1 % av delobjektytan. Källkärr.

Element 1, underelem. 6: Dråg, 15 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av oligotrof typ.

Element 1, underelem. 7: Dråg, 15 % av delobjektytan. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 2: Dråg, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2, underelem. 1: Golv, 15 % av delobjektytan. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Element 2, underelem. 2: Golv, 10 % av delobjektytan. Fastm.kärr,tuvsäv-S.papillosum-compactumtyp.

Delobj. 2: Topogent kärr
52 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Tallkärr av klotstarrtyp.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Tallkärr av fattig vitmosstyp.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
27 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Mosseplan, 40 % av delobjektytan. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 1, underelem. 2: Mosseplan, 15 % av delobjektytan. Fastm.mosse av tuvull-S. angustifoliumtyp.

Element 1, underelem. 3: Mosseplan, 20 % av delobjektytan. Tallmosse av ristyp.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukm.mosse, vitag-kallgräs-S.balticumtyp.

Delobj. 4: Sumpskog
50 ha, mosaikartad fördelning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 1, underelem. 1: Golv, 30 % av delobjektytan. Sumpgranskog av lågörttyp.

Element 1, underelem. 2: Golv, 30 % av delobjektytan. Sumpgranskog av ristyp, skogsfräkenvariant.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2, underelem. 1: Golv, 35 % av delobjektytan. Sumpgranskog av lågörttyp.

Element 2, underelem. 2: Källdråg, 4 % av delobjektytan. Sumpgranskog av lågörttyp.

Element 2, underelem. 3: Källa, 1 % av delobjektytan. Källkärr.

Delobj. 5: Mad vid vattendrag
23 ha, öppet.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet. Strandsumpkärrtyp.

Element 2: Kantzon utmed å. Dvärgvassar.

Delobj. 6: Tjärn
1 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1, underelem. 1: Kantzon vid tjärn, 5 % av delobjektytan. Egentliga vassar saknas.

Element 1, underelem. 2: Kantzon vid tjärn, 5 % av delobjektytan. Flytbladsvegetation av gul näckrostyp.

Nr 202

20H 5C 01 (4622) KLASS 2
FRÅTTENRÅMYRAN 19 KM NO JUNSELE

Myrkomplex, 173 ha (154 ha våtm), 275 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Åsrygg i anslutning.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
87 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mad vid vattendrag
11 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Bäck, 15 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 3: Sumpskog
58 ha, fördelat på 5 ytor. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 2: Golv, 45 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 203

20H 5D 01 (4935) KLASS 3
RISMYRAN 20 KM NV JUNSELE

Myrkomplex, 72 ha (64 ha våtm), 280 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 39 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Element 3: Göl, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
10 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 25 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 45 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Flark, 30 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 3: Topogent kärr
17 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
10 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Sumpskog
16 ha, fördelat på 5 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 204

20H 5D 02 (3427) KLASS 3
STORMYRAN 19 KM NO JUNSELE

Myrkomplex, 107 ha (100 ha våtm), 270 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
23 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 15 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Flark, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 2: Topogent kärr
21 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 35 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
30 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 4: Topogent kärr
27 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark generell påverkan från dikning, stark lokal påverkan från odling i våtmarken.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Nr 205

20H 5E 01 (2604) KLASS 3
GULBÄCKS-STORMYRAN 22 KM NO JUNSELE

Myrkomplex, 54 ha (51 ha våtm), 310 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
26 ha, öppet. Stark lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
10 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 80 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
15 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Nr 206

20H 6B 01 (3722) KLASS 4
HAVSSVALGMYRAN 19 KM NO JUNSELE

Myrkomplex, 239 ha (229 ha våtm), 455 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Mycket starkt generellt påverkat av anslutande hyggen, dikning, vinterväg.

Nr 207

20H 6C 01 (3549) KLASS 1
STORMYRAN-ÄSSAN 4 KM N GULSELE

Myrkomplex, 270 ha (235 ha våtm), 270 m ö h. Flygb. -80.
Storomr A2.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården. Hölador.

Delobj. 1: Strång-flarkkärr
55 ha, öppet. Geovetenskapliga värden, zoologiska värden.

Element 1: Strång, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 50 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Flarkgöl, 30 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Topogent kärr
35 ha, fördelat på 7 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 3: Topogent kärr
60 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt. Mjukmatta.

Element 3: Vegetation utmed mindre vattendrag, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
38 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Strång, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 5: Mosse av nordlig typ
35 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Nr 208

20H 6C 02 (2025) KLASS 1
PELLEMYRAN M FL 4 KM NV GULSELE

Myrkomplex, 510 ha (415 ha våtm), 275 m ö h. Flygb. -80. Fält -93.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården. Mosaik med fastmark.

Delobj. 1: Strång-flarkkärr
55 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, öppet.
Geovetenskapliga värden, mosaik av vatten och fastmark, zoologiska värden.

Element 1: Strång, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Element 2: Flark, 70 % av delobjektytan, öppet. Lösbottenkärr av rik mossfattig typ.

Element 3: Flarkgöl, 5 % av delobjektytan. Egentliga vassar saknas. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Tjärn
15 ha, fördelat på 7 ytor.

Element 1: Kantzon vid tjärn, 5 % av delobjektytan. Dvärgvassar.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
75 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Mosseplan, 45 % av delobjektytan. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 1, underelem. 2: Mosseplan, 25 % av delobjektytan. Tallmosse av ristyp.

Element 1, underelem. 3: Mosseplan, 15 % av delobjektytan. Fastm.mosse av tuvull-S. angustifoliumtyp.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjektytan. Mjukm.mosse, vitag-kallgräs-S.balticumtyp.

Delobj. 4: Topogent kärr
70 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, öppet.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 1, underelem. 1: Golv, 65 % av delobjektytan. Mjukmattekärr, starr-S. fallax variant.

Element 1, underelem. 2: Golv, 20 % av delobjektytan. Mjukmattekärr, starr-S. fallax variant.

Element 2: Bäckdråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Gungfly, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 5: Limnogen strandsumpskog
20 ha.

Element 1: Bäck, 10 % av delobjektytan.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt. Strand-sumpkärrtyp.

Element 3: Vegetation utmed mindre vattendrag, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet. Sumpgranskog av lågörttyp.

Delobj. 6: Topogent kärr
75 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Golv, 5 % av delobjektytan. Granbjörkkärr av fattig vitmosstyp.

Element 1, underelem. 2: Golv, 15 % av delobjektytan. Tallkärr av intermediär vitmosstyp.

Element 1, underelem. 3: Golv, 60 % av delobjektytan. Tallkärr av klotstarrtyp.

Element 1, underelem. 4: Golv, 20 % av delobjektytan. Tallkärr av fattig vitmosstyp.

Delobj. 7: Sumpskog
25 ha, fördelat på 9 eller fler ytor.

Element 1: Mindre fläckar, skogbevuxet, barrskog.

Element 1, underelem. 1: Mindre fläckar, 35 % av delobjektytan. Sumpgranskog av lågörttyp.

Element 1, underelem. 2: Mindre fläckar, 65 % av delobjektytan. Sumpgranskog av ristyp.

Delobj. 8: Blandmyr av mosaiktyp
80 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Golv, 30 % av delobjektytan. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 1, underelem. 2: Golv, 5 % av delobjektytan. Fastmattekärr, taggstarr-S.angustifolium var.

Element 1, underelem. 3: Golv, 10 % av delobjektytan. Fastm.kärr,tuvsåv-S.papillosum-compactumtyp.

Element 2: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 3: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3, underelem. 1: Tuva, 5 % av delobjektytan. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 3, underelem. 2: Tuva, 5 % av delobjektytan. Fastm.mosse av tuvull-S. angustifoliumtyp.

Nr 209

20H 6C 03 (1347) KLASS 2
MYR VID ABBORRTJÄRNEN 2 KM N GULSELE

Myrkomplex, 90 ha (86 ha våtm), 270 m ö h. Flygb. -80. Storomr A2.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården.

Delobj. 1: Tjärn
2 ha, fördelat på 2 ytor.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
38 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 45 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Delobj. 3: Sträng-flarkkärr
6 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta. Övergångstyp kärr-mosse.

Element 2: Flark, 65 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Flarkgöl, 15 % av delobjektytan.

Delobj. 4: Mad vid sjö
12 ha, öppet. Svag generell påverkan från vattenreglering.

Delobj. 5: Topogent kärr
28 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet.

Nr 210

20H 6C 04 (4909) KLASS 3
STORMYRAN 17 KM NNO JUNSELE

Myrkomplex, 74 ha (71 ha våtm), 330 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
26 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 4: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
45 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Nr 211

20H 6D 01 (3130) KLASS 3
MÖRMYRAN, SILVERTJÄRNMYRAN MFL 22 KM NO JUNSELE

Myrkomplex, 140 ha (127 ha våtm), 290 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
25 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Flark, 45 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 3: Topogent kärr
16 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
26 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 5: Blandmyr av mosaiktyp
37 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning, odling i våtmarken.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Öar, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 6: Sumpskog
13 ha.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Nr 212

20H 7A 01 (4025) KLASS 1
STORMYRAN-ÅKERBRÄNNA 17 KM NV GULSELE

Myrkomplex, 620 ha (580 ha våtm), 365 m ö h. Flygb. -78.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården. Höjdskillnad 50-100 m.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
105 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Geovetenskapliga värden, zoologiska värden.

Element 1: Sträng, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 60 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Flarkgöl, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr
110 ha, fördelat på 8 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 69 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Källa, 1 % av delobjektytan.

Element 3: Bäckdråg, 5 % av delobjektytan. Mjukmatta-lösbotten.

Element 4: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
205 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, vintervåg.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
20 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 5: Blandmyr av mosaiktyp
60 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Golv, 45 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 3: Sträng, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 6: Obestämbar myr
20 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark generell påverkan från dikning, stark lokal påverkan från väg.

Nr 213

20H 7A 02 (1149) KLASS 3
LILLFLON, STORFLON 20 KM N JUNSELE

Kärrkomplex, 66 ha (63 ha våtm), 385 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
30 ha, öppet. Svag generell påverkan från anslutande hyggen, svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
20 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Sträng, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Flark, 35 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
13 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag generell påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 214

20H 7A 03 (1721) KLASS 3
MYR V BRATTMYRAN 21 KM N JUNSELE

Myrkomplex, 103 ha (91 ha våtm), 435 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Naturskog i eller i anslutning.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
32 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
59 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Nr 215

20H 7A 04 (1039) KLASS 3
MYR VID FÖRELTJÄRNEN 20 KM N JUNSELE

Myrkomplex, 152 ha (119 ha våtm), 365 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
29 ha, mosaikartad fördelning, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Bäck, 5 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
60 ha, mosaikartad fördelning, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
32 ha, mosaikartad fördelning, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Tjärn
7 ha, fördelat på 4 ytor.

Nr 216

20H 7B 01 (1313) KLASS 4
NÄVERNÄSAMYRAN 21 KM NNO JUNSELE

Myrkomplex, 107 ha (105 ha våtm), 435 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Mycket starkt generellt påverkat av anslutande hyggen, dikning.

Nr 217

20H 7B 02 (0840) KLASS 2
ÖVER-HÖMYRAN, NYCKELMYRAN 21 KM NNO JUNSELE

Myrkomplex, 166 ha (138 ha våtm), 360 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
51 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från vintervåg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Bäckdråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
38 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Strängblandmyr
12 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
37 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, vinterväg.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Tjärn
1 ha.

Nr 218

20H 7B 03 (3438) KLASS 3
KVARNMYRAN 23 KM NNO JUNSELE

Våtmarkskomplex, 93 ha (83 ha våtm), 285 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
24 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från deposition från dike.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta. Diffus strängbildning.

Element 2: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
34 ha, fördelat på 8 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Mad vid vattendrag
29 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 66 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Gräs/starrvegetation.

Element 3: Bäck, 0 % av delobjektytan.

Nr 219

20H 7C 01 (1535) KLASS 1
SÖNNERSTMYRAN M FL 7 KM N GULSELE

Våtmarkskomplex, 330 ha (280 ha våtm), 270 m ö h. Flygb. -80. Fält -93. Storomr A2. Det: Stefan Grundström. Riksintresse för naturvården. Slingrande vattendrag.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
12 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Element 2: Flark, 60 % av delobjektytan, öppet. Lösbottenkärr av intermediär typ.

Delobj. 2: Topogent kärr
50 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt. Risvegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Golv, 55 % av delobjektytan. Tallkärr av klotstarrtyp.

Element 1, underelem. 2: Golv, 30 % av delobjektytan. Granbjörkkärr av fattig vitmosstyp.

Element 2: Golv, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt. Tallkärr av brunmossrik typ.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
60 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 88 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 3: Göl, 2 % av delobjektytan.

Delobj. 4: Tjärn
9 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Gungfly, 20 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 1, underelem. 1: Gungfly, 10 % av delobjektytan. Strand-sumpkärrtyp.

Element 1, underelem. 2: Gungfly, 5 % av delobjektytan. Mjukmattekärr, starr-S. fallax variant.

Element 1, underelem. 3: Gungfly, 5 % av delobjektytan. Fastm.mosse av tuvull-S. angustifoliumtyp.

Delobj. 5: Sluttande mosse
27 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 6: Sumpskog
30 ha, fördelat på 6 ytor. Stark lokal påverkan från avverkning, svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, skogbevuxet.

Element 1, underelem. 1: Golv, 48 % av delobjektytan. Sumpgranskog av ristyp.

Element 1, underelem. 2: 50 % av delobjektytan. Sumpgranskog av lågörttyp.

Element 1, underelem. 3: Golv, 2 % av delobjektytan. Sumpbjörkskog av ris-gråstyp. Området har slåtterhävdats.

Delobj. 7: Topogent kärr
45 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 57 % av delobjektytan, öppet. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Element 2: Gungfly, 40 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 2, underelem. 1: Golv, 30 % av delobjektytan. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 2, underelem. 2: Golv, 10 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av oligotrof typ.

Element 3: Gungfly, 3 % av delobjektytan. Mjukm.kärr, starr-S.fallax-subsecundum var.

Delobj. 8: Limnogen strandsumpskog
35 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 75 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Sumpgranskog av lågörttyp.

Element 2: Bäck, 5 % av delobjektytan.

Element 3: Vegetation utmed mindre vattendrag, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog.

Nr 220

20H 7C 02 (1547) KLASS 2
LÅNGMYRAN 7 KM N GULSELE

Myrkomplex, 70 ha (68 ha våtm), 280 m ö h. Flygb. -80.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
9 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 2: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mindre fläckar, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Kantzon, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
20 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 5: Sumpskog
7 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv, skogbevuxet.

Nr 221

20H 7C 03 (4001) KLASS 3
TOKBERGSMYRAN 25 KM NNO JUNSELE

Myrkomplex, 50 ha (47 ha våtm), 310 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
17 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Flark, 25 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
30 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, väg.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta-mjukmatta.

Nr 222

20H 7D 01 (2015) KLASS 2
RÄVELMYRAN 25 KM NO JUNSELE

Myrkomplex, 107 ha (104 ha våtm), 290 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Strång-flarkkärr
23 ha, öppet.

Element 1: Strång, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Flark, 40 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
36 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
13 ha, öppet.

Element 1: Strång, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 60 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
26 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Golv, 39 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Bäck, 1 % av delobjektytan, öppet.

Nr 223

20H 7E 01 (1535) KLASS 1
NYMYRAN 30 KM NO JUNSELE

Myrkomplex, 261 ha (225 ha våtm), 290 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Höjd vattennivå genom dämning, väsentlig del ansluter till större vattendrag.

Delobj. 1: Topogent kärr
38 ha, fördelat på 5 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strångbildning.

Delobj. 2: Strång-flarkkärr
22 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Strång, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 45 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Flark, 35 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 3: Topogent kärr
24 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
68 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 5: Mosse av nordlig typ
22 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Strång, 40 % av delobjektytan, öppet. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 50 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 6: Strångblandmyr
12 ha, öppet.

Element 1: Strång, 25 % av delobjektytan, öppet. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 60 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 3: Flarkgöl, 15 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 7: Mad vid vattendrag
22 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation.

Delobj. 8: Mad vid sjö
23 ha, öppet. Stark generell påverkan från dämning, vattenreglering.

Element 1: Gungfly, 90 % av delobjektytan, öppet.

Element 2: Lagun, 10 % av delobjektytan, öppet.

Nr 224

20H 8A 01 (4815) KLASS 2
HOMMELMYRAN 29 KM N JUNSELE

Myrkomplex, 139 ha (122 ha våtm), 515 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Terrängföljande våtmark.

Delobj. 1: Topogent kärr
22 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Soligent kärr
15 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
40 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 4: Sluttande mosse
13 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Strång, 10 % av delobjektytan, öppet. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 5: Blandmyr av mosaiktyp
32 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 225

20H 8A 03 (1827) KLASS 3
STORBACKMYRAN 26 KM N JUNSELE

Våtmarkskomplex, 136 ha (129 ha våtm), 325 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
28 ha, fördelat på 6 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Strång, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Flark, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
62 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Mad vid vattendrag
12 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Videvegetation.

Element 3: Bäck, 5 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 4: Sumpskog
27 ha, fördelat på 5 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 3: Bäck, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 226

20H 8B 04 (2526) KLASS 3
ÄXINGLUNDSMYRORNA 27 KM NNO JUNSELE

Myrkomplex, 161 ha (138 ha våtm), 405 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
12 ha, öppet.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 22 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Göl, 3 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Strång-flarkkärr
21 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Strång, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 28 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Flark, 50 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 4: Flarkgöl, 2 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Topogent kärr
27 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Bäck, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Permanent öppet vatten.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
53 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, anslutande dikning.

Element 1: Mosseplan, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 20 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 5: Blandmyr av mosaiktyp
26 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, anslutande dikning.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Öar, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Nr 227

20H 8B 05 (0317) KLASS 2
ÅBROMYRAN, ORRMYRAN, TJÄRNMYRAN 25 KM N JUNSELE

Myrkomplex, 233 ha (194 ha våtm), 290 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
37 ha, fördelat på 5 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
10 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
42 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
82 ha, fördelat på 5 ytor, öppet.

Element 1: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 5: Mad vid vattendrag
17 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Bäck, 20 % av delobjektytan, öppet. Slingrande vattendrag.

Delobj. 6: Sumpskog
10 ha.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 228

20H 8C 03 (0535) KLASS 3
KOJMYRAN 25 KM NV JUNSELE

Myrkomplex, 61 ha (59 ha våtm), 430 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
22 ha, skogsbevuxet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
13 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
24 ha, öppet.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Sträng, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 229

20H 8D 02 (0505) KLASS 1
STORMYRAN 26 KM NO JUNSELE

Myrkomplex, 245 ha (236 ha våtm), 350 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Höjdskillnad 50-100 m.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
17 ha, fördelat på 6 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 45 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Flark, 30 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Soligent kärr
20 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Öar, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
29 ha, mosaikartad fördelning, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
64 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 5: Blandmyr av mosaiktyp
54 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från odling i våtmarken.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Sträng, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 6: Sumpskog
52 ha, fördelat på 4 ytor.

Nr 230

18H 6D 03 (1603) Klass 3
RACKARMYRTJÄRNARNA 16 KM SO GRANINGE

20 ha, 365 m ö h. Flygb -86.

Ingår i naturvårdsplan.
Blandmyr med flera mindre tjärnar, klass III i myrskogsinventeringen.

Källa: Simonsson & Dynesius 1980.

Nr 231

19G 2J 01 (2313) Klass 3
BAKÅMYRAN 5 KM V HELGUMS K:A

20 ha, 245 m ö h. Flygb -86.

Ingår i naturvårdsplan.
Intermediärt kärr med rik förekomst av Kung Karls spira.

Källa: Fryleskog & Viotti 1981.

Nr 232

19G 3I 02 (4204) Klass 3
BODFLON-LÅNGMYRAN 13 KM NV HELGUMS K:A

48 ha, 270 m ö h. Flygb -86.

Ingår i naturvårdsplan.
Myrområde av rikkärrskaraktär med flera orkidéarter och glesgröe.

Källa: Fryleskog & Viotti 1981, Berg & Öhrling, Hotade skogsväxter 1988.

Nr 233

19G 7D 02 (0807) Klass 3
KÄLLMYRAN 7 KM SV LUNGSJÖN

12 ha, 475 m ö h. Flygb -86.

Ingår i naturvårdsplan.
Myr med ovanligt väl utbildade källor med rikt differentierad vegetation.

Källa: Björkbäck 1970.

Nr 234

19G 7D 03 (0517) Klass 3
MYR VID BITARBÄCKEN 6 KM SV LUNGSJÖN

16 ha, 460 m ö h. Flygb -86

Ingår i naturvårdsplan.
Rikkärr med källkärr och förekomst av ängs- och sumpnycklar, niprör, finbräk och kransrams.

Källa: Berg & Öhrling, Hotade skogsväxter 1988.

Nr 235

19G 7D 04 (0633) Klass 3
MYR 1,5 KM V STOR-HOCKSJÖN 5 KM SV LUNGSJÖN

2 ha, 435 m ö h. Flygb -86.

Ingår i naturvårdsplan.
Utdikat rikkärr med förekomst av Kung Karls spira och myrstarr.

Källa: Mascher 1990, Ångermanlands flora.

Nr 236

19G 9C 02 (4224) Klass 3
BODFLON 21 KM V RAMSELE

20 ha, 300 m ö h. Flygb -86.

Ingår i naturvårdsplan.
Rikkärr med förekomst av trådfräken, huvudstarr, brudsporre och guckusko.

Källa: Mascher 1990, Ångermanlands flora.

Nr 237

19G 6F 02 (3637) Klass 3
ELDSJÖ-STORFLON 8 KM V EDSELE

35 ha, 275 m ö h. Flygb -86.

Ingår i naturvårdsplan.
Mosse och mindre kärr med myrbräcka.

Källa: Fältbesökt av Per Simonsson 1979.

Nr 238

19G 8F 02 (4748) Klass 3
TJÄRNMYRAN 5 KM SV RAMSELE

12 ha, 285 m ö h. Flygb -86.

Ingår i naturvårdsplan.
Liten myr med kalkkrävande arter som ängsnycklar och brudsporre.

Källa: Mascher 1990, Ångermanlands flora.

Nr 239

19G 9F 02 (1414) Klass 3
BODMYRAN 7 KM VSV RAMSELE

15 ha, 290 m ö h. Flygb -86.

Ingår i naturvårdsplan.
Liten dikad myr med rikare flora, bl a ängsnycklar och brudsporre m fl kalkkrävande arter.

Källa: Mascher 1990, Ångermanlands flora.

Nr 240

19G 9G 01 (1313) Klass 3
LÅNGMYRAN 2,5 KM SV RAMSELE

8 ha, 280 m ö h. Flygb -86.

Ingår i naturvårdsplan.
Liten trädbevuxen myr med rikkärrsflora. Flera orkidéarter bl a blodnycklar, sumpnycklar och brudsporre.

Källa: Mascher 1990, Ångermanland flora.

Nr 241

19H 1E 01 (0708) Klass 3
LITEN MYR 3 KM SV SOLLEFTEÅ

3 ha, 275 m ö h. Flygb -86.

Ingår i naturvårdsplan.
Litet rikt myrstråk och sumpskog med skogsfru, skogsnycklar, tvåblad och trådfräken.

Källa: Guvå 1971, Mascher 1990, Ångermanlands flora.

Nr 242

20G 1D 03 (0704) Klass 3
MYR V LÅNGTJÄRNEN 1 KM NV STOR-FINNFORSE

2 ha, 280 m ö h. Flygb -86.

Ingår i naturvårdsplan.
Rikblandmyr med arter som sumpnycklar, brudsporre och huvudstarr.

Källa: Lindström & Simonsson 1977.

Nr 243

20G 1D 04 (1012) Klass 3
SLOCKBERGSTJÄRNEN 1 KM N STOR-FINNFORSE

10 ha, 280 m ö h. Flygb -86.

Ingår i naturvårdsplan.
Ängskärr och små öppna rikkärr med arter som guckusko sumpnycklar, tagelstarr och dvärgtätört.

Källa: Lindström & Simonsson 1977.


Nr 244

20H 0D 03 (4036) Klass 3
MYR 1 KM SSV ÖVERÅ 20 KM SO JUNSELE

8 ha, 255 m ö h. Flygbild -86.


Ingår i naturvårdsplan.
Botaniskt intressant myr med rikare flor och arter som ängsnycklar och sumpnycklar.

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN



Myr V Lotsberget. nr 1

Värdeklass I
Geokod 18I 8I 3D1D
Areal 2 ha
Flygbild 1987
Höh 35 m
VMI-nr 18I 8I01
Naturvårdsobjekt N84 016
Fältbesökt 1992-07, Ruben Fryleskog.



Litet *kärr* i en nord-syd orienterad dalgång väster om Lotsberget på N Ulvöns sydligaste del. Övre delen är svagt sluttande och med en gråalsbård mot fastmarken samt rik vattenklövervegetation i de våtare delarna. Stora fastmattetuvor, med vitmossor och björnmossa samt mindre gråalar, förekommer glest på kärrgolvet. Lokalen ligger sannorlikt på skalgrusunderlag. Kärret hyser ett mindre bestånd av det hotklassade (hotkategori 2) knottblomstret. I anslutande sumpskog/fuktig skogsmark växer också skogsfru (hotkategori 4) samt stor låsbräken (hotkategori 2).

Bedömning: Kärrets höga värde utgörs av dess förekomst av knottblomster samt andra hotklassade arter i anslutning.


Källa: Berg, I. & Öhrling, H. 1988. Hotade skogsväxter i Ångermanland, rapport 1988:1. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Löfroth, M. 1993. Knottblomster, status och utbredning i Sverige. Svensk botanisk tidskrift. 87:133-143. Lund.

Mascher, J. W. 1990. Ångermanlands flora. SBT-redaktionen, Lund.

Myr V Bölesberget. nr 2

Värdeklass I
Geokod 18I 8I 4D3B
Areal 3 ha
Flygbild 1987
Höh 45 m
VMI-nr 18I 8I02
Naturvårdsobjekt N84 285
Fältbesökt 1992-07, Ruben Fryleskog.



Litet långsträkt *kärr* V Bölesberget på N Ulvöns södra hälft. Kärret är ett smalt och svagt sluttande vattenklöverkärr med ojämt förekommande tuvor. Kärret är källpåverkat och detta är särskilt tydligt i den mellersta delen. Norra delen utgörs av ett fastare, lågtuvigt kärr med bl a gräsull och jungfru marie nycklar. Kärret hyser ett mycket kraftigt bestånd av det hotklassade (hotkategori 2) knottblomstret. Vid ett fältbesök sommaren 1992 noterades 248 exemplar, varav 179 blommande.

Bedömning: Kärrets höga värde motiveras av det mycket stora beståndet av knottblomster.

Källa: Löfroth, M. 1993. Knottblomster, status och utbredning i Sverige. Svensk botanisk tidskrift. 87:133-143. Lund.

Stormyran-Ulvön. nr 3

Värdeklass II
Geokod 18I 9J 2A2F
Areal 12 ha
Flygbild 1987
Höh 20 m
VMI-nr 18I 9J01
Naturvårdsobjekt N84 012
Fältbesök Jan W Mascher.



Myren är belägen 1 km söder om Sandvikens fiskeläger, mycket nära havet, på norra Ulvön. Myren omfattar tre, något åtskilda, öppna partier som avvattnas åt söder ut i havet. Myren upptas av öppna *topogena kärr* samt till mindre del av glest tallbevuxen *svagt välvd mosse*. De topogena kärren utgörs till stora delar av gungflyområden.


Vegetation och flora: Myrens gungflypartier uppvisar en för de kustnära myrarna karaktäristisk dybottenflora, typ medelrikkärr. Lokalen hyser ångermanlands rikaste förekomster av brunag, myggblomster och småsileshår. Myggblomstret har här noterats i tusental på myrens gungflyn. Gräsull och ängsnycklar växer även på myren.

Bedömning: Stormyrans hyser en för de kustnära myrarnas gungflyn karaktäristisk vegetation. Detta tillsammans med att den är helt opåverkad motiverar dess höga värde.

Källa: Mascher, J W. 1990. Ångermanlands flora. SBT-redaktionen, Lund.

Myr vid Bärmsjötjärnen. nr 7

Värdeklass II
Geokod 19H 5H 3C9G
Areal 75 ha
Flygbild 1986
Höh 324 m
VMI-nr 19H 5H01
Naturvårdsobjekt N84 182
Fältbesökt 1979-06, Per Simonsson.



Myrkomplex beläget strax V om Bärmsjöns nordspets. Myren avvattnas åt O ner i sjön samt åt S av två mindre vattendrag. Mitt i området ligger Bärmsjö*tjärnen*. Öster om denna vidtar ett stort öppet *topogent kärr* vars centrala delar utgörs av ett *sträng-flarkkärr*. Här förekommer såväl fastmattor som mjukmattor och fastmattesträngar med mellanliggande mjukmatte- och lösbottenflarkar. Kanten mot fastmarken upptas av en smal bård med *skogskärr*. Söder om det öppna kärret samt i en smal sträng åt NV vidtar huvudsakligen öppen *blandmyr*. Myrens S och V delar utgörs av glest tallbevuxen *nordlig mosse*.

Vegetation och flora: Bården med tallkärr längs myrens östra kant domineras i fältskitet av klotstarr. De öppna fastmattorna utanför domineras av tuvsäv och tuvull. De blöta mjukmattorna och lösbottenpartierna utgörs av gles högstarrvegetation samt rikligt med dystarr, vitag och ängsull.

Fauna: Värdeklass IV i myrfågelinventeringen med arter som grönbena, enkelbeckasin och gulärla.


Påverkan: Myren är hydrologiskt intakt och omges helt av äldre skog. En stor kraftledning passerar diagonalt genom områdets N del. I S gränsar en mindre del mot äldre odlingar.

Bedömning: Mindre myrkomplex som är hydrologiskt opåverkat. En stor centralt belägen tjärn, stora öppna kärrytor samt sträng-flarkkärr utgör myrens intressantaste element. Myren har också ett visst ornitologiskt värde.

Källa: Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Myr vid Övervattnet. nr 9

Värdeklass II
Geokod 19H 5I 2C7H
Areal 118 ha
Flygbild 1986
Höh 325 m
VMI-nr 19H 5I02
Naturvårdsobjekt N84 355




Myren är belägen en km öster om Bärmsjön och omsluter Övervattnet på dess nordsida. Avvattningen sker ner i Övervattnet samt via en liten bäck därifrån ner i Bärmsjön. Myren innehåller ett par större fastmarksholmar och har en mycket flikig utsträckning. I anslutning till Övervattnet och en långsträckt *tjärn* strax norr därom finns *topogena kärr*. Vid utloppet i V finns gungflypartier som kantar en del av bäcken men i övrigt dominerar fastmattor. Större delen av myren domineras av *blandmyrar* av mosaiktyp som alternerar med *nordlig mosse*. Längst i norr finns ett par mindre öppna vattenytor som troligen utgörs av igenväxta tjärnar.

Påverkan: Hyggen förekommer på anslutande fastmark och ett körspår leder över myren. Inverkan på hydrologin är dock mycket obetydlig och objektet kan sägas vara ostört.

Bedömning: Tämligen variationsrik hydrologiskt intakt myr med mycket flikig utsträckning och representativa myrtyper.

Frättnet. nr 14


Värdeklass II
Geokod 19H 7H 1A0A
Areal 112 ha
Flygbild 1986
Höh 280 m
VMI-nr 19H 7H01
Naturvårdsobjekt N84 183
Fältbesökt 1979-06, Mats Dynesius; 1980, Jan W. Mascher.



Våtmarkskomplex som utgörs av ett sedan gammalt överdämt myrområde invid Hermansjöån samt ej dämningspåverkade delar norr därom. Längs ån och ett mindre vattendrag som mynnar i denna sträcker sig *strandkärr*. Utanför dessa finns *flytande vegetation* som bildar flytande öar av mossa och starr. Mellan dessa och i strandkärren finns öppna vattenytor och laguner och området utgör en mosaik mellan vegetationsbeväxta partier och klarvattenytor. Norr om det dämda området finns ett område som domineras av glest trädbevuxna *blandmyrar* och ett flertal fastmarksholmar. Här finns också ett par mindre partier med *topogent kärr* samt en liten *tjärn*.

Vegetation och flora: Områdets centrala delar längs ån domineras av blöta högstarrkärr. På gungflypartierna ute i ån/dammen växer rikligt med myrull. I kanterna mot fastmarken, framför allt i väster, finns lågstarrpartier samt små mossepartier.

Fauna: Värdeklass II i myrfågelinventeringen med arter som vigg, gräsand, trana, gluttsnäppa, drillsnäppa, grönbena, gulärla och videsparv.



Drillsnäppa

Påverkan: En större kraftledning tangerar området i väster och fastmarken norr om området utgörs av hyggen. Dammen är förfallen och ej längre i bruk och vattenytan sjunker och glasbjörk vandrar in.


Bedömning: Ovanlig typ av våtmarkskomplex, med omfattand gungflyn, som till stor del fått sitt utseende genom tidigare dämmnings påverkan. Området har ornitologiska kvalitéer samt hyser ett rikt bestånd av myrull.

Källa: Mascher, J. W. 1990. Ångermanlands flora. SBT-redaktionen, Lund.

Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Myr vid Långtjärnen. nr 24

Värdeklass I
Geokod 19H 9G 0D0G
Areal 107 ha
Flygbild 1986
Höh 285 m
VMI-nr 19H 9G01
Naturvårdsobjekt N84 356




Myren är belägen ca 10 km V Hällvattnet och sträcker sig från Stor-Husjön åt NV uppmot Stor-Öringsjön. Området sluttar svagt åt söder och avvattningen sker från denna del av objektet via en bäck åt NV och vidare via flera vattendrag ut i Storsjön. En stor långsträckt fastmarksholme ligger mitt i myren och strax Ö om denna ligger Lång*tjärnen*. Från denna rinner en liten bäck ner mellan fastmarksholmar och förenar sig med bäcken som avvattnar Stor-Husjön. I anslutning till bäcken och sjön finns mindre arealer med öppet *topogent kärr*. Denna södra hälft av myren domineras annars av *skogskärr* och *nordlig mosse*. Den N delen karaktäriseras av en vackert utbildad *strängblandmyr* där mossesträngar alternerar med fast- och mjukmatteflarkar samt flarkgölar. Här ligger också ett öppet topogent kärr.

Påverkan: Myren är helt opåverkad men avgränsas av en väg i norr.

Bedömning: Tämligen variationsrikt myrkomplex med representativa myrtyper. Här finns bl a en vackert utbildad strängblandmyr. Myren är helt orörd.

Myr/skogsmosaik runt Bryngebodarna. nr 29

Värdeklass I
Geokod 19I 2D 0C8G
Areal 120 ha
Flygbild 1992
Höh 290 m
VMI-nr 19I 2D02
Naturvårdsobjekt N84 357




Myr/skogsmosaik belägen på Selshöjdens V-sluttning ner mot Stor-Degersjön. Området lämnar sitt vatten ner i Stor-Degersjön delvis via en liten bäck som rinner ner genom sluttningen. Längst ner i V ligger Långmyran som utgörs av öppna *topogena kärr*, huvudsakligen fastmattor. Från Långmyran och upp i sluttningen är området en mosaik av *skogskärr, sumpskog* och fastmarksskog. Skogskärr och sumpskog utgörs av både barr- och blandskog. Skogen är av naturskogskaraktär.

Påverkan: Mitt i området på en fastmarksholme ligger Bryngebodarna, en välbevarad liten öppen fäbod med några hus. Ett längre dike löper i fallriktningen i O delen och även i norr finns diken. Dikena har dock endast svag lokal inverkan. Området gränsar i söder och till mindre del i norr mot hyggen.

Bedömning: Vacker myr/skogsmosaik med obetydligt påverkad hydrologi. Skogen har naturskogskaraktär och mitt i området finns en välbevarad fäbod. Ostörda och ej avverkade områden av denna typ är mycket ovanliga i länet varför området representerar ett mycket högt värde.

Degelmyran. nr 31


Värdeklass I
Geokod 19I 2H 3E5J
Areal 30 ha
Flygbild 1988
Höh 155 m
VMI-nr 19I 2H01
Naturvårdsobjekt N84 358



Degelmyran ligger i norra delen av Höga kusten, drygt tre km N om Köpmanholmen och nära havet. Myren avvattnas åt norr samt åt söder. En *koncentrisk mosse* med radiärt utbildade strängar, mjukmattehöljor, randskog och en mjukmattelagg dominerar myren. Ett tallbevuxet plan med *nordlig mosse* och med inslag av kärrfönster sträcker sig ut från fastmarken i norr.

Påverkan: Sånär som på en kraftledning som passerar över objektet är myren helt ostörd.


Bedömning: Hydrologiskt intakt mossekomplex som domineras av en vackert utbildad koncentrisk mosse. Degelmyran utgör en vacker representant för denna i länet ovanliga myrtyp.



Tretåig hackspett

Björnböles-Stormyran. nr 33

Värdeklass I
Geokod 19I 3D 2B4G
Areal 211 ha
Flygbild 1986
Höh 260 m
VMI-nr 19I 3D01
Naturvårdsobjekt N84 116
Fältbesökt 1970, Folke Björkbäck;
1979-06, Tomas Rydkvist;
1993-08, Sören Uppsäll.



Björnböles-Stormyran utgör ett större myrkomplex beläget på en platå NV om Hinnsjön. Myren karaktäriseras av ett stort öppet mittparti och ett flertal myrarmar som sträcker sig ut från detta. Den centrala delen är i stort plan medan armarna sluttar, främst de södra. Myren avvattnas åt söder ner i Hinnsjö samt åt norr via Djupbäcken ner i Grätnäsån. Mittpartiet utgörs centralt av *topogent kärr*. Här förekommer både fast- och mjukmattor samt partier med låga fastmattesträngar och mjukmatte/lösbottenflarkar. Längre ut mot kanterna övergår kärret i *blandmyr*, bitvis som tydligt utbildad öblandmyr. Längst i norr ligger ett större öppet parti med *nordlig mosse*. Strax SO om detta finns en långsmal *tjärn*. Armarna som sträcker sig ut från mittpartiet är till stora delar trädbevuxna och utgörs av *skogskärr*, mindre delar med *sumpskog* samt även blandmyr och nordlig mosse. Hela objektet omges av äldre skog.

Vegetation och flora: Vegetationen är uteslutande av fattig typ. Det topogena kärrets strängar domineras av tuvsäv och Sphagnum papillosum och flarkarna av kallgräs och S. compactum samt Cladopodiella fluitans. S. majus och S. tenellum förekommer också. Dessa arter i olika konstellationer dominerar även övriga delar av de öppna kärren, vilka som helhet är mycket artfattiga. Blandmyrarnas golv utgörs av S. balticum i botten och tuvsäv och dystarr i fältskiktet. Skogskärren är övervägande tallkärr med klotstarrdominans. Mossarna utgörs av risdominerade plan med hjortron och S. fuscum, fastmattehöljor med tuvull och S. angustifolium, mjukmattehöljor med S. baltikum samt mjukmattedråg med S. majus och S. cuspidatum. Sumpskogen utgörs av grandominerad fattig ristyp, hjortronvariant.

Fauna: Myren utgör värdeklass I i myrfågelinventeringen med arter som smålom, trana, grönbena, tofsvipa och storspov.

Påverkan: Nydragna skogsbilvägar tangerar myren i N samt skär av myrens sydligaste arm. Spår av äldre (>70 år) dimensionsavverkningar, i form av stubbar, finns runt hela myren samt även ute på denna. Totalt sätt är dock myren i stort opåverkad.


Bedömning: Björnböles-Stormyran är ett stort terrängföljande myrkomplex med stora öppna centrala partier. Myrens storlek och relativa orördhet är kriterier som är ovanliga i denna del av länet. Ornitologska värden bidrar ytterligare till det totala värdet.

Källa: Björkbäck, F. 1970. Preliminär förteckning över särskilt skyddsvärda myrar i Västernorrlands län. Stecil vid länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Pigtjärnmyran. nr 34

Värdeklass II
Geokod 19I 4B 0A9H
Areal 73 ha
Flygbild 1992
Höh 315 m
VMI-nr 19I 4B01
Naturvårdsobjekt N84 359




Pigtjärnmyran är belägen tre km S Degersjön och sträcker sig från Pigtjärnen upp i en smalare dalsänka åt NV. Myren lämnar sitt vatten norrut, via en liten bäck som flyter i kanten av objektet, ner till Degersjön. I södra delen sänder myren iväg ett utskott åt V som utgörs av *mosaikblandmyr* med fastmattegolv och mindre mosseplan. Annars domineras södra delen av ett öppet *topogent kärr*. Myrens mellesta del upptas av en mosaik mellan tallbevuxen *nordlig mosse* och *skogskärr* med tall. Norra delen utgörs av öppna topogena kärr med gungflypartier kring en igenvuxen tjärn. Mot fastmarken finns här skogskärr samt mindre plan med nordlig mosse.

Påverkan: Myren är hydrologiskt opåverkad men hyggen ansluter och i norr tangerar en skogsbilväg.

Bedömning: Hydrologiskt helt ostörd myr med representativa myrtyper och med inslag av gungflypartier.

Storladumyran, Grönmyran, Sönnerstmyran. nr 36

Värdeklass II
Geokod 19I 7B 2B4J
Areal 127 ha
Flygbild 1992
Höh 205 m
VMI-nr 19I 7B01
Naturvårdsobjekt N84 360




Våtmarkskomplexet ligger strax N om Uvsjön ca åtta km SV Bredbyn. Området ligger på vattendelaren mellan Nätraån och Moälven och avvattnas följdaktligen åt både S och N. Myren har en mycket flikig utsträckning och utgörs egentligen av flera centralt förenade myrarmar. Längst i S finns öppna topogena kärr av mjuk- och fastmattetyp kring en igenväxande tjärn och längs en mindre bäck. Öppna *topogena kärr* återfinns även annorstädes i form av mjukmattedråg och även som bäckdråg. I övrigt kännetecknas myren av att de centralare partierna utgörs av *skogskärr* med *sumpskog* mot fastmarken. En liten *tjärn* finns också längst i öster.

Påverkan: Diken förekommer på några ställen i övergången mot fastmarken och en skogsbilväg utgör gräns i söder. Myrens S del, längs bäcken och den igenväxande tjärnen, har kalkats 1987 inom ramen för projekt Uvsjön.

Bedömning: Obetydligt påverkat våtmarkskomplex med en mycket flikig kontur och dominerat av trädbevuxna våtmarkstyper. Till områdets höga värde bidrar de stora arealerna med sumpskog.

Sörflärkesmossen. nr 43

Värdeklass I
Geokod 19J 5C 0C5H
Areal 13 ha
Flygbild 1988
Höh 55 m
VMI-nr 19J 5C01
Naturvårdsobjekt N84 100
Fältbesökt 1976-07, Thomas Arnnström, Arne Holgersson & Bengt Söderberg.



Mossen är belägen strax S om Sörflärke by, SV Husum och endast tre km från kusten. Avvattningen sker åt O via en liten bäck ner i Flärkån som mynnar i havet. Sörflärkesmossen är en *koncentriskt välvd mosse* med välutvecklat laggkärr, kantskog och mosseplan. Centralt på det öppna planet finns mjukmattehöljor samt ett par stora höljgölar. Längst i O finns ett *dikat kärr* som tidigare utgjort en del av laggkärret med som nu är skogsbevuxet.

Vegetation och flora: Mosseplanet domineras av ristuvvegetation samt fastmattor med Sphagnum balticum, S. tenellum och S. rubellum. Tuvsäv och tuvull upptar fältskiktet. I höljornas lösbottnar dominerar Sphagnum cuspidatum och Warnstorfia fluitans. I mjukmattorna minskar den senare och S. balticum och S. tenellum kommer in. Fältskiktet är alltid glest med tuvull, dystarr, kallgräs, vitag och storsileshår. Kantskogen utgörs av fyra m höga tallar med ljung, dvärgbjörk och skvattram i fältskiktet samt S.fuscum i botten. Laggens fastmattor karaktäriseras av S. papilosum och tuvsäv. Mjukmattorna är av högstarrtyp med flaskstarr och ängsull samt S.fallax.

Påverkan: SO delen av laggkärret är utdikat och till följd av det skogsbeväxt och i N delen av kantskogen finns en mindre torvtäkt. Den koncentriska mossens hydrologi är dock tämligen intakt.


Bedömning: Sörflärkesmossen är en av Sveriges nordligaste koncentriskt välvda mossar och dessutom mycket tydligt strukturerad. Detta förhållande gör att myren tjänar som ett mycket gott exempel på en högmosse vilket motiverar dess höga värde.

Källa: Björkbäck, F. 1970. TELMA (IBP). Preliminär förteckning över särskilt skyddsvärda myrar i Y län. Stencil vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Arnström, T., Holgersson, A. & Söderberg, B. 1977. Fem myrar i Västernorrlands län - vegetationsinriktad naturinventering, rapport 1977:9. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Sjutjärnsmyran. nr 48

Värdeklass I
Geokod 19J 7B 1D5J
Areal 64 ha
Flygbild 1988
Höh 100 m
VMI-nr 19J 7B01
Naturvårdsobjekt NR84 232
Fältbesökt 1982-07, Karin Due & Marie Muhr.



Mindre mossekomplex beläget NV om Husum och precis S om Örnsköldsviks flygplats. Myren är som helhet plan och avvattnas huvudsakligen åt O och S. Två partier med strängad *svagt välvd mosse* ger karaktär åt myren. Mossesträngarna innesluter bitvis stora mjukmatte- och lösbotten-

höljor. Det O av dessa innehåller en stor mängd större och mindre gölar. Mellan dessa båda mossepartier finns *topogent kärr* i form av ett golv med fast- och mjukmattor. Mot fastmarken längst i N samt med ett mindred partie i söder förekommer glest tallbevuxna *nordliga mossar*. Myren utgör riksintresse för naturvård.

Vegetation och flora: Myren domineras av uteslutande fattig vegetation. De glest tallbevuxna mossesträngarna har en vegetation dominerad av Sphagnum fuscum och ris och i höljorna mellan dessa strängar dominerar S. balticum, S. tenellum, S. majus tillsammans med rosling, tranbär och tuvull. De topogena kärren är mycket fattiga och har en vegetation som mossehöljorna fast med inslag av taggstarr och flaskstarr.

Påverkan: Endast ett dike med mycket lokal inverkan finns längst i söder.


Bedömning: Variationsrikt mindre mossekomplex med en mycket välstrukturerad svagt välvd mosse. Bitvis förekommer ett stort antal gölar. Myren är hydrologiskt intakt. Riksintresse.

Källa: Due, K. & Muhr, M. 1983. Nio myrar i Ångermanland. Opublicerad rapport vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Värmyran. nr 49

Värdeklass II
Geokod 19J 7B 2C8C
Areal 89 ha
Flygbild 1988
Höh 95 m
VMI-nr 19J 7B02
Naturvårdsobjekt N84 361
Fältbesökt 1993-08, Sören Uppsäll.


Myrkomplex som gränsar mot Örnsköldsviks flygplats nordvästra ände. Myren är plan och avvattnas åt söder av ett litet vattendrag. Norra delen upptas till stor del av en strängad *sluttande mosse* där strängarna bitvis bildar nätmönster. Höljorna utgörs av mjukmattor och lösbottnar. Enstaka gölar förekommer också. Den sluttande mossen övergår åt väster i ett öppet plan med *nordlig mosse*. Här förekommer mjukmattehöljor. En liten bäck/bäckdråg avvattnar den norra delen och flyter söderut genom myren kantad av ett öppet *strand-*



kärr. Här i S är myren trädbevuxen och upptas av tallbevuxen nordlig mosse samt *sumpskog*. Det senare företrädesvis mot fastmarken.

Påverkan: Den sluttande mossen i N delen ligger i förlängningen av landningsbanan. Här har man byggt en vägbank och en ramp med possitionsljus rakt ut i myren. På den anslutande fastmarken ligger ett grustag. Dessa ingrepp har en, främst visuellt, mycket negativ inverkan och den hydrologiska påverkan är stark men endast av lokal art. I NO utgör en landsväg gräns för myren och denna har skurit av en del av densamma. I söder har ett par utloppsdiken från ett dikat hygge dragits ut till bäcken och här finns också uppröjda skjutgator i anslutning till älgpass.


Bedömning: Varierat våtmarkskomplex som visuellt domineras av en vackert strukturerad sluttande mosse. Myren påverkad av närheten till flygplats.



Kallgräs

Degermyran. nr 54

Värdeklass I
Geokod 19J 7D 3D0B
Areal 115 ha
Flygbild 1988
Höh 40 m
VMI-nr 19J 7D01
Naturvårdsobjekt N84 219
Fältbesökt 1980-06, Per Simonsson; 1993-08, Sören Uppsäll.



Plant myrkomplex beläget mellan Husån och E4:an. Myren avvattnas åt SV ut i Husån samt åt SO via mindre vattendrag ut i Fannbyviken. Myrens östra del utgörs av ett stort öppet *topogent kärr* med diffust strängade mjumattepartier i centrum och fastmattor mot kanterna. Mindre lösbottenpartier förekommer också. I myrens centrum ligger ett större parti med *strängblandmyr*. Tydligt avsatta mossesträngar dämmer mjukmatteflarkar. Väster om blandmyren upptas myren av öppna plan med *nordlig mosse* omgivna av kärrdråg. Här finns en källa i anslutning till fastmarken i söder. I NV ligger en tallbevuxen nordlig mosse och mot fastmarken finns här *sumpskogspartier*.

Vegetation och flora: Myren domineras av fattiga vegetationstyper men med intermediära inslag. De topogena kärren i V utgörs av lösbottendråg med glest utbildat bottenskikt av Scorpidium scorpidioides, dybläddra och dvärgbläddra. I fältskiktet dominerar storsileshår tillsammans med bl a vitag, dytåg och vattenklöver. Här har även myggblomster noterats. Vid källan förekommer arter som Sphagnum teres, Warnstorfia sarmentosa, Paludella squarrosa samt enstaka exemplar av sumpnycklar. De omfattande mjukmattekärren i O har ett bottenskikt med S. papillosum och S. pulchrum och med tuvull, flaskstarr och trådstarr som alternerande fältskiktsdominanter. Överallt i kärren växer pors mer eller mindre talrikt. Mossarna är risdominerade men den i NV utgörs av en tallmosse av skvattramtyp. Strängblandmyrens flarkar utgörs nära nog av mjukmattemossevegetation med S.balticum och Gymnocolea inflata samt tuvull och tuvsäv. Här finns också dråg dominerade av S. angustifolium, pors, vattenklöver och sjöfräken. Sumpskogen utgörs av fattiga tall och gransumpskogar.

Fauna: Trana, grönbena, gulärla och videsparv har noterats från myren.

Påverkan: Myren är opåverkad sånär som på en kraftledning som tangerar östra spetsen samt en avverkad fastmarksholme och smärre anslutande hyggen. Hydrologin är helt ostörd. Rester av hässjor vittar om äldre tiders slåtter.


Bedömning: Stort opåverkat kustnära myrkomplex med en vegetation präglad av närhet till kusten.

Källa: Mascher, J. W. 1990. Ångermanlands flora. SBT-redaktionen, Lund.

Simonsson, P. 1980. Naturinventering av myrarna Bäckmyran, Stor-Flärkmyran och Degermyran i Örnsköldsviks kommun. Opublicerad inventering vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Bärmyran. nr 55

Värdeklass II
Geokod 19J 8B 1C0E
Areal 76 ha
Flygbild 1988
Höh 105 m
VMI-nr 19J 8B01
Naturvårdsobjekt N84 246
Fältbesökt 1982-07, Karin Due & Marie Muhr.



Mycket långsträckt myr med nord-sydlig utsträckning belägen några km söder om Gideå by. Myren sluttar svagt åt S och avvattnas i denna riktning av mindre bäckar ner i Gideälven. Det långsmala partiet i mitten av myren utgörs av en bitvis strängad *sluttande mosse*. Denna utgörs av plan, strängar, mjukmattehöljor och en lagg bestående även den av mjukmattor. Längst i N där myren vidgar sig finns även partier med *nordlig mosse* samt trädbevuxna *topogena kärr*. Längst i S vidgar sig myren igen runt en *tjärn*. Denna kantas av mjukmattekärr med gungflyn närmast tjärnen. Här finns också nordlig mosse mot fastmarken i V.

Vegetation och flora: Myren domineras helt av fattig mosse- och kärrvegetation.

Påverkan: I väster ansluter ett par större grustag till myren. Bäcken som avvattnar Fläsktjärnen i S är delvis uppgrävd som ett dike. Förutom dessa perifiera ingrepp är myren hydrologiskt ostörd.

Bedömning: Hydrologiskt ostört myrkomplex med ett större parti med bitvis välstrukturerad sluttande mosse.

Källa: Due, K. & Muhr, M. 1983. Nio myrar i Ångermanland. Opublicerad rapport vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Myr 1 km SV Skademark. nr 59

Värdeklass I
Geokod 19J 9D 0C3G
Areal 17 ha
Flygbild 1988
Höh 115 m
VMI-nr 19J 9D01
Naturvårdsobjekt N84 101



Myren är belägen fem km in från havet och strax S. om Skademarkssjön, till vilken avvattningen sker. Två *koncentriska mossar* dominerar myren. Dessa är uppbyggda av radiärt anordnade strängar som inramar bitvis stora mjukmatte- och lösbottenhöljor. Vattenfyllda höljegölar förekommer också. Laggkärr bestående av mjukmattor avgränsar mossen mot fastmarken.

Påverkan: Mossen är helt hydrologiskt ostörd.

Bedömning: Vackert och tydligt utbildad koncentrisk mosse, en myrtyp som är mycket ovanlig i länet.

Källa: Björkbäck, F. 1970. TELMA (IBP). Preliminär förteckning över särskilt skyddsvärda myrar i Västernorrlands län. Stencil vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Hästhuvudmyran.nr 73

Värdeklass II
Geokod 20H 2G 1A5F
Areal 88 ha
Flygbild 1986
Höh 255 m
VMI-nr 20H 2G01
Naturvårdsobjekt N84 362




Mindre myrkomplex beläget invid Holmsjöån två km S om Holmsjö by. Myren sluttar ner mot ån i V som avvattnar den i S riktning ner i Bergsjöån. Ett flertal fastmarksholmar förekommer i myrens mellersta del och delar den i en nordlig och en sydlig del. Den S delen upptas centralt av öppna *topogena kärr* dominerade av mjukmattegolv. Fastmattor förekommer också. I S och i N kantas det öppna kärret av glest tallbevuxna plan med *nordlig mosse*, bitvis genomkorsade av mjukmattedråg. Myrens N del domineras av mosseplan samt ett bredare stråk med topogent mjukmattekärr. Myrens O del upptas av ett större, kraftigt sluttande område med *sumpskog* i mosaik med fastmark. Mindre partier med sumpskog finns också i N och i V mot ån.

Bedömning: Mindre helt ostört myrkomplex med betydande areal sumpskog i mosaik med fastmark.

Isakmyran. nr 74

Värdeklass II
Geokod 20H 2I 2A9A
Areal 93 ha
Flygbild 1980
Höh 280 m
VMI-nr 20H 2I01
Naturvårdsobjekt NR84 241




Isakmyran är belägen vid Stor-Tågsjöns N strand och sträcker sig norrut från denna. Myren ingår i ett större myrkomplex tillsammans med objekt 20H 3H01-03, 3I01-02 samt 4I01. Isakmyran sluttar svagt åt S och lämnar sitt vatten till sjön. En mindre bäck rinner söderut genom myrens V del. Väster om denna upptas myren av partier med *skogskärr* och plan med *nordlig mosse*. Myrens centrala del utgörs av ett stort öppet plan med nordlig mosse som sträcker sig ner mot sjö. Mossen avgränsas i O av en långsträckt fastmarksholme. Öster om denna ligger ett stort långsmalt parti med öppet *topogent kärr* som sluttar svagt ner till sjön. Kärret utgörs av såväl mjuk- som fastmattor. Myren ingår i riksintresseområdet "Myrkomplex vid Pengsjöån".

Påverkan: Myren är i N och O avgränsad från Grundsjömyran (20H 3H03) av en skogsbilväg.

Bedömning: Huvudsakligen opåverkad myr som ingår som en del i det stora myrkomplexet vid Pengsjöån. Riksintresse, Myrskyddsplan.

Myr S Hästlandet. nr 77

Värdeklass II
Geokod 20H 3G 4E1E
Areal 178 ha
Flygbild 1986
Höh 320 m
VMI-nr 20H 3G02
Naturvårdsobjekt N84 363




Mosaikartat myrkomplex beläget tre km O om Sunnersta by. Myren är belägen i en diffus dalsänka och sluttar svagt ner mot Långsjöån som slingrar sig fram genom området. Från N rinner även en mindre bäck ner i ån. Myren innehåller en mängd fastmarksholmar samt en liten *tjärn*. Ån och bäcken kantas omväxlande av *sumpskog* och partier med öppna *strandkärr*. De senare är huvudsakligen starrbevuxna men videdominerade delar förekommer också. I de centrala delarna samt i S dominerar bitvis glest trädtäckta *blandmyrar* med fastmattegolv, mjukmattedråg och mindre mosseplan. I N finns ett par partier med öppna *topogena kärr* dominerade av mjukmattor. De O delarna utgörs av glest tallbevuxna plan med *nordlig mosse*. I NV finns också en större yta med *skogskärr*.

Påverkan: I myrens O och S delar förekommer diken med bitvis stark lokal påverkan. Körsår från skogsmakiner finns också i myrens N del. Anslutande fastmark är bitvis avverkad och även en del fastmarksholmar i S.

Bedömning: Variationsrikt och mosaikartat myrkomplex med ett flertal myrtyper representerade.

Stormyran-Stavarn. nr 78

Värdeklass I
Geokod 20H 3H 3E8H
Areal 320 ha
Flygbild 1980
Höh 310 m
VMI-nr 20H 3H01
Naturvårdsobjekt NR84 241
Fältbesökt 1970, Folke Björkbäck; 1976-07, Thomas Arnström mfl; 1978-06, Mats Dynesius & Per Simonsson.




Stormyran är belägen åtta km S om Solberg och ingår i ett större myrkomplex tillsammans med objekt 20H 2I01, 3H01-03, 3I01-02 samt 4I01. Myren sluttar svagt åt söder, sydväst samt åt sydost och avvattnas i SV av Degersjöån och i SO av Björkbäcken. Ett flertal fastmarksholmar förekommer spritt över hela myren. Stormyran karaktäriseras i första hand av öppna vidsträckta *strängflarkkärr*, vilka upptar större delen av myrens centrala delar. Fastmattesträngar dämmer här bitvis mycket stora mjukmatte- och lösbottenflarkar samt flarkgölar. Norr därom finns stora arealer med öppan *topogena fastmattekärr* omväxlande med blöta mjukmattedråg. I söder dominerar *blandmyrpartier* med fastmattor, mindre mosseplan och ristuvsträngar. Här förekommer även mindre partier med topogena mjukmattekärr. Längst i norr

mot fastmarken upptas myren av en blandning av *skogskärr* och *sumpskogspartier*. En mindre *tjärn* finns också längst i SV. Myren ingår i riksintresseområdet "Myrkomplex vid Pengsjöån".

Vegetation och flora: Stormyran varierar i trofigrad från mossevegetation via fattigkärr och intermediära kärr till rikkärr. Intermediära kärr upptar större delen av myren och rikkärr finns främst längs den N kanten samt i de O sträng-flarkkärren. Sträng-flarkkärrens strängar domineras av blåtåtel och tuvsäv och här är också snip och dvärgbjörk vanliga. I botten dominerar Sphagnum papillosum tillsammans med S. subfulvum. Flarkarn har en ofta en gles vegetation som karaktäriseras av dytåg, vitag, vit-, flask- och dystarr, vattenklöver, sjöfräken samt ängsull med S. majus, S. pulchrum och Gymnocolea inflata i botten. I rikare partier av sträng-flarkkärren förekommer arter som ängsnycklar och björnbrodd samt Scorpidium scorpidioides, S. contortum, S. teres, Trichocolea tomentella och Meesia triquetra.

Fauna: Myren utgör värdeklass II i myrfågelinventeringen med arter som kricka, trana, enkelbeckasin, tofsvipa, storspov, gluttsnäppa och grönbena.



Kricka

Påverkan: Enstaka mindre diken finns perifiert men myren är i övrigt opåverkad.

Bedömning: Variationsrik större myr som domineras av vidsträckta sträng-flarkkärr. Myren hyser en varierad vegetation och dessutom höga ornitologiska värden. Myren ingår som en del i det stora myrkomplexet vid Pengsjöån. Riksintresse, Myrskyddsplan.

Källa: Arnström, T., Holgersson, A. & Söderberg, B. 1977. Fem myrar i Västernorrlands län - vegetationsinriktad naturinventering, rapport 1977:9. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Sör-Långsjömyran mfl. nr 79

Värdeklass I
Geokod 20H 3H 2C9J
Areal 395 ha
Flygbild 1980
Höh 310 m
VMI-nr 20H 3H02
Naturvårdsobjekt NR84 241
Fältbesökt 1993-08, Sören Uppsäll.



Sör-Långsjömyran är ett mosaikartat myrkomplex beläget nio km S om Solberg. Myren ingår i ett större myrkomplex tillsammans med objekt 20H 2I01, 3H01, 3H03, 3I01-02 samt 4I01. Sör-Långsjömyran innehåller ett mycket stort antal fastmarksholmar och delas i en nordlig och en sydlig hälft av Långsjöån som slingrar sig fram genom myren. I O avgränsas myren mot objekt 20H 3H01 och 20H 3I01 av Degersjöån. Myren sluttar svagt ner mot åarna som avvattnar den i sydlig riktning. Åarna kantas av *strandsumpskog*, bitvis med öppnare partier. Centralt i den S delen ligger ett par mindre *tjärnar* och längst i S en större. De mindre tjärnarna omges av öppna *topogena kärr* utbildade som gungflyn. Längst i SO ligger ett större parti

med *blandmyr* som mot N övergår i en till stora delar strängad *sluttande mosse*. Blandmyren utgörs av ett fastmattegolv med mossetuvor samt mindre plan. Den sluttande mossen är huvudsakligen öppen och har mjukmattehöljor samt bitvis en lagg. Övriga delar av myrens S hälft utgörs av mindre partier med glest tallbevuxen *nordlig mosse* och *skogskärr* belägna mellan de talrika fastmarksholmarna. Från de centrala delarna löper också ett par öppna mjukmattedråg ner mot långsjöån i NO. Myrens N del domineras centralt av några större ytor med blandmyr. Ett brett öppet kärrdråg löper här söderut ner i Långsjöån. I övrigt domineras denna del av nordliga mossar och skogskärr. Längst i norr finns också ett par små partier med *sträng-flarkkärr*. Myren ingår i riksintresseområdet "Myrkomplex vid Pengsjöån".

Vegetation och flora: Myren domineras helt av fattigkärr- och mossevegetation. Endast strandsumpskogarna och strandkärren längs åarna uppvisar, pga vattenets inverkan, en mer intermediär vegetation. Mossarnas plan och strängar domineras antingen av Sphagnum fuscum och ris eller av S. angustifolium och tuvull. Partier med tallrismosse förekommer också. Mossehöljor och de fattiga kärren hyser en likartad vegetation med S. majus, S. balticum, S. lindbergii och S. tenellum i botten samt kallgräs, tuvull, dystarr och taggstarr som fältskiktsdominanter. I mjukmattedrågen dominerar flaskstarr tillsammans med S. fallax och S. majus. Skogskärren utgörs av klotstarrdominerade tallkärr eller fattiga vitmossdominerade gran/björkkärr. Åarna kantas av sumpgranskog av lågörttyp med grovstammig gran och stort inslag av asp som levande träd, högstubbar och lågor. Bottenskikt domineras här av S girgensohnii och Polytrichum commune. Här växer också Calliergon cordifolium, Climacium dentroides och Rhytidiadelphus subpinnatus vilka alla indikerar artrika miljöer. Öppnare partier med strandsumpkärr domineras av S. fallax tillsammans med brunrör, sump-, stylt- och flaskstarr. Endast myrens S del är fältbesökt.

Fauna: Fåglar som noterats i området är bl a svarthakedopping, trana och tretåig hackspett. Längs åarna är bävern verksam.

Påverkan: Nästa alla större fastmarksholmar i den S delen är nyligen (1989-90) avverkade och mellan dessa förekommer spår av vintervägar. I V är även stora delar av angränsande fastmark avverkad. Angränsande myrmarker i V är kraftigt dikade. Ett äldre dike finns också i S i anslutning till tjärnen. De öppnare partierna längs Långsjöån i norr har tidigare slagits vilket åtta ihopfallna timmerlador vittnar om.

Bedömning: Variationsrik och mosaikartad större myr med huvudsakligen fattiga vegetationstyper. Tyvärr är en stor del av fastmarksholmarna avverkade. Myren hyser bl a sumpskogar med naturskogskaraktär längs de slingrande åarna. Sör-Långsjömyran ingår som en del i det stora myrkomplexet vid Pengsjöån. Riksintresse, Myrskyddsplan.

Grundsjömyran mfl. nr 80

Värdeklass I
Geokod 20H 3H 0D0J
Areal 395 ha
Flygbild 1980
Höh 300 m
VMI-nr 20H 3H03
Naturvårdsobjekt NR84 241
Fältbesökt 1993-08, Sören Uppsäll.



Grundsjömyran är belägen två km N om Stor-Tågsjöns V ände. Myren ingår i ett större myrkomplex tillsammans med objekt 20H 2I01, 3H01-02, 3I01-02 samt 4I01. De N delarna av myren sluttar svagt åt NO och avvattnas ner i Sunnerstaån och Pengsjöån. De S delarna avvattnas åt S ner i Stor-Tågsjön. Myren innehåller ett flertal större fastmarksholmar men myrytorna mellan dessa är tämligen stora. Längs myrens N kant slingrar Sunnerstaån kantad av öppna *strandkärr* samt *skogskärr*. I NO ligger två stora *tjärnar*, Stor- och Lill-Grundsjön. Dessa kantas av öppna *topogena kärr* som i N utgörs av gungflyn. I S breder stora mjukmattor ut sig. Väster om Stor-Grundsjön finns ett parti med *sträng-flarkkärr* med låga fastmattesträngar och grunda mjukmatteflarkar. Längst i NV ligger ett större parti med *nordlig mosse* samt tallkärr. Även längre ner efter V kanten finns partier med nordlig mosse och myrens sydligaste del domineras av stora arealer skogskärr. Söder om Lill-Grundsjön sträcker sig en myrarm åt SO och i dess N ände ligger ett parti med *strängblandmyr*. Här ligger mossesträngar och tuvor på ett mjukmattegolv. Ett flertal mindre ytor med *sumpskog* finns också, företrädesvis i anslutning till fastmarksholmar och vattendrag. Myren ingår i riksintresseområdet "Myrkomplex vid Pengsjöån".

Vegetation och flora: Myren domineras helt av fattigkärrs- och mossevegetation. I V finns mindre fastmarksvattenpåverkade fastmattor med vegetation åt det intermediära hållet. Här dominerar blåtåtel, trådstarr och Sphagnum papillosum tillsammans med arter som dvärglummer, Sphagnum subnitens och S. Subsecundum. I övrigt domineras kärren av fattiga starr-vitmossmattor med S. fallax, S. balticum samt flaskstarr och kallgräs. Strankärren domineras i botten av S. riparium med ett fältskikt av brunrör, flask- och styltstarr samt viden. Skogskärren utgörs av klotstarrdominerade tallkärr samt tall och gran-björkkärr av fattig vitmosstyp. Sumpgranskogarna utgörs av skogsfräkendominerad ristyp samt lågörttyp.


Fauna: Vid fältbesök noterades bl a storlom, häckande fiskgjuse, häckande sångsvan, häckande bläsand samt tranor.

Påverkan: En nybyggd skogsbilväg har skurit av en liten myrtarm i V och dikena vid vägen har orsakat sedimentdeposition på angräsande kärrgolv. En vinterskogsbilväg har här också byggts ut till en nyligen avverkad fastmarksholme. Huvuddelen av de större fastmarksholmarna är bevuxna med plant/ungskog med contortatall. Strandkärren har tidigare utnyttjats för slåtter vilket hopfallna lador vittnar om.

Bedömning: Stor och variationsrik myr i storskalig mosaik med fastmark. Grundsjömyran ingår som en del i det stora myrkomplexet vid Pengsjöån och hyser dessutom höga ornitologiska värden. Tyvärr är flertalet av fastmarksholmarna bevuxna med ungskog av contortatall. Riksintresse, Myrskyddsplan.

Krigsmyran-Lagmyran. nr 82

Värdeklass I
Geokod 20H 3I 0A3J
Areal 290 ha
Flygbild 1980
Höh 300 m
VMI-nr 20H 3I01
Naturvårdsobjekt NR84 241
Fältbesökt 1993-08, Sören Uppsäll



Krigsmyran-Lagmyran är belägen längsmed Degersjöån och Pengsjöån vid Stor-Pengsjön, en dryg mil S om Solberg. Myren ingår i ett större myrkomplex tillsammans med objekt 20H 2I01, 3H01-03, 3I02 samt 4I01. Myren är långsträckt i NV-SO riktning och sluttar svagt från kanterna ner mot den slingrande ån i centrum. En del större fastmarksholmar ligger i anslutning till ån. Mitt i myren ligger Stor-Pengsjön som utgör ett stort sel i ån. Ån och sjön kantas av vidsträckta öppna *strandkärr*. Längre upp mot fastmarken vidtar en blandning av *skogskärr* och *blandmyr*. Blandmyrpartierna har en storskalig uppbyggnad med omväxlande mosseplan och fastmattegolv avbrutna av mjukmattedråg. På mindre delar förekommer en sträng-flarkuppbyggnad med mjukmatteflarkar. Längst i öster finns också en källa. Myren ingår i riksintresseområdet "Myrkomplex vid Pengsjöån".

Vegetation och flora: Strandkärren utgörs av vidsträckta vitmossmattor med Sphagnum papillosum, S. majus och S. fallax som dominanter. I fältskiktet dominerar flaskstarr tillsammans med dy- och strängstarr, vattenklöver och kärrspira. Stora ytor med videkärr förekommer också. Blandmyrarnas fastmattegolv domineras i botten av S. papillosum med antingen tuvsäv eller blåtåtel och trådstarr som fältskiktsdominanter. Snip förekommer också sparsamt här. Drågen är mycket blöta och saknar bitvis bottenskikt. Bitvis hyser de en rikare vegetation med Warnstorfia sarmentosa och Straminergon stramineum som dominerar tillsammans med S. teres, S. subnitens, Paludella squarosa, Warnstorfia exanulata och Scorpidium scorpidioides. Källan har ett bottenskikt som mycket liknar det ovan beskrivna men här förekommer även Calliergon cordifolium. Blandmyrens mosseinslag domineras av S. fuscum samt ris eller tuvull. Det strängade partiets flarkar domineras av S. lindbergii, S. balticum samt flaskstarr och tuvsäv. Skogskärren utgörs huvudsakligen av fattiga gran-björkkärr samt partier med sekundär björksumpskog.


Fauna: Bäver förekommer i vattensystemet. Fåglar som noterats vid fältbesök är bl a kanadagås och enkelbeckasin.

Påverkan: Längst i O finns en äldre dammanläggning och området har i alla fall tidvis varit överdämt. Skogskärren och de sumpskogsliknande partierna bär alla spår efter äldre avverkningar i form av stubbar. Troligen utgörs stora delar av dessa myrelement av avverkad och senare försumpad fastmark. Möjligen finns också spår efter anordningar som används i samband med flottningen. Gamla timrade lador vittnar om områdets stora värde som slåttermark.

Bedömning: Stort våtmarkskomplex vars höga värde betingas av de vidsträckta strandkärren i anslutning till det slingrande vattendraget. Krigsmyran-Lagmyran ingår dessutom som en del i det stora myrkomplexet vid Pengsjöån. Riksintresse, Myrskyddsplan.

Pengsjö-Stormyran. nr 83

Värdeklass II
Geokod 20H 3I 4D9B
Areal 102 ha
Flygbild 1980
Höh 280 m
VMI-nr 20H 3I02
Naturvårdsobjekt NR84 241



Pengsjö-Stormyran är belägen åtta km SO om Solberg. Myren ingår i ett större myrkomplex tillsammans med objekt 20H 2I01, 3H01-03, 3I01 samt 4I01. Pengsjö-Stormyran ligger i en NO sluttning ner mot Solbergsån som avvattnar området. Myren utgörs huvudsakligen av kärr med undantag för mindre delar *sumpskog* mot fastmarken. Längst i S ligger en större yta med öppet


topogent kärr som domineras av fastmattor med inslag av mjukmattedråg. Norr därom ligger ett parti med *sträng-flarkkärr* där fastmattesträngar dämmer mjukmatte- och lösbottenflarkar samt vattenfyllda flarkgölar. I myrens mellersta del finns ett flertal fastmarksholmar och mellan dessa upptas myren av *skogskärr*. Den N delen har ett mycket flikigt utseende och den upptas av en blandning av mindre partier med skogskärr, sträng-flarkkärr samt öppna topogena kärr. Myren ingår i riksintresseområdet "Myrkomplex vid Pengsjöån".

Påverkan: I myrens S delar förekommer diken i perifiera delar, bitvis med stark men lokal påverkan. Huvuddelen är dock hydrologiskt intakt.

Bedömning: Kärrkomplex vars värde motiveras av relativt stora sträng-flarkkärr. Myren ingår dessutom som en del i det stora myrkomplexet vid Pengsjöån. Riksintresse, Myrskyddsplan.

Rocksjömyran. nr 86

Värdeklass I
Geokod 20H 4E 2D8B
Areal 245 ha
Flygbild 1986
Höh 335 m
VMI-nr 20H 4E01
Naturvårdsobjekt N84 250
Fältbesökt 1993-08, Sören Uppsäll.



Myrkomplex beläget mellan Väster- och Öster Rocksjön. Myren sluttar svagt från N och S mot mitten där det vattendrag som förbinder sjöarna flyter. Från Väster Rocksjön, som utgör en myromgärdad *tjärn*, avvattnas sedan myren via Tärnickån åt väster. Ett flertal fastmarksholmar, med naturskogskaraktär, finns i myrens N och O del. Dessa utgör bitvis en åssträckning. Myrens O del domineras av ett större öppet parti med *sträng-flarkkärr* och angränsande *topogena kärr*. Sträng-flarkkärret utgörs av fastmattesträngar som dämmer mjukmatteflarkar och bitvis är strukturerna diffusa. De topogena kärren utgörs av både mjuk- och fastmattor. Ån som rinner mellan sjöarna kantas av huvudsakligen öppna *strandkärr*. Myrens västra del utgörs av omfattande arealer med glest tallbevuxen *blandmyr*. I den centrala delen, i anslutning till ån, finns ett par partier med *skogskärr*. Längs bäcken som som rinner ner i ån från N finns partier med bitvis mycket fin och grovstammig *gransumpskog*. I anslutning till sumpskogen, mot fastmarken finns en källa.

Vegetation och flora: Kärrens vegetation är huvudsakligen fattig med intermediära inslag. Fastmattorna domineras av trådstarr, blåtåtel och Sphagnum papillosum medan mjukmattorna har en dominans av flask-, sträng- och trådstarr i fältskiktet. Sträng-flarkkärren hyser en likartad vegetation men här kommer även in lite rikare arter som ängsnycklar och björnbrodd. Sumpskogen längs bäcken i norr utgörs av sumpgranskog av lågörttyp och här återfinns bl a Calliergon cordifolium och S. wulfianum. Källan domineras i botten av Philonotis tomentella och Bryum weigelii tillsammans med Brachythecium salebrosum, Marchantia alpestris mfl. Strandkärrens yttre del domineras i botten av S. flexuosum med flaskstarr och kråkklöver i fältskiktet. Lite längre upp tar strängstarr över och här är även slakstarr funnen.

Påverkan: På maden finns lämningar efter hässjor och en hölada. Myren saknar helt sentida ingrepp.

Bedömning: Variationsrikt och vackert myrkomplex med strandkärr, fina sumpskogspartier och förekomst av den ovanliga slakstarren. Dessutom fastmarksholmar samt intilliggande fastmark med naturskogskaraktär.


Myr O Tärnicksjön. nr 89

Värdeklass II
Geokod 20H 4E 0D9F
Areal 252 ha
Flygbild 1986
Höh 350 m
VMI-nr 20H 4E04
Naturvårdsobjekt N84 364

Myren är belägen ca 20 km NO om Junsele och sträcker ut sig i SO riktning från Tärnicksjön i N. Myrens N delar ansluter till Tärnicksjön och avvattnas direkt ner i denna. De S delarna sluttar svagt ner mot Gross*tjärnarna* och Grossbäcken som för vattnet i V riktning. Övervägande delen av den långsträckta och flikiga myren utgörs av stora ytor med en mosaik mellan *skogskärr* och glest tallbevuxna plan med *nordlig mosse*. I den mellersta delen finns ett större parti med *öppet topogent kärr*. Topogena kärr förekommer även längst i norr samt vid Grosstjärnarna i S. Fastmattegolv dominerar men mjukmattor i form av golv samt dråg förekommer också. En långsmal tjärn finns också i det mellersta partiet. Längst i N finns ett par ytor med *sumpskog*, mot sjön och i anslutning till fastmarken.


Påverkan: En kraftledning passerar över myrens mellersta del. Här finns också spår efter vintervägar. Hyggen ansluter bitvis, bl a till sumpskogspartier i N. I S och V är myren avgränsad mot dikade myrpartier.

Bedömning: Större samt hydrologiskt intakt myrkomplex med representativa myrtyper.



Rocksjö-Stormyran. nr 90

Värdeklass II
Geokod 20H 4F 0B3H
Areal 160 ha
Flygbild 1986
Höh 340 m
VMI-nr 20H 4F01
Naturvårdsobjekt N84 181
Fältbesökt 1979-06, Per Simonsson & Stefan Jansson.



Myrkomplex beläget i NV-SO orienterad dalsänka öster om Öster-Rocksjön. Myren avvattnas dels åt NV till Öster-Rocksjön samt åt SO via ett mindre vattendrag vidare till Sunnerstaån. De lägst belägna centrala delarna av myren utgörs av öppna kärr med *sträng-flarkkärr*, där fastmattesträngar dämmer mjukmatte- och lösbotten flarkar, samt *topogena kärr* med fast- och mjukmattor. Kanterna upp mot fastmarken upptas till större delen av glest trädbevuxna *blandmyrar*, i söder med stort inslag av fastmarksholmar. Myrens O del är mer uppsplittrad av större fastmarksholmar och här finns flera *tjärnar* omgivna av mindre partier med öppna topogena samt *skogskärr*.

Vegetation och flora: Myrens vegetation är huvudsakligen av fattigkärrstyp.

Fauna: Myren utgör värdeklass III i myrfågelinventeringen med arter som bläsand, enkelbeckasin, storspov och grönbena.

Påverkan: Myrens östra del omges av fastmark


som är avverkad och här är också fastmarksholmarna avverkade. Längst i väster mot Öster-Rocksjön finns några diken som dock har en mycket marginell inverkan på myrens hydrologi.

Bedömning: Tämligen opåverkat och variationsrikt myrkomplex med bl a strängflarkkärr och flera tjärnar samt ett visst ornitologiskt värde.

Källa: Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.


Långsjömyran, Sör-Långsjömyran. nr 93

Värdeklass II
Geokod 20H 4F 3D1H
Areal 354 ha
Flygbild 1986
Höh 355 m
VMI-nr 20H 4F04
Naturvårdsobjekt N84 187
Fältbesökt 1979-06, Mats Dynesius.



Den mycket långsmala myren är belägen V och S om Degersjön. Myren sträcker sig över en vattendelare och de nordliga delarna dräneras åt N ner i flera mindre *tjärnar* som avvattnas åt V. Resterande delar sluttar åt S och lämnar sitt vatten till Långsjöån och Sunnerstaån via mindre vattendrag. Myren innehåller ett stort antal mindre fastmarksholmar främst i den N delen. Här upptas myren annars av partier med *blandmyr* eller glest tallbevuxna plan med *nordlig mosse*. Här ligger också ett *topogent kärr* som utgörs av ett mjukmattedråg som löper ner mot tjärnarna i N. Centralt genom de delar som sluttar åt S löper smalare partier med topogena kärr. Mjukmattor dominerar dessa partier men här förekommer även bäckdråg samt ytor med sträng-flarkuppbyggnad. Upp mot fastmarken dominerar här tallbevuxna mosseplan och *skogskärr*. Genom myrens S del, som domineras av blandmyr och nordlig mosse, slingrar en bäck mellan flera fastmarksholmar.

Vegetation och flora: Övervägande fattiga vegetationstyper dominerar. Sträng-flarkpartiets flarkar domineras av vitmossor samt vit-, sump-, flask- och trådstarr. Blötare kärrdråg karaktäriseras av högstarrvegetation med ängsull.



Ängsull

Fauna: Myren utgör värdeklass III i myrfågelinventeringen med arter som trana, storspov och grönbena.


Påverkan: En kraftledning passerar över i norr. I myrens mellersta delar förekommer diken med bitvis stark lokal påverkan och här ansluter äldre myrodlingar. Körspår från skogsmaskiner förekommer på flera ställen och stora delar av omgivande fastmark är avverkad.

Bedömning: Stort och tämligen variationsrikt myrkomplex med visst ornitologiskt värde.

Källa: Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Myr vid Brandbärtjärnarna. nr 94

Värdeklass II
Geokod 20H 4G 2D1H
Areal 138 ha
Flygbild 1986
Höh 360 m
VMI-nr 20H 4G01
Naturvårdsobjekt N84 365




Myrkomplex beläget fyra km SO Degersjö by. Myren ligger på en vattendelare och sluttar åt N samt åt S. I N dräneras myren via Brandbär*tjärnarna* ut i Degerån. Åt S lämnar myren sitt vatten via Albäcken till Långsjöån. Tjärnarna i N omges av öppna *topogena kärr* dominerade av fastmattor och med gungflyn närmast vattnet. Myrens sluttningar åt N samt åt S upptas av fastmattedominerade *soligena kärr* med inslag av mjukmattedråg. Uppe på vattendelaren dominerar annars glest tallbevuxna plan med *nordlig mosse* samt *skogskärr*.

Påverkan: I skogskärren i myrens V kant finns diken med stark men lokal påverkan. Körspår från skogsmaskiner förekommer i myrens nordsluttning och i V är anslutande fastmark avverkad.

Bedömning: Tämligen variationsrik myr med betydande arealer öppna soliga kärr som intressant inslag.

Lill-Stavarsmyran. nr 95

Värdeklass II
Geokod 20H 4I 0B7G
Areal 74 ha
Flygbild 1980
Höh 300 m
VMI-nr 20H 4I01
Naturvårdsobjekt NR84 241




Lill-Stavarsmyran är belägen sju km SO om Solberg. Myren ingår i ett större myrkomplex tillsammans med objekt 20H 2I01, 3H01-03 samt 3I01-02. Myren ligger längsmed en östsluttning ner mot Solbergsån till vilken avvattningen sker. Ett flertal fastmarksholmar förekommer, främst i myrens mellersta del. Där omges de av glest tallbevuxna plan med *nordlig mosse* samt *skogskärr*. Norr om dessa upptas myren av ett större parti med *strängflarkkärr* omgivet av öppna *topogena kärr*. I strängflarkkärret dämms mjukmatteflarkar och enstaka flarkgölar av fastmattesträngar. De topogena kärren utgörs här av diffust strängade fastmattor. I O gränsar myren mot Pengsjö-Stormyran (objekt 20H 3I02) och upptas av skogskärr. Det södra partiet utgörs av omväxlande öppna- och skogsbeväxta kärr, nordlig mosse samt ett mindre parti med sträng-flarkkärr. Myren ingår i riksintresseområdet "Myrkomplex vid Pengsjöån".

Bedömning: Mindre helt opåverkat myrkomplex där bl a sträng-flarkkärr bidrar till myrens höga värde. Myren ingår dessutom som en del i det stora myrkomplexet vid Pengsjöån. Riksintresse, Myrskyddsplan.

Bodmyran. nr 96

Värdeklass II
Geokod 20H 4I 2A6I
Areal 76 ha
Flygbild 1986
Höh 290 m
VMI-nr 20H 4I02
Naturvårdsobjekt N84 157
Fältbesökt 1979-06, Bertil Charlie Wallin.



Bordmyran är en långsmal myr belägen i en östsluttning mot Solbergsån, fyra km S om Solberg. Myren sluttar svagt åt N samt åt S och avvattnas från sina ändar av två mindre bäckar ner i Solbergsån. Längsmed hela myren upptas de lägre partierna av öppna *topogena kärr*. Dessa utgörs av såväl fast- som mjukmattor med högstarrvegetation. Delar med fastmattesträngar och lösbottenflarkar samt flarkgölar förekommer också. Mot fastmarkskanterna, främst i V, upptas myren av glest tallbevuxna plan med *nordlig mosse* genomdragna av mjukmattedråg. I myrens centrala del finns fyra små *tjärnar*.

Fauna: Myren utgör värdeklass III i myrfågelinventeringen med arter som knipa, grönbena och gulärla.


Påverkan: I SV är angränsande fastmark avverkad men annars är myren helt ostörd.

Bedömning: Mindre helt ostörd myr med ett flertal öppna vattenytor, i form av tjärnar och gölar. Myren hyser också ett visst ornitologiskt värde.

Källa: Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Myr längs Åselån. nr 97

Värdeklass II
Geokod 20H 4J 0D8C
Areal 184 ha
Flygbild 1986
Höh 280 m
VMI-nr 20H 4J01
Naturvårdsobjekt N84 254




Långsträckt myrkomplex beläget längs Åselån strax SO Åbodsjö. Myren sluttar svagt ner mot ån som flyter centralt genom området och avvattnar det åt NV ut i den angränsande Åbosjön. Södra sidan om ån är huvudsakligen öppen och upptas av alternerande partier av *nordlig mosse, blandmyr* av mosaiktyp samt *strängblandmyr*. På åns N sida upptas myren huvudsakligen av nordlig mosse. Längst uppe i NV finns ett större parti med strängblandmyr. Höga skogbevuxna strängar dämmer blöta flarkar och flarkgölar. Runt det strängade partiet finns omfattande arealer med *skogskärr* samt en mindre *tjärn*. Åns *strandkärr* är närmast vattnet öppna, dominerad av omväxlande videvegetation eller gräs/starrvegetation. Längre upp från vattnet vidtar en zon av lövdominerad *strandskog*. Vid åns utlopp i sjön finns också strandkärr.

Påverkan: Skogskärren samt till mindre del strängblandmyren upp i NV är kraftigt dikade och längst i norr passerar en mindre kraftledning över området.

Bedömning: Variationsrikt myrkomplex med bl a större partier med strängblandmyr.

Brudsängmyran, Bodmyran. nr 100

Värdeklass I
Geokod 20H 5F 2C6E
Areal 227 ha
Flygbild 1986
Höh 466 m
VMI-nr 20H 5F01
Naturvårdsobjekt N84 366
Fältbesökt 1979-06, Per Simonsson.



Myren ligger högt belägen i en västsluttning på ett par skogsberg, tolv km V om Solberg. Myren sluttar huvudsakligen åt SV och avvattnas i denna riktning av Brudsängsbäcken. Den absolut västligaste samt östligaste delen avvattnas i respektive riktning. Myrens centrala del är plan och upptas av ett stort öppet *topogent kärr*. Här finns såväl fastsom mjukmattor och ett parti med fastmattesträngar och lösbottenflarkar. En med gungfly igenvuxen tjärn ligger dessutom i myrens centrala del. I NV sänder myren upp en arm som tillsammans med dess V del upptas av omväxlande partier med *blandmyr* och *nordlig mosse*. Här alternerar fastmattegolv och mjukmattedråg med glest tallbevuxna mosseplan. De sluttande delarna i SO utgörs av omväxlande nordlig mosse och *soligena kärr*. De senare domineras av fastmattor med inslag av mjukmattedråg. Där Brudsängsbäcken tar sin början i SV ligger ett parti med lövdominerad *sumpskog* med fastmarksinslag.

Vegetation och flora: Det stora öppna kärrpartiet domineras i V av högstarrkärr med stort inslag av ris och lågvuxet vide. Flarkarna i det strängade partiet har ett glesare fältskikt av vitstarr. En igenvuxen tjärn i kärrpartiet är helt bevuxen med flaskstarr, sjöfräken och kråkklöver. De O delarnas fastmattor domineras av flaskstarr och ängsull.

Fauna: Myren utgör värdeklass IV i myrfågelinventeringen med arter som grönbena och gulärla.


Påverkan: Enstaka diken med marginell påverkan finns i anslutning till fastmark i S och O. Här förekommer också spår efter en vinterväg. Anslutande fastmark är bitvis avverkad och även ett par fastmarksholmar i S har avverkats. Trots dessa ingrepp är myrens hydrologi tämligen intakt.

Bedömning: Tämligen variationsrik myr med ett stort öppet topogent kärr.

Källa: Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Stormyran, Villbrännmyran. nr 101

Värdeklass I
Geokod 20H 5H 0B1E
Areal 118 ha
Flygbild 1986
Höh 440 m
VMI-nr 20H 5H01
Naturvårdsobjekt N84 255



Myren ligger högt belägen på en platå på Storberget, fyra km SV om Solberg. Myren sluttar huvudsakligen åt N och NV och avvattnas via flera mindre bäckar ner i Gafselsjön-Solbergsån. Myren har en mycket flikig utsträckning och avdelas

i flera ytor av en större fastmarksholme samt fastmarkstungor som skjuter ut i myren. Längst i V dominerar ett större parti med öppen *strängblandmyr*. Här dämmer mossesträngar fastmatteflarkar men även mjukmatteflarkar och vattenfyllda flarkgölar. Söder om detta parti finns öppna *topogena kärr* som utgörs av fastmattor samt även mjukmattedråg. Åt öster vidtar ett område med *mosaikblandmyr* som utgörs av fastmattegolv, mjukmattedråg samt mindre mosseplan. Vidare österut slingrar myren mellan fastmattetungor och upptas till större delen av strängblandmyr. Här finns också en liten *tjärn* mot fastmarken i S. Längst i O dominerar glest tallbevuxna plan med *nordlig mosse* med ett flertal små fastmarksholmar.


Påverkan: Ett dike med svag lokal påverkan finns i SV och stora delar av anslutande fastmark är avverkad. Myren kan ändå sägas vara hydrologiskt intakt.

Bedömning: Tämligen variationsrikt och ostört myrkomplex med stora arealer strängblandmyr.

Mossaträsk-Stormyran. nr 102

Värdeklass I
Geokod 20H 6E 1E3A
Areal 690 ha
Flygbild 1980
Höh 430 m
VMI-nr 20H 6E01
Naturvårdsobjekt NR84 154
Fältbesökt 1970, Folke Björkbäck;
1978-06, Per Simonsson & Bertil Charlie Wallin;
1984, B. Dahlén; 1985-07, Marie Muhr.

Mossaträsk-Stormyran är belägen sju km O om Ångermanälven och sträcker sig från Mossaträsksjön i SO som ett brett sjok upp åt NV. Myrens S hälft sluttar huvudsakligen åt SO och avvattnas ner i Mossaträsksjö som tillhör Ångernamälven vattensystem. Ovan den mellersta delen går en vattendelare tvärs över myren och de N delarna sluttar och avvattnas i detta väderstreck ner i älven. Myren domineras centralt av två breda stråk med *sträng-flarkkärr* som löper samman i S ner mot Mossaträsksjön. De glest trädbevuxna fastmatteströngarna dämmer bitvis mycket stora mjuk-




mattesträngarna dämmer bitvis mycket stora mjukmatte- och lösbottenflarkar samt vattenfyllda flarkgölar. Söder om sträng-flarkkärren och sjön ligger ett område med ett stort antal fastmarksholmar. Här finns ett parti med *dikad myr* men de övriga delarna utgörs av *skogskärr* och *blandmyr*. De senare utgörs av fastmattor med mossetuvor och mindre glest tallbevuxna plan. Här ligger också en liten *tjärn*. I anslutning till sträng-flarkpartiet och i dess förlängning åt NV finns öppna *topogena kärr*. Dessa domineras av mjukmattor. Myrens N hälft utgörs av två mycket stora ytor, med en blandning av skogskärr och *sumpskog*, vilka åtskiljs av två långsträckta fastmarksholmar. I deras förlängning ligger ett större parti med en blandning av glest tallbevuxen blandmyr och skogskärr. Myren utgör ett riksintresse.

Vegetation och flora: Myren utgörs huvudsakligen av fattiga vegetationstyper. Partier med intermediär vegetation förekommer bitvis i sträng-flarkkärren. Där domineras annars strängarna av trådstarr och blåtåtel samt Sphagnum papillosum och S. fallax. På högre strängar kommer även ljung och dvärgbjörk in och bottenskiktet är svagt utvecklat med bl a S. compactum. Flarkarna domineras av av dystarr tillsammans med kallgräs och strängstarr. I vattenfyllda flarkar utgörs växtligheten av vattenklöver tillsammans med flaskstarr. I de intermediära partierna kommer arter som snip,

vitstarr, dytåg samt S. teres, Warnstorfia exannulata, W. sarmentosa och Paludella squarrosa in. De topogena kärrens mjukmattor upptas huvudsakligen av S. balticum, S. papillosum, S. compactum, S. tenellum, S. lindbergii och S. majus i botten med ett fältskikt av kallgräs, tuvull, dy- och taggstarr samt tuvsäv. Mossevegetation förekommer på tuvor och strängar och domineras av S. fuscum, kråkbär och hjortron. Skogskärren och sumpskogarna utgörs uteslutande av fattiga vegetationstyper.

Fauna: Myren utgör värdeklass I i myrfågelinventeringen med arter som sädgås, enkelbeckasin, dvärgbeckasin, storspov, småspov, tofsvipa, brushane, myrsnäppa, grönbena och gluttsnäppa.



Brushane

Påverkan: På perifiera delar av myren finns en lokal dikespåverkan. Dikena är huvudsakligen av äldre datum och till stor del igenvuxna. Den påverkade arealen är relativt sett obetydlig och myren kan sägas vara i stort opåverkad. Slåtter har tidigare bedrivits på lämpliga delar av myren.

Bedömning: Mossaträsk-Stormyran är mycket variationsrik och utgör en av länets största myrar. Myrens mycket höga värde betingas av de vidsträckta och välstrukturerade sträng-flarkkärren med upp till flera ha stora vattenfyllda flarkar. Mycket stora arealer skogskärr förekommer också. Myren är dessutom länets kanske förnämsta fågelmyr. Riksintresse, Myrskyddsplan.

Källa: Björkbäck, F. 1970. TELMA (IBP). Preliminär förteckning över särskilt skyddsvärda myrar i Västernorrlands län. Stencil vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.


Dahlén, B. 1984. Slättbränna och Mossaträsk - två fågelmyrar i Ångermanland. Artikel i Gråspetten årg. 4:4. Ångermanlands Ornitologiska förening.

Muhr, M. 1985. Mossaträsk-Stormyran, en botanisk inventering. Manuskript vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Rävelmyran. nr 103

Värdeklass I
Geokod 20H 6E 0C3E
Areal 280 ha
Flygbild 1986
Höh 425 m
VMI-nr 20H 6E02
Naturvårdsobjekt N84 155
Fältbesökt 1978-06, Mats Dynesius.



Större myrkomplex beläget intill och väster om Mossaträsk-Stormyran (20H 6E01) invid Ångermanälvens övre lopp. Myren avvattnas åt S via Bodtjärnbäcken samt till mindre del åt NV. Ungefär mitt i myren ligger en större *tjärn*, Bodtjärnen. På båda sidor om tjärnen finns huvudsakligen öppna *blandmyrar* som upp mot kanterna övergår i glest tallbevuxen *nordlig mosse*. Bäcken som avvattnar tjärnen kantas bitvis av smala *strandkärr* och i S av en smal remsa *sumpskog*. Här i anslutning förekommer också partier med *skogskärr*. Nordväst om tjärnen ligger ett större öppet parti med *topogent kärr* dominerat av mjukmattor men även lösbottnar och ett par gölar förekommer. Mot kanterna finns partier med *sträng-flarkkärr* där strängarna bitvis är glest trädbevuxna. Från detta öppna parti löper kärrdråg ner mot tjärnen. Norr om tjärnen och det öppna kärren upptas myren av omfattande arealer med skogskärr och ett stort antal mindre fastmarksholmar.


Fauna: Myren utgör värdeklass III i myrfågelinventeringen med arter som kricka, tofsvipa, gluttsnäppa och grönbena.

Påverkan: Längst i SO löper tre stora diken i fallriktningen och ner i bäcken. Påverkan är här kraftig men av lokal karaktär.

Källa: Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Rödmossamyran.nr 107

Värdeklass II
Geokod 20H 6G 3D0G
Areal 105 ha
Flygbild 1986
Höh 395 m
VMI-nr 20H 6G01
Naturvårdsobjekt N84 367




Rödmossamyran är belägen åtta km NV om Solberg. Myren, som huvudsakligen är plan, ligger i gryta mellan omgivande skogsberg och sluttningar. Från väster, norr och öster rinner bäckar in till den centralt belägna Svarttopp*tjärnen*. Denna och myren avvattnas åt S av Svarttoppbäcken ner i Gafselsjön. På ömse sidor om tjärnen samt i söder finns fastmarksholmar. Bäckarna och tjärnen kantas av övervägande öppna *strandkärr*, som närmast tjärnen utgörs av gungflyn. I anslutning till strandkärren ligger partier med öppet *topogent kärr*, främst i den N delen. Kärren upptas företrädesvis av fastmattor med mjukmattor förekommer också i form av dråg. Mindre delar med blandskogskärr finns också. Övriga delar av myren upptas av glest tallbevuxna plan med *nordlig mosse*, främst i N, samt huvudsakligen öppna *blandmyrar*. Blandmyrarna, vilka upptar huvuddelen av myrens S hälft, utgörs av fastmattegolv med mosseöar och mjukmattedråg.

Påverkan: I myrens V periferi förekommer något enstaka dike samt spår efter en vinterväg. Dessa ingrepp har en mycket lokal och svag påverkan på myrens hydrologi. Delar av omgivande fastmark är avverkad.

Bedömning: Tämligen variationsrik samt hydrologiskt intakt myr med större tjärn och strandkärrskantade bäckar.

Lokmyran. nr 109

Värdeklass II
Geokod 20H 6H 4E8I
Areal 69 ha
Flygbild 1986
Höh 355 m
VMI-nr 20H 6H02
Naturvårdsobjekt N84 093
Fältbesökt 1979-06, Per Simonsson; 1982-07, Karin Due & Marie Muhr.



Lokmyren ligger åtta km N om Solberg mellan Storsjön och Mjölksjön, till vilken den ansluter i S. Myren har en flikig utsträckning och de huvudsakligen öppna och mer eller mindre strängade myrelementen ligger delvis åtskiljda av flera moränåsar. Myren domineras av *strängblandmyrar* med ett stort parti i S samt två mindre i N. Vid en utbuktning i N ligger två små *tjärnar* omgivna av strängblandmyr. Dessa partier utgörs av fastmattegolv, mossesträngar och mjukmatteflarkar. I myrens mellersta del ligger ett parti med *strängflarkkärr* där fastmattesträngar dämmer lösbotten-

flarkar och ett flertal vattenfyllda flarkgölar. Här ansluter också en mindre yta med öppet *topogent kärr*. I SV finns också ett mindre parti med topogent kärr som omsluter två små tjärnar. De topogena kärren domineras av fastmattegolv. Mindre delar med *nordlig mosse* förekommer också mot fastmarken i O samt längst i S. Betydande delar av mossepartierna utgörs av ristuvsträngar och mjukmattehöljor.

Vegetation och flora: Vegetation en är genomgående fattig men med enstaka intermediära inslag. Dessa utgörs av flarkar med arter som Warnstorfia sarmentosa, W. exannulata och Drepanocladus aduncus.

Fauna: Myren utgör värdeklass II i myrfågelinventeringen med arter som storspov, småspov, tofsvipa, gluttsnäppa och grönbena.

Påverkan: Den SO delen som utgörs av strängblandmyr samt mindre delar mosse är torrlagd pga kraftiga diken. Här finns även en äldre igenväxande myrodling. Större delar av omgivande fastmark är avverkad. De öppan mjukmattekärren har tidigare utnyttjats för myrslåtter vilket rester efter hässjor vittnar om.

Bedömning: Mindre myr som trots sin storlek är mycket mångformig med strängblandmyrar och sträng-flarkkärr med stort inslag av gölar. Myren hyser dessutom ett högt ornitologiskt värde. Vissa delar har dock dikats kraftigt.

Källa: Due, K. & Muhr, M. 1983. Nio myrar i Ångermanland. Opublicerad inventering vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Nymyran, nr 115

Värdeklass I
Geokod 20H 7F 1E4l
Areal 322 ha
Flygbild 1986
Höh 460 m
VMI-nr 20H 7F02
Naturvårdsobjekt N84 095
Fältbesökt 1979-06, Per Simonsson; 1993-08, Sören Uppsäll.



Större höglägesmyr belägen i en välvd dalsänka strax söder om västerbottensgränsen. Myren sluttar och avvattnas åt NV samt SO från en centralt belägen vattendelare. Genom större delen av den långsträckta myren går ett kärrstråk genom de lägst belägna delarna. Kärrstråket upptas av omväxlande *sträng-flarkkärr* och öppna *topogena kärr*. I de tidigare dämmer fastmattesträngar mjukmatte- och lösbottenflarkar samt enstaka flarkgölar. De topogena kärren domineras av mjukmattor som mot kanterna övergår i fastmattegolv. I N går ett bäckdråg genom kärret och här finns också ett par större slukhål i anslutning till fastmarksholmar. Myrens N del är bredare och i SV utbreder sig ett stort parti med *nordlig mosse*. Kanterna mot fastmarken utgörs av tallbevuxna plan men de centrala delarna är öppna och upptas av strängar, höljor, dråg samt kärrfönster. Myrens O kant mot fastmarken samt den västra i söder utgörs av mer eller mindre trädbevuxna *soligena kärr* samt av *skogskärr*. I nordsluttningen i SO finns också en källa. Från Tvärmyrtjärnen som gränsar till myren i öster rinner en bäck ner genom myrens södra del.

Vegetation och flora: Vegetationen har huvudsakligen fattigkärrskaraktär. De topogena kärrens mjuk- och fastmattor utgörs huvudsakligen av ett bottenskikt där Sphagnum papillosum dominerar tillsammans med S. lindbergii. Fältskiktets dominanter är tråd- och flaskstarr. Strängflarkkärrets strängar domineras av fastmattor med S. papillosum, S. compactum och S. pulchrum samt tuvsäv

och trådstarr. Flarkarna utgörs av lösbottnar med S. majus, S. pulchrum och Cladopodiella fluitans samt vattenklöver, ängsull och dystarr som dominanter. Skogskärren utgörs av fattiga tall och gran/björkkärr. De soligena kärren utgörs till större delar av fastmattor med S. angustifolium, taggstarr och tuvsäv. Rikare mindre partier med dominans av S. teres och S.warnstorfii förekommer också. Vid källan dominerar källdunört och Warnstorfia exannulata tillsammans med arter som Philonotis seriata. Nedanför källan finns en rikare fastmatta med dominans av Warnstorfia sarmentosa, Paludella squarrosa och Scapania paludicola.

Fauna: Myren utgör värdeklass III i myrefågelinventeringen med arter som dalripa, ljungpipare, enkelbeckasin och grönbena.

Påverkan: Diken förekommer i kanten av myren längst i norr och i de tallbevuxna delarna av det stora mossepartiet. Dikena har bitvis kraftig men endast lokal påverkan. Tvärs över myrens vattendelare går en träspång kantad av ett dike. Strax intill finns också en nyare vinterväg och på N-sidan kantas myren av stora nyupptagna hyggen. Rester av gamla starrhässjor vittnar om att de topogena kärren tidigare uttnyttjats för slåtter.

Bedömning: Variationsrik höglägesmyr med bl a sträng-flarkkärr och betydande arealer soligena kärr. Myren är endast perifiert påverkad och hyser visst ornitologiskt värde.

Källa: Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Öster-Stormyran, Gårmyran. nr 116

Värdeklass I
Geokod 20H 7G 0D5J
Areal 181 ha
Flygbild 1986
Höh 440 m
VMI-nr 20H 7G01
Naturvårdsobjekt N84 094
Fältbesökt 1979-06, Mats Dynesius.

Kärrkomplex högt beläget strax söder om västerbottensgränsen. Myren sluttar ner mot centrum och avvattnas åt norr ner i Storsjön samt åt söder



via ett litet vattendrag ner i Svarttopptjärnarna. På vattendelaren i myren ligger ett *sträng-flarkkärr* med mjukmatte- och lösbottenflarkar samt flarkgölar. Från detta parti sänder myren ut två armar åt NV som i dess nedre delar upptas av fastmattedominerade *topogena kärr*. Längst upp i armarna vidtar glest trädbevuxna *soligena kärr*. I den arm som går söderut från strängflarkpartiet dominerar *skogskärr* och längst i söder finns också ett parti med soligent kärr. Här rinner en trädkantad bäck som leder från sträng-flarkpartiet. Myren gränsar i NV mot Väster-Stormyran (objekt 20H 7G02).

Fauna: Området utgör värdeklass II i myrfågelinventeringen med arter som enkelbeckasin, tofsvipa, brushane, gluttsnäppa och grönbena.


Påverkan: I myrens NO del finns diken i kanten och här gränsar myren mot dikade myrpartier. Även i NV finns diken som skär myrarmarna rakt av. Objektet är avgränsat mot dessa diken. Stora delar av omgivande fastmark är avverkad och utgörs av hyggen eller ungskogar.

Bedömning: Variationsrikt kärrkomplex med sträng-flarkkärr och betydande arealer soligena kärr. Myren hyser ett stort ornitologiskt värde.

Källa: Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Billsta-Rödmyran. nr 125

Värdeklass I
Geokod 20I 2F 1E1C
Areal 58 ha
Flygbild 1988
Höh 470 m
VMI-nr 20I 2F01
Naturvårdsobjekt NR84 091
Fältbesökt 1979-08, Per Simonsson.



Billsta-Rödmyran ligger högt belägen mellan Kålhuvudet, Storliden och ytterligare två skogsberg. Myren omges helt av naturskog av gran. I söder och norr kryper myren över vattendelarna men i övrigt sluttar den huvudsakligen åt NV vilket leder till att avvattningen sker i tre vädersträck. I söder på vattendelaren utbreder sig en *nordlig mosse* med risvegetation och mjukmattehöljor. Denna typ förekommer också i mindre enheter på de armar som myren sänder ut åt norr. Centralt och i myrens längdriktning ligger en större fastmarksholme och norr om denna ett större parti med *topogent kärr*. Här dominerar mjukmattor med ett centralt parti med lösbotten och någon liten göl. Söder om fastmarksholmen utgörs myren av *blandmyr* som i norr gränsar mot ett svagt sluttande *skogskärr*. Denna typ förekommer på fler ställen i övergången mot fastmark och inkluderar även mindre fragment av sumpskog. Myren ligger inom Kålhuvudets naturreservat.

Vegetation och flora: Vegetationen utgörs helt av fattiga växtsamhällen. I kärren dominerar tuvull, dystarr, sumpstarr och flaskstarr mjukmattornas fältskikt. Skogskärren utgörs av grankärr där klotstarr är karaktärsart i fältskiktet. Även i övrigt är det framför allt granen som utgör dominerande träd på myren.


Påverkan: Sånär som på några mycket små och perifiert belägna diken är myren helt opåverkad.

Bedömning: Myren värde ligger i att den i stort är helt opåverkad och omges av naturskog tillsammans med vilken den utgör naturligt fungerande helhet. Riksintresse, Myrskyddsplan, Naturreservat.

Källa: Simonsson, P. 1979. Urskogar och naturskogar i västernorrlands län, rapport 1979:11. Länsstyrelsen i Västernorrland, Härnösand.

Västerhus-Rödmyran. nr 127

Värdeklass I
Geokod 20I 2G 1A0G
Areal 43 ha
Flygbild 1988
Höh 430 m
VMI-nr 20I 2G01
Naturvårdsobjekt NR84 091
Fältbesökt 1979-08, Per Simonsson.



Västerhus-Rödmyran ligger i skogsberget Storlidens O-sluttning och har en amplitud på över 60 meter. Myren omges helt av naturskog av gran. Avvattning sker via en liten bäck åt öster ner i Hejarsbäcken. Åt väster, upp i sluttningen, sänder myren iväg två armar som till större delen utgörs av *backkärr* och till mindre del av *soligent kärr*. Längst ner i öster planar myren ut och här breder

topogena kärr ut sig. Här finns längst i norr ett par små vattensamlingar, rester av en tjärn, och runt dessa ett mindre parti med mjukmatta. I övrigt dominerar fastmattor, även i de sluttande kärren. Mot fastmarken finns på flera håll *skogskärr* som övergår i *sumpskog*. Myren ligger inom Kålhuvudets naturreservat.

Vegetation och flora: Myren domineras av fattiga växtsamhällen huvudsakligen fastmattor med arter som taggstarr, tuvull och tuvsäv. I skogskärren är det gran som dominerar med klotstarr i fältskiktet. Skogskärren går diffust över i gransumpskog av klotstarrtyp eller rikare typer. Här återfinns de hotade mossorna Anastrophyllum hellerianum, Calypogeia suecica och Lophozia ascendens, alla hotklass 4.

Påverkan: Myren är helt opåverkad sånär som på ett litet dike längst i norr. Förmodligen har den före detta tjärnen en gång dränerats ur med hjälp av detta.

Bedömning: De kraftigt sluttande kärren utgör en ovanlig myrtyp för denna naturgeografiska region och myren är dessutom i stort helt opåverkad. Tillsammans med den omgivande naturskogen utgör den en naturligt fungerande helhet som blivit allt ovanligare i norrlands inland. Riksintresse, Myrskyddsplan, Naturreservat.


Källa: Simonsson, P 1979. Urskogar och naturskogar i västernorrlands län, rapport 1979:11. Länsstyrelsen i Västernorrland, Härnösand.

Söderström, L. 1992. Inventering av mossor i 10 sumpskogar i Västernorrlands län. Stencil Skogsstyrelsen.

Frusenmyran. nr 129


Värdeklass II
Geokod 20I 3C 1D6B
Areal 69 ha
Flygbild 1991
Höh 255 m
VMI-nr 20I 3C01
Naturvårdsobjekt N84 166
Fältbesökt 1978-06, Enar Olofsson.

Långsmalt myrkomplex beläget längs Utterån nedströms Stor-Uttersjön. Myren är huvudsakligen plan och avvattnas ner i ån. Längs ån sträcker



sig ett *strandkärr*, bitvis glest trädbevuxen men huvudsakligen öppet. Ett flertal långsträckta fastmarksholmar (ev åsrygg) löper ovan strandkärren. Ovanför dessa finns i S samt i myrens mellersta del två partier med *sträng-flarkkärr*. Fastmattesträngar dämmer stora mjukmatte- och lösbottenflarkar samt även flarkgölar. Här förekommer också smärre arealer med fastmattegolv. Längst i norr ligger ett *blandmyrparti* med huvudsakligen strängstruktur. Mellan detta och sträng-flarkkärren upptas myren av glest tallbevuxen *nordlig mosse.*

Fauna: Värdeklass III i länets myrfågelinventering med arter som grönbena (4 par), gulärla, tofsvipa (2 par), kricka och enkelbeckasin.



Tofsvipa


Påverkan: Stora delar av den omgivande fastmarken, samt enstaka fastmarksholmar, är avverkad och utgörs huvudsakligen av hyggen och ungskog. Vägar löper parallellt på båda sidor om myren. Själva myren är dock hydrologiskt opåverkad.

Bedömning: Hydrologiskt opåverkat myrkomplex med ett stort antal fastmarksholmar, strandkärr samt sträng-flarkkärr. Visst ornitologiskt värde.

Källa: Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Gamm-Uttersjömyrorna. nr 131

Värdeklass II
Geokod 20I 4B 0B5G
Areal 126 ha
Flygbild 1991
Höh 285 m
VMI-nr 20I 4B01
Naturvårdsobjekt N84 368




Myren utgörs av en myr/fastmarksmosaik belägen vid Stor-Uttersjöns NO strand. Myren sluttar svagt åt S och avvattas direkt ner i sjön. Ett flertal större fastmarksholmar finns spridda inom området. Vissa av dessa har en skog med naturskogskaraktär. De övre delarna av myren upptas av *skogskärr* och glest tallbevuxna *blandmyrar*. De senare utgörs av fastmattegolv, mjukmattedråg samt mindre mosseplan. Här finns även mindre partier med *blandsumpskog*. Även i myrens Ö del dominerar blandmyrar och här finns också partier med strängflarkuppbyggnad. Mossesträngar alternerar här med mjukmatteflarkar. Längst upp i NV ligger ett parti med glest tallbevuxna plan med *nordlig mosse*. Här finns också några gölar. Ner mellan fastmarksholmarna i myrens V del löper ett bredare stråk med omväxlande öppna *topogena kärr* och *strängflarkkärr*. Detta stråk möter i sin nedre del sjöstranden. De topogena kärren domineras av fastmattor men mjukmattor förekommer också. I strängflarkkärret dämmer fastmattesträngar mjukmatte- och lösbottenflarkar.

Påverkan: I myrens övre del förekommer enstaka diken med svag lokal påverkan men i ett centralt beläget parti med skogskärr finns ett dikessystem med en stark lokal påverkan. En stor del av anslutande fastmark samt flera av fastmarksholmarna är avverkade.

Bedömning: Tämligen variationsrikt och mosaikartat myrkomplex som till stor del ansluter till större sjö. Sträng-flarkkärr utgör intressant myrelement.

Kallkällmyran, Ladumyran. nr 133

Värdeklass II
Geokod 20I 4D 0C9D
Areal 101 ha
Flygbild 1991
Höh 285 m
VMI-nr 20I 4D02
Naturvårdsobjekt N84 369




Myr/fastmarksmosaik belägen strax N om Storselsån, två km V sjön Västborgaren. Området sluttar svagt åt SO och S och avvattnas ner i Storselsån. Myren innehåller ett mycket stort antal fastmarksholmar som omges av huvudsakligen trädbevuxna myrelement. I den V delen finns dock flera partier med öppna *topogena kärr*. Dessa domineras av fastmattor men även mjukmattor förekommer samt mindre strängade partier. I dessa alternerar fastmattesträngar med lösbottenflarkar. Här finns också en en *tjärn*. Övriga delar av myren upptas av omväxlande delar *nordlig mosse* och *sumpskog*. Mosseplanen är till stora delar tallskogsbevuxna. Sumpskogarna som dominerar den östra delen är av blandskogstyp.

Bedömning: Opåverkad myr/fastmarksmosaik med betydande arealer sumpskog.

Storselsmyrorna. nr 138

Värdeklass II
Geokod 20I 5C 4C4E
Areal 90 ha
Flygbild 1991
Höh 375 m
VMI-nr 20I 5C01
Naturvårdsobjekt N84 370



Storselsmyrorna är belägna mellan Stensjön och Mossavattnet, knappt tio km NO om byn Rödvattnet. Myren är utsträckt i NV-SO:lig riktning och sluttar in mot mitten. Det centrala partiet sluttar åt NO och avvattnar myren via en liten bäck ner i Mossavattnet. Myrens vidare centrala del upptas av öppna fastmattedominerade *topogena kärr* med inslag av mjukmattedråg. Invid en fastmarksholme finns här ett parti med *skogskärr* som innehållen flera mindre gölar. Myrens V arm upptas till stora delar av *blandmyr* där vissa delar är strängade med mjukmatteflarkar. Övriga delar av blandmyrarna utgörs av fastmattegolv samt mindre glest trädtäckta mosseplan. Längst i V finns också en litet parti med *sträng-flarkkärr* med mjukmatte/lösbottenflarkar. Här finns dessutom mindre delar med skogskärr och *sumpskog*. Även myrens östra arm domineras av blandmyr men med glest tallbevuxna plan med *nordlig mosse* mot fastmarken.

Påverkan: I sumpskogen längst i V finns några enstaka diken med endast lokal påverkan men i övrigt är myren ostörd.

Bedömning: Tämligen variationsrik och hydrologiskt intakt myr.

Rödmossamyran, Stormyran. nr 139

Värdeklass II
Geokod 20I 5G 3E4G
Areal 95 ha
Flygbild 1988
Höh 230 m
VMI-nr 20I 5G01
Naturvårdsobjekt N84 257
Fältbesökt 1979-08, Per Simonsson.



Mindre myrkomplex beläget strax O om Gideälven vid Nordanås. Myren sluttar svagt åt SO och avvattnas i denna riktning, ner i älven, av den bäck som flyter genom området. Bäcken som kantas av en bård av *strandskog* delar myren i två hälfter. Norra delen domineras centralt av en *strängblandmyr* med tydligt avsatta mossesträngar och mellanliggande mjuk- och fastmatte- samt lösbottenflarkar. Några enstaka gölar förekommer också. I anslutning till detta parti finns mosaikartad *blandmyr* och mot fastmarken större partier med tallbevuxen *nordlig mosse*. Söder om bäcken alternerar nordlig mosse med blandmyrpartier. Längst i O ligger ett öppet *topogent kärr*.


Vegetation och flora: Strängblandmyrens strängar hyser en mossevegetation med ljung, dvärgbjörk och tuvull som fältskiktsdominanter. I flarkarna dominerar antingen kallgräs och tuvull eller dystarr och vitag.

Påverkan: I V är myren avgränsad mot dikade och uppodlade perifiera delar. Myren i övrigt är opåverkad.

Bedömning: Tämligen varierat myrkomplex med tydligt strukturerad strängblandmyr. Myren är hydrologiskt intakt.

Lillsjöslåttern. nr 140

Värdeklass I
Geokod 20I 6A 0A1H
Areal 5 ha
Flygbild 1978
Höh 365 m
VMI-nr 20I 6A01
Naturvårdsobjekt NR84 080
Fältbesökt 1979, Lennart Isaksson; 1990, Helén Öhrling.




Lillsjöslåttern ligger i en sydsluttning ner mot Lillsjön, fyra km NV byn Rödvattnet. Genom områdets O del rinner Gulltjärnsbäcken som tillsammans med övriga delar lämnar sitt vatten ner i sjön. I områdets norra del finns ett mindre öppet *topogent kärr* som utgörs av fastmattor. På båda sidor om bäcken och gränsande mot sjön ligger ett lite större parti. Detta upptas huvudsakligen av öppna kärr som utgörs av fastmattor samt mjukmattor mot bäcken och sjön. Mellan dessa öppna delar finns områden med *barrsumpskog* och mindre delar *skogskärr*. I dessa delar förekommer bitvis inslag av fastmark. Området utgör riksintresse för såväl natur- som för kulturmiljövården samt naturreservat.

Vegetation och flora: Områdets vegetation är uteslutande av fattigkärrstyp. Vissa delar har dock pga ökad näringsgenomströmmning genom översilning en något mer intermediär vegetation. Det övre öppna kärret domineras i fältskiktet av flaskstarr tillsammans med kråkklöver och kärrviol. Här förekommer också grå- och sumpstarr samt tuvtåtel och brunrör allmänt. Bottenskiktet domineras av Sphagnum angustifolium och S. girgensohnii. Här förekommer även S. ters och Warnstorfia exannulata sällsynt. Övriga delar av de öppna kärren hyser en likartad vegetation men med S. fallax och S. riparium som dominanter i blötare delar. Vissa partier ner mot sjön, främst O om bäcken har ett mycket tätt buskskikt av lapp- och grönvide. Längsmed bäcken finns sumpgranskog av lågörttyp.

Påverkan: De topogena kärren utgörs av silängar som slåttrats in i sen tid. Slåtter bedrivs i dag inom ramen för reservatsskötseln, främst på det övre partiet. Detta samt det nedre kärret är även påverkat av de sildiken och rännor som ökar vattengenomströmningen. På det nedre partiet har betydande ytor växt igen med viden sedan slåttern upphört. Flera starrlador och hässjor finns inom området, både upprustade och förfallna.

Hässja



Bedömning: Lillsjöslåttern utgör kanske den sista kvarlevan av en siläng där slåtter och översilning fortfarande bedrivs. Området utgör därför ett ovärderligt dokument över äldre tiders nyttjande av våtmarker. Riksintresse, Myrskyddsplan, Naturreservat.

Källa: Isaksson, L. 1981. Lillsjöslåttern, en botanisk och kulturhistorisk undersökning, rapport 1981:5. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Öhrling, H., Viotti, A. & Berg, I. 1990. Ängs- och hagmarker i Västernorrlands län, del 2 Ångermanland, rapport 1990:3. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Stormyran. nr 142

Värdeklass I
Geokod 20I 6E 2D9D
Areal 174 ha
Flygbild 1991
Höh 277 m
VMI-nr 20I 6E01
Naturvårdsobjekt N84 371
Fältbesökt 1981-07, Karin Due & Marie Muhr.



Stormyran är belägen två km söder om byn Remmarn, 30 km NV om Björna. Myren ligger mellan flera skogsberg och sträcker sig upp i NV riktning från Mitti-Holmsjön i S. Övervägande delarna av myren avvattnas i denna riktning av en liten bäck som rinner genom myren ner i sjön. Bäcken försvinner bitvis ner i slukhål för att lite senare dyka upp igen. De allra nordligast delen avvattnas i detta väderstreck ner i Remmarån. Genom de centrala delarna sträcker sig ett stråk med öppna *topogena kärr* med ett bäckdråg i mitten. Kärren domineras av mjukmattor. I S vidgar sig myren och här finns en *tjärn* omgiven a topogena kärr. Här finns också tre fastmarksholm varav två kantas av ett parti med *skogskärr*. I myrens mellersta del finns ett par partier med *blandmyr* bestående av ett fastmattegolv med mosseöar. Kanterna mot fastmarken upptas i S av skogskärr och glest tallbevuxna plan med *nordlig mosse* genomdragna av mjukmattedråg. Myren nordligaste del upptas av stora ytor med en blandning av skogskärr och *sumpskog*.

Vegetation och flora: Myren består till övervägande del av fattiga eller intermediära kärr. De öppna kärren domineras i botten främst av Sphagnum papillosum och i fältskiktet av omväxlande tråd- och flaskstarr samt blåtåtel, tuvull och tuvsäv. I intermediära delar kommer arter som snip, dvärglummer och bladvass in. Skogskärren utgörs huvudsakligen av blandskogskärr med klotstarrdominans.


Påverkan: Längst i N finns ett par små diken, med mycket marginell påverkan, i kanten mot fastmarken. Spår av en vinterväg löper diagonalt över myrens N del men påverkan är ringa. Rester efter hässjor i högstarrpartier vittnar om äldre tiders slåtter.

Bedömning: Variationsrik och opåverkad myr med stora öppna kärr samt sumpskogar som intressanta myrelement.

Källa: Due, K. & Muhr, M. 1982. Tretton myrar i Västernorrlands län, en botanisk inventering, rapport 1983:1. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Stormyran. nr 144

Värdeklass II
Geokod 20I 6G 3C6D
Areal 74 ha
Flygbild 1988
Höh 255 m
VMI-nr 20I 6G03
Naturvårdsobjekt N84 258




Stormyran ligger invid Gideälvens O strand fem km N om Studsvikens kapell. Myren sluttar svagt åt V och avvattnas direkt ner i älven. I myrens S del finns ett större öppet parti där *sträng-flarkkärr* omger två *tjärar*. Här dämmer fastmattesträngar lösbottenflarkar och här finns även delar med mjukmattegolv. Mot fastmarken i O finns *skogskärr*. Myren sänder i SV iväg en tarm söderut längs älven med tre mindre tjärnar omgivna av *nordlig mosse*. Norr om det öppna partiet ligger flera glest tallbevuxna plan med nordlig mosse avgränsade av breda kärrdråg som för vatten ner mot älven. I myrens V kant finns flera fastmarksholmar. Mellan dessa och älven dominerar *sumpskog* med inslag av skogskärr. Sumpskogarna närmast älven är lövdominerade och utbildade på leveer.

Påverkan: Myren gränsar i O mot en skogsbilväg men är annars helt opåverkad.

Bedömning: Tämligen variationsrik och helt opåverkad myr med sträng-flarkkärr samt sumpskogar på leveer utmed Gideälven.

Skarpmyran. nr 146

Värdeklass I
Geokod 20I 8B 0E5C
Areal 62 ha
Flygbild 1986
Höh 365 m
VMI-nr 20I 8B01
Naturvårdsobjekt NR84 083
Fältbesökt 1978-06, Mats Dynesius.



Den långsträckta Skarpmyran är orienterad i NV-SO:lig riktning och belägen fem km SO om byn Tegelträsk och västerbottensgränsen. Myrens S del sluttar åt SO och den norra åt V och dräneringen sker i dessa riktninger. Myrens mellersta del upptas av en strängad *sluttande mosse* där strängar alternerar med mjukmattehöljor. Mot fastmarken finns här en kantzon med *skogskärr*. I den N delen ligger en mindre *tjärn* omgiven av öppna *topogena kärr* som närmast vattnet utgörs av gungflyn. Längre uppmot kanterna vidtar glest tallbevuxna plan med *nordlig mosse*. Myrens S del upptas centralt av ett parti med *strängblandmyr* med mossesträngar på ett fast/mjukmattegolv. Här finns också mindre delar topogent kärr samt skogskärr och nordlig mosse i kanterna mot fastmarken.

Fauna: Myren utgör värdeklass III i myrfågelinventeringen med arter som storspov, småspov, gluttsnäppa och grönbena.


Bedömning: Variationsrik och helt opåverkad mindre myr med visst ornitologiskt värde.

Källa: Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Storslättmyran. nr 147

Värdeklass I
Geokod 20I 8B 0D5C
Areal 138 ha
Flygbild 1991
Höh 345 m
VMI-nr 20I 8B02
Naturvårdsobjekt N84 373

Långsträckt myrkomplex beläget längs Holmsjöbäcken strax S om västerbottensgränsen. Myren sluttar från sidorna ner mot bäcken som avvattnar myren åt SO. Bäcken kantas av *strandkärr* som huvudsakligen är öppna men i N kantas den av en bård med strandskog. I N där myren är bredare upptas den till större delen av *topogena kärr* av varierande slag. Här förekommer fast- och mjukmattor, lösbottnar, mindre partier med sträng-flarkkärr samt även små partier med soligena kärr. I myrens södra del dominerar glest tallbevuxen *nordlig mosse* men här finns också mindre kärrpartier i anslutning till bäcken.




Påverkan: Förutom några mycket små, perifiert belägna diken, med obefintlig inverkan, är myren opåverkad.

Bedömning: Större opåverkat myrkomplex med hydrologiskt variationsrika topogena kärr samt ett mycket långt strandkärr.


Hem-Stormyran. nr 148

Värdeklass II
Geokod 20I 8B 1A9D
Areal 114 ha
Flygbild 1991
Höh 395 m
VMI-nr 20I 8B03
Naturvårdsobjekt N84 084
Fältbesökt 1978-06, Bertil Charlie Wallin.



Kärrkomplex beläget strax söder om byn Tegelträsk på västerbottensgränsen. Större delen av myren avvattnas åt NV ner i sjön Tegelträsket och en mindre del åt S via ett litet vattendrag. Längst i N, mot byn finns ett parti med bitvis strängat *skogskärr* som ansluter till uppodlad myrmark. Här ligger också en liten *tjärn*. Söder därom finns en stor öppen myrvidd som centralt upptas av *sträng-flarkkärr*. Fastmattesträngar alternerar med mjukmatte- och lösbottenflarkar samt flarkgölar. Sträng-flarkkärret omges av *topogena kärr* med fastmattor genomdragna av blötare dråg som löper in mot det strängade partiet. Mot S smalnar myren av och upptas här av topogena fastmattekärr med inslag av något strängat parti. En lång fastmarksholme ligger mitt i myren. Längs kanterna mot fastmarken i V samt i O finns smalare partier med glest tallbevuxna *nordliga mossar*.

Fauna: Myren utgör värdeklass III i myrfågelinventeringen med arter som tofsvipa, storspov och småspov.



Småspov


Påverkan: I skogskärret längst i norr finns flera kraftiga diken och uppodlad myrmark ansluter. I öster utgör en skogsbilväg, som avskurit en myrarm, gräns för myren. I stort är dock myren hydrologiskt intakt.

Bedömning: Kärrkomplex med en stor öppen myrvidd med betydande arealer sträng-flarkkärr. Störningen är ringa och myren hyser också visst ornitologiskt värde.

Källa: Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Tallmyran, Slädamyran. nr 149

Värdeklass II
Geokod 20I 8C 1A1F
Areal 237 ha
Flygbild 1991
Höh 295 m
VMI-nr 20I 8C01
Naturvårdsobjekt N84 372




Myren ligger i en bredare dalgång längsmed Häggsjöbäcken strax S om västerbottensgränsen. Området har ett mosaikartat utseende och innehåller ett stort antal fastmarksholmar. Myren sluttar från sidorna ner mot bäcken, som kantad av en bred zon med *strandkärr*, rinner centralt genom större delen av området och avvattnar det i SO riktning. Ovanför strandkärren vidtar öppna *topogena kärr* dominerade av fastmattor och enstaka mjukmattedråg. Mindre strängade partier med lösbottenflarkar förekommer också. I de öppna kärren finns också flera gölar. Högre belägna delar på bäckens V sida upptas av *blandmyrar*. Här ligger också tre mindre *tjärnar*. På den O sidan upptas motsvarande delar av glest tallbevuxna plan med *nordlig mosse*, bitvis med strängar och mjukmattehöljor. I anslutning till fastmark finns också flera partier med *sumpskog*. Myrens sydligaste del har ej kontakt med bäcken och upptas centralt av topogena kärr omgivna av nordlig mosse.

Påverkan: Några små perifiert belägna diken, med marginell inverkan, förekommer. En kraftledning passerar också över myrens S del. I den S delen finns en kraftig dammanläggning i bäcken. På grund av denna utsätts strandkärren omväxlande för dränkning eller uttorkning med en mycket kraftig vegetationspåverkan som följd.

Bedömning: Stort mosaikartat och mångformigt myrkomplex vars centrala delar dock utsätts för kraftig påverkan genom periodvis dämning.

Stor-Flärkmyran. nr 150

Värdeklass II
Geokod 20I 8E 2C1I
Areal 237 ha
Flygbild 1988
Höh 240 m
VMI-nr 20I 8E01
Naturvårdsobjekt N84 131
Fältbesökt 1978-06, Mats Dynesius; 1980-06, Per Simonsson.




Större myrkomplex som gränsar mot Flärken och i väster avgränsas av Flärkån till vilken den plana myren avvattnas. Myren utgörs till övervägande delen av glest tallbevuxen *nordlig mosse*. Denna får mot väster allt tydligare strängar, inneslutande en mängd höljor. Här finns också ett par vattenfyllda gölar omgivna av lösbottnar. Från väster ner

mot Flärkån löper en liten bäck genom mossen. Mot väster övergår mossen i en *strängblandmyr* med huvudsakligen mjukmatteflarkar samt ett par gölar omgivna av lösbottnar. Längst i väster finns ett parti med *skogskärr* mellan Flärken och en grupp fastmarksholmar. En rad av fastmarksholmar löper mellan mossen i öster och ån. Mellan dessa och ån finns huvudsakligen öppna, eller längre upp glest trädbevuxna, *strandkärr*.

Vegetation och flora: Myrens vegetation domineras av fattiga ombrotrofa mossesamhällen. Strandkärren längs Flärkån utgörs dock av högstarrvegetation.

Fauna: Myren utgör värdeklass III i myrfågelinventeringen med arter som kricka, fiskgjuse, dalripa, enkelbeckasin, tofsvipa, gluttsnäppa, grönbena och varfågel.



Varfågel

Påverkan: Genom myrens östra och södra del löper långa diken som till synes haft mycket begränsad inverkan på mossens hydrologi. En rejäl dammanläggning finns i Flärkån vid myrens sydgräns och innebär att maden utsätts för en fluktuerande vattennivå.


Bedömning: Stort mossedominerat myrkomplex med omfattande strandkärr längs Flärkån. Myren har också visst ornitologiskt värde.

Källa: Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Simonsson, P. 1980. Naturinventering av myrarna Bäckmyran, Stor-Flärkmyran och Degermyran i Örnsköldsviks kommun. Opublicerad rapport vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Rönbergsmyran. nr 152

Värdeklass II
Geokod 20I 8E 4E7H
Areal 191 ha
Flygbild 1991
Höh 265 m
VMI-nr 20I 8E03
Naturvårdsobjekt N84 256
Fältbesökt 1978-06, Bertil Charlie Wallin.



Rönbergsmyran är belägen V om Gideälven, fem km NV Tällvattnet. Myrens centrala parti är huvudsakligen plant och ligger på en vattendelare. Avvattningen sker både åt V till Flärkån samt åt O ner mot Gidälven. Myren har en mycket flikig utsträckning. I dess centrala parti ligger en vackert utbildad öppen *strängblandmyr* där mossesträngar alternerar med mjukmatteflarkar och ett flertal flarkgölar. Lite längre åt V finns en större yta med öppet *topogent kärr* med mjuk- och fastmattegolv. Övriga delar av myrens centrala parti domineras av glest trädtäckta plan med *nordlig mosse* med inslag av mjukmattehöljor. Här finns också flera mindre partier med *skogskärr*. Längst i O ligger några mindre *tjärnar*. Tarmen som myren sänder ut i SV innehåller en vackert utbildad strängblandmyr. Här ligger flarkgölar som trappsteg dämda av mossesträngar.

Fauna: Myrtarmen i SV är besökt vid myrfågelinventeringen och arter som kricka, knipa, grönbena och gulärla har noterats.


Påverkan: I vissa delar förekommer körspår efter skogsmaskiner och större delar av omgivande fastmark är avverkade. Myrens hydrologi är dock intakt.

Bedömning: Tämligen variationsrik och hydrologiskt ostörd myr med vackert utbildade strängblandmyrar. Myren hyser dessutom ett visst ornitologiskt värde.

Källa: Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.


Björklundsmyran, Kammyran. nr 154

Värdeklass I
Geokod 20I 9F 2B3F
Areal 148 ha
Flygbild 1988
Höh 260 m
VMI-nr 20I 9F01
Naturvårdsobjekt N84 077
Fältbesökt 1978-06, Mats Dynesius & Bertil Charlie Wallin.



Långsträckt myrkomplex beläget i länets NO ände strax norr om Tällvattnet. Myren sluttar från sidorna mot centrum och avvattnas huvudsakligen åt söder ut i Gideälven samt till mindre del åt NV via Mörttjärnarna. Myrens norra del karaktäriseras av ett huvudsakligen öppet, blött parti där *sträng-flarkkärr, topogena kärr* alternerar med ett flertal *tjärnar* och gölar. Sträng-flarkkärrens kraftigt vindlande strängar innesluter båder mjukmatte- och lösbottenflarkar samt gölar. Kanterna mot fastmarken upptas av tallbevuxen *nordlig mosse* samt *skogskärr*. Mot myrens mitt blir dessa bredare och upptar tillsammans med ett flertal fastmarksholmar hela myrens bredd. Söder därom vidtar ett parti med *blandmyr* där smärre mossetungor och strängar alternerar med mjukmatte- och lösbotteflarkar samt en mängd gölar och tjärnar. Myrens S del domineras av ett större parti med glest tallbevuxen nordlig mosse uppsplittrat av ett flertal mindre fastmarksholmar. I myrens V kant rinner en bäck söderut och kantas här bitvis av *sumpskog*. En rullstensås löper längs myrens västra sida och till mindre del även ute i myren.

Fauna: Området utgörs av värdeklass I resp. II i myrfågelinventeringen med arter som gräsand, dalripa, trana, enkelbeckasin, småspov, gluttsnäppa och grönbena.



Gräsand

Påverkan: Myren är hydrologiskt opåverkad. I väster ansluter hyggen till liten del.


Bedömning: Mycket variationsrikt och hydrologiskt mångformigt myrkomplex med en rad olika myrtyper och ett stort antal tjärnar. Myren hyser också höga ornitologiska värden.

Källa: Guvå, L. 1970. Naturvårdsinventering i Västernorrlands län. Del 1 Ångermanland, Nolaskogsdelen. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Bäckmyran. nr 155

Värdeklass I
Geokod 20I 9G 2A5E
Areal 142 ha
Flygbild 1988
Höh 250 m
VMI-nr 20I 9G01
Naturvårdsobjekt N84 156, NR84 242
Fältbesökt 1978-06, Bertil Charlie Wallin, Mats Dynesius;
1980-06, Per Simonsson.



Långsträckt myrkomplex beläget utmed Gideälvens V strand i länets nordostligaste hörn. Myren avvattnas självfallet ner i älven. Älven kantas av en *strandskog*sbård och ovanför denna ligger bitvis en zon av *skogskärr*. I myrens södra del ligger ett parti med *sträng-flarkkärr* och angränsande *topogena kärr*. Här dämmer strängarna bitvis breda och blöta flarkar. Enstaka flarkgölar förekommer. Söder därom finns ett parti med *blandmyr* som centralt innehåller ett lösbottenparti med ett par större gölar. Myrens allra sydligaste del tillsammans med större delen av norra hälften utgörs av till övervägande delen glest tallbevuxen *nordlig mosse*. Längst i norr finns också ett mindre blötare parti med sträng-flarkkärr, topogent kärr samt blandmyr.

Vegetation och flora: Mossepartierna utgörs huvudsakligen av tallbevuxna rismossar där låga ris och tuvull dominerar. Fastmattekärren domineras av högstarrvegetation och sträng-flarkkärrens flarkar domineras av dystarr, vitstarr, vitag och ängsull. I botten finns också dy och dvärgbläddra.



Vitstarr

Fauna: Myren utgör värdeklass IV i myrfågelinventeringen men noteringar från senare fältbesök motiverar en högre klass. Arter som noterats är bl a kricka, enkelbeckasin, gluttsnäppa, grönbena och storspov.

Påverkan: Angränsande fastmark längs myrens NV sida är avverkad och utgörs av hyggen. De två gölarna på blandmyren i söder lär enl. uppgift utgöra äldre torvgravar. Myrslåtter har fordom bedrivits på myren.

Bedömning: Stort, opåverkat och variationsrikt myrkomplex som gränsar mot Gideälven. Myren hyser dessutom visst ornitologiskt värde.


Källa: Mascher, J. W. 1990. Ångermanlands flora. SBT-redaktionen, Lund.

Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Simonsson, P. 1980. Naturinventeringa av myrarna Bäckmyran, Stor-Flärkmyran och Degermyran i Örnsköldsviks kommun. Opublicerad rapport vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

St. Fäbodtjärnmyran. nr 159

Värdeklass II
Geokod 20J 1C 3E8D
Areal 169 ha
Flygbild 1986
Höh 195 m
VMI-nr 20J 1C01
Naturvårdsobjekt N84 260
Fältbesökt 1982-09, Karin Due & Marie Muhr.



St. Fäbodtjärnmyran är belägen två km NO om Gryssjön, 15 km N om Gideå. Myren sluttar svagt åt NV och V och avvattnas i den senare riktningen av en bäck, som rinner genom de N delarna, ner i Husån. Myren innehåller flera större och mindre fastmarksholmar och upptas till större delen av öppen *nordlig mosse*. Både mjukmattor och ristuvpartier upptar stora arealer. I N samt i S finns stora ytor med öppna *topogena kärr*. Mjukmattor dominerar men även fastmattor förekommer. I den S ytan finns också en *tjärn* omgiven av gungflyn. En myrtarm i SO upptas huvudsakligen av öppna kärr med fastmatteströngar. Mindre partier med *skogskärr* förekommer också i kanterna mot fastmark.


Vegetation och flora: Myren utgörs uteslutande av fattiga vegetationstyper där stora delar hyser en ren mossevegetation. De topogena kärren domineras i botten av Sphagnum balticum, S. compactum, S. tenellum och S. papillosum med ett fältskikt av tuvull och tuvsäv. Mindre partier med högstarrvegetation förekommer också. Skogskärren är oftast fattiga blandskogskärr med klotstarrdominans.

Bedömning: Tämligen stort och helt opåverkat myrkomplex beläget i en myrfattig omgivning.

Källa: Due, K. & Muhr, M. 1983. Nio myrar i Ångermanland. Opublicerad inventering vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Stormyran. nr 160

Värdeklass II
Geokod 20J 1C 1E9I
Areal 71 ha
Flygbild 1986
Höh 175 m
VMI-nr 20J 1C02
Naturvårdsobjekt N84 261



Stormyran ligger en km O om Gryssjön, 13 km N om Gideå. Myren sluttar mycket svagt åt SO och avvattnas i denna riktning av en bäck ner i Saluån. Den O delen domineras helt av ett stort öppet *topogent kärr* med ett centralt beläget bäckdråg. Kärrytan upptas av fastmattegolv med mjukmattedråg. I den V delen ligger en större fastmarksholme och S om den ett parti med bitvis strängad *blandmyr*. Här ligger mossesträngar och öar på ett fastmattegolv. Längst i V ligger höljebestödda glest tallbevuxna plan med *nordlig mosse*. Nordlig mosse upptar även den tarm som myren sänder ut i SO.

Påverkan: Ett dike korsar kärrpartiet men påverkan är endast lokal. I övrigt är myren ostörd.

Bedömning: Mindre myr med stora öppna kärrpartier med bl ett bäckdråg som intressant myrelement.

Nr 1

18I 8I 01 (3233) KLASS 1
MYR V HAMNBERGET 500 M SV ULVÖHAMN

Topogent kärr, 2 ha (2 ha våtm), 35 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
2 ha, glest trädtäckt. Botaniska värden.

Nr 2

18I 8I 02 (4431) KLASS 1
MYR V BÖLESBERGET 1 KM NV ULVÖHAMN

Topogent kärr, 3 ha (3 ha våtm), 45 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
3 ha, glest trädtäckt. Botaniska värden.

Nr 3

18I 9J 01 (2305) KLASS 2
STORMYRAN-ULVÖN 4 KM N ULVÖHAMN

Myrkomplex, 12 ha (12 ha våtm), 20 m ö h. Flygb. -87.
Det: Stefan Grundström.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
8 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Botaniska värden, diffus strängbildning.

Element 1: Gungfly, 70 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 2: Kantzon, 29 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Källa, 1 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
3 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Lagg, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Nr 4

19H 4I 01 (3928) KLASS 2
BÄRMSJÖMYRAN 24 KM NO SOLLEFTEÅ

Myrkomplex, 66 ha (63 ha våtm), 315 m ö h. Flygb. -86.
Storomr HE.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Naturskog i eller i anslutning.

Delobj. 1: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
10 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Strängblandmyr
31 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Flark, 44 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Flarkgöl, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 5: Tjärn
3 ha, fördelat på 3 ytor.

Nr 5

19H 4I 02 (3839) KLASS 3
MYR O BÄRMSJÖMYRAN 25 KM NO SOLLEFTEÅ

Myrkomplex, 78 ha (71 ha våtm), 310 m ö h. Flygb. -86.
Storomr HE.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
27 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 48 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 25 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 4: Bäck, 2 % av delobjektytan, öppet, blandskog.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
32 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Bäck, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Nr 6

19H 4J 01 (2403) KLASS 3
LILLTANNSJÖ-STORMYRAN 25 KM NO SOLLEFTEÅ

Myrkomplex, 73 ha (68 ha våtm), 345 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
11 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Ö̈ar, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
16 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 20 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
24 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 20 % av delobjektytan, öppet. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 5: Tjärn
5 ha.

Element 1: Gungfly, 20 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Nr 7

19H 5H 01 (3926) KLASS 2
MYR VID BÄRMSJÖTJÄRNEN 25 KM NNO SOLLEFTEÅ

Myrkomplex, 89 ha (75 ha våtm), 324 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll. Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
14 ha, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
11 ha, öppet.

Element 1: Flark, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Flark, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Lösbotten.

Element 3: Sträng, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
27 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning. Nedlagda odlingar i våtmarken.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 25 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
23 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 5: Tjärn
4 ha.

Nr 8

19H 5I 01 (1305) KLASS 3
BÄRMSJÖMYRAN 23 KM NNO SOLLEFTEÅ

Myrkomplex, 43 ha (42 ha våtm), 320 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll. Naturskog i eller i anslutning, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 48 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 48 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Mindre vattenytor, 4 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten. Rest av tjärn.

Delobj. 2: Topogent kärr
10 ha, mosaikartad fördelning, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
13 ha, mosaikartad fördelning, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
9 ha, öppet.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 9

19H 5I 02 (2728) KLASS 2
MYR VID ÖVERVATTNET 27 KM NNO SOLLEFTEÅ

Myrkomplex, 136 ha (118 ha våtm), 325 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Gungfly, 15 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Bäck, 3 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten. Sel.

Element 4: Mindre vattenytor, 2 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten. Rest av tjärn.

Delobj. 2: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
42 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 20 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
49 ha, fördelat på 6 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 28 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Bäck, 2 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 5: Tjärn
6 ha.

Nr 10

19H 5I 03 (2947) KLASS 3
MYR V GÄDDVATTNET 29 KM NO SOLLEFTEÅ

Myrkomplex, 61 ha (55 ha våtm), 315 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
19 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag generell påverkan från kalkning utförd.

Element 1: Dråg, 49 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Element 4: Bäck, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
36 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 3: Tjärn
1 ha.

Nr 11

19H 6G 01 (3828) KLASS 3
TEGMYRAN, STORMYRAN 29 KM OSO NÄSÅKER

Kärrkomplex, 72 ha (61 ha våtm), 255 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
16 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
13 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 59 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 3: Flarkgöl, 6 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Topogent kärr
22 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
10 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 35 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Delobj. 5: Tjärn
4 ha, fördelat på 3 ytor.

Nr 12

19H 6G 02 (3633) KLASS 3
BJÖRKMYRAN 26 KM NNO SOLLEFTEÅ

Myrkomplex, 88 ha (85 ha våtm), 245 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
62 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 64 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Bäck, 1 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 4: Gungfly, 15 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta-lösbotten. Sjö ansluter till minst 25%.

Element 5: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
23 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 39 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Golv, 10 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten. Rest av tjärn.

Element 5: Göl, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Nr 13

19H 7G 01 (2437) KLASS 3
STAVARMYRAN 29 KM O NÄSÅKER

Myrkomplex, 82 ha (75 ha våtm), 280 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
27 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 66 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Flark, 5 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 5: Bäck, 4 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten. Sel.

Delobj. 2: Topogent kärr
23 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 4: Bäck, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Permanent öppet vatten. Bäver förekommer, större förekomst av döda träd.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
13 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 77 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Göl, 3 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
13 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin, kraftledning.

Element 1: Sträng, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Nr 14

19H 7H 01 (1101) KLASS 2
FRÄTTNET 30 KM O NÄSÅKER

Våtmarkskomplex, 135 ha (112 ha våtm), 280 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Äldre dammanläggning i våtmarken, höjd vattennivå genom dämning, området ornitologiskt inventerat, sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
40 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag generell påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 71 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Mindre vattenytor, 4 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Mad vid vattendrag
43 ha, fördelat på 6 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, öppet. Vattenvegetation.

Element 3: Lagun, 15 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 4: Bevuxen sjö
22 ha, fördelat på 8 ytor, öppet.

Element 1: Gungfly, 85 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor.

Element 2: Lagun, 15 % av delobjektytan, öppet.

Nr 15

19H 7H 02 (2724) KLASS 3
MYR V LÖVSJÖN 27 KM VSV BREDBYN

Myrkomplex, 71 ha (71 ha våtm), 320 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Topogent kärr
36 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag generell påverkan från kalkning utförd.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
16 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
19 ha, öppet. Svag generell påverkan från kalkning utförd.

Element 1: Golv, 74 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Öar, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Göl, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Nr 16

19H 7J 01 (4748) KLASS 3
STORMYRAN, SKALMSJÖMYRAN 15 KM V BREDBYN

Kärrkomplex, 104 ha (93 ha våtm), 245 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
32 ha, fördelat på 6 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
24 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Sträng, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 45 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Flark, 15 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 3: Topogent kärr
16 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
13 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 5: Vegetationsrikt vatten
8 ha, öppet.

Element 1: Vegetation utmed sjöstrand, 90 % av delobjektytan, öppet. Vattenvegetation.

Nr 17

19H 8F 02 (4425) KLASS 3
STORMYRAN 25 KM ONO NÄSÅKER

Myrkomplex, 167 ha (142 ha våtm), 340 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
39 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strångbildning.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Soligent kärr
15 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Öar, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
49 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 25 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 7 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Bäck, 3 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
29 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 5: Tjärn
9 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Gungfly, 10 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 6: Sumpskog
10 ha, fördelat på 6 ytor. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Nr 18

19H 8G 01 (2124) KLASS 3
TORRTALLMYRAN 29 KM O NÄSÅKER

Myrkomplex, 108 ha (106 ha våtm), 340 m ö h. Flygb. -91.
Det: Sören Uppsäll.
Höjdskillnad 50-100 m, sjö ansluter till högst 24%, terrängföljande våtmark.

Delobj. 1: Topogent kärr
24 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, kalkning utförd, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
49 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kalkning utförd, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
16 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Sluttande mosse
9 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 35 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 55 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Nr 19

19H 8H 01 (1701) KLASS 3
LÅSJÖMYRAN 30 KM V BREDBYN

Våtmarkskomplex, 44 ha (40 ha våtm), 310 m ö h. Flygb. -91.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
7 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Flark, 31 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 3: Topogent kärr
9 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
14 ha, fördelat på 4 ytor.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Nr 20

19H 8J 01 (3128) KLASS 3
TVÄRAMYRAN 17 KM V BREDBYN

Myrkomplex, 68 ha (68 ha våtm), 270 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Flikiga kantzoner.

Delobj. 1: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 58 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Göl, 2 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Topogent kärr
24 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
14 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Öar, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
10 ha. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Nr 21

19H 9F 01 (2136) KLASS 3
GÖSTAMYRAN 25 KM ONO NÄSÅKER

Våtmarkskomplex, 89 ha (81 ha våtm), 240 m ö h. Flygb. -91.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
15 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, körspår från traktor/skogsmaskin, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
16 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Öar, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Mad vid vattendrag
11 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Meandring.

Element 1: Golv, 42 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Bäck, 18 % av delobjektytan, öppet, blandskog.

Delobj. 5: Sumpskog
19 ha, fördelat på 4 ytor. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 74 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Bäck, 1 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog.

Delobj. 6: Tjärn
12 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Gungfly, 50 % av delobjektytan, öppet.

Nr 22

19H 9F 02 (4825) KLASS 3
LILL-HÖMYRAN 25 KM NO NÄSÅKER

Våtmarkskomplex, 80 ha (78 ha våtm), 270 m ö h. Flygb. -91.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten. Diffus strängbildning.

Delobj. 2: Topogent kärr
17 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande väg.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
10 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
11 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Öar, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 5: Mad vid vattendrag
10 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 42 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Element 3: Bäck, 3 % av delobjektytan, öppet, blandskog.

Delobj. 6: Sumpskog
10 ha, fördelat på 4 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Nr 23

19H 9F 03 (4539) KLASS 4
MYR V BERGSJÖTJ. 26 KM NO NÄSÅKER

Obestämbar myr, 62 ha (62 ha våtm), 295 m ö h. Flygb. -91.
Det: Sören Uppsäll.
Mycket starkt generellt påverkat av anslutande hyggen, dikning.

Nr 24

19H 9G 01 (0137) KLASS 1
MYR VID LÅNGTJÄRNEN 29 KM ONO NÄSÅKER

Myrkomplex, 130 ha (107 ha våtm), 285 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
17 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Gungfly, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 4: Bäck, 5 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Topogent kärr
13 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 28 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Bäck, 2 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
51 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 3 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 17 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Element 4: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Strängblandmyr
26 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 45 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Flark, 28 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Flarkgöl, 2 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 5: Tjärn
6 ha, fördelat på 3 ytor.

Nr 25

19H 9G 02 (2030) KLASS 3
STORFLON 30 KM NO NÄSÅKER

Myrkomplex, 82 ha (76 ha våtm), 290 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
42 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Element 3: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
32 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning. Nedlagda odlingar i våtmarken.

Element 1: Mosseplan, 55 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Element 4: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 3: Tjärn
2 ha, fördelat på 3 ytor.

Nr 26

19H 9H 01 (0944) KLASS 3
MYR VID STOR-TORRTJÄRNEN 26 KM VNV BREDBYN

Mossekomplex, 95 ha (78 ha våtm), 225 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
68 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 2: Mad vid vattendrag
12 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 58 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Gräs/starrvegetation.

Element 3: Bäck, 17 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 3: Tjärn
9 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Gungfly, 10 % av delobjektytan, öppet.

Nr 27

19I 2B 01 (2349) KLASS 3
BÄRFLON, TREHÖRNINGEN 25 KM V BJÄSTA

Myrkomplex, 41 ha (40 ha våtm), 350 m ö h. Flygb. -92.
Det: Sören Uppsäll.
Flikiga kantzoner.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
12 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
19 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Öar, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
9 ha.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog.

Nr 28

19I 2D 01 (2416) KLASS 3
TORSMYRAN 20 KM V BJÄSTA

Myrkomplex, 118 ha (118 ha våtm), 255 m ö h. Flygb. -92.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
23 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
54 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
13 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
10 ha, öppet.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Öar, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Sumpskog
18 ha, fördelat på 9 eller fler ytor. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 29

19I 2D 02 (0926) KLASS 1
MYRIFASTMARKSMOSAIK RUNT BRYNGEBODARNA 19 KM V BJÄSTA

Våtmarkskomplex, 157 ha (120 ha våtm), 290 m ö h. Flygb. -92.
Det: Sören Uppsäll.
Fäbodvall i anslutning, mosaik med fastmark, naturskog i eller i anslutning.

Delobj. 1: Topogent kärr
10 ha, öppet.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
45 ha, mosaikartad fördelning, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
65 ha, mosaikartad fördelning. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 30

19I 2E 01 (0128) KLASS 3
KORNSJÖ-STORMYRAN 12 KM VSV BJÄSTA

Myrkomplex, 55 ha (54 ha våtm), 320 m ö h. Flygb. -92.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
25 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
10 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
19 ha, fördelat på 5 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Öar, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 31

19I 2H 01 (3549) KLASS 1
DEGELMRYAN 4 KM O BJÄSTA

Mossekomplex, 30 ha (30 ha våtm), 155 m ö h. Flygb. -88.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Koncentrisk mosse
20 ha, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning. Geovetenskapliga värden.

Element 1: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 2: Strång, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Randskog, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 5: Lagg, 30 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
10 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Kärrfönster, 25 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Nr 32

19I 3C 01 (2817) KLASS 3
GRÅSSEMYRAN 25 KM VNV BJÄSTA

Myrkomplex, 206 ha (193 ha våtm), 320 m ö h. Flygb. -92.
Det: Sören Uppsäll.
Naturskog i eller i anslutning.

Delobj. 1: Topogent kärr
43 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 45 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten. Rest av tjärn.

Delobj. 2: Topogent kärr
71 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
46 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
19 ha, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Öar, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Strängblandmyr
14 ha, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Sträng, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Flark, 20 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Nr 33

19I 3D 01 (2417) KLASS 1
BJÖRNBÖLES-STORMYRAN 10 KM SV SIDENSJÖ KYRKA

Myrkomplex, 238 ha (211 ha våtm), 260 m ö h. Flygb. -86. Fält -93.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Naturskog i eller i anslutning, terrängföljande våtmark.

Delobj. 1: Topogent kärr
42 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Ornitologiska värden, zoologiska värden.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Golv, 25 % av delobjektytan. Fastm.kärr, tuvsäv-S.papillosum-compactumtyp.

Element 1, underelem. 2: Golv, 18 % av delobjektytan. Mjukmattekärr, starr-S. papillosum var.

Element 1, underelem. 3: Tuva, 2 % av delobjektytan. Ristuvmosse av S. rubellumtyp.

Element 2: Dråg, 30 % av delobjektytan, öppet. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 3: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet. Fastm.kärr, tuvsäv-S.papillosum-compactumtyp. Diffus strängbildning.

Element 4: Flark, 20 % av delobjektytan, öppet. Mjukmattekärr, kallgräs-vitmoss variant.

Delobj. 2: Topogent kärr
65 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Tallkärr av klotstarrtyp.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gran-björkkärr av fattig vitmosstyp.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
23 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Mosseplan, 87 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 1, underelem. 1: Dråg, 3 % av delobjektytan. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Element 2, underelem. 1: Hölja, 6 % av delobjektytan. Fastm.mosse av tuvull-S. angustifoliumtyp.

Element 2, underelem. 2: Hölja, 4 % av delobjektytan. Mjukm.mosse, vitag-kallgräs-S.balticumtyp.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
67 ha, fördelat på 6 ytor, öppet.

Element 1: Öar, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Golv, 40 % av delobjektytan. Fastm.kärr, tuvsäv-S.papillosum-compactumtyp.

Element 1, underelem. 2: Golv, 26 % av delobjektytan. Fastmattemosse av tuvull-S. balticumtyp.

Element 1, underelem. 3: Golv, 4 % av delobjektytan. Fastm.kärr, tuvsäv-S.papillosum-compactumtyp.

Element 2: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2, underelem. 1: Öar, 15 % av delobjektytan. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 5: Sumpskog
12 ha, fördelat på 3 ytor. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog. Sumpgranskog av ristyp, hjortronvariant.

Delobj. 6: Tjärn
5 ha. Ornitologiska värden.

Element 1: Gungfly, 30 % av delobjektytan, öppet. Mjukm.mosse, vitag-kallgräs-S.balticumtyp.

Element 1, underelem. 1: Kantzon, 3 % av delobjektytan. Dvärgvassar.

Nr 34

19I 4B 01 (1008) KLASS 2
PIGTJÄRNMYRAN 21 KM SSV BREDBYN

Myrkomplex, 73 ha (73 ha våtm), 315 m ö h. Flygb. -92. Det: Sören Uppsäll. Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
21 ha, fördelat på 5 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Gungfly, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten. Rest av tjärn.

Delobj. 2: Topogent kärr
17 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 39 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 3: Bäck, 1 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
25 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
10 ha, öppet.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 35

19I 4C 01 (4015) KLASS 3
STORMYRAN 16 KM S BREDBYN

Topogent kärr, 57 ha (55 ha våtm), 255 m ö h. Flygb. -92. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
26 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin, kraftledning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 32 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Gungfly, 3 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten. Rest av tjärn.

Delobj. 2: Topogent kärr
19 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin, kraftledning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
10 ha, fördelat på 3 ytor. Stark lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Nr 36

19I 7B 01 (2319) KLASS 2
STORLADUMYRAN, GRÖNMYRAN, SÖNNERSTMYRAN 9 KM VSV BREDBYN

Våtmarkskomplex, 128 ha (127 ha våtm), 205 m ö h. Flygb. -92. Det: Sören Uppsäll. Flikiga kantzoner.

Delobj. 1: Topogent kärr
27 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från kalkning utförd.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Bäckdråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 2: Topogent kärr
50 ha, fördelat på 8 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, kalkning utförd, anslutande väg.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
48 ha, fördelat på 9 eller fler ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 4: Tjärn
3 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Gungfly, 65 % av delobjektytan, öppet. Rest av tjärn.

Nr 37

19I 8B 01 (0204) KLASS 3
MARBÄCKSMYRAN 10 KM V BREDBYN

Våtmarkskomplex, 57 ha (46 ha våtm), 155 m ö h. Flygb. -92. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
21 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
11 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Öar, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
12 ha, fördelat på 4 ytor. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Tjärn
6 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Gungfly, 30 % av delobjektytan, öppet.

Nr 38

19I 8E 01 (3416) KLASS 4
MJÖSJÖN 7 KM NO BREDBYN

Topogent kärr, 50 ha (48 ha våtm), 90 m ö h. Flygb. -92. Det: Sören Uppsäll.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning, odling i våtmarken. Nedlagda odlingar i våtmarken.

Nr 39

19I 8G 01 (3626) KLASS 3
AFTONSMYRAN, LÅNGMYRAN 10 KM NO MELLANSEL

Myrkomplex, 108 ha (101 ha våtm), 265 m ö h. Flygb. -88. Det: Sören Uppsäll.
Flikiga kantzoner.

Delobj. 1: Topogent kärr
34 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Delobj. 2: Topogent kärr
35 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin, kraftledning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
32 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 4: Tjärn
2 ha.

Nr 40

19I 8H 01 (2814) KLASS 3
HÖRNETT-LÅNGMYRAN 12 KM NO MELLANSEL

Myrkomplex, 41 ha (40 ha våtm), 250 m ö h. Flygb. -88. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
9 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
23 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
8 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Nr 41

19I 8I 01 (2917) KLASS 3
JÖSSESLÄTTEN 17 KM ONO MELLANSEL

Myrkomplex, 73 ha (66 ha våtm), 275 m ö h. Flygb. -88.
Det: Sören Uppsäll.
Flikiga kantzoner.

Delobj. 1: Topogent kärr
53 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 76 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Gungfly, 20 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Bäck, 4 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Tjärn
5 ha, fördelat på 3 ytor.

Nr 42

19I 9A 01 (4302) KLASS 3
TRANEMYRORNA, NÖTMYRAN, FÅBODMYRAN, PIPER-MYRAN 18 KM NV BREDBYN

Våtmarkskomplex, 232 ha (214 ha våtm), 210 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
10 ha, öppet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Videvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
61 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 58 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Mindre vattenytor, 2 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
46 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 55 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
98 ha, fördelat på 7 ytor. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 43

19J 5C 01 (0527) KLASS 1
SÖRFLÄRKEMOSSEN 6 KM SV HUSUM

Koncentrisk mosse, 13 ha (13 ha våtm), 55 m ö h. Flygb. -88.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården.

Delobj. 1: Koncentrisk mosse
9 ha, glest trädtäckt. Geovetenskapliga värden.

Element 1: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 2: Hölja, 20 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Göl, 5 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Element 4: Lagg, 25 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Element 5: Randskog, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 2: Obestämbart kärr
4 ha, glest trädtäckt. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 44

19J 5D 01 (0704) KLASS 3
MYR 1 KM V AGGÖSUNDET 5 KM SV HUSUM

Myrkomplex, 15 ha (15 ha våtm), 30 m ö h. Flygb. -88.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
11 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Gungfly, 30 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 4: Göl, 10 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten. Rest av tjärn.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
4 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 45

19J 5D 02 (1406) KLASS 3
DEGERMYRAN 4 KM SV HUSUM

Topogent kärr, 19 ha (18 ha våtm), 20 m ö h. Flygb. -88.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
15 ha, öppet.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Gungfly, 20 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
3 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 46

19J 6C 01 (3518) KLASS 3
MYR VID STOR-SKARRTJÄRNEN 8 KM NV HUSUM

Sluttande mosse, 25 ha (23 ha våtm), 85 m ö h. Flygb. -88.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Sluttande mosse
23 ha, öppet.

Element 1: Strång, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 25 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Lagg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Tjärn
2 ha.

Nr 47

19J 7A 01 (1344) KLASS 3
DEGERMYRAN, FÄRNÄSDALEN 15 KM NV HUSUM

Myrkomplex, 50 ha (49 ha våtm), 85 m ö h. Flygb. -88.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
11 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
12 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, öppet. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
13 ha, fördelat på 4 ytor. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 48

19J 7B 01 (1540) KLASS 1
SJUTJÄRNSMYRAN 1 KM S Ö-VIKS FLYGPLATS

Myrkomplex, 70 ha (64 ha våtm), 100 m ö h. Flygb. -88.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
45 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Strång, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Göl, 10 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
12 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
8 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Nr 49

19J 7B 02 (2923) KLASS 2
VÄRMYRAN 14 KM NV HUSUM

Myrkomplex, 90 ha (89 ha våtm), 95 m ö h. Flygb. -88.
Fält -93.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
35 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, skottfältsröjning.

Element 1: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta. Älgjakttorn.

Element 2: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 2: Sluttande mosse
31 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från anslutande flygplats, svag lokal påverkan från anslutande annan täkt, stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Strång, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Hölja, 30 % av delobjektytan, öppet. Mjukm.mosse, vitag-kallgräs-S.balticumtyp.

Element 3: Hölja, 30 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 3, underelem. 1: Hölja, 5 % av delobjektytan. Lösbottenmosse.

Element 4: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mad vid vattendrag
9 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Bäck, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 4: Sumpskog
14 ha, fördelat på 4 ytor. Svag lokal påverkan från skottfältsröjning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog.

Nr 50

19J 7B 03 (1603) KLASS 3
HÖMYRAN 15 KM NV HUSUM

Myrkomplex, 59 ha (40 ha våtm), 85 m ö h. Flygb. -88. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
22 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
18 ha, öppet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 51

19J 7B 04 (0949) KLASS 3
TVÄRBÄCKSMYRAN 11 KM NV HUSUM

Myrkomplex, 69 ha (68 ha våtm), 80 m ö h. Flygb. -88. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
16 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning, svag generell påverkan från anslutande flygplats, svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
32 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag generell påverkan från anslutande flygplats.

Element 1: Mosseplan, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
10 ha, öppet. Svag generell påverkan från anslutande flygplats.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Öar, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
10 ha, fördelat på 3 ytor. Svag lokal påverkan från dikning, svag generell påverkan från anslutande flygplats.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Nr 52

19J 7B 05 (4613) KLASS 3
FÅBODMYRAN, RATÄMYRAN 16 KM NV HUSUM

Topogent kärr, 62 ha (62 ha våtm), 90 m ö h. Flygb. -88. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
25 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
25 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
12 ha, fördelat på 4 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Nr 53

19J 7C 01 (3442) KLASS 3
BUMYRAN, V. LÅNGMYRAN 10 KM NV HUSUM

Myrkomplex, 95 ha (92 ha våtm), 70 m ö h. Flygb. -88. Det: Sören Uppsäll. Flikiga kantzoner.

Delobj. 1: Topogent kärr
21 ha, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
17 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 10 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Gungfly, 30 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
19 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Strång, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta. Diffus strångbildning.

Delobj. 4: Obestämbar myr
35 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet. Stark generell påverkan från dikning.

Nr 54

19J 7D 01 (3031) KLASS 1
DEGERMYRAN 9 KM N HUSUM

Myrkomplex, 116 ha (115 ha våtm), 40 m ö h. Flygb. -88. Fält -93. Det: Sören Uppsäll. Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
53 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen. Äldre hässjor eller rester.

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Golv, 5 % av delobjektytan. Fastm.kärr,tuvsäv-S.papillosum-compactumtyp.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp. Diffus strångbildning.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Lösbottenkärr av intermediär typ.

Element 3, underelem. 1: Källa, 1 % av delobjektytan. Källkärr.

Element 4: Golv, 5 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, lövskog. Gran-björkkärr av fattig vitmosstyp.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
30 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Mosseplan, 40 % av delobjektytan. Tallmosse av skvattramtyp.

Element 1, underelem. 2: Mosseplan, 30 % av delobjektytan. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 3: Dråg, 3 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Hölja, 2 % av delobjektytan, öppet. Fastm.mosse av tuvull-S. angustifoliumtyp.

Delobj. 3: Strångblandmyr
20 ha, öppet.

Element 1: Strång, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Strång, 30 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 1, underelem. 2: Strång, 5 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. rubellumtyp.

Element 2: Flark, 45 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2, underelem. 1: Flark, 25 % av delobjektytan. Fastm.kärr,tuvsäv-S.papillosum-compactumtyp.

Element 2, underelem. 2: Flark, 5 % av delobjektytan. Lösbottenmosse av mossfattig typ.

Element 3: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3, underelem. 1: Dråg, 10 % av delobjektytan. Videkärr av starrtyp.

Delobj. 4: Sumpskog
12 ha, fördelat på 4 ytor. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, kraftledning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog.

Element 1, underelem. 1: Golv, 30 % av delobjektytan. Sumptallskog av ristyp.

Element 1, underelem. 2: Golv, 60 % av delobjektytan. Sumpgranskog av ristyp, skogsfräkenvariant.

Element 2: Bäck, 1 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 55

19J 8B 01 (1024) KLASS 2
BÄRMYRAN 16 KM NV HUSUM

Myrkomplex, 80 ha (76 ha våtm), 105 m ö h. Flygb. -88. Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Tillfredsställ. dokumentation finns.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
18 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Sluttande mosse
37 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Strång, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 30 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 4: Lagg, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
21 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Element 3: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 4: Gungfly, 15 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 4: Tjärn
4 ha.

Nr 56

19J 8B 02 (1248) KLASS 3
TÅVRAMYRAN 15 KM NV HUSUM

Myrkomplex, 61 ha (61 ha våtm), 120 m ö h. Flygb. -88. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
14 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
21 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
25 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Öar, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 57

19J 8E 01 (0706) KLASS 3
BOTESMYRAN, DEGERMYRAN 11 KM NNO HUSUM

Topogent kärr, 48 ha (45 ha våtm), 45 m ö h. Flygb. -88. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
25 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 33 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Flark, 15 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 4: Strång, 2 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 58

19J 9A 01 (1417) KLASS 3
SPÅNGMYRAN 24 KM NV HUSUM

Myrkomplex, 51 ha (51 ha våtm), 160 m ö h. Flygb. -88. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
8 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
12 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 20 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 3: Strångblandmyr
20 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Strång, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
11 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Nr 59

19J 9D 01 (0426) KLASS 1
MYR 1 KM SV SKADEMARK 16 KM N HUSUM

Koncentrisk mosse, 17 ha (17 ha våtm), 115 m ö h.
Flygb. -88.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Koncentrisk mosse
17 ha, öppet. Geovetenskapliga värden.

Element 1: Sträng, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 19 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 20 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 4: Höljegöl, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Element 5: Lagg, 20 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Nr 60

19J 9D 02 (1704) KLASS 4
STORMYRAN 17 KM NNV HUSUM

Våtmarkskomplex, 264 ha (259 ha våtm), 80 m ö h.
Flygb. -88.
Det: Sören Uppsäll.
Väsentlig del ansluter till större vattendrag, tillstånd för torvtäkt har givits.

Delobj. 1: Topogent kärr
93 ha, fördelat på 6 ytor, skogsbevuxet. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
21 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
29 ha, fördelat på 3 ytor. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Obestämbar myr
116 ha, öppet. Stark generell påverkan från torvtäkt.

Element 1: Golv, öppet.

Nr 61

19J 9D 03 (2811) KLASS 3
SKÖNDALSMYRAN 18 KM NNV HUSUM

Myrkomplex, 47 ha (47 ha våtm), 80 m ö h. Flygb. -88.
Det: Sören Uppsäll.
Väsentlig del ansluter till större vattendrag.

Delobj. 1: Topogent kärr
13 ha, öppet. Stark lokal påverkan från dikning, väg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
26 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, väg.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
8 ha, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Sträng, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 40 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Nr 62

19J 9D 04 (3914) KLASS 3
FÄLLMYRAN, LÅNGRÅMYRAN 19 KM N HUSUM

Myrkomplex, 80 ha (80 ha våtm), 95 m ö h. Flygb. -88.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
11 ha, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
19 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
24 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
16 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Sträng, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 5: Sumpskog
10 ha. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Nr 63

20H 0G 01 (0302) KLASS 3
MYR O ROLLÅSTJÄRN 30 KM SO JUNSELE

Blandmyr av mosaiktyp, 53 ha (48 ha våtm), 315 m ö h. Flygb. -86. Storomr Hl.
Det: Sören Uppsäll.
Naturskog i eller i anslutning, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Blandmyr av mosaiktyp
36 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Strång, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Sumpskog
12 ha, fördelat på 4 ytor. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 3: Tjärn
1 ha, fördelat på 3 ytor.

Nr 64

20H 0G 02 (0210) KLASS 3
GRAVAMYRAN 31 KM SO JUNSELE

Myrkomplex, 147 ha (128 ha våtm), 310 m ö h. Flygb. -86. Storomr Hl.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
22 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 94 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Bäck, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
38 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 59 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Strång, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Element 4: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 5: Bäck, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
59 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Golv, 34 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Öar, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Bäck, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten. Slingrande vattendrag.

Delobj. 4: Sumpskog
10 ha, fördelat på 2 ytor. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Nr 65

20H 0G 03 (4620) KLASS 3
VÅLANDSMYRAN 30 KM OSO JUNSELE

Blandmyr av mosaiktyp, 91 ha (88 ha våtm), 300 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Blandmyr av mosaiktyp
76 ha, glest trädtäckt. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Sumpskog
12 ha, fördelat på 2 ytor. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Nr 66

20H 0G 04 (4927) KLASS 4
MYR O VÅLANDSMYRAN 31 KM OSO JUNSELE

Myrkomplex, 58 ha (58 ha våtm), 305 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning.

Nr 67

20H 0H 01 (3210) KLASS 3
TORRVATTENMYRAN 24 KM S SOLBERG

Myrkomplex, 91 ha (89 ha våtm), 335 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
35 ha, öppet. Stark lokal påverkan från deposition från dike, dikning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
15 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från deposition från dike, dikning, svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 70 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
12 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
26 ha, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Nr 68

20H 0J 01 (1142) KLASS 3
STORMYRAN 19 KM NV BREDBYN

Topogent kärr, 68 ha (65 ha våtm), 140 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Området har slåtterhävdats, hölador.

Delobj. 1: Topogent kärr
46 ha, öppet.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Bäckdråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Topogent kärr
19 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 69

20H 1F 01 (3512) KLASS 3
MYR N MELLANBERGET 24 KM SV SOLBERG

Mossekomplex, 104 ha (95 ha våtm), 325 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
75 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Sumpskog
16 ha. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Nr 70

20H 1F 02 (0721) KLASS 3
MYR SV N BERGSJÖBERGET 21 KM SV SOLBERG

Våtmarkskomplex, 112 ha (111 ha våtm), 305 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
24 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
56 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Sträng, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 23 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Göl, 2 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Sumpskog
31 ha, fördelat på 5 ytor. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Bäck, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 71

20H 1G 01 (0931) KLASS 3
MYR 2 KM SV VÄSTANBÄCK 22 KM SSV SOLBERG

Myrkomplex, 54 ha (51 ha våtm), 280 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
35 ha, öppet. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Strång, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
16 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Nr 72

20H 1J 01 (4935) KLASS 3
MYR VID DEGERMYRTJÄRNARNA 18 KM SSO SOLBERG

Blandmyr av mosaiktyp, 70 ha (60 ha våtm), 310 m ö h.
Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Blandmyr av mosaiktyp
60 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, vintervåg.

Element 1: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Strång, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 5: Flark, 10 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Tjärn
4 ha, fördelat på 3 ytor.

Nr 73

20H 2G 01 (1606) KLASS 2
HÄSTHUVUDMYRAN 19 KM S SOLBERG

Myrkomplex, 104 ha (88 ha våtm), 255 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Väsentlig del ansluter till större vattendrag.

Delobj. 1: Topogent kärr
37 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
29 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
22 ha, fördelat på 3 ytor. Mosaik med fastmark.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Nr 74

20H 2I 01 (3000) KLASS 2
ISAKMYRAN 9 KM N MYCKELGENSJÖ

Myrkomplex, 105 ha (93 ha våtm), 280 m ö h. Flygb. -80.
Storomr A1.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården. Sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
44 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 2: Randskog, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
22 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
23 ha, öppet.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Nr 75

20H 3F 01 (3938) KLASS 3
MYR SV SUNNERSTASJÖN 14 KM SV SOLBERG

Myrkomplex, 116 ha (95 ha våtm), 365 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
16 ha, öppet. Väsentlig del ansluter till större vattendrag, sjö ansluter till minst 25%.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Gungfly, 15 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Soligent kärr
19 ha, fördelat på 5 ytor, skogsbevuxet. Inslag av backkärr.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
60 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Tjärn
3 ha, fördelat på 3 ytor.

Nr 76

20H 3G 01 (4833) KLASS 3
STORMYRAN 10 KM SV SOLBERG

Myrkomplex, 114 ha (108 ha våtm), 330 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
48 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från deposition från dike.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
14 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från deposition från dike, svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
30 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, deposition från dike, dikning.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
16 ha, fördelat på 4 ytor.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 3: Bäck, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 77

20H 3G 02 (4144) KLASS 2
MYR S HÄSTLANDET 10 KM SV SOLBERG

Myrkomplex, 209 ha (178 ha våtm), 320 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Videvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
19 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
69 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mesalktyp
45 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 5: Sumpskog
14 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Golv, 93 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Bäck, 7 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog.

Delobj. 6: Mad vid vattendrag
22 ha, öppet.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Videvegetation.

Delobj. 7: Tjärn
1 ha.

Nr 78

20H 3H 01 (4045) KLASS 1
STORMYRAN-STAVARN 16 KM N MYCKELGENSJÖ

Myrkomplex, 340 ha (320 ha våtm), 310 m ö h. Flygb. -80. Storomr A1.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården. Litteratur om objektet finns, ornitologiska värden.

Delobj. 1: Strång-flarkkärr
150 ha, öppet. Zoologiska värden.

Element 1: Strång, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 65 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Flarkgöl, 15 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 2: Topogent kärr
38 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
52 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Blandmyr av mosaiktyp
20 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Strång, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 6: Sumpskog
30 ha, fördelat på 7 ytor.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet.

Element 2: Golv, 85 % av delobjektytan, skogbevuxet.

Nr 79

20H 3H 02 (3030) KLASS 1
SÖR-LÅNGSJÖMYRAN M FL 15 KM N MYCKELGENSJÖ

Myrkomplex, 460 ha (395 ha våtm), 310 m ö h. Flygb. -80. Fält -93. Storomr A1.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården. Mosaik med fastmark.

Delobj. 1: Sluttande mosse
38 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Strång, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 1, underelem. 1: Strång, 15 % av delobjektytan. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 1, underelem. 2: Strång, 5 % av delobjektytan. Fastm.mosse av tuvull-S. angustifoliumtyp.

Element 2: Hölja, 30 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2, underelem. 1: Hölja, 20 % av delobjektytan. Mjukmattemosse av vitag-kallgräs-S.majustyp.

Element 2, underelem. 2: Hölja, 10 % av delobjektytan. Mjukm.mosse, vitag-kallgräs-S.balticumtyp.

Element 3: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 4: Randskog, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 5: Lagg, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
75 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 1, underelem. 2: Mosseplan, 25 % av delobjektytan. Tallmosse av ristyp. Vegetationen är påverkad av ingrepp.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Kärrfönster, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
60 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, öppet.

Element 1: Gungfly, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmattekärr, kallgräs-vitmoss variant.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 30 % av delobjektytan, öppet. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Delobj. 4: Topogent kärr
65 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, vintervåg.

Element 1: Kantzon, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2, underelem. 1: Golv, 15 % av delobjektytan. Tallkärr av klotstarrtyp.

Element 2, underelem. 2: Golv, 30 % av delobjektytan. Tallkärr av fattig vitmosstyp.

Element 3: Mindre fläckar, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 5: Sträng-flarkkärr
6 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 70 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 6: Tjärn
2 ha, fördelat på 3 ytor.

Delobj. 7: Limnogen strandsumpskog
25 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 65 % av delobjektytan, skogbevuxet. Sumpgranskog av lågörttyp. Naturskog i eller i anslutning.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt. Strand-sumpkärrtyp. Området har slåtterhävdats, hölador.

Element 3: Bäck, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 8: Blandmyr av mosaiktyp
50 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastm.kärr,tuvsäv-S.papillosum-compactumtyp.

Element 3: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3, underelem. 1: Tuva, 5 % av delobjektytan. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 3, underelem. 2: Tuva, 5 % av delobjektytan. Fastmattekärr, taggstarr-S.angustifolium var.

Nr 80

20H 3H 03 (0040) KLASS 1
GRUNDSJÖMYRAN M FL 12 KM N MYCKELGENSJÖ

Myrkomplex, 460 ha (395 ha våtm), 300 m ö h. Flygb. -80. Fält -93. Storomr A1.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården. Mosaik med fastmark, omitologiska värden.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
10 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Flark, 70 % av delobjektytan, öppet, alskog. Mjukmattekärr, kallgräs-vitmoss variant.

Element 2: Sträng, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmattekärr av tuvull-vitmosstyp.

Element 3: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
65 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Mad vid vattendrag
10 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Kantzon utmed å, 90 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 1, underelem. 1: Kantzon utmed å, 70 % av delobjektytan. Strand-sumpkärrtyp. Hölador.

Element 1, underelem. 2: Kantzon utmed å, 20 % av delobjektytan. Videkärr av starrtyp.

Element 2: Bäck, 10 % av delobjektytan.

Delobj. 4: Topogent kärr
65 ha, fördelat på 6 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från deposition från dike, stark lokal påverkan från väg. Zoologiska värden.

Element 1: Gungfly, 15 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Element 2: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2, underelem. 1: Golv, 40 % av delobjektytan. Mjukmattekärr, kallgräs-vitmoss variant.

Element 2, underelem. 2: Golv, 24 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vitmosstyp.

Element 2, underelem. 3: Golv, 20 % av delobjektytan. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp. Vegetationen är påverkad av ingrepp.

Element 3: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Mjukmattekärr, starr-S. fallax variant.

Delobj. 5: Topogent kärr
160 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, glest trädtäckt. Zoologiska värden.

Element 1: Kantzon utmed å, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gran-björkkärr av fattig vitmosstyp.

Element 2, underelem. 1: Golv, 25 % av delobjektytan. Tallkärr av fattig vitmosstyp.

Element 2, underelem. 2: Golv, 25 % av delobjektytan. Tallkärr av kotstarrtyp.

Element 3: Kantzon, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 6: Strängblandmyr
12 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 1, underelem. 1: Sträng, 10 % av delobjektytan. Fastm.mosse av tuvull-S. angustifoliumtyp.

Element 2: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2, underelem. 1: Golv, 25 % av delobjektytan. Mjukm.mosse, vitag-kallgräs-S.balticumtyp.

Element 2, underelem. 2: Golv, 20 % av delobjektytan. Mjukmattekärr, kallgräs-vitmoss variant.

Element 3: Tuva, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Delobj. 7: Sumpskog
40 ha, fördelat på 9 eller fler ytor.

Element 1: Bäckdråg, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Kantzon, 35 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 2, underelem. 1: Kantzon, 25 % av delobjektytan. Sumpgranskog av ristyp, skogsfräkenvariant.

Element 2, underelem. 2: Kantzon, 10 % av delobjektytan. Sumpgranskog av lågörttyp.

Element 3: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet.

Delobj. 8: Tjärn
28 ha, fördelat på 2 ytor.

Nr 81

20H 3H 04 (2813) KLASS 4
N STORMYRAN 10 KM SV SOLBERG

Myrkomplex, 225 ha (192 ha våtm), 310 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Mycket starkt generellt påverkat av anslutande hyggen, dikning, anslutande väg. Väsentlig del ansluter till större vattendrag.

Nr 82

20H 3I 01 (0510) KLASS 1
KRIGSMYRAN-LAGMYRAN 12 KM N MYCKELGENSJÖ

Våtmarkskomplex, 360 ha (290 ha våtm), 300 m ö h.
Flygb. -80. Fält -93. Storomr A1.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården. Äldre dammanläggning i våtmarken, slingrande vattendrag.

Delobj. 1: Mad vid vattendrag
130 ha, öppet.

Element 1: Kantzon utmed å, 95 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 1, underelem. 1: Kantzon utmed å, 70 % av delobjektytan. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 1, underelem. 2: Kantzon utmed å, 25 % av delobjektytan. Videkärr av starrtyp.

Element 2: Bäck, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
78 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Golv, 20 % av delobjektytan. Fastm.kärr,tuvsåv-S.papillosum-compactumtyp.

Element 1, underelem. 2: Golv, 15 % av delobjektytan. Fastm.kärr av tuvsåv-blåtåtel-vitmosstyp.

Element 1, underelem. 3: Golv, 5 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Fastmattekärr, taggstarr-S.angustifolium var.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3, underelem. 1: Dråg, 4 % av delobjektytan. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 3, underelem. 2: Dråg, 5 % av delobjektytan. Mjukm. kärr av ört-starr-brunmosstyp.

Element 3, underelem. 3: Källa, 1 % av delobjektytan. Källkärr.

Element 4: Sträng, 4 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmattemosse av tuvull-S. fuscumtyp.

Element 5: Flark, 6 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Delobj. 3: Topogent kärr
60 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Kantzon, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Kantzon, 40 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, blandskog. Gran-björkkärr av fattig vitmosstyp. Bäver förekommer.

Element 1, underelem. 2: Kantzon, 20 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, blandskog. Sumpblandskog av örttyp. Bäver förekommer, vegetationen är påverkad av ingrepp.

Element 2: Mindre fläckar, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2, underelem. 1: Mindre fläckar, 30 % av delobjektytan. Tallkärr av fattig vitmosstyp.

Element 2, underelem. 2: Mindre fläckar, 10 % av delobjektytan. Tallkärr av klotstarrtyp.

Nr 83

20H 3I 02 (4535) KLASS 2
PENGSJÖ-STORMYRAN 17 KM N MYCKELGENSJÖ

Myrkomplex, 110 ha (102 ha våtm), 280 m ö h. Flygb. -80.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården.

Delobj. 1: Strång-flarkkärr
25 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Strång, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 65 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Flarkgöl, 10 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr
22 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 3: Topogent kärr
42 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
12 ha, fördelat på 6 ytor.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 2: Mindre fläckar, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 84

20H 3I 03 (2111) KLASS 3
RÖDMYRAN, ÄLGTUNGAN, RÄVELSMYRAN 10 KM S SOLBERG

Myrkomplex, 443 ha (344 ha våtm), 300 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården.
Mosaik med fastmark.

Delobj. 1: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Dråg, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
12 ha, mosaikartad fördelning, skogsbevuxet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
196 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Strång, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 20 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 4: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
89 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Strång, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 5: Sumpskog
27 ha, fördelat på 3 ytor. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Bäck, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 85

20H 3I 04 (4214) KLASS 3
PENGSJÖMYRAN 8 KM S SOLBERG

Myrkomplex, 67 ha (63 ha våtm), 325 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården.

Delobj. 1: Topogent kärr
16 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
17 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
30 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Nr 86

20H 4E 01 (2832) KLASS 1
ROCKSJÖMYRAN 21 KM ONO JUNSELE

Myrkomplex, 296 ha (250 ha våtm), 335 m ö h. Flygb. -86. Fält -93.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Naturskog i eller i anslutning, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
55 ha, fördelat på 6 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Golv, 40 % av delobjektytan. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vitmosstyp.

Element 1, underelem. 2: Golv, 15 % av delobjektytan. Mjukmattekärr, starr-S. fallax variant.

Element 2: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Element 2, underelem. 1: Golv, 25 % av delobjektytan. Mjukmattekärr, starr-S. papillosum var.

Element 2, underelem. 2: Golv, 5 % av delobjektytan. Mjukmattekärr, kallgräs-vitmoss variant.

Element 2, underelem. 3: Golv, 15 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av oligotrof typ.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
20 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Sträng, 20 % av delobjektytan. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Element 1, underelem. 2: Sträng, 5 % av delobjektytan. Mjukmattekärr, starr-S. papillosum var.

Element 1, underelem. 3: Sträng, 3 % av delobjektytan. Fastm.mosse av tuvull-S. angustifoliumtyp.

Element 1, underelem. 4: Sträng, 2 % av delobjektytan. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Flark, 70 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2, underelem. 1: Flark, 45 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av intermediär typ.

Element 2, underelem. 2: Flark, 30 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av oligotrof typ.

Delobj. 3: Topogent kärr
22 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Tallkärr av fattig vitmosstyp.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 24 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Sumpgranskog av lågörttyp. Slingrande vattendrag.

Element 3, underelem. 1: Golv, 1 % av delobjektytan. Källkärr.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
137 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Mosseplan, 20 % av delobjektytan. Fastm.mosse av tuvull-S. angustifoliumtyp.

Element 1, underelem. 2: Mosseplan, 15 % av delobjektytan. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmattekärr, taggstarr-S.angustifolium var.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Delobj. 5: Mad vid vattendrag
19 ha, öppet.

Element 1: Golv, 88 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation.

Element 1, underelem. 1: Golv, 40 % av delobjektytan. Strand-sumpkärrtyp. Väsentlig del ansluter till större vattendrag.

Element 1, underelem. 2: Golv, 48 % av delobjektytan. Strand-sumpkärrtyp.

Element 2: Bäck, 12 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 6: Tjärn
27 ha, fördelat på 3 ytor.

Nr 87

20H 4E 02 (4113) KLASS 3
BODFLON 20 KM NO JUNSELE

Myrkomplex, 74 ha (70 ha våtm), 355 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
23 ha, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
47 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från vintervåg.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Nr 88

20H 4E 03 (0813) KLASS 3
S TÄRNICKMYRAN 19 KM ONO JUNSELE

Myrkomplex, 150 ha (150 ha våtm), 350 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
16 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande dikning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
35 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
88 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från anslutande hyggen, svag lokal påverkan från anslutande dikning.

Element 1: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
11 ha.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Nr 89

20H 4E 04 (0936) KLASS 2
MYR O TÄRNICKSJÖN 21 KM ONO JUNSELE

Myrkomplex, 276 ha (252 ha våtm), 350 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
59 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Delobj. 2: Topogent kärr
84 ha, mosaikartad fördelning, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin, kraftledning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
94 ha, mosaikartad fördelning, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
15 ha, fördelat på 2 ytor. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 5: Tjärn
14 ha, fördelat på 5 ytor.

Nr 90

20H 4F 01 (0317) KLASS 2
ROCKSJÖ-STORMYRAN 24 KM ONO JUNSELE

Myrkomplex, 194 ha (160 ha våtm), 340 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Området ornitologiskt inventerat, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
35 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen. Området har slåtterhävdats.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning, rest av tjärn.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
22 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 45 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Flark, 25 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 3: Topogent kärr
28 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 4: Bäckdråg, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
76 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Öar, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 5: Tjärn
8 ha, fördelat på 6 ytor.

Nr 91

20H 4F 02 (4006) KLASS 3
SKANSMYRAN 15 KM VSV SOLBERG

Myrkomplex, 77 ha (74 ha våtm), 420 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
16 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
58 ha, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Öar, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 92

20H 4F 03 (0334) KLASS 3
MYR V SUNNERSTATJÄRNEN 15 KM SV SOLBERG

Myrkomplex, 74 ha (64 ha våtm), 345 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
29 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Bäckdråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
35 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 93

20H 4F 04 (3237) KLASS 2
LÅNGSJÖMYRAN SÖR-LÅNGSJÖMYRAN 12 KM SV SOLBERG

Myrkomplex, 421 ha (354 ha våtm), 355 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Nedlagda odlingar i våtmarken, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
71 ha, fördelat på 7 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Dråg, 45 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Bäckdråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Sträng, 3 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 5: Flark, 7 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Topogent kärr
37 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
123 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, körspår från traktor/skogsmaskin, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
124 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin, kraftledning.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Tjärn
6 ha, fördelat på 5 ytor.

Nr 94

20H 4G 01 (2337) KLASS 2
MYR S BRANDBÄRTJÄRNARNA 8 KM SV SOLBERG

Myrkomplex, 166 ha (138 ha våtm), 360 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
14 ha, öppet. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Gungfly, 25 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Soligent kärr
32 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 90 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
24 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
68 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 5: Tjärn
5 ha, fördelat på 2 ytor.

Nr 95

20H 4I 01 (0815) KLASS 2
LILL-STAVARSMYRAN 18 KM N MYCKELGENSJÖ

Myrkomplex, 80 ha (74 ha våtm), 300 m ö h. Flygb. -80.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
13 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 50 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Flarkgöl, 10 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr
22 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
25 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Fastmatta. Diffus strängbildning.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
12 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog.

Nr 96

20H 4I 02 (2707) KLASS 2
BODMYRAN 5 KM S SOLBERG

Myrkomplex, 88 ha (76 ha våtm), 290 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Topogent kärr
37 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 8 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Flark, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta-lösbotten.

Element 4: Flarkgöl, 2 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Element 5: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
40 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Tjärn
5 ha, fördelat på 4 ytor.

Nr 97

20H 4J 01 (0932) KLASS 2
MYR LÄNGS ÅSELÅN 10 KM SO SOLBERG

Myrkomplex, 200 ha (184 ha våtm), 280 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
48 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Stark generell påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
51 ha, fördelat på 7 ytor, öppet.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
21 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Öar, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Strängblandmyr
27 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Sträng, 18 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 7 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Flark, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Flark, 20 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 5: Flarkgöl, 5 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 5: Strand vid vattendrag
42 ha, glest trädtäckt. Slingrande vattendrag.

Element 1: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Videvegetation.

Element 3: Golv, 48 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 6: Tjärn
5 ha, fördelat på 2 ytor.

Nr 98

20H 4J 02 (1402) KLASS 3
STORMYRAN 7 KM SO SOLBERG

Myrkomplex, 76 ha (74 ha våtm), 275 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Nedlagda odlingar i våtmarken.

Delobj. 1: Topogent kärr
16 ha, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta. Diffus strängbildning.

Delobj. 2: Topogent kärr
35 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Stark generell påverkan från dikning, stark lokal påverkan från odling i våtmarken.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
23 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Tjärn
1 ha. Stark generell påverkan från dikning.

Nr 99

20H 4J 03 (4621) KLASS 3
S RYXASJÖMYRAN 6 KM OSO SOLBERG

Myrkomplex, 102 ha (94 ha våtm), 305 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
62 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta. Vegetationen är påverkad av ingrepp.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
32 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Tjärn
3 ha, fördelat på 2 ytor.

Nr 100

20H 5F 01 (2527) KLASS 1
BRUDSÅNGSMYRAN, BODMYRAN 12 KM V SOLBERG

Myrkomplex, 238 ha (227 ha våtm), 466 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Topogent kärr
91 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, anslutande dikning, vinterväg.

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Gungfly, 1 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Rest av tjärn.

Element 4: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 5: Flark, 9 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Soligent kärr
14 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Öar, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
61 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, vinterväg.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
49 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Sumpskog
13 ha, fördelat på 2 ytor. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning. Mosaik med fastmark.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Nr 101

20H 5H 01 (0215) KLASS 1
STORMYRAN, VILLBRÄNNMYRAN 4 KM SV SOLBERG

Myrkomplex, 134 ha (118 ha våtm), 440 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Flikiga kantzoner, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
12 ha, öppet.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
32 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
28 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Strängblandmyr
48 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Sträng, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Flark, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 5: Flarkgöl, 5 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 5: Tjärn
1 ha.

Nr 102

20H 6E 01 (1040) KLASS 1
MOSSATRÅSK-STORMYRAN 8 KM O GULSELE

Myrkomplex, 750 ha (690 ha våtm), 430 m ö h. Flygb. -80.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården. Terrängföljande våtmark.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
100 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Geovetenskapliga värden, zoologiska värden.

Element 1: Sträng, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Fastmatta.

Element 2: Flark, 70 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Element 3: Flarkgöl, 5 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Topogent kärr
95 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, öppet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
130 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 3: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 4: Topogent kärr
245 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Vegetation utmed mindre vattendrag, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 5: Tjärn
3 ha, fördelat på 4 ytor.

Delobj. 6: Sumpskog
90 ha, fördelat på 9 eller fler ytor.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Nr 103

20H 6E 02 (0324) KLASS 1
RÅVELMYRAN 25 KM NO JUNSELE

Myrkomplex, 324 ha (280 ha våtm), 425 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Rest av tjärn.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
13 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 75 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Flarkgöl, 5 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Topogent kärr
143 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 49 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 5: Bäck, 1 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Permanent öppet vatten.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
55 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 5: Blandmyr av mosaiktyp
50 ha, fördelat på 5 ytor, öppet.

Element 1: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Vegetation utmed mindre vattendrag, 4 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 5: Bäck, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 6: Tjärn
14 ha.

Element 1: Gungfly, 10 % av delobjektytan, öppet.

Nr 104

20H 6F 01 (2714) KLASS 3
KVARNBÄCK-STORMYRAN 14 KM VNV SOLBERG

Myrkomplex, 77 ha (75 ha våtm), 410 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
42 ha, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från avverkning, svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
23 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mad vid vattendrag
11 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 61 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Bäck, 9 % av delobjektytan, öppet.

Nr 105

20H 6F 02 (0531) KLASS 3
STORMYRAN 12 KM VNV SOLBERG

Myrkomplex, 84 ha (77 ha våtm), 420 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
30 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
14 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
27 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Sträng, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 5: Flarkgöl, 5 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 4: Obestämbar myr
7 ha, glest trädtäckt. Stark generell påverkan från dikning, odling i våtmarken. Hölador.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, lövskog.

Nr 106

20H 6F 03 (0345) KLASS 3
DALAMYRAN 11 KM VNV SOLBERG

Myrkomplex, 157 ha (142 ha våtm), 420 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Topogent kärr
58 ha, öppet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Flark, 22 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 5: Göl, 3 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Topogent kärr
40 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning, stark lokal påverkan från odling i våtmarken.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Hölador, vegetationen är påverkad av ingrepp.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
45 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Öar, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 107

20H 6G 01 (3136) KLASS 2
RÖDMOSSAMYRAN 8 KM NV SOLBERG

Myrkomplex, 125 ha (105 ha våtm), 395 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
35 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
17 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Bäck, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
35 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, vinterväg.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Öar, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Mad vid vattendrag
19 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Gungfly, 25 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Golv, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation.

Delobj. 5: Tjärn
8 ha.

Nr 108

20H 6H 01 (1712) KLASS 3
HENRIKSMYRAN 6 KM NV SOLBERG

Kärrkomplex, 104 ha (103 ha våtm), 455 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
50 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, kraftledning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Öar, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Soligent kärr
13 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
16 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
24 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 109

20H 6H 02 (4847) KLASS 2
LOKMYRAN 8 KM N SOLBERG

Myrkomplex, 83 ha (69 ha våtm), 355 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Området ornitologiskt inventerat, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. diffus strängbildning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
13 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 30 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 3: Flarkgöl, 30 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
11 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 4: Strängblandmyr
36 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning, odling i våtmarken. Nedlagda odlingar i våtmarken.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Flark, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 5: Tjärn
4 ha, fördelat på 4 ytor.

Nr 110

20H 6H 03 (0722) KLASS 4
LÅNGMYRAN 4 KM NV SOLBERG

Myrkomplex, 50 ha (49 ha våtm), 465 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.
Mycket starkt generellt påverkat av anslutande hyggen, dikning.

Nr 111

20H 6H 04 (3334) KLASS 3
BÄCKMYRAN 6 KM NNV SOLBERG

Myrkomplex, 53 ha (51 ha våtm), 385 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
22 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
10 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 65 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 4: Mad vid vattendrag
10 ha, öppet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan, öppet. Videvegetation.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation.

Nr 112

20H 6I 31 (2102) KLASS 3
SNÖSTARRMYRAN 5 KM N SOLBERG

Myrkomplex, 74 ha (68 ha våtm), 375 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Element 2: Gungfly, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
22 ha, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Lavdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
37 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Sträng, 15 % av delobjektytan, öppet. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Flarkgöl, 5 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Element 5: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Tjärn
4 ha, fördelat på 2 ytor.

Nr 113

20H 6J 01 (0803) KLASS 3
TALLBUSKMYRAN 7 KM NO SOLBERG

Våtmarkskomplex, 358 ha (295 ha våtm), 335 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Mosaik med fastmark, rullstensås, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
26 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
24 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
26 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Flark, 39 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Göl, 6 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 4: Mad vid vattendrag
53 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Stark generell påverkan från dämning, svag lokal påverkan från dikning, stark generell påverkan från vattenreglering. Vegetationen är påverkad av ingrepp.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Gungfly, 45 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation.

Delobj. 5: Obestämbar myr
173 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 6: Tjärn
6 ha, fördelat på 6 ytor.

Nr 114

20H 6J 02 (3115) KLASS 4
GRUBBMYRAN 9 KM NO SOLBERG

Myrkomplex, 75 ha (75 ha våtm), 460 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Mycket starkt generellt påverkat av anslutande hyggen, dikning.

Nr 115

20H 7F 02 (1449) KLASS 1
NYMYRAN 14 KM NV SOLBERG

Myrkomplex, 336 ha (322 ha våtm), 460 m ö h. Flygb. -86. Fält -93.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Området omitologiskt inventerat, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
36 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, vintervåg.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Golv, 30 % av delobjektytan. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 1, underelem. 2: Golv, 35 % av delobjektytan. Fastm.kärr,tuvsäv-S.papillosum-compactumtyp.

Element 1, underelem. 3: Golv, 15 % av delobjektytan. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vitmosstyp.

Element 2: Golv, 16 % av delobjektytan, öppet. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 3: Bäckdråg, 3 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Slukhål, 1 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
29 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Sträng, 20 % av delobjektytan. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Element 1, underelem. 2: Sträng, 5 % av delobjektytan. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 2: Flark, 45 % av delobjektytan, öppet. Lösbottenkärr av oligotrof typ.

Element 3: Flark, 25 % av delobjektytan, öppet. Lösbottenkärr av intermediär typ.

Element 4: Flarkgöl, 5 % av delobjektytan, öppet. Egentliga vassar saknas. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Topogent kärr
96 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 54 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Tallkärr av klotstarrtyp.

Element 1, underelem. 1: Källdråg, 1 % av delobjektytan. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gran-björkkärr av fattig vitmosstyp.

Element 3: Golv, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Soligent kärr
67 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Golv, 20 % av delobjektytan. Fastmattekärr, taggstarr-S.angustifolium var.

Element 1, underelem. 2: Golv, 10 % av delobjektytan. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.

Element 1, underelem. 3: Golv, 10 % av delobjektytan. Mjukmattekärr, starr-S. papillosum var.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3, underelem. 1: Källa, 1 % av delobjektytan. Källkärr.

Element 3, underelem. 2: Källdråg, 3 % av delobjektytan. Källkärr.

Delobj. 5: Mosse av nordlig typ
96 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Mosseplan, 20 % av delobjektytan. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 1, underelem. 2: Mosseplan, 15 % av delobjektytan. Fastm.mosse av tuvull-S. angustifoliumtyp.

Element 2: Sträng, 25 % av delobjektytan, öppet. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 3: Hölja, 25 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3, underelem. 1: Hölja, 10 % av delobjektytan. Fastmattemosse av tuvull-S. balticumtyp.

Element 3, underelem. 2: Hölja, 15 % av delobjektytan. Fastm.mosse av tuvull-S. angustifoliumtyp.

Element 4: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 5: Kärrfönster, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Nr 116

20H 7G 01 (0540) KLASS 1
ÖSTER-STORMYRAN, GÅRMYRA 10 KM NV SOLBERG

Kärrkomplex, 182 ha (181 ha våtm), 440 m ö h. Flygb. -86. Storomr HJ.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
37 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
40 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande dikning. Zoologiska värden.

Element 1: Sträng, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Flark, 42 % av delobjektytan, öppet, lövskog. Lösbotten.

Element 4: Flarkgöl, 3 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Topogent kärr
63 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, anslutande dikning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Bäck, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Sollgent kärr
42 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, anslutande dikning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Nr 117

20H 7G 02 (2520) KLASS 3
VÄSTER-STORMYRAN 13 KM NV SOLBERG

Myrkomplex, 145 ha (145 ha våtm), 450 m ö h. Flygb. -86. Storomr HJ.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
54 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, vinterväg.

Element 1: Golv, 72 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Bäckdråg, 3 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
50 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, vinterväg.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
24 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, vinterväg.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
17 ha, fördelat på 5 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Bäck, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 118

20H 7I 02 (0730) KLASS 3
LAPPMYRAN 9 KM NO SOLBERG

Myrkomplex, 70 ha (65 ha våtm), 380 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
17 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
20 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
19 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Mad vid vattendrag
10 ha, öppet. Slingrande vattendrag.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation.

Nr 119

20l 0C 01 (2611) KLASS 3
SPELMYRAN 12 KM NNV BREDBYN

Våtmarkskomplex, 47 ha (45 ha våtm), 310 m ö h. Flygb. -91.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
18 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Strång, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
10 ha, öppet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Öar, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
15 ha, fördelat på 3 ytor. Svag lokal påverkan från dikning, vinterväg.

Element 1: Golv, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 75 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 120

20l 2B 01 (0434) KLASS 3
MYR VID PÅLBÄCKSTJÄRNEN 20 KM NNV BREDBYN

Myrkomplex, 107 ha (104 ha våtm), 245 m ö h. Flygb. -91.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
19 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
61 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande flygplats, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 20 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
24 ha, fördelat på 4 ytor. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 48 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 3: Bäck, 2 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Tjärn
1 ha.

Nr 121

20l 2B 02 (0748) KLASS 3
KALLKÄLLMYRAN 20 KM NNV BREDBYN

Våtmarkskomplex, 69 ha (67 ha våtm), 235 m ö h. Flygb. -91.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
9 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
33 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
25 ha, fördelat på 4 ytor. Svag lokal påverkan från dikning, vinterväg.

Element 1: Golv, 97 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Bäck, 3 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 122

20l 2C 01 (1239) KLASS 3
SKOTTJÄRNMYRORNA 21 KM N BREDBYN

Myrkomplex, 114 ha (89 ha våtm), 265 m ö h. Flygb. -91.
Det: Sören Uppsäll.
Flikiga kantzoner, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
61 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
23 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Öar, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Tjärn
9 ha.

Element 1: Gungfly, 50 % av delobjektytan, öppet.

Element 2: Göl, 1 % av delobjektytan, öppet.

Nr 123

20I 2C 02 (3803) KLASS 3
MYR O ÖVERSJÖN 25 KM NNV BREDBYN

Myrkomplex, 67 ha (65 ha våtm), 280 m ö h. Flygb. -91.
Det: Sören Uppsäll.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
38 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Element 4: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
13 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Element 3: Tuva, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
14 ha, fördelat på 7 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 49 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 3: Bäck, 1 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 124

20I 2E 01 (0846) KLASS 4
STORMYRAN, GRÖNINGEN 17 KM NV BJÖRNA

Myrkomplex, 125 ha (117 ha våtm), 280 m ö h. Flygb. -88.
Det: Sören Uppsäll.
Mycket starkt generellt påverkat av anslutande hyggen, dikning. Sjö ansluter till högst 24%.

Nr 125

20I 2F 01 (1243) KLASS 1
BILLSTA-RÖDMYRAN 13 KM NV BJÖRNA

Myrkomplex, 64 ha (58 ha våtm), 470 m ö h. Flygb. -88.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården, ingår i urskogsinventering 1982. Naturreservat. Naturskog i eller i anslutning, terrängföljande våtmark, värdefull natur i anslutning.

Delobj. 1: Topogent kärr
12 ha, öppet.

Element 0: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Lösbotten.

Delobj. 2: Topogent kärr
11 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Bäck, 5 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
24 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 20 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
11 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Öar, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Nr 126

20I 2F 02 (4210) KLASS 3
MYR SV BERGSSJÖN 17 KM NV BJÖRNA

Myrkomplex, 135 ha (109 ha våtm), 285 m ö h. Flygb. -88.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Flikiga kantzoner, området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Topogent kärr
35 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 49 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Bäck, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Topogent kärr
19 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
35 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
18 ha, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Tjärn
13 ha, fördelat på 8 ytor.

Element 1: Gungfly, 15 % av delobjektytan, öppet.

Nr 127

20I 2G 01 (1107) KLASS 1
VÄSTERHUS-RÖDMYRAN 12 KM NV BJÖRNA

Kärrkomplex, 46 ha (43 ha våtm), 430 m ö h. Flygb. -88.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården, ingår i urskogsinventering 1982. Naturreservat. Höjdskillnad 50-100 m, naturskog i eller i anslutning, värdefull natur i anslutning.

Delobj. 1: Topogent kärr
17 ha, öppet.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Mindre vattenytor, 5 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten. Rest av tjärn.

Element 4: Tuva, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
8 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 3: Backkärr
18 ha, glest trädtäckt.

Element 0: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Nr 128

20I 3B 01 (2333) KLASS 4
HAMPTJÄRNMYRAN 26 KM NNV BREDBYN

Våtmarkskomplex, 96 ha (91 ha våtm), 340 m ö h. Flygb. -91.
Det: Sören Uppsäll.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning, vinterväg.

Nr 129

20I 3C 01 (1631) KLASS 2
FRUSEMYRAN 27 KM N BREDBYN

Myrkomplex, 82 ha (69 ha våtm), 255 m ö h. Flygb. -91.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården. Området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Strång-flarkkärr
22 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Strång, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Flark, 40 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 4: Flarkgöl, 5 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Element 5: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
19 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
15 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Strång, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Mad vid vattendrag
16 ha, öppet.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog.

Nr 130

20l 3E 01 (3105) KLASS 3
MYR N STORBORGAREN 24 KM NV BJÖRNA

Mossekomplex, 80 ha (72 ha våtm), 270 m ö h. Flygb. -91.
Det: Sören Uppsäll.
Slingrande vattendrag.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
58 ha, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från vintervåg.

Element 1: Mosseplan, 78 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
15 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Nr 131

20l 4B 01 (0517) KLASS 2
GAMM-UTTERSJÖMYRORNA 18 KM SO SOLBERG

Myrkomplex, 157 ha (126 ha våtm), 285 m ö h. Flygb. -91.
Det: Sören Uppsäll.
Mosaik med fastmark, sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Topogent kärr
33 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
13 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Flark, 30 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 3: Topogent kärr
30 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
10 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 5: Blandmyr av mosaiktyp
41 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Sträng, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 5: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Nr 132

20l 4D 01 (0140) KLASS 3
MYR V VÄSTBORGAREN 27 KM NV BJÖRNA

Våtmarkskomplex, 96 ha (78 ha våtm), 255 m ö h. Flygb. -91.
Det: Sören Uppsäll.
Åsrygg i anslutning, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
33 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaiktyp
16 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 3: Mad vid vattendrag
32 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation.

Nr 133

20l 4D 02 (0924) KLASS 2
KALLKÄLLMYRAN, LADUMYRAN 28 KM NV BJÖRNA

Våtmarkskomplex, 128 ha (101 ha våtm), 285 m ö h.
Flygb. -91.
Det: Sören Uppsäll.
Mosaik med fastmark.

Delobj. 1: Topogent kärr
29 ha, fördelat på 5 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Strång, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Flark, 10 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
42 ha, fördelat på 8 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
30 ha, fördelat på 6 ytor.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 4: Tjärn
2 ha.

Nr 134

20l 4E 01 (4731) KLASS 3
INNER-MADDMYRAN, STORMYRAN 29 KM NV BJÖRNA

Myrkomplex, 85 ha (81 ha våtm), 350 m ö h. Flygb. -91.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
31 ha, fördelat på 6 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Strång, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Flark, 10 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Soligent kärr
14 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
10 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Sumpskog
11 ha, fördelat på 5 ytor.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Bäck, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Nr 135

20l 4F 01 (0149) KLASS 3
FÅBODKALSMYRAN 20 KM NNV BJÖRNA

Våtmarkskomplex, 50 ha (50 ha våtm), 195 m ö h. Flygb. -88.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
18 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 3: Mad vid vattendrag
19 ha, glest trädtäckt. Slingrande vattendrag.

Element 1: Golv, 69 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Bäck, 1 % av delobjektytan, öppet.

Nr 136

20l 4F 02 (3535) KLASS 3
KULLMYRAN 24 KM NV BJÖRNA

Myrkomplex, 47 ha (47 ha våtm), 225 m ö h. Flygb. -88.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
29 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Gungfly, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
18 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Nr 137

20I 5A 01 (3301) KLASS 3
BLEKAN, RISHULTMYRAN 10 KM O SOLBERG

Myrkomplex, 193 ha (182 ha våtm), 345 m ö h. Flygb. -86. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
89 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
35 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
13 ha, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, odling i våtmarken.

Element 1: Sträng, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Flark, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Mad vid vattendrag
26 ha, öppet. Området har slåtterhävdats, hölador.

Element 1: Golv, 87 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Gräs/starrvegetation.

Element 3: Bäck, 3 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 5: Sumpskog
20 ha, fördelat på 4 ytor. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 98 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Bäck, 2 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog.

Nr 138

20I 5C 01 (4525) KLASS 2
STORSELSMYRORNA 22 KM ONO SOLBERG

Myrkomplex, 94 ha (90 ha våtm), 375 m ö h. Flygb. -91. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
30 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Flark, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-kösbotten.

Delobj. 2: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 78 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Element 3: Göl, 2 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
12 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
24 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Flark, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Element 4: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Sumpskog
11 ha, fördelat på 4 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Nr 139

20I 5G 01 (3446) KLASS 2
RÖDMOSSAMYRAN, STORMYRAN 20 KM NV TREHÖRNINGSJÖ

Myrkomplex, 95 ha (95 ha våtm), 230 m ö h. Flygb. -88.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
32 ha, fördelat på 8 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande dikning.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Strångblandmyr
16 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Flark, 44 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta-lösbotten.

Element 4: Flarkgöl, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
26 ha, fördelat på 5 ytor, öppet.

Element 1: Öar, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 5: Limnogen strandsumpskog
10 ha.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog.

Element 2: Bäck, 1 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Permanent öppet vatten.

Nr 140

20I 6A 01 (0107) KLASS 1
LILLSJÖSLÅTTERN 4 KM NV RÖDVATTNET

Våtmarkskomplex, 5 ha (5 ha våtm), 365 m ö h. Flygb. -78.
Det: Stefan Grundström.
Kulturminne, riksintresse för naturvården. Naturreservat.
Tillfredsställ. dokumentation finns,
sjö ansluter till högst 24%, våtmarken slåtterhävdas.

Delobj. 1: Topogent kärr
2 ha, öppet. Svag generell påverkan från dikning. Området har översilats.

Element 1: Golv, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Sumpskog
3 ha.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Vegetation utmed mindre vattendrag, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Örtdominerad vegetation.

Nr 141

20I 6A 02 (1310) KLASS 4
MYR VID GULLTJÄRNARNA 10 KM O SOLBERG

Myrkomplex, 124 ha (118 ha våtm), 385 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning, väg.

Nr 142

20I 6E 01 (2934) KLASS 1
STORMYRAN 31 KM NV TREHÖRNINGSJÖ

Myrkomplex, 182 ha (174 ha våtm), 277 m ö h. Flygb. -91.
Det: Sören Uppsäll.
Tillfredsställ. dokumentation finns,
sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
54 ha, öppet.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Bäckdråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
41 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vintervåg.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
42 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Kärrfönster, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
13 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från vinterväg.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Öar, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Sumpskog
24 ha, fördelat på 9 eller fler ytor. Svag lokal påverkan från dikning, vinterväg.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 6: Tjärn
2 ha.

Nr 143

20I 6G 02 (3710) KLASS 3
LERBÄCKSMYRAN 25 KM NV TREHÖRNINGSJÖ

Myrkomplex, 64 ha (64 ha våtm), 225 m ö h. Flygb. -88. Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
32 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
10 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
10 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Sträng, 35 % av delobjektytan, öppet. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 45 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Flark, 20 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 4: Sumpskog
12 ha, fördelat på 4 ytor. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Bäck, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Nr 144

20I 6G 03 (3624) KLASS 2
STORMYRAN 24 KM NV TREHÖRNINGSJÖ

Myrkomplex, 83 ha (74 ha våtm), 225 m ö h. Flygb. -88. Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Väsentlig del ansluter till större vattendrag.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr
19 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 55 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 3: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
15 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
29 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 4: Sumpskog
11 ha. Leveer utmed vattendraget.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 5: Tjärn
4 ha, fördelat på 5 ytor.

Nr 145

20I 7B 01 (1434) KLASS 3
BLACKFJÄLLMYRAN 21 KM NO SOLBERG

Myrkomplex, 77 ha (75 ha våtm), 440 m ö h. Flygb. -91. Det: Sören Uppsäll.
Området ornitologiskt inventerat, sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Topogent kärr
17 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Flark, 25 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
31 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
27 ha, öppet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 35 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Flarkgöl, 3 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Element 4: Flark, 2 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta-lösbotten.

Nr 146

20I 8B 01 (0840) KLASS 1
SKARPMYRAN 13 KM VNV REMMARN

Myrkomplex, 65 ha (62 ha våtm), 365 m ö h. Flygb. -86.
Det: Stefan Grundström.
Riksintresse för naturvården.

Delobj. 1: Mosse av nordlig typ
14 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från intervåg.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Gungfly, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta-lösbotten.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Flarkgöl.

Delobj. 3: Sluttande mosse
22 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Element 2: Hölja, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Mjukmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
9 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Kantzon, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Tjärn
2 ha.

Delobj. 6: Strängblandmyr
5 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 25 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog.

Element 2: Golv, 75 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta-mjukmatta.

Nr 147

20I 8B 02 (0532) KLASS 1
STORSLÅTTMYRAN 22 KM NO SOLBERG

Myrkomplex, 145 ha (138 ha våtm), 345 m ö h. Flygb. -91.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
74 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 4: Sträng, 1 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 5: Flark, 4 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
46 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 3: Mad vid vattendrag
19 ha, öppet.

Element 1: Golv, 69 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Bäck, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Nr 148

20I 8B 03 (1903) KLASS 2
HEM-STORMYRAN 20 KM NO SOLBERG

Kärrkomplex, 121 ha (114 ha våtm), 395 m ö h. Flygb. -91.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Åkermark ansluter, området omitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Topogent kärr
57 ha, öppet.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Bäckdråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
18 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Flark, 40 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 3: Topogent kärr
15 ha, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Golv, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Golv, 15 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
25 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Tjärn
1 ha.

Nr 149

20I 8C 01 (1206) KLASS 2
TALLMYRAN, SLÅDAMYRAN 25 KM NO SOLBERG

Våtmarkskomplex, 288 ha (237 ha våtm), 295 m ö h.
Flygb. -91.
Det: Sören Uppsäll.
Mosaik med fastmark.

Delobj. 1: Topogent kärr
57 ha, fördelat på 6 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 9 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Flark, 15 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 5: Göl, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
77 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
39 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 4: Mad vid vattendrag
54 ha, öppet. Stark generell påverkan från dämning, vattenreglering.

Element 1: Golv, öppet.

Delobj. 5: Sumpskog
16 ha, fördelat på 4 ytor.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 2: Golv, 33 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Bäck, 2 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 6: Tjärn
5 ha, fördelat på 3 ytor.

Nr 150

20I 8E 01 (2229) KLASS 2
STOR-FLÄRKMYRAN 37 KM NV TREHÖRNINGSJÖ

Myrkomplex, 258 ha (237 ha våtm), 240 m ö h. Flygb. -88.
Storomr HK.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Området ornitologiskt inventerat, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
10 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
162 ha, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 68 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Göl, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Element 5: Bäck, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Strängblandmyr
37 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 65 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Flark, 4 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 4: Flarkgöl, 1 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 4: Mad vid vattendrag
30 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dammanläggning, stark generell påverkan från vattenreglering.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog.

Nr 151

20I 8E 02 (2116) KLASS 3
FLÄRKMYRAN 35 KM ONO SOLBERG

Myrkomplex, 135 ha (113 ha våtm), 245 m ö h. Flygb. -91. Storomr HK.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Väsentlig del ansluter till större vattendrag, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
75 ha, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
24 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 88 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 2 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 3: Mad vid vattendrag
14 ha, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dämning, vattenreglering.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, glest trädtäckt, lövskog. Videvegetation.

Nr 152

20I 8E 03 (4648) KLASS 2
RÖNBERGSMYRAN 36 KM NV TREHÖRNINGSJÖ

Myrkomplex, 203 ha (191 ha våtm), 265 m ö h. Flygb. -91.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Topogent kärr
19 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Topogent kärr
16 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
127 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 4: Strängblandmyr
31 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Sträng, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 53 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Flarkgöl, 7 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 5: Tjärn
3 ha, fördelat på 4 ytor.

Nr 153

20I 9E 02 (2921) KLASS 3
STORMYRAN 37 KM NO SOLBERG

Myrkomplex, 137 ha (121 ha våtm), 250 m ö h. Flygb. -91.
Det: Sören Uppsäll.
Väsentlig del ansluter till större vattendrag.

Delobj. 1: Topogent kärr
16 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta. Väsentlig del ansluter till större vattendrag.

Element 2: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Flark, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
49 ha, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, vintervåg.

Element 1: Golv, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
22 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 4: Blandmyr av mosaiktyp
22 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Sumpskog
12 ha, fördelat på 4 ytor. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 6: Tjärn
5 ha, fördelat på 3 ytor.

Nr 154

20l 9F 01 (2315) KLASS 1
BJÖRKLUNDSMYRAN, KAMMYRAN 37 KM NV TREHÖRNINGSJÖ

Myrkomplex, 183 ha (148 ha våtm), 260 m ö h. Flygb. -88.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Rullstensås,
sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
27 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Zoologiska värden.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 8 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 4: Göl, 2 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
19 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Zoologiska värden.

Element 1: Sträng, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Flark, 35 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 4: Flarkgöl, 10 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Topogent kärr
16 ha, fördelat på 4 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
51 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 20 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 5: Blandmyr av mosaiktyp
26 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Flark, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 4: Flark, 38 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 5: Flarkgöl, 2 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 6: Sumpskog
12 ha, fördelat på 4 ytor.

Element 1: Golv, skogbevuxet, barrskog.

Element 2: Bäck, 1 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Permanent öppet vatten.

Delobj. 7: Tjärn
13 ha, fördelat på 9 eller fler ytor.

Element 1: Gungfly, 20 % av delobjektytan, öppet.

Nr 155

20l 9G 01 (2604) KLASS 1
BÄCKMYRAN 35 KM NV TREHÖRNINGSJÖ

Myrkomplex, 145 ha (142 ha våtm), 250 m ö h. Flygb. -88.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården.
Väsentlig del ansluter till större vattendrag.

Delobj. 1: Topogent kärr
14 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Sträng-flarkkärr
16 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Flark, 32 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 4: Flarkgöl, 3 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Delobj. 3: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Väsentlig del ansluter till större vattendrag.

Delobj. 4: Mosse av nordlig typ
74 ha, fördelat på 7 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 15 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 5: Blandmyr av mosaiktyp
13 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 25 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta-mjukmatta.

Element 3: Flark, 31 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 4: Göl, 4 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten. Vattenfyllda torvgravar.

Delobj. 6: Limnogen strandsumpskog
13 ha, fördelat på 4 ytor.

Element 1: Golv, skogbevuxet, lövskog.

Nr 156

20J 0A 01 (3323) KLASS 3
MYR VID JUNGFRUTJÄRNEN 14 KM ONO BJÖRNA

Topogent kärr, 54 ha (52 ha våtm), 210 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Nedlagda odlingar i våtmarken.

Delobj. 1: Topogent kärr
16 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag generell påverkan från kalkning utförd.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Delobj. 2: Topogent kärr
37 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag generell påverkan från kalkning utförd, stark lokal påverkan från odling i våtmarken.

Element 1: Golv, 72 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Bäck, 3 % av delobjektytan, öppet. Permanent öppet vatten.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 3: Tjärn
1 ha.

Nr 157

20J 0A 02 (4419) KLASS 3
NÖRDMYRAN 14 KM ONO BJÖRNA

Topogent kärr, 81 ha (81 ha våtm), 215 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
47 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag generell påverkan från kalkning utförd.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
34 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, svag generell påverkan från kalkning utförd, svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Bäck, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Nr 158

20J 0C 01 (0637) KLASS 3
STORMYRAN 21 KM NNV HUSUM

Myrkomplex, 91 ha (91 ha våtm), 105 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.

Delobj. 1: Topogent kärr
16 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
22 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 10 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
12 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädtäckt. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Strängblandmyr
30 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Flark, 55 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Sumpskog
11 ha, fördelat på 3 ytor. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Nr 159

20J 1C 01 (3844) KLASS 2
ST. FÄBODTJÄRNMYRAN 16 KM SO TREHÖRNINGSJÖ

Myrkomplex, 198 ha (169 ha våtm), 195 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan. Tillfredsställ. dokumentation finns.

Delobj. 1: Topogent kärr
45 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta.

Element 2: Sträng, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Golv, 5 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 5: Tuva, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
29 ha, fördelat på 6 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 3: Mosse av nordlig typ
95 ha, fördelat på 8 ytor, öppet.

Element 1: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Sträng, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Tjärn
1 ha.

Nr 160

20J 1C 02 (1849) KLASS 2
STORMYRAN 18 KM SO TREHÖRNINGSJÖ

Myrkomplex, 76 ha (71 ha våtm), 175 m ö h. Flygb. -86.
Det: Sören Uppsäll.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr
36 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 40 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Mjukmatta. Diffus strängbildning.

Element 3: Bäckdråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 4: Golv, 5 % av delobjektytan, glest trädtäckt, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Mosse av nordlig typ
22 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädtäckt.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, glest trädtäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
13 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Öar, 15 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Nr 161

19J 2A 01 (4303) Klass 3
ÖGELTJÄRNEN 10 KM SO ÖRNSKÖLDSVIK

4 ha, 26 m ö h.

Ingår i naturvårdsplan.
Tjärn med anslutande myr och sumpskog med förekomst av artar som tvåblad, grönkulla, ängsnycklar och myggblomster.

Källa: Mascher 1990, Ångermanlands flora.

Nr 162

19J 3A 01 (0101) Klass 3
BERGTJÄRNEN 9 KM SO ÖRNSKÖLDSVIK

4 ha, 85 m ö h.

Ingår i naturvårdsplan.
Tjärn med omgivande myr. Ornitologiskt intressant område med smålom.

Nr 163

19J 3C 01 (1236) Klass 3
STORSTENMYRAN 16 KM SO ÖRNSKÖLDSVIK

20 ha, 15 m ö h.

Ingår i naturvårdsplan.
Myr med förekomst av strängkärr samt mosse mot fastmarken.

Källa: Björkbäck 1970.

Nr 164

19J 4C 01 (2423) Klass 3
BANAFJÄLSVIKEN 16 KM O ÖRNSKÖLDSVIK

15 ha, 0 m ö h.

Ingår i naturvårdsplan.
Grund, igenväxt havsvik omgiven av omfattande sankmarker. Rastlokal för vadare och änder.

Källa: Guvå 1970.

Nr 165

19J 5D 03 (0909) Klass 3
MYR 500 M V AGGÖSUNDET 4 KM SV HUSUM

3 ha, 25 m ö h.

Ingår i naturvårdsplan.
Botaniskt intressant myr.

Källa: Mascher 1990, Ångermanlands flora.

Nr 166

19J 5D 04 (1512) Klass 3
MYR 750 M NNV AGGÖSUNDET 4 KM SV HUSUM

3 ha, 10 m ö h.

Ingår i naturvårdsplan.
Liten myr med gungflyområden och dybottnar och av visst botaniskt värde.

Källa: Mascher 1990, Ångermanlands flora

KÄLLFÖRTECKNING

Andersson, G., Ståhl, P. & Delang, M. 1975. Översiktlig naturinventering av Helgumsjöns delta, rapport 1975:21. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Arnström, T., Holgersson, A. & Söderberg, B. 1977. Fem myrar i Västernorrlands län - vegetationsinriktad naturinventering, rapport 1977:9. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Berg, I. & Öhrling, H. 1988. Hotade skogsväxter i Ångermanland, rapport 1988:1. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Bergström, L. & Sohlin, L. 1980. Björkmyran-Stordjupdalen - en botanisk inventering, rapport 1980:9. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Bergvall, F. 1953. Orkidémyrarna i Gideåberg. I Natur i Ångermanland och Medelpad. Red. Elofson, O & Curry-Lindahl, K. Uppsala.

Björkbäck, F. 1970. TELMA (IBP). Preliminär förteckning över särskilt skyddsvärda myrar i Y län. Stencil vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Bolin, E. 1983. Fyra myrar i Medelpad. Opublicerad inventering vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Dahlén, B. 1984. Slättbränna och Mossaträsk - två fågelmyrar i Ångermanland. Artikel i Gråspetten årg. 4:4. Ångermanlands Ornitologiska förening.

Due, K. 1984. Stormyran - Åkerbränna, en botanisk inventering. Opublicerad inventering vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Due, K. & Muhr, M. 1982. Tretton myrar i Västernorrlands län, rapport 1983:1. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Due, K. & Muhr, M. 1982.Nio myrar i Ångermanland. Opublicerad rapport vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Fryleskog, R. & Viotti, A. 1981. Ådalen - växter och djur, översiktlig naturinventering. En basrapport från Ådalskommittén, Länsstyrelsen i Västernorrland, Härnösand.

Guvå, L. 1970. Naturvårdsinventering i Västernorrlands län. Del 1 Ångermanland, Nolaskogsdelen. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Guvå, L. 1971. Naturvårdsinventering i Västernorrlands län. Del 2 Ångermanland, Ådalen. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Guvå, L. 1972. Naturvårdsinventering i Västernorrlands län. Del 3 Medelpad. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Hermansson, J. 1991. Inventering av lavar i tio sumpskogar i Västernorrlands län. Stencil. Skogsstyrelsen.

Isaksson, L. 1981. Lillsjöslåttern, en botanisk och kulturhistorisk undersökning, rapport 1981:5. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Leijon, B. 1977. Måckelmyran, naturinventering i Sundsvalls kommun. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Lidberg, R. & Lindström, H. Medelpads flora, opublicerat arbetsmaterial. Lindström,

B-M. Lindström & Simosson, P. 1977. Västra Ramsele - naturinventering i Sollefteå kommun, rapport 1977:15. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Lundqvist, J. A. G. 1973. Växter på Gideåbergsmyrarna. Manuskript vid Länsstyrelsen Västernorrlands län, Härnösand.

Lundqvist, J. A. G. 1978. Vegetation och flora i Halsviksravinens naturreservat. Svensk botanisk tidskrift 71:335-362. Stockholm 1978.

Lundqvist, J. 1987. Beskrivning till jordartskarta över Västernorrlands län och förutvarande Fjällsjö k:n. Sveriges geologiska undersökningar, SER ca, avhandlingar och uppsatser i A4, nr 55. Uppsala.

Länsstyrelsen Västernorrlands län 1983. Skötselplan för Halsviksravinens naturreservat. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Länsstyrelsen Västernorrlands län 1986. Skötselplan för Prästflons naturreservat. Länsstyrelsen Västernorrlands län, Härnösand.

Löfroth, M. 1993. Knottblomster, status och utbredning i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 87:133-146. Lund.

Mascher, J. W. 1990. Ångermanlands flora. SBT-redaktionen, Lund.

Mascher, J. W. 1992. Florafynd under ångermanlänska botanikdagar. Natur i norr 11(1)49-53. Umeå 1992.

Muhr, M. 1985. Mossaträsk-Stormyran, en botanisk inventering. Manuskript vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Muhr, M. & Kustås, K. 1982. Inventering av myrar i Stensjö-Berg området. Opublicerad rapport vid Länsstyrelsen Västernorrlands län, Härnösand.

Ohlson, M. 1982. Prästflon - en botanisk inventering, rapport 1982:6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Simonsson, P. 1979. Urskogar och naturskogar i västernorrlands län, rapport 1979:11. Länsstyrelsen i Västernorrland, Härnösand.

Simonsson, P. 1980. Naturinventering av myrarna Bäckmyran, Stor-Flärkmyran och Degermyran i Örnsköldsviks kommun. Opublicerad inventering vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län, rapport 1980:13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Sturesson, L. 1994. Naturinventering i Tynderö, Timrå kommun. Beskrivning av områden med höga naturvärden, rapport 1994:1. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Ståhl, P. 1978. Östra Nora i Höga Kusten, rapport 1978:18. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Söderström, L. 1992. Inventering av mossor i 10 sumpskogar i Västernorrlands län. Stencil. Skogsstyrelsen.

Uppsäll, S. & Holmqvist, M. 1993. Program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden, rapport 1993:1. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

Waldén, H. W. 1992. Sumpskogen och molluskerna. Föredrag av Henrik W. Waldén vid Skogsstyrelsens sumpskogsseminarium i Sollefteå den 6-7 okt. 1992. Stencil. Skogsstyrelsen.


Öhrling, H. & Ottosson, R. 1988. Vägen ut i Sundsvalls natur. Sundsvalls naturskyddsförerning, Sundsvall.

Öhrling, H., Viotti, A. & Berg, I. 1990. Ängs- och hagmarker i Västernorrlands län, del 2 Ångermanland, rapport 1990:3. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand.

LÄNSSTYRELSENS PUBLIKATIONSSERIE

under 1994 har hittills följande publikationer utgivits av
Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Litt	Enhet/ motsv	Rubrik
1994:1	ME	Naturinventering av Tynderö-Åstön
1994:2	ME	Skyddsvärda våtmarker i Västernorrlands län



LÄNSSTYRELSEN I
VÄSTERNORRLANDS LÄN

GATUADRESS
NYBROGATAN 15
HÄRNÖSAND

POSTADRESS
871 86 HÄRNÖSAND

TELEFON
0611 - 290 00 (växel)
TELEFAX
0611 - 298 05

POSTGIRO
3 51 92 - 4