


Bottenfauna i Blekinge län 2008

– Undersökningar av 20 lokaler i
vattendrag



Rapport: 2009:4

Rapportnamn: Bottenfauna i Blekinge län 2008. Undersökning av 20 lokaler i vattendrag

Utgåva: Endast publicerad på webben

Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona.

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/blekinge

Dnr: 581-6763-08

ISSN: 1651-8527

Layout: Ekologgruppen, Landskrona

Kontaktperson: Roger Johnsson

Foto/Omslag: Jan Pröjts

Länsstyrelsen rapporter: www.lansstyrelsen.se/blekinge/Publikationer

Bottenfauna i Blekinge län 2008

Undersökning av 20 lokaler i vattendrag

Rapporten är upprättad av: Ann Nilsson.
Granskning: Cecilia Holmström/Jan Pröjts.

Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Blekinge.

Omslagsbild: Mieån, Grimsmåla (Mi12). Foto: Håkan Björklund.

Landskrona 2009-02-24
EKOLOGGRUPPEN

Totalt antal sidor i huvuddokument (inkl omslag): 15

Antal bilagor: 3

Utskriftsversion: 09-02-24

Wordfil: M:\DATA-NY\BTNFAUNA\BLEKINGE\2008\rapport2008.doc

Innehållsförteckning

	sidan
1. Sammanfattning	3
2. Inledning	4
3. Resultat med kommentarer	6
3.1 Allmänt	6
3.2 Försurningspåverkan	7
3.3 Organisk/eutrofierande föroreningspåverkan	8
3.4 Naturvärden	8
Allmänt	8
Rödlistade och ovanliga arter	8
3.5 Jämförelse med tidigare undersökningar	9
Allmänt	9
Försurning	10
4. Provpunktsvis redovisning	12
Förklaring till artlistorna	13
 Bilagor	
1. Metodik	54
2. Resultatbehandling	54
3. Litteratur	58

1. Sammanfattning

Årets undersökning har omfattat totalt 20 lokaler i rinnande vatten. Proverna har tagits i hela länet, från Lillån i Lyckebyån i öster till Holjeån i Skräbeån i väster. Bedömning har gjorts av föroreningspåverkan, påverkan av organiska/eutrofierande föroreningar samt naturvärde.

Föroreningspåverkan

- 14 lokaler bedömdes som **obetydligt** påverkade av förorening
- två lokaler bedömdes som **måttligt** påverkade av förorening
- två lokaler bedömdes som **betydligt** påverkade av förorening
- två lokaler bedömdes som **starkt eller mycket starkt** påverkade av förorening

Organiska/eutrofierande föroreningar

Av de undersökta lokalerna bedömdes de flesta som **obetydligt** eller **svagt** påverkade av organiska/eutrofierande föroreningar. En lokal bedömdes som **måttligt** påverkad.

Naturvärde

Mycket höga naturvärden konstaterades på en lokal och **höga** naturvärden konstaterades på en lokal. På övriga lokaler var naturvärdet **allmänt**.

Tabell 1. Sammanfattning av resultaten från bottenfaunaundersökningen i Blekinge län 2008.

Nr	Vattendrag	Lokal	Förorenings- påverkan	Org./eutrof. påverkan	Naturvärde
Ly23	Lillån	Åstugan	obetydlig	svag	allmänt
Si08	Silletorpsån	Kvarnagården	obetydlig	obetydlig	allmänt
Na26	Nättrabyån	Långasjöbäcken	betydlig	obetydlig	allmänt
Na30	Lillån	Alnaryd	stark-mkt stark	obetydlig	allmänt
Li08	Listerbyån	Kvarngölen/Hallasjön	betydlig	svag	allmänt
Ro01	Lillån till Hjorthålan	Hyltan	obetydlig	svag	allmänt
Vi20BF	Vierysån	Kroks kvarn	obetydlig	svag	allmänt
Br06	Bräkneån	Hallarna	obetydlig	obetydlig	allmänt
Br13	Lillån (Öljehultsbäcken)	N. Bälgalet	obetydlig	obetydlig	allmänt
Ah16	Nedre Agnsjöns utlopp	Högahult	måttlig	svag	allmänt
Ah21	Bäck från Älmtasjön	Björnamåla	obetydlig	måttlig	allmänt
Mi12	Mieån	Grimsmåla	obetydlig	obetydlig	mycket högt
Mo02	Bjällerbäcken	Fridafors	obetydlig	svag	allmänt
Mo11	Hejasjöbäcken	Härnäs	obetydlig	svag	allmänt
Or11BF	Bäck fr. Skinsagylet	Värhult	stark-mkt stark	obetydlig	allmänt
Or30	Ö. Orlundsån	Mynningen	obetydlig	svag	högt
Sk19	Örsjön	Järnvägen	obetydlig	svag	allmänt
Sk22	Byemålaån	Vid väg 585	obetydlig	svag	allmänt
Sk33	Vilshultsån	Flyborgstorpet	obetydlig	obetydlig	allmänt
Sk34	Ulvsbäck	Norra Holje	måttlig	svag	allmänt

2. Inledning

Inom ramen för kalkningsuppföljningen i Blekinge län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 20 lokaler i rinnande vatten, på uppdrag av länsstyrelsen i Blekinge. Provtagningen utfördes mellan den 23 oktober och 11 november 2008. De vattendrag som undersökts är väl spridda från Lillån i Lyckebyån i öster till Holjeån i Skräbeåns avrinningsområde i väster.

Blekinge län är till stora delar drabbat av försurningen, dels p g a jordartsförhållandena där de inre delarna naturligt har en svag buffertkapacitet. En av målsättningarna med föreliggande undersökning har varit att utröna hur försurningspåverkade bottenfaunasamhällena är och hur kalkningsinsatserna påverkat bottenfaunan i vattendragen. Undersökningen kommer också att ligga till grund för framtida arbeten med biologisk återställning i vattendragen. En omfattande kalkningsverksamhet bedrivs i länet, i form av sjö- våtmarks- och doserarkalkning.


Rapporten är upplagd på så sätt att resultatet med sammanfattande utvärdering presenteras först (kapitel 3). Därefter följer en detaljerad beskrivning av provpunkterna och deras enskilda resultat inklusive artlista (kapitel 4), med en provpunkt per uppslag. Metodik och redovisning av resultatbehandlingen redovisas i bilaga 1 och 2, medan litteratur redovisas i bilaga 3.

Rapporten är sammanställd av Ann Nilsson, Ekologgruppen.


Tabell 2. Undersökta lokaler i Blekinge 2008 samt kalkningspåverkan på respektive lokal.

Nr	Vattendrag	Lokal	X-koord	Y-koord	Kommun	Kalkningsmetod
Ly23	Lillån	Åstugan	6237377	1495805	Karlskrona	Sjökalkning
Si08	Siljetorpsån	Kvarnagården	6247940	1486240	Karlskrona	Sjökalkning
Na26	Långasjöbäcken	Berga	6247200	1476100	Karlskrona	Sjökalkning
Na30	Lillån	Alnaryd	6246081	1476973	Karlskrona	Sjökalkning
Li08	Listerbyån	Kvarngölen/Hallasjön	6246434	1472204	Karlskrona	Sjökalkning
Ro01	Lillån till Hjorthålan	Hyltan	6256100	1463310	Ronneby	Sjökalkning
Vi20BF	Vierysån	Kroks kvarn	6228310	1459871	Ronneby	Sjökalkning
Br06	Bräkneån	Hallarna	6255810	1450310	Ronneby	Sjökalkning
Br13	Lillån (Öljehultsbäcken)	N. Bälganet	6251750	1452080	Ronneby	Sjö/våtmarkskalkning
Ah16	Nedre Agnsjöns utlopp	Högahult	6242046	1448917	Karlshamn	Sjö/våtmarkskalkning
Ah21	Bäck från Älmtasjön	Björnamåla	6240190	1444914	Karlshamn	Sjökalkning
Mi12	Mieån	Grimsmåla	6244106	1442290	Karlshamn	Sjökalkning
Mo02	Bjällerbäcken	Fridafors	6253803	1429343	Karlshamn	Sjökalkning, doserarkalkning
Mo11	Hejasjöbäcken	Härnäs	6245830	1432610	Karlshamn	Sjö/våtmarkskalkning, doserarkalk
Or11BF	Bäck fr. Skinsagylet	Värhult	6230346	1424583	Sölvesborg	Ej kalkningspåverkad
Or30	Ö. Orlundsån	Mynningen	6225243	1429440	Sölvesborg	Sjökalkning
Sk19	Örsjöån	Järnvägen	6249321	1413932	Olofström	Sjökalkning
Sk22	Byemålaån	Vid väg 585	6248717	1423706	Olofström	Sjö/våtmarkskalkning
Sk33	Vilshultsån	Flyborgstorpet	6245396	1419131	Olofström	Sjö/våtmarkskalkning, doserarkalk
Sk34	Ulvsbäck	Norra Holje	6245289	1419256	Olofström	Sjö/våtmarkskalkning

Försurningspåverkan



Naturvärdesbedömning



Figur 1. Bedömning av försurningspåverkan och naturvärde vid bottenfaunalokaler i Blekinge län, provtagning hösten 2008. För förklaring till lokalnumren, se tabell 2.

3. Resultat med kommentarer

Vädret under perioden före eller under provtagningen kan inverka på resultatet. Mycket nederbörd på kort tid ökar t ex risken för surstötter, höglöde och problem vid provtagningen. Om sommaren och hösten är kylig växer djuren långsammare, medan en varm höst kan ge möjlighet för värmekrävande arter att hinna fortplanta sig. Vissa arter hinner kanske också med en extra generation under varma sommarsäsonger.

Våren var varm vilket gav en ovanligt tidig vegetationsutveckling. Flödena var låga och varade hela sommaren fram till oktober. Vid provtagningen var vattenföringen relativt normal och provtagningen kunde genomföras utan problem.

3.1 Allmänt

Resultaten från respektive provpunkt redovisas provpunktsvis i kapitel 4, inklusive artlistorna.

Antalet taxa på de 20 lokalerna varierade mellan 21 och 54. Den artrikaste lokalen i undersökningen var Mieån vid Grimsmåla (Mi12) och den artfattigaste var bäcken från Skinsagylet vid Värhult (Or11). Mieån vid Grimsmåla (Mi12) var den enda lokal som uppnådde ”mycket högt artantal” (>45 taxa). Högt artantal (35-45 taxa) uppnåddes däremot på nio lokaler. Måttligt artantal (25-34) uppnåddes också på nio lokaler. Endast en lokal uppnådde ett lågt artantal (15-24), Skinsagylet vid Värhult (Or11).

Tätheten av djur varierade mellan 360 individer/m² i Lillån vid Alnaryd (Na30) och 5700 individer/m² i Mieån vid Grimsmåla (Mi12). Tätheten av djur var måttlig på de flesta lokalerna.

Den artrikaste djurgruppen var nattsländor med 34 noterade taxa (se tabell 3). Därefter följde dagsländor, tvåvingar, bäcksländor och skalbaggar. Det totala antalet taxa som noterades i årets prover var 114.

Tabell 3. Antalet bestämda taxa inom respektive djurgrupp i 2008 års bottenfaunundersökning (20 lokaler).

Grupp		Antal taxa	Grupp		Antal taxa
Trichoptera	Nattsländor	34	Turbellaria	Virvelmaskar	3
Ephemeroptera	Dagsländor	14	Bivalvia	Musslor	2
Diptera	Tvåvingar	12	Oligochaeta	Glatmaskar	2
Plecoptera	Bäcksländor	12	Hydrozoa	Polypdjur	1
Coleoptera	Skalbaggar	11	Nematoda	Rundmaskar	1
Odonata	Trollsländor	6	Acarida	Vattenkvalster	1
Gastropoda	Snäckor	5	Araneae	Spindlar	1
Hirudinea	Iglar	4	Megaloptera	Sävsländor	1
Crustacea	Kräftdjur	4	Totalt antal taxa		114

Tabell 4. Resultatet av 2008 års bottenfaunaundersökning i Blekinge (20 lokaler). För beskrivning av index, se bilaga 2.

Nr	Vattendrag	Antal taxa	Individ-antal/m ²	Diversitet Shannon	ASPT-index	EPT-index	BpHI	Försurnings-index	Danskt faunaindex	Naturvärdes-index
Ly23	Lillån	41	3883	3,07	6,08	20	10	9 obetydlig	6 svag	1 allmänt
Si08	Silletorpsån	34	2101	2,87	5,83	19	8	10 obetydlig	7 obetydlig	3 allmänt
Na26	Långasjöbäcken	30	620	3,53	6,11	13	8	5 betydlig	7 obetydlig	0 allmänt
Na30	Lillån	31	555	2,48	6,30	15	8	4 st -mkt stark	7 obetydlig	0 allmänt
Li08	Listerbyån	33	1851	3,11	6,16	18	8	4 betydlig	6 svag	0 allmänt
Ro01	Lillån till Hjorthålan	36	574	3,67	6,29	19	8	7 obetydlig	6 svag	3 allmänt
Vi20BF	Vierysån	38	1139	3,70	5,65	21	10	10 obetydlig	6 svag	0 allmänt
Br06	Bräkneån	36	898	3,65	6,12	23	10	8 obetydlig	7 obetydlig	0 allmänt
Br13	Lillån (Öljehtsb)	39	827	3,56	6,45	25	10	8 obetydlig	7 obetydlig	3 allmänt
Ah16	Ned Agnsjöns utl	30	2314	2,49	5,76	16	8	6 måttlig	6 svag	0 allmänt
Ah21	Bäck fr Älmtasjön	41	1763	3,64	5,69	19	10	9 obetydlig	5 måttlig	1 allmänt
Mi12	Mieån	54	5666	4,01	6,88	35	10	10 obetydlig	7 obetydlig	20 mycket högt
Mo02	Bjällerbäcken	36	1825	2,67	6,20	19	8	9 obetydlig	6 svag	3 allmänt
Mo11	Hejasjöbäcken	38	1246	4,05	6,04	20	8	7 obetydlig	6 svag	4 allmänt
Or11BF	Bäck fr. Skinsagylet	21	951	2,73	5,31	9	0	2 st – mkt stark	4 obetydlig	0 allmänt
Or30	Ö. Orlundsån	30	1232	3,17	6,06	15	8	8 obetydlig	6 svag	6 högt
Sk19	Örsjöån	30	1077	2,24	5,76	16	8	8 obetydlig	6 svag	3 allmänt
Sk22	Byemålaån	35	1437	3,52	6,00	19	8	7 obetydlig	6 svag	0 allmänt
Sk33	Vilshultsån	33	1987	3,31	6,67	20	8	7 obetydlig	7 obetydlig	0 allmänt
Sk34	Ulvsbäck	30	632	3,59	6,00	17	8	6 måttlig	6 svag	0 allmänt

3.2 Försurningspåverkan

I Lyckebyåns avrinningsområdet i **Lillån** (Ly23) var försurningspåverkan obetydlig. I **Silletorpsån** (Si08) var bedömningen densamma.

I Nättrabyåns avrinningsområde undersöktes lokalerna **Långasjöbäcken** (Na26) samt **Lillån vid Alnaryd** (Na30). Långasjöbäcken (Na26) bedömdes vara betydligt påverkad av försurning och lokalen i Alnaryd (Na30) bedömdes vara starkt påverkad av försurning.

I **Listerbyån** (Li08) var påverkansgraden betydlig. I **Lillån** (Ro01) i Ronnebyåns avrinningsområde var försurningspåverkan obetydlig. Även i **Vierysån** (Vi20BF) var lokalen obetydligt försurningspåverkad.

I Bräkneåns övre del bedömdes de båda lokalerna **Hallarna** (Br06) och **Lillån, N.Bälganet** (Br13), vara obetydligt försurningspåverkade.

I Årdsåns avrinningsområde vid **Nedre Agnsjöns utlopp** (Ah16) vid Höghult var bottenfaunan måttligt påverkad av försurning. I Bräkenån/Mieåns avrinningsområde, **bäck från Älmtasjön** (Ah21) bedömdes försurningspåverkan vara obetydlig.

Försurningspåverkan i **Mieåns** mellersta delar vid Grimsmåla (Mi12) var obetydlig.

I Mörrumsåns avrinningsområde var lokalerna **Bjällerbäcken** (Mo02) och **Hejasjöbäcken** (Mo11) obetydligt påverkade av försurning. Även den nya lokalen i **Östra Orlundsån** (Or30BF) var obetydligt försurningspåverkad. Däremot i Orlundsåns västra gren i **bäck från Skinsagylet** (Or11BF) var försurningspåverkan stark. Denna lokal är okalkad och fungerar som referenslokal.

I Skräbeåns avrinningsområde har fyra lokaler provtagits. Tre av lokalerna visade på obetydlig försurningpåverkan. **Ulvsbäck vid Norra Holje** (Sk34), som ligger längst ned i vattensystemet, visade på måttlig försurningspåverkan.

3.3 Organisk/eutrofierande föroreningspåverkan

Av de 20 undersökta lokalerna kunde flertalet betraktas som obetydligt eller svagt påverkade av organiska/eutrofierande föroreningar. Skillnaden mellan dessa kategorier är liten och egentligen ovidkommande i sammanhanget, eftersom enstaka individer kan påverka resultatet.

Bland de allmänt förekommande arterna som indikerar rent vatten kan nämnas dagsländan *Heptagenia sulphurea* och bland nattsländorna fanns bl a släktet *Rhyacophila*. Flera olika renvattenindikerande bäcksländor noterades såsom *Leuctra hippopus*, *Nemoura avicularis* och *Isoperla difformis*. Dessa arter noterades på flertalet lokaler och ibland i stort antal. Även bäckvattenbaggar *Elmis aenea* och *Limnius volckmari* indikerar renvattenförhållanden.

I de fall vattendraget är försurat kan känsliga sländarter slås ut och det kan vara svårt att särskilja denna påverkan från organisk påverkan. I år gällde detta framförallt bäcken från Skinsagylet (Or11BF), som var starkt-mycket starkt försurningspåverkad och det var svårt att bedöma den eventuella organiska föroreningspåverkan. Lokalen uppvisade dåliga naturliga förutsättningar med lågt flöde och organisk pålagring. Inga känsligare arter hittades i proverna och den enda förekommande indikatorgruppen var musslor. Föroreningsindex har troligen påverkats negativt av försurningspåverkan och nådde endast upp i 4 poäng, men föroreningspåverkan var troligen obetydlig. Måttlig föroreningspåverkan noterades endast på en lokal, bäck från Älmtasjön (Ah21). Här noterades en viss organisk påverkan från den uppströms belägna sjön.

3.4 Naturvärden

Allmänt

Resultatet i årets undersökning visade att:

- **mycket höga naturvärden** konstaterades på en lokal
- **höga naturvärden** konstaterades på en lokal
- **allmänna naturvärden** konstaterades på övriga 18 lokaler

Mieån vid Grimsmåla (Mi12) var den lokal som hade högst indexvärde med 20 indexpoäng och var således den enda med **mycket högt naturvärde** (>16). Här noterades ett högt antal arter kombinerat med fynd av ovanliga arter. **Högt naturvärde** noterades i Ö.Orlundsån vid mynningen (Or30), här noterades två ovanliga arter medan artantalet var måttligt. Båda lokalerna betraktades som obetydligt påverkade av försurning.

Rödlistade och ovanliga arter


I årets undersökning påträffades inga rödlistade arter (enligt Artdatabankens rödlista från 2005). I fjor noterades nattsländan *Wormaldia occipitalis*, som är klassad som sårbar (VU) i Listerbyån uppströms Hallasjön (Li08). Tyvärr noterades arten inte vid årets undersökning.

På åtta av de undersökta lokalerna noterades fem **ovanliga arter** (tabell 5). Den ovanliga bäckvattenbaggen *Normandia nitens* noterades i Mieån vid Grimsmåla (Mi12), där också

bäckbromsen *Ibisia marginata* och nattsländan *Triaenodes sp.* noterades. *Triaenodes sp.* noterades även i Lillån till Hjorthålan vid Hyltan (Ro01). Nattsländan *Hydropsyche saxonica* noterades på sex olika lokaler. Mer ovanlig var nattsländan *Tinodes pallidulus* som bara hittades i Ö. Orlundsån vid mynningen (Or30). *Tinodes pallidulus* är tidigare mest funnen i Skåne. I Ekologgruppens bottenfaunabas med 1506 lokaler finns inga tidigare fynd från Blekinge, förutom från Sissebäck vid länsgränsen. Samtliga lokaler på vilka det noterades någon ovanlig art bedömdes också vara obetydligt påverkade av försurning.

Tabell 5. Antalet påträffade individer av ovanliga arter i bottenfaunaundersökningen i Blekinge län 2008. Bedömningen av ovanliga arter förklaras i bilaga 2.

Arter	Si08	Ro01	Br13	Mi12	Mo02	Mo11	Or30	Sk19	Summa antal
Skalbaggar									
<i>Normandia nitens</i>				6					6
Nattsländor									
<i>Tinodes pallidulus</i>							2		2
<i>Hydropsyche saxonica</i>	1		3		1	13	94	1	113
<i>Triaenodes sp.</i>		1		1					2
Tvåvingar									
<i>Ibisia marginata</i>				9					9




Figur2. *Normandia nitens*.
Teckning: Jan Pröjts

3.5 Jämförelse med tidigare undersökningar

Allmänt

Jämfört med tidigare besök har årets artantal varit högre än vid närmast föregående undersökning på 12 av 17 återbesökta lokaler. Artantalet för ett urval av lokaler som återbesökts vid ett flertal tillfällen illustreras nedan (figur 2). Artantalet ökar och minskar mellan åren men inga specifika trender kunde noteras utan de variationer som är kan tillskrivas naturliga fluktuationer. Referenslokalen i bäcken vid Skinsagylet (Or11) hade fortsatt lågt artantal men någon art har dock tillkommit varje år.



Figur 2. Antal taxa på vissa återbesökta lokaler 2008 i förhållanden till tidigare resultat.

Försurning

14 av lokalerna bedömdes vara obetydligt försurningspåverkade, nio av dessa bedömdes vara obetydligt påverkade även vid föregående provtagningstillfälle:

- Ly23, Lillån, Åstugan
- Si08, Silletorpsån, Kvarnagården
- Vi20BF, Vierydsån, ned Kroks kvarn
- Br06, Bräkneån, Hallarna
- Br13, Lillån N. Bälgenet
- Ah21, Bäck fr Älmtasjön, Björnamåla
- Mi12, Mieån, Grismåla
- Mo11, Hejasjöbäcken, Härnäs
- Sk33, Vilshultsån, Flyborgstorpet

Lokaler med en **förbättrad** bedömning var:

- Ro01, Lillån till Hjorthålan, lokalen har undersökts tre gånger tidigare och har bedömts vara betydligt försurningspåverkad vid varje provtagning. I undersökningen 2008 fanns antydningar till förbättringar. De riktigt försurningskänsliga sländarterna saknades fortfarande men en relativt känslig nattslända noterades. Lokalen bedömdes med viss tvekan vara obetydligt försurningspåverkad, på gränsen till måttlig påverkan.
- Mo02, Bjällerbäcken, bedömdes i år vara obetydligt påverkad av försurning. Lokalen har pendlat mellan obetydlig och betydlig påverkan mellan undersökningarna.



Figur 3. Lillån till Hjorthålan (Ro01) har uppvisat betydlig försurningspåverkan vid provtagningarna 1999, 2001 och 2006. Vid årets provtagning kunde ett bättre resultat skönjas och lokalen bedömdes med viss tvekan vara obetydligt försurningspåverkad. Foto: Jan Pröjts.

Lokaler med en **försämrad** bedömning var:

- Na26, Långasjöbäcken, där bedömningen ändrats från obetydlig 2005 till betydlig påverkan 2008. Vid de tidigare undersökningarna 2001, 2002 och 2004 uppvisade lokalen också sämre förhållanden med bedömningarna betydlig respektive måttlig påverkan. Resultaten visar på instabila förhållanden.
- Na30, Lillån, Alnaryd, där bedömningen ändrats från obetydlig 2001 till stark-mycket stark påverkan 2008. Vid varje undersökningstillfälle har lokalen fått lägre och lägre försurningsindex (9-6-5-4) bland annat på grund av att försurningskänsliga sländarter inte återfunnits. Iglar har inte noterats sedan 1998, snäckor noterades 1998, 1999 och 2001 men inte 2008. Även artantalet var lägre 2008 än jämfört med tidigare undersökningar.
- Li08, Listerbyån, där bedömningen ändrats från obetydlig 2007 till betydlig påverkan 2008. 1999 och 2001 bedömdes lokalen vara obetydligt påverkad av försurning. Försurningssituationen försämrades till betydlig påverkan 2002, förbättrades något till måttlig påverkan 2004 och ytterligare en förbättring till obetydlig påverkan 2005 och 2007. 2008 saknades snäckor och försurningskänsliga sländarter. Tyvärr noterades inte de känsliga nattsländorna *Hydropsyche saxonica* och *Wormaldia occipitalis* som noterats tidigare på lokalen. Försurningssituationen verkar inte vara stabil.
- Sk34, Ulvsbäck, där bedömningen ändrats från obetydlig 2005 till måttlig påverkan 2008. Vid undersökningen 2001 uppvisade lokalen ett sämre resultat och bedömdes vara betydligt försurningspåverkad. Resultaten visar på instabila förhållanden.

Tabell 6. Sammanfattning av förändringar av försurningsbedömningen på årets 20 lokaler mellan 1997-2008. Längst till höger ges en trendbedömning av försurningsläget med avseende på bottenfaunan. Alla lokaler 1997-2002 samt 2005 är besökta av Medins biolog. 2006 av Calluna, 2004, 2007 samt 2008 av Ekologgruppen. Notera att vissa år saknas i tabellen.

Nr	Lokalnamn	1997	1998	1999	2001	2002	2004	2005	2006	2007	2008	Trend
Ly23	Lillån				obetydlig						obetydlig	OK
Si08	Silletorpsån				obetydlig	obetydlig	obetydlig				obetydlig	OK
Na26	Långasjöbäcken				betydlig	betydlig	måttlig	obetydlig			betydlig	Ej OK
Na30	Lillån, Alnaryd	obetydlig	obetydlig	obetydlig	obetydlig						m stark	Sämre
Li08	Listerbyån			obetydlig	obetydlig	betydlig	måttlig	obetydlig		obetydlig	betydlig	Ej OK
Ro01	Lillån till Hjorthålan			betydlig	betydlig				betydlig		obetydlig	Bättre
Vi20BF	Vierysån									obetydlig	obetydlig	OK
Br06	Bräkneån				obetydlig	obetydlig	obetydlig				obetydlig	OK
Br13	Lillån (Öljehultsbäcken)			obetydlig	obetydlig						obetydlig	OK
Ah16	Nedre Agnsjöns utlopp			obetydlig	betydlig	betydlig	obetydlig			måttlig	måttlig	Ej OK
Ah21	Bäck från Älmtasjön			betydlig	obetydlig						obetydlig	OK
Mi12	Mieån	obetydlig	obetydlig	obetydlig	obetydlig	obetydlig		obetydlig		obetydlig	obetydlig	OK
Mo02	Bjällerbäcken			betydlig	betydlig	betydlig		obetydlig	betydlig		obetydlig	Bättre
Mo11	Hejasjöbäcken	obetydlig	obetydlig	obetydlig	obetydlig		obetydlig				obetydlig	OK
Or11BF	Bäck fr. Skinsagylet	betydlig		m stark	m stark			betydlig		m stark	m stark	Dålig
Or30	Ö. Orlundsån										obetydlig	OK
Sk19	Örsjöån										obetydlig	OK
Sk22	Byemålaån										obetydlig	OK
Sk33	Vilshultsån				obetydlig					obetydlig	obetydlig	OK
Sk34	Ulvsbäck				betydlig			obetydlig			måttlig	Ej OK

4. Provpunktvis redovisning

I detta kapitel redovisas varje provpunkt på ett uppslag. På vänstersidan finns lokalbeskrivning med foto och skiss, bedömning av undersökningsresultatet med kommentarer samt jämförelser med tidigare resultat. På högersidan finns de kompletta artlistorna. Lokalbeskrivningen följer SLU:s "Handbok för miljöövervakning, sjöar och vattendrag-bottenfauna tidsserier" (96-06-24).

Underlag till bedömningar av indexvärden och påverkansgrad ges i metodikkapitlet. Under rubriken "Jämförelser med tidigare undersökningar" har endast datum för undersökningarna uppgivits. Följande undersökningar avses:

1998: Medins Sjö- och Åbiologi AB. Bottenfauna i Blekinge län 1998. Länsstyrelsen i Blekinge län. 1999.

1999: Medins Sjö- och Åbiologi AB. Bottenfauna i Blekinge län 1999. Länsstyrelsen i Blekinge län. 1999.

2001: Medins Sjö- och Åbiologi AB. Bottenfauna i Blekinge län 2001. Länsstyrelsen i Blekinge län. 2002.

2002: Medins Sjö- och Åbiologi AB. Bottenfauna i Blekinge län 2002. Länsstyrelsen i Blekinge län. 2003.

2004: Ekologgruppen i Landskrona AB. Bottenfauna i Blekinge län 2004. Länsstyrelsen i Blekinge län. 2005.

2005: Medins Biologi AB. Bottenfauna i Blekinge län 2005. Länsstyrelsen i Blekinge län. 2006.

2006: Calluna AB. Bottenfauna i Blekinge län 2006. Länsstyrelsen i Blekinge län. 2007.

2007: Ekologgruppen i Landskrona AB. Bottenfauna i Blekinge län 2007. Länsstyrelsen i Blekinge län.2008.

Förklaring till artlistorna

I artlistan redovisas totala antalet individer av förekommande taxa samt den procentuella andelen av provets totala individantal. Sparkproverna kompletterades med ett kvalitativt sökprov riktat mot miljöer som ej ingått i sparkproverna. Tillkommande taxa som noterats i de kvalitativa sökproverna har markerats med ett **kryss** i artlistan. Provtagningens kvalitet har kontrollerats efter förändring av antal taxa med fler delprov, om förändringen då sista delprovet räknas in är < 8 % bedöms kvaliteten vara mycket god (anges i tabellen som värde >92), 30 – 8 % god (värde 70 – 92) och under 30 % svag (värde under 70). Varje taxas känslighetsgrad/funktion anges i kolumnerna A-D, vilket förklaras i tabellen nedan.

Försurningskänslighet	Taxats funktion	Känslighet för organisk-eutrofierande belastning	Taxats hotkategori
Kolumn A	Kolumn B	Kolumn C	Kolumn D
1=taxat tål pH <4,5	1=filtrerare	1=påträffats i höggradig förorenat vatten	Akut hotad (CR)
2=taxat tål pH 4,5-4,9	2=detritusätare	2=påträffats i vattendrag som bedömts kraftigt påverkade av jordbruk	Starkt hotad (EN)
3=taxat tål pH 5,0-5,4	3=predator	3=påträffats i vattendrag som bedömts måttligt påverkade av jordbruk	Sårbar (VU)
4=taxat tål pH 5,5-5,9	4=skrapare	4=typiskt för vattendrag som på sin höjd är belastade av skogsbruk	Missgynnad (NT)
5=taxat tål inte pH <6,0	5=sönderdelare	5=påträffats mest i vattendrag med mycket låg ledningsförmåga	Kunskapsbrist (DD)
			5=ovanlig art i ett regionalt perspektiv

Klassningen enligt kolumnerna A och C har huvudsakligen hämtats ur SNV Rapport 4345 av Degerman m fl. 1994 "Bottenfauna och fisk i sjöar och vattendrag". Klassningen enligt kolumn B har hämtats ur fack- och bestämmingslitteratur för respektive art/grupp. Klassningen enligt D grundar sig på "Rödlistade arter i Sverige 2005". Som underlag vid bedömningen av "ovanliga" arter har använts Degerman, E. (1994), där resultatet från 5445 skilda lokaler redovisas (Limnodatas databas). För att en art skall klassas som ovanlig måste den förekomma vid mindre än 5 % av dessa lokaler. Även fynddata från Ekologgruppens databas med för närvarande 1506 lokaler från södra Sverige har vägts in vid bedömningen.

Vattensystem:
LYCKEBYÅN

Provdatum: 2008-11-05

Lokaltyp: Bäck

Vattendrag/namn:
Lillån, Åstugan

Koordinater x: 6237377 y: 1495805


Naturligt/grävt: naturligt

Provpunktsbeteckning:
BLE-Ly23

Kommun: Karlskrona

Läge: ca 100 m uppströms utflöde i damm





Provtagning: Jan Pröjts

Sortering: Maja Holmström

Artbestämning: Cecilia Holmström

Antal prov: 5

Separerade prover: Ja

Metod: Handbok för miljöövervakn. 1996

Tid/prov (s): 60

Provsträcka (m): 1

Lokalens längd (normalt 10 m): 10 m

Lokalens bredd (provyta, uppsk): 3 m

Vattendragsbredd (våtyta): 4 m

Lokalens medeldjup (provyta): 0,2 m

Lokalens maxdjup (provyta): 0,3 m

Vattenhastighet (0-3): 3

Vattennivå: medel

Grumlighet: klart

Färg: färgat

Vattentemperatur: 7 °C

Dom

Täck

Findetritus: D2 1

Grovdetritus: D1 2

Fin död ved: D3 1

Grov död ved: 0

Utfällningar: 0

Dom

Täck

Finsediment: 0

Sand: 0

Grus: D2 2

Fin sten: D1 3

Grov sten: D3 1

Fina block: 0

Grova block: 0

Häll: 0

Dom

Täck

Dom.art

Överv.veg: 0

Flytbladsveg: 0

Långskottsv: 0

Rosettväxter: 0

Mossor: 0

Makroalger: D1 1

Bottentyp: hård

Kvalprov substr.: 0

Övrigt utanför delprov:

Närmiljö 0-30m bredd, 50m sträcka

Strandzon 0-5m, 50m sträcka

Dom

Täck

Lövskog: 0

Barrskog: 0

Blandskog: D1 3

Kalhygge: 0

Våtmark: 0

Aker: 0

Dom

Täck

Gräs/äng: 0

Hed: 0

Hällmark: 0

Blockmark: 0

Artif mark: D2 2

0

Dom

Dom.art

Subdom.art

Träd: D1 al

Buskar: D2

Gräs/halvgräs: D3

Annan veg: 0

Övrigt: 0

Beskuggning (0-3): 2

Dom. markanvändning: skogsbygd

Tätortsmiljö: Nej

Lokal lämplig för provtagning: mycket bra

Provet representativt för den provtagna åsträckan: ja

Övriga iakttagelser i fält:

Påverkan A: styrka: 0

Påverkan B: styrka: 0

Påverkan C: styrka: 0

Bedömning av prov från 2008-11-05											
Allmänt			Försurningspåverkan: obetydlig			Föroreningspåverkan: svag			Naturvärde: allmänt		
Artantal:	høgt		Kriteriepoäng (max 14):	9p		Indikatorgrupper, renvatten:			Kriteriepoäng - totalt:	1p	
Individtäthet:	høg		Antal taxa:	2p		5 bäcksländesläkten			Övriga kriterier:		
Shannonindex:	høgt		Försurn.känslig sländart:	3p		2 dagsländefamiljer			Antal taxa: 1 poäng		
ASPT-index:	måttligt		Gammarus:	-		4 familjer husbyggare					
EPT-index:	måttligt		Bäckbaggar:	1p		Limnius volckmari, Ancylus fluviatilis					
Surhetsindex:	høgt		Iglar:	1p		Indikatorgrupper, smutsvatten:					
DFI-index:	høgt		Musslor:	1p		>100 Oligochaeta					
			Snäckor:	1p		Asellus aquaticus, Erpobdella,					
			B/P index:	-		Sphaerium, Psychodidae					
Dominerande taxa:											
Leuctra hippopus, 26%											
Simuliidae, 21%											
Chironomidae, 14%											

Kommentarer:

Artantalet var høgt, 41 taxa, liksom individantalet, 3880 individer. Hela 8 olika bäcksländearter noterades. Det var också bäcksländan Leuctra hippopus som var den mest talrika arten. Alla viktiga djurggrupper noterades. Några individer av den försurningskänsliga dagslåndan Baetis muticus noterades. Lokalen bedömdes vara obetydligt påverkad av försurning. Såväl renvatten som smutsvattentåliga arter noterades och lokalen bedömdes ha en svag föroreningspåverkan.


Inga rödlistade eller ovanliga arter noterades. Naturvärdet bedömdes vara allmänt.

Jämförelse med tidigare resultat

Datum	Artantal inkl kval	Individantal per m2	Shannon- index	ASPT- index	EPT- index	BpHI- max	Surhets- index	Försurnings- påverkan	DFI- index	Förorenings- påverkan	Naturvärde index värde
1999-11-09	44	2807	3,2	6,1	22	10	9		7		4
2001-11-01	39	843	4,1	5,9	20	10	8		7		4
2008-11-05	41	3883	3,1	6,1	20	10	9	obetydlig	6	svag	1 allmänt

ARTLISTA		Provpunkt		Ly23 Lillån, Åstugan								
Provt.datum 2008-11-05				Provtagningskvalitet							86	
				Delprov				(ant ind)		Summa		
Känslighetsgrad/funktion	A	B	C	D	1	2	3	4	5	ant ind		%
GLATTMASKAR												
<i>Oligochaeta</i> övriga	2				46	100	100	50	51	347		8,9
IGLAR												
<i>Hirudinea</i>	3											
<i>Glossiphonia complanata</i>	3	3	2					1		1		0,0
<i>Glossiphonia concolor</i>	3	3	2		3					3		0,1
<i>Glossiphoniidae</i>	3					2				2		0,1
<i>Erpobdella octoculata</i>	1	3	2		8	3		1	4	16		0,4
MUSSLOR												
<i>Bivalvia</i>												
<i>Pisidium</i> sp.	1	1	2		55	81	37	118	29	320		8,2
<i>Sphaerium</i> sp.	2	1	2						1	1		0,0
SNÄCKOR												
<i>Gastropoda</i>	3	4	2									
<i>Gyraulus albus</i>	3	4	2			1		3		4		0,1
<i>Ancylus fluviatilis</i>	3	4	3		9	11	8	62	6	96		2,5
<i>Acroloxus lacustris</i>	3	4	2				1			1		0,0
KRÄFTDJUR												
<i>Crustacea</i>												
<i>Asellus aquaticus</i>	1	5	2				1			1		0,0
DAGSLÄNDOR												
<i>Ephemeroptera</i>												
<i>Leptophlebia marginata</i>	1	4	2							X		
<i>Baetis digitatus</i>	3	4	3					1		1		0,0
<i>Baetis muticus</i>	4	4	3			2			2	4		0,1
<i>Baetis niger</i>	2	4	3		1	1	1	2	3	8		0,2
<i>Baetis rhodani</i>	2	4	2		2					2		0,1
BÄCKSLÄNDOR												
<i>Plecoptera</i>												
<i>Brachyptera risi</i>	2	4	4			1	2	2		5		0,1
<i>Amphinemura sulcicollis</i>	1	5	3		58	64	74	101	67	364		9,4
<i>Amphinemura borealis</i>	1	5	4				2		2	4		0,1
<i>Nemoura avicularis</i>	1	5	4		2	2	1			5		0,1
<i>Nemoura cinerea</i>	1	5	2		1	1	1		1	4		0,1
<i>Leuctra hippopus</i>	1	5	4		190	72	315	210	231	1018		26,2
<i>Isoperla difformis</i>	1	3	4		1					1		0,0
<i>Isoperla grammatica</i>	1	3	3				1	1	4	6		0,2
<i>Isoperla</i> sp.	1	3	3			1	1		2	4		0,1
TROLLSLÄNDOR												
<i>Odonata</i>												
<i>Onychogomphus forcipatus</i>	2	3	4						1	1		0,0
SKALBAGGAR												
<i>Coleoptera</i>												
<i>Orectochilus villosus</i>	3	3	2					1		1		0,0
<i>Limnius volckmari</i>	2	4	4		32	80	14	24	8	158		4,1
<i>Oulimnius tuberculatus</i>	3	4	3			1				1		0,0
<i>Oulimnius</i> sp.	3	4	3		3		3	2	2	10		0,3
NATSLÄNDOR												
<i>Trichoptera</i>												
<i>Plectrocnemia conspersa</i>	1	1	3		4		4	8	1	17		0,4
<i>Polycentropus flavomaculatus</i>	1	1	3		14	13	2	14	2	45		1,2
<i>Hydropsyche siltalai</i>	1	1	2		1				6	7		0,2
<i>Lepidostoma hirtum</i>	2	5	3			2				2		0,1
<i>Limnephilidae</i>	1	5	2				1			1		0,0
<i>Limnephilus</i> sp.	1	5	2			1				1		0,0
<i>Sericostoma personatum</i>	1	5	3			5				5		0,1
<i>Mystacides</i> sp.	2	5	3			1				1		0,0
TVÄVINGAR												
<i>Diptera</i>												
<i>Tipula</i> sp.						1	4			5		0,1
<i>Limoniidae</i>	3	3	3		1					1		0,0
<i>Eloeophila</i> sp.	3									X		
<i>Pericomini</i>	3	3	1				2		1	3		0,1
<i>Simuliidae</i>	1	1	2		66	133	109	251	275	834		21,5
<i>Chironomidae</i>	1	2	1		78	130	129	107	100	544		14,0
<i>Ceratopogonidae</i>	1	3	1			25	2			27		0,7
<i>Empididae</i>	2	3	3						1	1		0,0
ANTAL TAXA (exkl sökprov)												
										40		
ANTAL TAXA (inkl sökprov)												
										41		
INDIVIDANTAL					575	734	815	959	800	3883		100
Individantal/m ²					3883							

Vattensystem: SILLETORPSÅN Provdatum: 2008-11-05 Lokaltyp: Bäck	Vattendrag/namn: Silletorpsån, Kvarnagården Koordinater x: 6247940 y: 1486240 Naturligt/grävt: naturligt Läge: Kvarnagården - 10-20 m uppströms järnvägsbro	Provpunktsbeteckning: BLE-Si08 Kommun: Karlskrona
--	---	---



Lokal lämplig för provtagning: bra - något blockig, mycket mossor
Provet representativt för den provtagna åsträckan: ja
Övriga iakttagelser i fält:

Lokalbeskrivning efter Handledning för miljöövervakning (Naturvårdsverket 2003)

Provtagning: Jan Pröjts	Antal prov: 5	Tid/prov (s): 60
Sortering: Maja Holmström	Separerade prover: Ja	Provsträcka (m): 1
Artbestämning: Cecilia Holmström	Metod: Handbok för miljöövervakn. 1996	

Lokalens längd (normalt 10 m):	10 m	Vattenhastighet (0-3):	3
Lokalens bredd (provyta, uppsk):	2 m	Vattennivå:	hög
Vattendragsbredd (våtyta):	3 m	Grumlighet:	klart
Lokalens medeldjup (provyta):	0,3 m	Färg:	färgat
Lokalens maxdjup (provyta):	0,5 m	Vattentemperatur:	7 °C

Bottensubstrat och vegetation på provytan

	Dom	Täck		Dom	Täck		Dom	Täck	Dom.art
Findetritus:		0	Finsediment:		0	Överv.veg:		0	
Grovdetritus:	D1	2	Sand:		0	Flytbladsveg:		0	
Fin död ved:	D2	2	Grus:		0	Långskottsveg:		0	
Grov död ved:	D3	1	Fin sten:	D3	1	Rosettväxter:		0	
Utfällningar:		0	Grov sten:	D2	2	Mossor:	D1	3	fontinalis
			Fina block:	D1	2	Makroalger:		0	
			Grova block:		1				
			Häll:		0				

Bottentyp: hård
Kvalprov substr.: kantblock, mossor
Övrigt utanför delprov:

Närmiljö 0-30m bredd, 50m sträcka						Strandzon 0-5m, 50m sträcka		
	Dom	Täck		Dom	Täck	Dom	Dom.art	Subdom.art
Lövskog:	D3	2	Gräs/äng:	D1	2	Träd:	D2	ask
Barrskog:		0	Hed:		0	Buskar:	D3	
Blandskog:		0	Hällmark:		0	Gräs/halvgräs:	D1	
Kalhygge:		0	Blockmark:		0	Annan veg:		
Våtmark:		0	Artif mark:	D2	2	Övrigt:		
Aker:		0			0			

Beskuggning (0-3): 0
Dom. markanvändning: mellanbygd
Tätortsmiljö: Nej

Bedömning av prov från 2008-11-05

Underlag för bedömningar redovisas under respektive kolumn (se förklaringar under Metodik)

Allmänt		Försurningspåverkan: obetydlig		Föroreningspåverkan: obetydlig		Naturvärde: allmänt	
Artantal:	måttligt	Kriteriepoäng (max 14):	10p	Indikatorgrupper, renvatten:		Kriteriepoäng - totalt:	3p
Individtäthet:	hög	Antal taxa:	1p	Virvelmaskar		Ovanliga arter:	
Shannonindex:	måttligt	Försurn.känslig sländart:	3p	3 bäcksländesläkten		Hydropsyche saxonica, 3p	
ASPT-index:	måttligt	Gammarus:	-	3 dagslände familjer			
EPT-index:	måttligt	Bäckbaggar:	1p	4 familjer husbyggare			
Surhetsindex:	högt	Iglar:	1p	Elodes, Rhyacophila, Ancylus fluviatilis			
DFI-index:	mycket högt	Musslor:	1p	Indikatorgrupper, smutsvatten:			
Dominerande taxa:		Snäckor:	1p	>100 Oligochaeta			
Simuliidae, 35%		B/P index:	2p	Asellus aquaticus, Erpobdella, Sphaerium			
Chironomidae, 25%							
Baetis rhodani, 12%							

Kommentarer:



Artantalet var måttligt, 34 taxa. Alla viktiga djurgrupper noterades. Många nattsländearter noterades, hela 12 arter. Den försurningskänsliga dagsländan Caenis luctuosa noterades vid undersökningen 2004 med en individ, i år noterades ingen individ. Frågan är om det finns en liten population av arten eller det var en tillfällighet att arten kunde noteras vid detta tillfälle. Däremot noterades en försurningskänslig nattslända Hydropsyche saxonica som inte hittats på lokalen tidigare. Lokalen bedömdes vara obetydligt påverkad av försurning. Några renvattenkrävande arter noterades och lokalen bedömdes vara obetydligt påverkad av organisk/eutrofierande förorening. En ovanlig nattslända noterades; Hydropsyche saxonica. Naturvärdet bedömdes vara allmänt.

Jämförelse med tidigare resultat

Datum	Artantal inkl kval	Individantal per m2	Shannon- index	ASPT- index	EPT- index	BpHI- max	Surhets- index	Försurnings- påverkan	DFI- index	Förorenings- påverkan	Naturvärde index värde
2001-11-01	31	1489	3,2	5,6	15	8	8		6		3
2002-11-21	40	574	4,1	5,3	15	8	6	obetydlig	7	obetydlig	4 allmänt
2004-10-07	33	1919	3,1	5,6	14	10	10	obetydlig	6	svag	0 allmänt
2008-11-05	34	2101	2,9	5,8	19	8	10	obetydlig	7	obetydlig	3 allmänt

ARTLISTA		Provpunkt		Si08 Silletorpsån, Kvarnagården							
Prov.t.datum 2008-11-05				Provtagningskvalitet							90
				Delprov		(ant ind)			Summa		
Känslighetsgrad/funktion	A	B	C	D	1	2	3	4	5	ant ind	%
VIRVELMASKAR obest											
<i>Turbellaria</i>											
Dendrocoelum lacteum	3	3	2		1					1	0,0
GLATTMASKAR											
<i>Oligochaeta övriga</i>	2				25	25	51	50	25	176	8,4
Eiseniella tetraedra	2	2	3		1	1				2	0,1
IGLAR											
<i>Hirudinea</i>	3										
Erpobdella octoculata	1	3	2		13	1	2	1		17	0,8
MUSSLOR											
<i>Bivalvia</i>											
Pisidium sp.	1	1	2		10	2	17	25	13	67	3,2
Sphaerium sp.	2	1	2				1			1	0,0
SNÄCKOR											
<i>Gastropoda</i>	3	4	2								
Gyraulus albus	3	4	2				1			1	0,0
Ancylus fluviatilis	3	4	3		3	1	2			6	0,3
KRÄFTDJUR											
<i>Crustacea</i>											
Asellus aquaticus	1	5	2		2	2	2		1	7	0,3
DAGSLÄNDOR											
<i>Ephemeroptera</i>											
Heptagenia fuscogrisea	1	4	3			2	1		1	4	0,2
Leptophlebia marginata	1	4	2			2	1			3	0,1
Leptophlebia sp.	1	4	3					1		1	0,0
Baetis niger	2	4	3		5	4	4	2	1	16	0,8
Baetis rhodani	2	4	2		59	45	37	69	41	251	11,9
BÄCKSLÄNDOR											
<i>Plecoptera</i>											
Nemoura cinerea	1	5	2		21	33	13	14	10	91	4,3
Leuctra hippopus	1	5	4		4	6	6	7	3	26	1,2
Isoperla difformis	1	3	4			1				1	0,0
SKALBAGGAR											
<i>Coleoptera</i>											
Hydraena riparia	5					2				2	0,1
Elodes sp.	2	4	2		1					1	0,0
Oulimnius sp.	3	4	3		1					1	0,0
NATTSLÄNDOR											
<i>Trichoptera</i>											
Rhyacophila nubila	1	3	4			5	1	4	1	11	0,5
Rhyacophila sp.	1	3	3		1					1	0,0
Polycentropodidae	1	1	2						1	1	0,0
Plectrocnemia conspersa	1	1	3			1	1			2	0,1
Polycentropus flavomaculatus	1	1	3		2	1	3	5	1	12	0,6
Polycentropus sp.	1	1	3			1				1	0,0
Hydropsyche angustipennis	2	1	3			1				1	0,0
Hydropsyche pellucidula	1	1	3				1			1	0,0
Hydropsyche saxonica	4	1	3	5			1			1	0,0
Hydropsyche siltalai	1	1	2		3	16	45	25	3	92	4,4
Hydroptilidae							1			1	0,0
Limnephilidae	1	5	2		1	2	4	5	1	13	0,6
Glyptotaelius pellucidus	1	5	3					1		1	0,0
Limnephilus sp. (annan)						1	1			2	0,1
Sericostoma personatum	1	5	3				4	1	1	6	0,3
Molannodes tinctus	3	5	4					1		1	0,0
TVÄVINGAR											
<i>Diptera</i>											
Simuliidae	1	1	2		55	114	257	254	51	731	34,8
Chironomidae	1	2	1		59	54	152	203	53	521	24,8
Ceratopogonidae	1	3	1				2	25		27	1,3
ANTAL TAXA (exkl sökprov)										34	
ANTAL TAXA (inkl sökprov)										34	
INDIVIDANTAL					267	323	611	693	207	2101	100
Individantal/m ²										2101	

Vattensystem: NÄTTRABYÅN	Vattendrag/namn: Långasjöbäcken, Berga	Provpunktsbeteckning: BLE-Na26
Provdatum: 2008-11-05	Koordinater x: 6247200 y: 1476100	Kommun: Karlskrona
Lokaltyp: Bäck Naturligt/grävt: naturligt Läge: Berga - 10-20 m nedströms bro		



Lokalbeskrivning efter Handledning för miljöövervakning (Naturvårdsverket 2003)

Provtagning: Jan Pröjts
Sortering: Maja Holmström
Artbestämning: Cecilia Holmström

Antal prov: 5
Separerade prover: Ja
Metod: Handbok för miljöövervakn. 1996

Tid/prov (s): 60
Provsträcka (m): 1

Lokalens längd (normalt 10 m): 10 m
Lokalens bredd (provyta, uppsk): 2 m
Vattendragsbredd (våtyta): 3 m
Lokalens medeldjup (provyta): 0,2 m
Lokalens maxdjup (provyta): 0,2 m

Vattenhastighet (0-3): 3
Vattennivå: medel
Grumlighet: klart
Färg: färgat
Vattentemperatur: 7 °C

Bottensubstrat och vegetation på provytan

	Dom	Täck		Dom	Täck		Dom	Täck	Dom.art
Findetritus:	D3	1	Finsediment:		0	Överv.veg:		0	
Grovdetritus:	D1	3	Sand:		0	Flytbladsveg:		0	
Fin död ved:	D2	1	Grus:	D3	2	Långskottsveg:		0	
Grov död ved:		0	Fin sten:	D1	2	Rosettväxter:		0	
Utfällningar:		0	Grov sten:	D2	2	Mossor:		0	
			Fina block:		1	Makroalger:	D1	1	
			Grova block:		0				
			Häll:		0				

Bottentyp: hård
Kvalprov substr.: kantsten

Övrigt utanför delprov:

Närmiljö 0-30m bredd, 50m sträcka

	Dom	Täck		Dom	Täck
Lövskog:		0	Gräs/äng:		0
Barrskog:		0	Hed:		0
Blandskog:	D1	3	Hällmark:		0
Kalhygge:		0	Blockmark:		0
Våtmark:		0	Artif mark:	D2	1
Aker:		0			0

Strandzon 0-5m, 50m sträcka

	Dom	Dom.art	Subdom.art
Träd:	D1	al	bok
Buskar:	D2		
Gräs/halvgräs:	D3		
Annan veg:			
Övrigt:			

Beskuggning (0-3): 2 **Dom. markanvändning:** skogsbygd **Tätortsmiljö:** Nej

Lokal lämplig för provtagning: mycket bra
Provet representativt för den provtagna åsträckan: ja
Övriga iakttagelser i fält:

Påverkan A: styrka: 0
Påverkan B: styrka: 0
Påverkan C: styrka: 0

Bedömning av prov från 2008-11-05											
Underlag för bedömningar redovisas under respektive kolumn (se förklaringar under Metodik)											
Allmänt		Försurningspåverkan: betydlig		Föroreningspåverkan: obetydlig		Naturvärde: allmänt					
Artantal:	måttligt	Kriteriepoäng (max 14):	5p	Indikatorgrupper, renvatten:		Kriteriepoäng - totalt: 0p					
Individtäthet:	måttlig	Antal taxa:	1p	4 bäcksländesläkten							
Shannonindex:	högt	Försurn.känslig sländart:	1p	2 dagsländefamiljer							
ASPT-index:	måttligt	Gammarus:	-	2 familjer husbyggare							
EPT-index:	måttligt	Bäckbaggar:	1p	Rhyacophila, Elmia aenea, Limnius							
Surhetsindex:	måttligt	Iglar:	-	volckmari, Ancylus fluviatilis							
DFI-index:	mycket högt	Musslor:	1p	Indikatorgrupper, smutsvatten:							
Dominerande taxa:		Snäckor:	1p	Asellus aquaticus							
Leuctra hippopus, 30%		B/P index:	-								
Simuliidae, 12%											
Oligochaeta övriga, 11%											

Kommentarer:

Antalet taxa var måttligt på lokalen. Av viktigare grupper saknades bara iglar. Bäcksländor var allmänt förekommande i proverna, vilket brukar vara fallet i denna typ av miljö. Inga tydligt försurningskänsliga arter hittades. Lokalen bedöms i år som betydligt påverkad av försurning. Jämfört med tidigare har inga större förändringar skett i försurningssituationen. Detsamma gäller föroreningspåverkan samt naturvärdet.


Jämförelse med tidigare resultat

Datum	Artantal inkl kval	Individantal per m2	Shannon-index	ASPT-index	EPT-index	BpHI-max	Surhets-index	Försurnings-påverkan	DFI-index	Förorenings-påverkan	Naturvärde index värde
2001-11-01	31	1061	2,5	6,1	15	8	5		7		0
2002-11-21	31	369	3,5	5,8	12	8	5	betydlig	6	obetydlig	0 allmänt
2004-10-08	35	2411	3,5	5,9	17	8	5	måttlig	7	obetydlig	0 allmänt
2005-11-14	25	303	3,4	6,2	11	8	5		6		0
2008-11-05	30	620	3,5	6,1	13	8	5	betydlig	7	obetydlig	0 allmänt

ARTLISTA		Provpunkt		Na26 Långasjöbäcken, Berga										
Provt.datum 2008-11-05				Provtagningskvalitet								90		
2				Delprov					(ant ind)		Summa			
Känslighetsgrad/funktion		A	B	C	D	1	2	3	4	5	ant ind		%	
GLATTMASKAR														
<i>Oligochaeta</i> övriga		2				5	3	15	20	25	68		11,0	
<i>Eiseniella tetraedra</i>		2		2		3		1	1		2		0,3	
MUSSLOR														
<i>Bivalvia</i>														
<i>Pisidium</i> sp.		1		1		2	2		2	3	10		1,6	
SNÄCKOR														
<i>Gastropoda</i>		3		4		2								
<i>Ancylus fluviatilis</i>		3		4		3			1		1		0,2	
KRÄFTDJUR														
<i>Crustacea</i>														
<i>Asellus aquaticus</i>		1		5		2	3	1	2		6		1,0	
<i>Trichoniscus</i> sp?							1				1		0,2	
VATTENKVALSTER														
<i>Hydracarina</i>		1		3		2	2		1		3		0,5	
HOPPSTJÄRTAR														
<i>Collembola</i>		1		3		1	1			1	2		0,3	
DAGSLÄNDOR														
<i>Ephemeroptera</i>														
<i>Heptagenia sulphurea</i>		2		4		4		1		1	2		0,3	
<i>Baetis niger</i>		2		4		3	15	2	8	5	4		5,5	
<i>Baetis rhodani</i>		2		4		2	2		1		3		0,5	
BÄCKSLÄNDOR														
<i>Plecoptera</i>														
<i>Brachyptera risi</i>		2		4		4	6	3	8	2	7		26	4,2
<i>Nemoura avicularis</i>		1		5		4	1				1		0,2	
<i>Nemoura cinerea</i>		1		5		2			2	1	3		0,5	
<i>Leuctra hippopus</i>		1		5		4	41	27	40	63	17		188	30,3
<i>Isoperla difformis</i>		1		3		4	1	2	7	6	2		18	2,9
<i>Isoperla grammatica</i>		1		3		3	5	4	1	5	1		16	2,6
<i>Isoperla</i> sp.		1		3		3	10	7	3	7	3		30	4,8
TROLLSLÄNDOR														
<i>Odonata</i>														
<i>Cordulegaster boltoni</i>		1		3		4		1			1		0,2	
SKALBAGGAR														
<i>Coleoptera</i>														
<i>Orectochilus villosus</i>		3		3		2					X			
<i>Hydraena gracilis</i>		3		5		3	2		2	4	8		18	2,9
<i>Elmis aenea</i>		2		4		4			1		1		0,2	
<i>Limnius volckmari</i>		2		4		4	4	2	5	1	5		17	2,7
<i>Oulimnius</i> sp.		3		4		3		1	1		1		3	0,5
NATTSLÄNDOR														
<i>Trichoptera</i>														
<i>Rhyacophila nubila</i>		1		3		4		1			1		0,2	
<i>Plectrocnemia conspersa</i>		1		1		3	16	5	9	12	6		48	7,7
<i>Limnephilidae</i>		1		5		2			1		1		0,2	
<i>Micropterna sequax</i>		2		5		3					1		1	0,2
<i>Sericostoma personatum</i>		1		5		3		1			1		2	0,3
TVÄVINGAR														
<i>Diptera</i>														
<i>Dicranota</i> sp.		1		3		2			2		2		0,3	
<i>Simuliidae</i>		1		1		2	10	13	7	26	21		77	12,4
<i>Chironomidae</i>		1		2		1	10	5	6	13			34	5,5
ANTAL TAXA (exkl sökprov)													29	
ANTAL TAXA (inkl sökprov)													30	
INDIVIDANTAL							134	85	122	172	107		620	100
Individantal/m ²													620	

ARTLISTA		Provpunkt		Na30 Lillån, Alnaryd									
Provt.datum 2008-11-05				Provtagningskvalitet								97	
				Delprov (ant ind)					Summa				
Känslighetsgrad/funktion	A	B	C	D	1	2	3	4	5	ant ind	%		
GLATTMASKAR													
<i>Oligochaeta</i> övriga	2				1	1		2	1	5	0,9		
<i>Eiseniella tetraedra</i>	2	2	3				1		3	4	0,7		
MUSSLOR													
<i>Bivalvia</i>													
<i>Pisidium</i> sp.	1	1	2		2	2	1			5	0,9		
KRÄFTDJUR													
<i>Crustacea</i>													
<i>Pacifastacus leniusculus</i>	3									X			
VATTENKVALSTER													
<i>Hydracarina</i>	1	3	2				2			2	0,4		
DAGSLÄNDOR													
<i>Ephemeroptera</i>													
<i>Heptagenia sulphurea</i>	2	4	4		2	1	1	4	2	10	1,8		
<i>Leptophlebia</i> sp.	1	4	3				3			3	0,5		
<i>Baetis niger</i>	2	4	3		1		3	3	1	8	1,4		
BÄCKSLÄNDOR													
<i>Plecoptera</i>													
<i>Amphinemura sulciollis</i>	1	5	3							X			
<i>Amphinemura borealis</i>	1	5	4							X			
<i>Nemoura avicularis</i>	1	5	4		1	1	6	1	1	10	1,8		
<i>Nemoura cinerea</i>	1	5	2		3	1				4	0,7		
<i>Leuctra hippopus</i>	1	5	4		78	55	103	37	15	288	51,9		
<i>Isoperla difformis</i>	1	3	4						1	1	0,2		
TROLLSLÄNDOR													
<i>Odonata</i>													
Coenagrionidae	2	3	3		1					1	0,2		
<i>Onychogomphus forcipatus</i>	2	3	4					3		3	0,5		
SKALBAGGAR													
<i>Coleoptera</i>													
Hydrophilidae	2	3	3				1			1	0,2		
<i>Elmis aenea</i>	2	4	4		9	2	1	3	1	16	2,9		
<i>Limnius volckmari</i>	2	4	4		6	3	1	2	1	13	2,3		
<i>Oulimnius</i> sp.	3	4	3		1	1				2	0,4		
NATTSLÄNDOR													
<i>Trichoptera</i>													
<i>Lype phaeopa</i>	2	2	4					1		1	0,2		
<i>Polycentropus flavomaculatus</i>	1	1	3				1	1		2	0,4		
<i>Polycentropus irroratus</i>	1	1	3		2	1	6	3		12	2,2		
<i>Hydropsyche siltalai</i>	1	1	2					1	1	2	0,4		
Limnephilidae	1	5	2			1		1		2	0,4		
<i>Glyptotaelius pellucidus</i>	1	5	3				1			1	0,2		
<i>Mystacides</i> sp.	2	5	3				1			1	0,2		
TVÄVINGAR													
<i>Diptera</i>													
<i>Tipula</i> sp.						1				1	0,2		
Simuliidae	1	1	2		1	7	11	5	3	27	4,9		
Chironomidae	1	2	1		64	23	28	10	3	128	23,1		
Empididae	2	3	3						1	1	0,2		
<i>Limnophora</i> sp.	3	5	3					1		1	0,2		
ANTAL TAXA (exkl sökprov)										28			
ANTAL TAXA (inkl sökprov)										31			
INDIVIDANTAL													
Individantal/m ²										555	100		
										555			

Vattensystem: LISTERBYÅN	Vattendrag/namn: Listerbyån, Kvarngölen/Hallasjön	Provpunktsbeteckning: BLE-Li08
Provdatum: 2008-11-05	Koordinater x: 6246434 y: 1472204	Kommun: Karlskrona
Lokaltyp: Bäck	Naturligt/grävt: naturligt	Läge: uppströms Hallasjön - ca 200 m uppströms sjön



Provtagning: Jan Pröjts	Antal prov: 5	Tid/prov (s): 60
Sortering: Maja Holmström	Separerade prover: Ja	Provsträcka (m): 1
Artbestämning: Cecilia Holmström	Metod: Handbok för miljöövervakn. 1996	

Lokalens längd (normalt 10 m):	10 m	Vattenhastighet (0-3):	3
Lokalens bredd (provyta, uppsk):	2,5 m	Vattennivå:	medel
Vattendragsbredd (våtyta):	3 m	Grumlighet:	klart
Lokalens medeldjup (provyta):	0,3 m	Färg:	färgat
Lokalens maxdjup (provyta):	0,3 m	Vattentemperatur:	6 °C

Bottensubstrat och vegetation på provytan

	Dom	Täck		Dom	Täck		Dom	Täck	Dom.art
Findetritus:		1	Finsediment:		0	Överv.veg:		0	
Grovdetritus:	D1	2	Sand:		0	Flytbladsveg:		0	
Fin död ved:	D2	2	Grus:	D3	2	Långskottsveg:		0	
Grov död ved:	D3	1	Fin sten:	D1	2	Rosettväxter:		0	
Utfällningar:		0	Grov sten:	D2	2	Mossor:	D1	1	fontinalis
			Fina block:		1	Makroalger:		0	
			Grova block:		0				
			Häll:		0				

Bottentyp: hård**Kvalprov substr.:** kantblock**Övrigt utanför delprov:****Närmiljö 0-30m bredd, 50m sträcka****Strandzon 0-5m, 50m sträcka**

	Dom	Täck		Dom	Täck		Dom	Dom.art	Subdom.art
Lövskog:		0	Gräs/äng:		0	Träd:	D1	gran	al
Barrskog:	D1	3	Hed:		0	Buskar:	D2		
Blandskog:		0	Hällmark:		0	Gräs/halvgräs:	D3		
Kalhygge:		0	Blockmark:		0	Annan veg:			
Våtmark:		0	Artif mark:		0	Övrigt:			
Aker:		0			0				

Beskuggning (0-3): 2**Dom. markanvändning:** skogsbygd**Tätortsmiljö:** Nej**Lokal lämplig för provtagning:** mycket bra**Provet representativt för den provtagna åsträckan:** ja**Övriga iakttagelser i fält:****Påverkan A:** styrka: 0**Påverkan B:** styrka: 0**Påverkan C:** styrka: 0**Bedömning av prov från 2008-11-05**

Underlag för bedömningar redovisas under respektive kolumn (se förklaringar under Metodik)

Allmänt	Försurningspåverkan: betydlig	Föroreningspåverkan: svag	Naturvärde: allmänt
Artantal: måttligt Individtäthet: måttlig Shannonindex: högt ASPT-index: högt EPT-index: måttligt Surhetsindex: lågt DFI-index: högt Dominerande taxa: Chironomidae, 24% Amphinemura sulciollis, 23% Pisidium sp., 21%	Kriteriepoäng (max 14): 4p ----- Antal taxa: 1p Försurn.känslig sländart: 1p Gammarus: - Bäckbaggar: 1p Iglar: - Musslor: 1p Snäckor: - B/P index: -	Indikatorgrupper, renvatten: 4 bäcksländesläkten 3 dagslände familjer 2 familjer husbyggare Rhyacophila, Limnius volckmari Indikatorgrupper, smutsvatten: >100 Oligochaeta Asellus aquaticus	Kriteriepoäng - totalt: 0p

Kommentarer:

Artantalet var måttligt, i nivå med tidigare undersökningar. Snäckor och iglar saknades i provena. Försurningssituationen förbättrades från betydlig påverkan 2002, till måttlig påverkan 2004 och obetydlig påverkan 2005 och 2007. I årets undersökning saknades försurningskänsliga sländarter. Tyvärr noterades inte de känsliga nattsländorna Hydropsyche saxonica och Wormaldia occipitalis som noterats tidigare på lokalen. Försurningssituationen verkar inte vara stabil och lokalen bedömdes vara betydligt försurningspåverkad. Föroreningsgraden var svag, inte minst beroende på rik förekomst av bäcksländor. Inga rödlistade eller ovanliga arter noterades. Naturvärdet bedömdes vara allmänt.

Jämförelse med tidigare resultat

Datum	Artantal inkl kval	Individantal per m2	Shannon- index	ASPT- index	EPT- index	BpHI- max	Surhets- index	Försurnings- påverkan	DFI- index	Förorenings- påverkan	Naturvärde index värde
1999-11-09	37	2170	3,0	6,4	21	10	7		7		6
2001-10-28	36	2075	3,0	6,1	20	8	6		6		19
2002-11-21	21	663	2,5	5,5	7	8	3	betydlig	4	obetydlig	0 allmänt
2004-10-08	32	2203	3,4	5,9	16	8	6	måttlig	6	svag	6 högt
2005-11-14	38	2333	3,2	6,6	20	10	7	obetydlig	7	obetydlig	3 allmänt
2007-10-31	29	1587	3,6	6,2	16	8	6	obetydlig	6	svag	19 mycket högt
2008-11-05	33	1851	3,1	6,2	18	8	4	betydlig	6	svag	0 allmänt


ARTLISTA		Provpunkt		Li08 Listerbyån, Listerby								
Provt.datum 2008-11-05				Provtagningskvalitet								94
				Delprov				(ant ind)		Summa		
Känslighetsgrad/funktion	A	B	C	D	1	2	3	4	5	ant ind	%	
GLATTMASKAR												
<i>Oligochaeta</i> övriga		2			4	40	50	72	1	167	9,0	
<i>Eiseniella tetraedra</i>		2	2	3	2		2	2		6	0,3	
MUSSLOR												
<i>Bivalvia</i>												
<i>Pisidium</i> sp.	1	1	2		65	175	7	85	55	387	20,9	
KRÄFTDJUR												
<i>Crustacea</i>												
<i>Asellus aquaticus</i>	1	5	2		1		1	2		4	0,2	
DAGSLÄNDOR												
<i>Ephemeroptera</i>												
<i>Heptagenia sulphurea</i>	2	4	4		11	6	7	7	4	35	1,9	
<i>Leptophlebia marginata</i>	1	4	2		1					1	0,1	
<i>Baetis niger</i>	2	4	3		6		6	4	3	19	1,0	
<i>Baetis rhodani</i>	2	4	2		22	13	15	8	5	63	3,4	
BÄCKSLÄNDOR												
<i>Plecoptera</i>												
<i>Amphinemura sulcicollis</i>	1	5	3		164	82	69	107	3	425	23,0	
<i>Nemoura avicularis</i>	1	5	4		1		2	2	9	14	0,8	
<i>Nemoura cinerea</i>	1	5	2						1	1	0,1	
<i>Leuctra hippopus</i>	1	5	4		27	11	18	20	5	81	4,4	
<i>Isoperla difformis</i>	1	3	4		1		1			2	0,1	
<i>Isoperla grammatica</i>	1	3	3		1				1	2	0,1	
<i>Isoperla</i> sp.	1	3	3		5	1	1	1	2	10	0,5	
TROLLSLÄNDOR												
<i>Odonata</i>												
<i>Cordulegaster boltoni</i>	1	3	4		3			1	2	6	0,3	
SKALBAGGAR												
<i>Coleoptera</i>												
<i>Hydraena riparia</i>		5					1			1	0,1	
<i>Limnius volckmari</i>	2	4	4		1	2	1			4	0,2	
<i>Oulimnius</i> sp.	3	4	3		10	7	9	6	4	36	1,9	
NATTSLÄNDOR												
<i>Trichoptera</i>												
<i>Rhyacophila nubila</i>	1	3	4					2		2	0,1	
<i>Lype phaeopa</i>	2	2	4					1		1	0,1	
<i>Plectrocnemia conspersa</i>	1	1	3				1		1	2	0,1	
<i>Polycentropus flavomaculatus</i>	1	1	3		8	4	9	4	8	33	1,8	
<i>Hydropsyche siltalai</i>	1	1	2		25	7	21	15	2	70	3,8	
<i>Limnephilidae</i>	1	5	2		1	1	2		4	8	0,4	
<i>Glyptotaelius pellucidus</i>	1	5	3						2	2	0,1	
<i>Potamophylax latipennis</i>	1	5	2				1	2		3	0,2	
<i>Sericostoma personatum</i>	1	5	3						1	1	0,1	
TVÄVINGAR												
<i>Diptera</i>												
<i>Tipula</i> sp.						1				1	0,1	
<i>Eloeophila</i> sp.		3				1				1	0,1	
<i>Simuliidae</i>	1	1	2		6	3	2	2		13	0,7	
<i>Chironomidae</i>	1	2	1		105	26	64	86	164	445	24,0	
<i>Ceratopogonidae</i>	1	3	1			1			1	2	0,1	
<i>Empididae</i>	2	3	3		1		1			2	0,1	
<i>Tabanidae</i>	3	3	2		1					1	0,1	
ANTAL TAXA (exkl sökprov)												
ANTAL TAXA (inkl sökprov)												
INDIVIDANTAL												
Individantal/m ²					472	381	291	429	278	1851	100	

ARTLISTA		Provpunkt		Ro01 Lillån till Hjorthålan, Hyltan							
Provt.datum 2008-11-11				Provtagningskvalitet						92	
				Delprov (ant ind)				Summa			
Känslighetsgrad/funktion	A	B	C	D	1	2	3	4	5	ant ind	%
GLATTMASKAR											
<i>Oligochaeta</i> övriga	2				1	25	31	21	31	109	19,0
MUSSLOR											
<i>Bivalvia</i>											
<i>Pisidium</i> sp.	1	1	2			2		1		3	0,5
KRÄFTDJUR											
<i>Crustacea</i>											
<i>Asellus aquaticus</i>	1	5	2		1				1	2	0,3
DAGSLÄNDOR											
<i>Ephemeroptera</i>											
<i>Leptophlebia marginata</i>	1	4	2						1	1	0,2
<i>Leptophlebia vespertina</i>	1	4	3		1				1	2	0,3
<i>Baetis niger</i>	2	4	3		21	8	20	10	15	74	12,9
<i>Baetis rhodani</i>	2	4	2		1	2	2	2	1	8	1,4
BÄCKSLÄNDOR											
<i>Plecoptera</i>											
<i>Brachyptera risi</i>	2	4	4			1			1	2	0,3
<i>Taeniopteryx nebulosa</i>	1	5	4		3	1	1	3	3	11	1,9
<i>Nemoura avicularis</i>	1	5	4						1	1	0,2
<i>Nemoura cinerea</i>	1	5	2				3	1	1	5	0,9
<i>Leuctra hippopus</i>	1	5	4		3	5	7	7	11	33	5,7
<i>Leuctra nigra</i>	1	5	4			1				1	0,2
<i>Isoperla difformis</i>	1	3	4		4	2	1		5	12	2,1
<i>Isoperla</i> sp.	1	3	3		4	1	1	1	3	10	1,7
TROLLSLÄNDOR											
<i>Odonata</i>											
<i>Coenagrionidae</i>	2	3	3						1	1	0,2
<i>Onychogomphus forcipatus</i>	2	3	4		1	1				2	0,3
<i>Cordulegaster boltoni</i>	1	3	4						1	1	0,2
<i>Somatochlora metallica</i>	2	3	3		1					1	0,2
SKALBAGGAR											
<i>Coleoptera</i>											
<i>Orectochilus villosus</i>	3	3	2		2	5	1		2	10	1,7
<i>Hydraena riparia</i>		5							1	1	0,2
<i>Limnius volckmari</i>	2	4	4					1		1	0,2
<i>Oulimnius tuberculatus</i>	3	4	3		4					4	0,7
<i>Oulimnius</i> sp.	3	4	3		1	2	9	7	6	25	4,4
MEGALOPTERA											
<i>Sialis lutaria</i>	1	3	2		6	3	3	3	6	21	3,7
NATTSLÄNDOR											
<i>Trichoptera</i>											
<i>Lype phaeopa</i>	2	2	4			1				1	0,2
<i>Plectrocnemia conspersa</i>	1	1	3			1	1			2	0,3
<i>Polycentropus flavomaculatus</i>	1	1	3		4	1	2		6	13	2,3
<i>Polycentropus irroratus</i>	1	1	3		1		1	10	6	18	3,1
<i>Hydropsyche pellucidula</i>	1	1	3		2	1		1		4	0,7
<i>Limnephilidae</i>	1	5	2						2	2	0,3
<i>Oecetis testacea</i>	3	5	4		1					1	0,2
<i>Trienodes</i> sp.	1	5	3	5		1				1	0,2
TVÄVINGAR											
<i>Diptera</i>											
<i>Tipula</i> sp.								1		1	0,2
<i>Eloeophila</i> sp.		3			1					1	0,2
<i>Simuliidae</i>	1	1	2		3	6	9		32	50	8,7
<i>Chironomidae</i>	1	2	1		28	34	33	31	9	135	23,5
<i>Ceratopogonidae</i>	1	3	1		4					4	0,7
ANTAL TAXA (exkl sökprov)										36	
ANTAL TAXA (inkl sökprov)										36	
INDIVIDANTAL					98	104	125	100	147	574	100
Individantal/m ²										574	

ARTLISTA		Provpunkt		Vi20BF Vierydsån, nedan Kroks kvarn									
Provt.datum 2008-11-05				Provtagningskvalitet								90	
				Delprov (ant ind)					Summa				
Känslighetsgrad/funktion	A	B	C	D	1	2	3	4	5	ant ind		%	
RUNDMASKAR													
Nematoda	2	2	1					1		1		0,1	
VIRVELMASKAR obest													
Turbellaria													
Planaria-Dugesia	3					1				1		0,1	
GLATTMASKAR													
Oligochaeta övriga	2					4	8		5	17		1,5	
IGLAR													
Hirudinea	3												
Helobdella stagnalis	2	3	1					1		1		0,1	
MUSSLOR													
Bivalvia													
Pisidium sp.	1	1	2		1	3	5			9		0,8	
Sphaerium sp.	2	1	2		4	2		2		8		0,7	
SNÄCKOR													
Gastropoda	3	4	2										
Physa fontinalis	3	4	2					1		1		0,1	
Radix balthica/labiata	3	4	2		1			3		4		0,4	
KRÄFTDJUR													
Crustacea													
Asellus aquaticus	1	5	2		23	11		8	13	55		4,8	
Ostracoda	3	1	2			2				2		0,2	
DAGSLÄNDOR													
Ephemeroptera													
Ephemer a sp.	4	2	3				1			1		0,1	
Heptagenia fuscogrisea	1	4	3		1	1				2		0,2	
Heptagenia sulphurea	2	4	4		5	1	3	20	11	40		3,5	
Leptophlebia vespertina	1	4	3			1				1		0,1	
Baetis niger	2	4	3		17	17	18	32	30	114		10,0	
Baetis rhodani	2	4	2		34	38	37	65	51	225		19,8	
BÄCKSLÄNDOR													
Plecoptera													
Protonemura meyeri	1	5	4			1		4	1	6		0,5	
Nemoura avicularis	1	5	4		5	3	4	1	2	15		1,3	
Nemoura cinerea	1	5	2				1	1		2		0,2	
Isoperla difformis	1	3	4	1		1	1	4	5	12		1,1	
Isoperla grammatica	1	3	3		4	1		2		7		0,6	
Isoperla sp.	1	3	3		2	4	2	9	12	29		2,5	
SKALBAGGAR													
Coleoptera													
Orectochilus villosus	3	3	2		1			1	3	5		0,4	
Hydraena riparia		5			1		1	1	1	4		0,4	
Elmis aenea	2	4	4		10	2	3	12	12	39		3,4	
Oulimnius sp.	3	4	3		4	1		1	2	8		0,7	
NATTSLÄNDOR													
Trichoptera													
Rhyacophila nubila	1	3	4					1	1	2		0,2	
Rhyacophila sp.	1	3	3			1				1		0,1	
Polycentropus flavomaculatus	1	1	3					1		1		0,1	
Hydropsyche pellucidula	1	1	3		2		2	9	2	15		1,3	
Hydropsyche siltalai	1	1	2		13	15	22	16	24	90		7,9	
Lepidostoma hirtum	2	5	3		56	20	22	53	39	190		16,7	
Limnephilidae	1	5	2		1	2			3	6		0,5	
Limnephilus sp.	1	5	2			1	1			2		0,2	
Limnephilus rhombicus?	1	5	2		1					1		0,1	
Limnephilus sp. (annan)							1			1		0,1	
Athripsodes sp.	2	5	3				1			1		0,1	
Oecetis testacea	3	5	4			1	1		1	3		0,3	
TVÄVINGAR													
Diptera													
Tipula sp.										X			
Simuliidae	1	1	2		46	43	30	28	20	167		14,7	
Chironomidae	1	2	1			10	6	14	20	50		4,4	
ANTAL TAXA (exkl sökprov)										37			
ANTAL TAXA (inkl sökprov)										38			
INDIVIDANTAL					233	187	170	291	258	1139		100	
Individantal/m²										1139			

ARTLISTA		Provpunkt		Br06 Bräkneån, Hallarna							
Provt.datum 2008-11-06				Provtagningskvalitet							87
				Delprov				(ant ind)		Summa	
Känslighetsgrad/funktion	A	B	C	D	1	2	3	4	5	ant ind	%
VIRVELMASKAR obest											
Turbellaria											
Dendrocoelum lacteum	3	3	2						1	1	0,1
Planaria-Dugesia		3							1	1	0,1
GLATTMASKAR											
Oligochaeta övriga		2							2	2	0,2
IGLAR											
Hirudinea		3									
Erpobdella octoculata	1	3	2		1					1	0,1
MUSSLOR											
Bivalvia											
Pisidium sp.	1	1	2			12	1	10	5	28	3,1
KRÄFTDJUR											
Crustacea											
Asellus aquaticus	1	5	2		3	1	2	3		9	1,0
DAGSLÄNDOR											
Ephemeroptera											
Caenis luctuosa	4	4	3				1		4	5	0,6
Heptagenia sulphurea	2	4	4		12	20	19	26	1	78	8,7
Baetis digitatus	3	4	3						3	3	0,3
Baetis niger	2	4	3				2	3	3	8	0,9
Baetis rhodani	2	4	2		11	12	6	10	23	62	6,9
Cloeon sp.	2	4	2		1					1	0,1
BÄCKSLÄNDOR											
Plecoptera											
Taeniopteryx nebulosa	1	5	4			1				1	0,1
Protonemura meyeri	1	5	4			1				1	0,1
Amphinemura sulciollis	1	5	3			3	1			4	0,4
Nemoura avicularis	1	5	4			3				3	0,3
Leuctra hippopus	1	5	4		2	4	3	1	1	11	1,2
Isoperla difformis	1	3	4		5	15	10	6	5	41	4,6
Isoperla sp.	1	3	3		1	5	2	1	5	14	1,6
TROLLSLÄNDOR											
Odonata											
Onychogomphus forcipatus	2	3	4			2	3	3	1	9	1,0
SKALBAGGAR											
Coleoptera											
Orectochilus villosus	3	3	2			2	2		2	6	0,7
Hydraena riparia		5						1		1	0,1
Elmis aenea	2	4	4		1		2	1	2	6	0,7
NATTLÄNDOR											
Trichoptera											
Rhyacophila nubila	1	3	4			1	1	1	1	4	0,4
Chimarra marginata	4	1	4		4	9	10	20		43	4,8
Polycentropus irroratus	1	1	3				1		1	2	0,2
Polycentropus sp.	1	1	3			1				1	0,1
Cheumatopsyche lepida	4	1	4			1		2		3	0,3
Hydropsyche pellucidula	1	1	3		2	5	6	8	9	30	3,3
Hydropsyche siltalai	1	1	2		10	11	15	12	11	59	6,6
Agapetus ochripes	2	4	3			3	1	4		8	0,9
Ithytrichia sp.	3	4	4			1		2		3	0,3
Lepidostoma hirtum	2	5	3			4	1	2	1	8	0,9
Limnephilidae	1	5	2						1	1	0,1
Glyptotaelius pellucidus	1	5	3				1			1	0,1
Athripsodes sp.	2	5	3			1				1	0,1
TVÄVINGAR											
Diptera											
Simuliidae	1	1	2		5	50	6	33	6	100	11,1
Chironomidae	1	2	1		7	160	40	20	55	282	31,4
Ceratopogonidae	1	3	1		25	25	5	1		56	6,2
ANTAL TAXA (exkl sökprov)										36	
ANTAL TAXA (inkl sökprov)										36	
INDIVIDANTAL					90	353	141	170	144	898	100
Individantal/m²										898	

Vattensystem: BRÄKNEÅN	Vattendrag/namn: Lillån (Öljehultsbäcken), N.Bälganet	Provpunktsbeteckning: BLE-Br13
Provdatum: 2008-11-06	Koordinater x: 6251750 y: 1452080	Kommun: Ronneby
Lokaltyp: Bäck Naturligt/grävt: naturligt Läge: 50 m nedströms vitt hus, upp till forsen		



Lokal lämplig för provtagning: mycket bra	Påverkan A:	styrka: 0
Provet representativt för den provtagna åsträckan: ja	Påverkan B:	styrka: 0
Övriga iakttagelser i fält:	Påverkan C:	styrka: 0

Bedömning av prov från 2008-11-06											
Allmänt				Försumningspåverkan: obetydlig				Föroreningspåverkan: obetydlig			
Artantal:	høgt	Kriteriepoäng (max 14):		8p	Indikatorgrupper, renvatten:		Kriteriepoäng - totalt:		3p		
Individtäthet:	måttlig	Antal taxa:		1p	6 bäcksländesläkten		Ovanliga arter:				
Shannonindex:	høgt	Försumn.känslig sländart:		3p	4 dagslände familjer		Hydropsyche saxonica, 3p				
ASPT-index:	høgt	Gammarus:		-	5 familjer husbyggare						
EPT-index:	høgt	Bäckbaggar:		1p	Indikatorgrupper, smutsvatten:						
Surhetsindex:	høgt	Iglar:		-	Asellus aquaticus						
DFI-index:	mycket høgt	Musslor:		1p							
Dominerande taxa:		Snäckor:		-							
Baetis rhodani, 23%		B/P index:		2p							
Simuliidae, 22%											
Chironomidae, 12%											

Kommentarer:
Artantalet var høgt, 39 taxa. Alla viktiga djurgrepper fanns representerade förutom iglar och snäckor. Försumningskänsliga sländarter noterades såsom dagsländan Caenis luctuosa och Hydropsyche saxonica. Lokalen bedömdes därmed vara obetydligt försumningspåverkad. Renvattenindikerande arter noterades och lokalen bedömdes vara obetydligt påverkad av förorening.

En ovanlig nattsländan noterades; Hydropsyche saxonica. Naturvärdet bedömdes vara allmänt.

Jämförelse med tidigare resultat

Datum	Artantal inkl kval	Individantal per m2	Shannon- index	ASPT- index	EPT- index	BpHI- max	Surhets- index	Försumnings- påverkan	DFI- index	Förorenings- påverkan	Naturvärde index värde
1999-11-10	36	751	3,9	6,0	19	8	8		7		7
2001-11-02	26	494	3,2	6,0	15	8	9		7		3
2008-11-06	39	827	3,6	6,5	25	10	8	obetydlig	7	obetydlig	3 allmänt

ARTLISTA		Provpunkt		Br13 Lillån (Öljehultsbäcken), N Bälganet							
Provt.datum 2008-11-06				Provtagningskvalitet 87							
				Delprov (ant ind)					Summa		
Känslighetsgrad/funktion	A	B	C	D	1	2	3	4	5	ant ind	%
GLATTMASKAR											
Oligochaeta övriga		2				4	2	1	1	8	1,0
Eiseniella tetraedra	2	2	3			1				1	0,1
MUSSLOR											
Bivalvia											
Pisidium sp.	1	1	2		3	9	1			13	1,6
KRÄFTDJUR											
Crustacea											
Asellus aquaticus	1	5	2			1				1	0,1
Trichoniscus sp?						2		1		3	0,4
HOPPSTJÄRTAR											
Collembola	1	3	1		1					1	0,1
DAGSLÄNDOR											
Ephemeroptera											
Caenis luctuosa	4	4	3				1			1	0,1
Heptagenia sulphurea	2	4	4		8			1		9	1,1
Leptophlebia marginata	1	4	2					2		2	0,2
Leptophlebia sp.	1	4	3						1	1	0,1
Baetis niger	2	4	3		8	19	9	24	14	74	8,9
Baetis rhodani	2	4	2		17	40	40	67	28	192	23,2
Centroptilum luteolum	2	4	3							X	
BÄCKSLÄNDOR											
Plecoptera											
Brachyptera risi	2	4	4		2	1	1	1	2	7	0,8
Protonemura meyeri	1	5	4		8	2	6	4	3	23	2,8
Amphinemura sulciollis	1	5	3						1	1	0,1
Nemoura avicularis	1	5	4		2	1	4	7	1	15	1,8
Leuctra hippopus	1	5	4		15	10	14	28	5	72	8,7
Isoperla difformis	1	3	4		2	4	3	4	3	16	1,9
Isoperla sp.	1	3	3		1	5	1		1	8	1,0
SKALBAGGAR											
Coleoptera											
Limnebius truncatellus	3	5	3						1	1	0,1
Elodes sp.	2	4	2						1	1	0,1
Oulimnius sp.	3	4	3		2	3	3	4	2	14	1,7
NATTSLÄNDOR											
Trichoptera											
Rhyacophila nubila	1	3	4					4		4	0,5
Rhyacophila sp.	1	3	3			1	1			2	0,2
Lype phaeopa	2	2	4		2	1	1	1		5	0,6
Cyrnus trimaculatus	1	1	3			1		1		2	0,2
Plectrocnemia conspersa	1	1	3				1			1	0,1
Polycentropus flavomaculatus	1	1	3		2	11	4	9	4	30	3,6
Polycentropus irroratus	1	1	3			2	2	2		6	0,7
Hydropsyche saxonica	4	1	3	5	1			1	1	3	0,4
Hydropsyche siltalai	1	1	2		5		1	2	7	15	1,8
Agapetus ochripes	2	4	3					1	1	2	0,2
Oxyethira sp.	1	4	3							X	
Limnephilidae	1	5	2					2		2	0,2
Glyptotaelius pellucidus	1	5	3			1				1	0,1
Sericostoma personatum	1	5	3		1	1	3	2	1	8	1,0
Mystacides sp.	2	5	3			1				1	0,1
TVÄVINGAR											
Diptera											
Eloeophila sp.		3				1	2			3	0,4
Simuliidae	1	1	2		41	7	2	89	41	180	21,8
Chironomidae	1	2	1		30	28	6	34		98	11,9
Empididae	2	3	3							X	
Muscidae	3		2							X	
ANTAL TAXA (exkl sökprov)											
ANTAL TAXA (inkl sökprov)											
INDIVIDANTAL											
Individantal/m²					151	157	108	292	119	827	100
827											

Vattensystem: ÅRYDSÅN	Vattendrag/namn: Nedre Agnsjöns utlopp, Högahult	Provpunktsbeteckning: BLE-Ah16
Provdatum: 2008-11-06	Koordinater x: 6242046 y: 1448917	Kommun: Karlshamn
Lokaltyp: Bäck Naturligt/grävt: naturligt Läge: Högahult - 3-13 m nedströms vägbro		



Lokalbeskrivning efter Handledning för miljöövervakning (Naturvårdsverket 2003)

Provtagning: Håkan Björklund **Antal prov:** 5 **Tid/prov (s):** 60
Sortering: Maja Holmström **Separerade prover:** Ja **Provsträcka (m):** 1
Artbestämning: Cecilia Holmström **Metod:** Handbok för miljöövervakn. 1996

Lokalens längd (normalt 10 m): 10 m **Vattenhastighet (0-3):** 2
Lokalens bredd (provyta, uppsk): 1,5 m **Vattennivå:** medel
Vattendragsbredd (våtyta): 1,5 m **Grumlighet:** klart
Lokalens medeldjup (provyta): 0,3 m **Färg:** starkt färg
Lokalens maxdjup (provyta): 0,5 m **Vattentemperatur:** 2 °C

Bottensubstrat och vegetation på provytan

	Dom	Täck		Dom	Täck		Dom	Täck	Dom.art
Findetritus:	D2	2	Finsediment:		0	Överv.veg:		0	
Grovdetritus:	D1	2	Sand:	D3	2	Flytbladsveg:		0	
Fin död ved:		0	Grus:	D1	2	Långskottsveg:		0	
Grov död ved:		0	Fin sten:	D2	2	Rosettväxter:		0	
Utfällningar:		0	Grov sten:		2	Mossor:	D1	1	
			Fina block:		0	Makroalger:		0	
			Grova block:		0				
			Häll:		0				

Bottentyp: hård
Kvalprov substr.: kantveg,rötter,block **Övrigt utanför delprov:**

Närmiljö 0-30m bredd, 50m sträcka **Strandzon 0-5m, 50m sträcka**

	Dom	Täck		Dom	Täck		Dom	Dom.art	Subdom.art
Lövskog:		0	Gräs/äng:		0	Träd:	D2	gran	
Barrskog:		0	Hed:		0	Buskar:	D1	björk	
Blandskog:	D1	3	Hällmark:		0	Gräs/halvgräs:			
Kalhygge:		0	Blockmark:		0	Annan veg:			
Våtmark:		0	Artif mark:	D2	0	Övrigt:			
Aker:		0			0				

Beskuggning (0-3): 2 **Dom. markanvändning:** skogsbygd **Tätortsmiljö:** Nej

Lokal lämplig för provtagning: mycket bra
Provet representativt för den provtagna åsträckan: ja
Övriga iakttagelser i fält:

Påverkan A: styrka: 0
Påverkan B: styrka: 0
Påverkan C: styrka: 0

Bedömning av prov från 2008-11-06										Underlag för bedömningar redovisas under respektive kolumn (se förklaringar under Metodik)	
Allmänt		Försurningspåverkan: måttlig		Föroreningspåverkan: svag		Naturvärde: allmänt					
Artantal:	måttligt	Kriteriepoäng (max 14):	6p	Indikatorgrupper, renvatten:		Kriteriepoäng - totalt:		0p			
Individtäthet:	hög	Antal taxa:	1p	4 bäcksländesläkten							
Shannonindex:	måttligt	Försurn.känslig sländart:	1p	3 dagsländedefamiljer							
ASPT-index:	måttligt	Gammarus:	-	1 familj husbyggare							
EPT-index:	måttligt	Bäckbaggar:	1p	Indikatorgrupper, smutsvatten:							
Surhetsindex:	måttligt	Iglar:	1p	>100 Oligochaeta							
DFI-index:	högt	Musslor:	1p	Asellus aquaticus, Erpobdella, Sialis							
Dominerande taxa:		Snäckor:	-								
Chironomidae, 40%		B/P index:	1p								
Simuliidae, 23%											
Pisidium sp., 17%											

Kommentarer:


Artantalet var måttligt, i nivå med de föregående undersökningarna. Fjädermygglarver, Chironomidae, noterades i riklig mängd och dominerade bottenfaunasamhället. Alla viktiga djurgrupper noterades förutom snäckor. Försurningskänsliga sländarter saknades och lokalen bedömdes därmed ha en måttlig försurningspåverkan. Detta är samma bedömning som år 2007. År 2004 bedömdes lokalen vara obetydligt påverkad och 2002 betydligt påverkad. Andelen filtrerare är stor, ca 85 %, vilket visar på att en större mängd organiskt material kommer från den uppströms liggande sjön. Den organiska/eutrofierande påverkan var svag. Inga rödlistade eller ovanliga arter noterades. Naturvärdet var allmänt.

Jämförelse med tidigare resultat

Datum	Artantal inkl kval	Individantal per m2	Shannon-index	ASPT-index	EPT-index	BpHI-max	Surhets-index	Försurnings-påverkan	DFI-index	Förorenings-påverkan	Naturvärde index värde
1999-11-10	29	3280	2,6	5,7	14	8	9		6		3
2001-11-01	26	3481	2,5	5,7	13	8	7		6		3
2002-11-20	23	406	2,8	4,8	10	6	5	betydlig	4	betydlig	3 allmänt
2004-10-07	33	3175	2,7	5,2	14	10	10	obetydlig	6	svag	0 allmänt
2007-10-31	32	2702	3,4	5,7	17	8	5	måttlig	6	svag	0 allmänt
2008-11-06	30	2314	2,5	5,8	16	8	6	måttlig	6	svag	0 allmänt

ARTLISTA				Provpunkt		Ah16 Nedre Agnsjöns utlopp, Högahult						
Provt.datum 2008-11-06					Provtagningskvalitet							88
					Delprov				(ant ind)		Summa	
Känslighetsgrad/funktion		A	B	C	D	1	2	3	4	5	ant ind	%
GLATTMASKAR												
<i>Oligochaeta</i> övriga			2			3	25	50	51	51	180	7,8
IGLAR												
<i>Hirudinea</i>			3									
Glossiphonia complanata		3	3	2				2		1	3	0,1
Erpobdella octoculata		1	3	2					2		2	0,1
MUSSLOR												
<i>Bivalvia</i>												
Pisidium sp.		1	1	2		68	61	64	126	70	389	16,8
KRÄFTDJUR												
<i>Crustacea</i>												
Asellus aquaticus		1	5	2		4	2	3	2	3	14	0,6
VATTENKVALSTER												
<i>Hydracarina</i>		1	3	2				1			1	0,0
VATTENSPINDLAR												
<i>Arachnida</i>		1	3	3								
Argyroneta aquatica							1				1	0,0
DAGSLÄNDOR												
<i>Ephemeroptera</i>												
Heptagenia fuscogrisea		1	4	3			4	5	1		10	0,4
Leptophlebia marginata		1	4	2			1				1	0,0
Leptophlebia vespertina		1	4	3			2				2	0,1
Leptophlebia sp.		1	4	3					2	1	3	0,1
Baetis niger		2	4	3		5	2	9	3	7	26	1,1
BÄCKSLÄNDOR												
<i>Plecoptera</i>												
Brachyptera risi		2	4	4				1			1	0,0
Nemoura avicularis		1	5	4							X	
Nemoura cinerea		1	5	2			3	2	3	2	10	0,4
Leuctra hippopus		1	5	4		1				1	2	0,1
Isoperla difformis		1	3	4			3		5	3	11	0,5
Isoperla grammatica		1	3	3						1	1	0,0
Isoperla sp.		1	3	3				1	1	2	4	0,2
TROLLSLÄNDOR												
<i>Odonata</i>												
Coenagrionidae		2	3	3					1		1	0,0
Cordulegaster boltoni		1	3	4				1			1	0,0
SKALBAGGAR												
<i>Coleoptera</i>												
Oulimnius tuberculatus		3	4	3				2			2	0,1
Oulimnius sp.		3	4	3		15	13	36	35	34	133	5,8
MEGALOPTERA												
Sialis lutaria		1	3	2			6	1	7	3	17	0,7
NATTSLÄNDOR												
<i>Trichoptera</i>												
Lype phaeopa		2	2	4			1				1	0,0
Plectrocnemia conspersa		1	1	3						1	1	0,0
Polycentropus flavomaculatus		1	1	3		4		5	8	8	25	1,1
Hydropsyche angustipennis		2	1	3			1	1	1		3	0,1
Limnephilidae		1	5	2					2	4	6	0,3
Glyptotaelius pellucidus		1	5	3						1	1	0,0
Limnephilus sp.		1	5	2					1		1	0,0
TVÄVINGAR												
<i>Diptera</i>												
Eloeophila sp.			3							1	1	0,0
Simuliidae		1	1	2		55	79	107	127	153	521	22,6
Chironomidae		1	2	1		130	132	160	258	255	935	40,5
ANTAL TAXA (exkl sökprov)											29	
ANTAL TAXA (inkl sökprov)											30	
INDIVIDANTAL						285	336	451	636	602	2310	100
Individantal/m ²											2310	

Vattensystem: BRÄKNEÅN/MIEÅN	Vattendrag/namn: Bäck från Älmtasjön, Björnamåla	Provpunktsbeteckning: BLE-Ah21
Provdatum: 2008-11-06	Koordinater x: 6240190 y: 1444914	Kommun: Karlshamn
Lokaltyp: Bäck Naturligt/grävt: naturligt Läge: 5-15 m nedströms vägbro		



Provtagning: Håkan Björklund	Antal prov: 5	Tid/prov (s): 60
Sortering: Maja Holmström	Separerade prover: Ja	Provsträcka (m): 1
Artbestämning: Cecilia Holmström	Metod: Handbok för miljöövervakn. 1996	

Lokalens längd (normalt 10 m):	10 m	Vattenhastighet (0-3):	2
Lokalens bredd (provyta, uppsk):	1 m	Vattennivå:	medel
Vattendragsbredd (våtyta):	2 m	Grumlighet:	klart
Lokalens medeldjup (provyta):	0,4 m	Färg:	färgat
Lokalens maxdjup (provyta):	0,8 m	Vattentemperatur:	2 °C

Bottensubstrat och vegetation på provytan

	Dom	Täck		Dom	Täck		Dom	Täck	Dom.art
Findetritus:	D1	1	Finsediment:		0	Överv.veg:		0	
Grovdetritus:	D2	1	Sand:		1	Flytbladsveg:		0	
Fin död ved:	D3	1	Grus:		2	Långskottsveg:		0	
Grov död ved:		0	Fin sten:	D3	2	Rosettväxter:		0	
Utfällningar:		0	Grov sten:	D2	2	Mossor:	D1	1	
			Fina block:	D1	3	Makroalger:	D2	1	
			Grova block:		1	Veg utanför			
			Häll:		0	delprov:			

Bottentyp: hård**Kvalprov substr.:** kantvegetation, bloc**Övrigt utanför delprov:****Närmiljö 0-30m bredd, 50m sträcka****Strandzon 0-5m, 50m sträcka**

	Dom	Täck		Dom	Täck		Dom	Dom.art	Subdom.art
Lövskog:	D3	1	Gräs/äng:		0	Träd:	D1	björk	al
Barrskog:		0	Hed:		0	Buskar:	D2	ypon, fläder, mr	
Blandskog:		0	Hällmark:		0	Gräs/halvgräs:			
Kalhygge:		0	Blockmark:		0	Annan veg:			
Våtmark:	D1	3	Artif mark:	D2	2	Övrigt:			
Aker:		0			0				

Beskuggning (0-3): 2**Dom. markanvändning:** skogsbygd**Tätortsmiljö:** Nej**Lokal lämplig för provtagning:** mycket bra**Provet representativt för den provtagna åsträckan:** ja**Övriga iakttagelser i fält:****Påverkan A:** styrka: 0**Påverkan B:** styrka: 0**Påverkan C:** styrka: 0**Bedömning av prov från 2008-11-06**

Underlag för bedömningar redovisas under respektive kolumn (se förklaringar under Metodik)

Allmänt	Försurningspåverkan: obetydlig	Föroreningspåverkan: måttlig	Naturvärde: allmänt
Artantal: högt Individtäthet: måttlig Shannonindex: högt ASPT-index: måttligt EPT-index: måttligt Surhetsindex: högt DFI-index: måttligt Dominerande taxa: Pisidium sp., 25% Oligochaeta övriga, 22% Chironomidae, 12%	Kriteriepoäng (max 14): 9p ----- Antal taxa: 2p Försurn.känslig sländart: 3p Gammarus: - Bäckbaggar: 1p Iglar: 1p Musslor: 1p Snäckor: 1p B/P index: -	Indikatorgrupper, renvatten: Virvelmaskar 2 bäcksländesläkten 4 dagslände familjer 3 familjer husbyggare Elodes, Rhyacophila Indikatorgrupper, smutsvatten: >100 Oligochaeta Asellus aquaticus, Erpobdella, Sphaerium, Radix, Psychodidae	Kriteriepoäng - totalt: 1p Övriga kriterier: Antal taxa: 1 poäng

Kommentarer:

Artantalet var högt, 41 taxa. Alla viktiga djurgrupper noterades. Den försurningskänsliga dagslåndan Caenis horaria noterades med en individ, även några känsligare nattsländor noterades; Mystacides azurea och Oecetis testacea. Lokalen bedömdes vara obetydligt försurningspåverkad. En viss organisk påverkan från den uppströms belägna sjön kunde noteras då andelen filtrerade individer var hög. Även några smutsvatten-indikerande arter noterades och lokalen bedömdes vara måttligt föroreningspåverkad.


Inga rödlistade eller ovanliga arter noterades. Naturvärdet bedömdes vara allmänt.

Jämförelse med tidigare resultat

Datum	Artantal inkl kval	Individantal per m2	Shannon- index	ASPT- index	EPT- index	BpHI- max	Surhets- index	Försurnings- påverkan	DFI- index	Förorenings- påverkan	Naturvärde index värde
1999-11-11	27	2734	2,7	6,3	14	8	6		6		22
2001-11-01	35	2763	3,2	6,0	20	10	8		6		3
2008-11-06	41	1763	3,6	5,7	19	10	9	obetydlig	5	måttlig	1 allmänt

ARTLISTA		Provpunkt		Ah21 Bäck från Älmtasjön, Björnamåla							
Provt.datum 2008-11-06				Provtagningskvalitet							91
				Delprov				(ant ind)		Summa	
Känslighetsgrad/funktion	A	B	C	D	1	2	3	4	5	ant ind	%
POLYPDJUR											
Hydrozoa obest	3		1								
Hydridae	3		1			2				2	0,1
RUNDMASKAR											
Nematoda	2	2	1		1					1	0,1
VIRVELMASKAR obest											
Turbellaria											
Dendrocoelum lacteum	3	3	2		1			1		2	0,1
Polycelis sp.	3	3	3				1			1	0,1
GLATTMASKAR											
Oligochaeta övriga	2				25	4		350	2	381	21,6
IGLAR											
Hirudinea		3									
Glossiphonia complanata	3	3	2		1					1	0,1
Erpobdella octoculata	1	3	2			1	2	2		5	0,3
MUSSLOR											
Bivalvia											
Pisidium sp.	1	1	2		45	61	263	34	40	443	25,1
Sphaerium sp.	2	1	2		4	2	16	1	1	24	1,4
SNÄCKOR											
Gastropoda	3	4	2								
Physa fontinalis	3	4	2				1			1	0,1
Radix balthica/labiata	3	4	2			1				1	0,1
Gyraulus albus	3	4	2				11	1	1	13	0,7
KRÄFTDJUR											
Crustacea											
Asellus aquaticus	1	5	2		6	4	58	6	1	75	4,3
DAGSLÄNDOR											
Ephemeroptera											
Caenis horaria	4	4	3					1		1	0,1
Heptagenia fuscogrisea	1	4	3			7		1	3	11	0,6
Leptophlebia marginata	1	4	2		12	7	1	3	9	32	1,8
Leptophlebia vespertina	1	4	3		10	18	8	1	23	60	3,4
Baetis niger	2	4	3			8	13	1	2	24	1,4
BÄCKSLÄNDOR											
Plecoptera											
Nemoura avicularis	1	5	4		3	5	2	7	2	19	1,1
Nemoura cinerea	1	5	2		1	2	4	2	7	16	0,9
Isoperla difformis	1	3	4		1	4	6	3	5	19	1,1
Isoperla sp.	1	3	3		1	3	4	2	21	31	1,8
TROLLSLÄNDOR											
Odonata											
Calopteryx virgo	3	3	3							X	
Calopteryx sp.	3	3	3				1			1	0,1
Cordulegaster boltoni	1	3	4				2			2	0,1
Somatochlora sp.	1	3	3		1					1	0,1
SKALBAGGAR											
Coleoptera											
Elodes sp.	2	4	2				2		7	9	0,5
Oulimnius sp.	3	4	3		7		7		2	16	0,9
NATTSLÄNDOR											
Trichoptera											
Rhyacophila nubila	1	3	4			1				1	0,1
Lype phaeopa	2	2	4			1	1	1		3	0,2
Polycentropus flavomaculatus	1	1	3						1	1	0,1
Polycentropus irroratus	1	1	3			1	1	1	1	4	0,2
Hydropsyche angustipennis	2	1	3			6	13	22	71	112	6,4
Hydropsyche siltalai	1	1	2			3	13	12	10	38	2,2
Lepidostoma hirtum	2	5	3			7	14	3	5	29	1,6
Limnephilidae	1	5	2			5	3	2	9	19	1,1
Glyptotaelius pellucidus	1	5	3		1	8		1	4	14	0,8
Limnephilus rhombicus?	1	5	2		1	2	3		2	8	0,5
Mystacides azurea	3	5	3		1					1	0,1
Oecetis testacea	3	5	4			1				1	0,1
TVÄVINGAR											
Diptera											
Pericomini	3	3	1			1		1		2	0,1
Simuliidae	1	1	2		2	2	4	32	35	75	4,3
Chironomidae	1	2	1		3	25	4	66	110	208	11,8
Ceratopogonidae	1	3	1		55					55	3,1
ANTAL TAXA (exkl sökprov)										41	
ANTAL TAXA (inkl sökprov)										41	
INDIVIDANTAL					182	192	458	557	374	1763	100
Individantal/m ²										1763	

Vattensystem: MIEÅN	Vattendrag/namn: Mieån, Grimsmåla	Provpunktsbeteckning: BLE-Mi12
Provdatum: 2008-11-06	Koordinater x: 6244106 y: 1442290	Kommun: Karlshamn
Lokaltyp: A	Naturligt/grävt: naturligt	Läge: gränsen mellan betesmark och lövskog



Provtagning: Håkan Björklund	Antal prov: 5	Tid/prov (s): 60
Sortering: Maja Holmström	Separerade prover: Ja	Provsträcka (m): 1
Artbestämning: Cecilia Holmström	Metod: Handbok för miljöövervakn. 1996	

Lokalens längd (normalt 10 m):	10 m	Vattenhastighet (0-3):	2
Lokalens bredd (provyta, uppsk):	6 m	Vattennivå:	medel
Vattendragsbredd (våtyta):	7 m	Grumlighet:	klart
Lokalens medeldjup (provnya):	0,3 m	Färg:	starkt färg
Lokalens maxdjup (provnya):	0,5 m	Vattentemperatur:	3 °C

Bottensubstrat och vegetation på provytan

	Dom	Täck		Dom	Täck		Dom	Täck	Dom.art
Findetritus:		1	Finsediment:		0	Överv.veg:		0	
Grovdetritus:	D1	3	Sand:		2	Flytbladsveg:		0	
Fin död ved:		1	Grus:		2	Långskottsveg:		0	
Grov död ved:		0	Fin sten:	D3	2	Rosettväxter:	D2	1	
Utfällningar:		0	Grov sten:	D2	2	Mossor:	D1	3	
			Fina block:	D1	3	Makroalger:		0	
			Grova block:		0				
			Häll:		0				

Bottentyp: hård**Kvalprov substr.:** kantvegetation, bloc**Veg utanför delprov:****Övrigt utanför delprov:****Närmiljö 0-30m bredd, 50m sträcka****Strandzon 0-5m, 50m sträcka**

	Dom	Täck		Dom	Täck		Dom	Dom.art	Subdom.art
Lövskog:	D1	3	Gräs/äng:	D2	1	Träd:	D1	björk	
Barrskog:		0	Hed:		0	Buskar:	D3	pors	
Blandskog:		0	Hällmark:		0	Gräs/halvgräs:	D2		
Kalhygge:		0	Blockmark:		0	Annan veg:			
Våtmark:		0	Artif mark:		0	Övrigt:			
Aker:		0			0				

Beskuggning (0-3): 1**Dom. markanvändning:** skogsbygd**Tätortsmiljö:** Nej**Lokal lämplig för provtagning:** mycket bra**Provet representativt för den provtagna åsträckan:** ja**Övriga iakttagelser i fält:****Påverkan A:** styrka: 0**Påverkan B:** styrka: 0**Påverkan C:** styrka: 0**Bedömning av prov från 2008-11-06**

Underlag för bedömningar redovisas under respektive kolumn (se förklaringar under Metodik)

Allmänt	Försumningspåverkan: obetydlig	Föroreningspåverkan: obetydlig	Naturvärde: mycket högt
Artantal: mycket högt Individtäthet: mycket hög Shannonindex: mycket högt ASPT-index: högt EPT-index: mycket högt Surhetsindex: högt DFI-index: mycket högt Dominerande taxa: Chironomidae, 19% Baetis niger, 14% Leuctra hippopus, 11%	Kriteriepoäng (max 14): 10p ----- Antal taxa: 2p Försum.känslig sländart: 3p Gammarus: - Bäckbaggar: 1p Iglar: - Musslor: 1p Snäckor: 1p B/P index: 2p	Indikatorgrupper, renvatten: 8 bäcksländesläkten 4 dagslände familjer 6 familjer husbyggare Rhyacophila, Elmia aenea, Limnius volckmari, Ancylus fluviatilis Indikatorgrupper, smutsvatten:	Kriteriepoäng - totalt: 20p Ovanliga arter: Normandia nitens, 3p Ibis marginata, 3p Triaenodes sp., 3p Övriga kriterier: Antal taxa: 10 poäng Shannon index: 1 poäng

Kommentarer:


Artantalet var mycket högt, och lokalen var den artrikaste i årets undersökning. Alla viktiga djurgrupper noterades förutom iglar. Sländfaunan var rik med 10 bäcksländearter och inte mindre än 18 nattsländearter. Riktigt försumningskänsliga arter noterades såsom Caenis-dagsländor samt nattsländorna Chimarra marginata och Cheumatopsyche lepida. Lokalen bedömdes vara obetydligt påverkad av försumning liksom vid sju tidigare besök sedan 1997. Således verkar bottenfaunasamhället vara stabilt. Renvattenkrävande arter noterades både bland dag-, bäck- och nattsländor. Föroreningspåverkan bedömdes vara obetydlig. Tre ovanliga arter noterades; bäckvattenbaggen Normandia nitens, nattsländan Triaenodes sp. samt bäckbrosen Ibis marginata. Naturvärdet bedömdes vara mycket högt.

Jämförelse med tidigare resultat

Datum	Artantal inkl kval	Individantal per m2	Shannon- index	ASPT- index	EPT- index	BpHI- max	Surhets- index	Försumnings- påverkan	DFI- index	Förorenings- påverkan	Naturvärde index värde
1998-11-26	51	4944	3,8	6,5	29	10	8		7		16
1999-11-11	52	5867	3,2	6,8	31	10	7		7		19
2001-11-01	45	3471	3,7	6,6	28	10	7		7		10
2002-11-20	47	3448	3,9	6,3	29	10	10		7		13
2005-11-15	48	2929	3,8	6,6	30	10	9	obetydlig	7	obetydlig	12 högt
2007-10-30	44	1265	4,4	6,4	24	10	8	obetydlig	7	obetydlig	7 högt
2008-11-06	54	5666	4,0	6,9	35	10	10	obetydlig	7	obetydlig	20 mycket högt

ARTLISTA		Provpunkt		Mi12 Mieån, Grimsmåla							
Provt.datum 2008-11-06				Provtagningskvalitet 96							
				Delprov (ant ind)				Summa			
Känslighetsgrad/funktion	A	B	C	D	1	2	3	4	5	ant ind	%
GLATTMASKAR											
Oligochaeta övriga	2					2	2	1	4	9	0,2
Eiseniella tetraedra	2	2	3						1	1	0,0
MUSSLOR											
Bivalvia											
Pisidium sp.	1	1	2		3	8	14	10	11	46	0,8
SNÄCKOR											
Gastropoda	3	4	2								
Ancylus fluviatilis	3	4	3				1			1	0,0
KRÄFTDJUR											
Crustacea											
Ostracoda	3	1	2			1				1	0,0
DAGSLÄNDOR											
Ephemeroptera											
Caenis luctuosa	4	4	3		1		1	2		4	0,1
Caenis rivulorum	4	4	3				4	2	1	7	0,1
Heptagenia sulphurea	2	4	4		49	34	14	8	3	108	1,9
Leptophlebia marginata	1	4	2			3				3	0,1
Baetis digitatus	3	4	3		4	2	1	1	1	9	0,2
Baetis niger	2	4	3		168	202	150	143	152	815	14,4
Baetis rhodani	2	4	2		80	141	102	90	78	491	8,7
BÄCKSLÄNDOR											
Plecoptera											
Brachyptera risi	2	4	4		1	3	3	1	2	10	0,2
Taeniopteryx nebulosa	1	5	4		2	4	2	1	4	13	0,2
Protonemura meyeri	1	5	4		70	44	28	17	12	171	3,0
Amphinemura sulciollis	1	5	3		29	15	22	6	20	92	1,6
Amphinemura borealis	1	5	4		3	25	3	3	4	38	0,7
Nemoura avicularis	1	5	4		6	11	6	14	2	39	0,7
Leuctra hippopus	1	5	4		85	140	161	107	102	595	10,5
Perlodes dispar	1	3	4		2	2	2		1	7	0,1
Isoperla difformis	1	3	4		8	2			2	12	0,2
Isoperla grammica	1	3	3		5	13	5	4		27	0,5
Isoperla sp.	1	3	3		57	37	58	12	36	200	3,5
TROLLSLÄNDOR											
Odonata											
Calopteryx splendens	3	3	3			2	1	1	1	5	0,1
Calopteryx sp.	3	3	3		2					2	0,0
Onychogomphus forcipatus	2	3	4		6	11	12	7	16	52	0,9
Cordulegaster boltoni	1	3	4				1			1	0,0
SKALBAGGAR											
Coleoptera											
Orectochilus villosus	3	3	2						1	1	0,0
Elmis aenea	2	4	4		57	64	41	46	60	268	4,7
Limnius volckmari	2	4	4		8	4	13	6	21	52	0,9
Normandia nitens	3	4	3	5	2		2	1	1	6	0,1
Oulimnius sp.	3	4	3		3	2	7	3	9	24	0,4
NATTSLÄNDOR											
Trichoptera											
Rhyacophila nubila	1	3	4		1				1	2	0,0
Chimarra marginata	4	1	4			1	1		1	3	0,1
Polycentropus flavomaculatus	1	1	3			6	3	6	3	18	0,3
Polycentropus irroratus	1	1	3		1	1		4		6	0,1
Cheumatopsyche lepida	4	1	4		2	2	2		2	8	0,1
Hydropsyche pellucidula	1	1	3		76	56	58	13	75	278	4,9
Hydropsyche siltalai	1	1	2				1	2		3	0,1
Agapetus ochripes	2	4	3		1	5	20	5	12	43	0,8
Ithytrichia sp.	3	4	4		5	28	52	55	25	165	2,9
Oxyethira sp.	1	4	3		2			1		3	0,1
Lepidostoma hirtum	2	5	3		4	60	60	12	10	146	2,6
Limnephilidae	1	5	2		1	2				3	0,1
Sericostoma personatum	1	5	3			1		1		2	0,0
Athripsodes sp.	2	5	3			1	3		1	5	0,1
Mystacides azurea	3	5	3			5		2		7	0,1
Mystacides sp.	2	5	3		1					1	0,0
Oecetis testacea	3	5	4							X	
Setodes argentipunctellus	3	3	5		2	1	2	1		6	0,1
Trienodes sp.	1	5	3	5			1			1	0,0
TVÄVINGAR											
Diptera											
Dicranota sp.	1	3	2				5	2	2	9	0,2
Simuliidae	1	1	2		52	100	101	100	51	404	7,1
Chironomidae	1	2	1		114	260	190	380	160	1104	19,5
Ceratopogonidae	1	3	1				25	50	25	100	1,8
Empididae	2	3	3		25	50	51	100	4	230	4,1
Ibisia marginata	3	3	2	5		2	1	5	1	9	0,2
ANTAL TAXA (exkl sökprov)										53	
ANTAL TAXA (inkl sökprov)										54	
INDIVIDANTAL					938	1353	1232	1225	918	5666	100
Individantal/m²										5666	

Vattensystem: MÖRRUMSÅN	Vattendrag/namn: Bjällerbäcken, Fridafors	Provpunktsbeteckning: BLE-Mo02
Provdatum: 2008-10-23	Koordinater x: 6253803 y: 1429343	Kommun: Karlshamn
Lokaltyp: Bäck Naturligt/grävt: naturligt Läge: 5-15 m upp bro		



Lokalbeskrivning efter Handledning för miljöövervakning (Naturvårdsverket 2003)

Provtagning: Jan Pröjts **Antal prov:** 5 **Tid/prov (s):** 60
Sortering: Maja Holmström **Separerade prover:** Ja **Provsträcka (m):** 1
Artbestämning: Cecilia Holmström **Metod:** Handbok för miljöövervakn. 1996

Lokalens längd (normalt 10 m): 10 m **Vattenhastighet (0-3):** 3
Lokalens bredd (provyta, uppsk): 2 m **Vattennivå:** medel
Vattendragsbredd (våtyta): 2,5 m **Grumlighet:** klart
Lokalens medeldjup (provyta): 0,3 m **Färg:** färgat
Lokalens maxdjup (provyta): 0,4 m **Vattentemperatur:** 9 °C

Bottensubstrat och vegetation på provytan

	Dom	Täck		Dom	Täck		Dom	Täck	Dom.art
Findetritus:		0	Finsediment:		0	Överv.veg:		0	
Grovdetritus:	D1	1	Sand:		0	Flytbladsveg:		0	
Fin död ved:	D2	1	Grus:	D2	1	Långskottsveg:		0	
Grov död ved:		0	Fin sten:	D1	3	Rosettväxter:		0	
Utfällningar:		0	Grov sten:	D3	1	Mossor:	D1	1	fontinalis
			Fina block:		0	Makroalger:		0	
			Grova block:		0				
			Häll:		0				

Bottentyp: hård **Veg utanför delprov:**
Kvalprov substr.: kantsten **Övrigt utanför delprov:**

Närmiljö 0-30m bredd, 50m sträcka **Strandzon 0-5m, 50m sträcka**

	Dom	Täck		Dom	Täck		Dom	Dom.art	Subdom.art
Lövskog:	D2	1	Gräs/äng:		0	Träd:	D2	lön	
Barrskog:		0	Hed:		0	Buskar:	D3		
Blandskog:		0	Hällmark:		0	Gräs/halvgräs:	D1		
Kalhygge:		0	Blockmark:		0	Annan veg:			
Våtmark:		0	Artif mark:	D1	2	Övrigt:			
Aker:		0			0				

Beskuggning (0-3): 2 **Dom. markanvändning:** skogsbygd **Tätortsmiljö:** Nej

Lokal lämplig för provtagning: mycket bra - bra hård botten
Provet representativt för den provtagna åsträckan: ja
Övriga iakttagelser i fält:

Påverkan A: samhälle **styrka:** 0
Påverkan B: **styrka:** 0
Påverkan C: **styrka:** 0

Bedömning av prov från 2008-10-23											
Allmänt			Försumningspåverkan: obetydlig			Föroreningspåverkan: svag			Naturvärde: allmänt		
Artantal:	høgt		Kriteriepoäng (max 14):	9p		Indikatorgrupper, renvatten:			Kriteriepoäng - totalt:	3p	
Individtäthet:	måttlig		Antal taxa:	1p		4 bäcksländesläkten			Ovanliga arter:		
Shannonindex:	måttligt		Försum.känslig sländart:	3p		2 dagsländefamiljer			Hydropsyche saxonica, 3p		
ASPT-index:	høgt		Gammarus:	-		3 familjer husbyggare					
EPT-index:	måttligt		Bäckbaggar:	1p		Elmis aenea					
Surhetsindex:	høgt		Iglar:	1p		Indikatorgrupper, smutsvatten:					
DFI-index:	høgt		Musslor:	1p		>100 Oligochaeta					
			Snäckor:	-		Helobdella stagnalis, Sialis					
			B/P index:	2p							
Dominerande taxa:											
Simuliidae, 29%											
Oligochaeta övriga, 27%											
Chironomidae, 25%											


Kommentarer:
Snäckor saknades helt i proverna, i övrigt påträffades de flesta indikatorgrupperna. Dock var känsligare sländarter fåtaliga. Årets resultat visar på obetydlig försumningspåverkan, genom indexpoängen. Föroreningsgraden var svag och naturvärdet allmänt. Intressant var fyndet av den ovanliga nattsländan Hydropsyche saxonica som gav tre poäng i naturvärdesindexet.

Jämförelse med tidigare resultat

Datum	Artantal inkl kval	Individantal per m2	Shannon- index	ASPT- index	EPT- index	BpHI- max	Surhets- index	Försumnings- påverkan	DFI- index	Förorenings- påverkan	Naturvärde index värde
1999-11-11	39	2557	2,9	6,1	22	8	5		7		0
2001-10-31	33	2905	2,5	6,2	18	8	7		7		0
2002-11-20	34	339	3,6	5,8	13	8	6		6		3
2005-11-15	33	1134	3,2	6,0	15	8	6		6		0
2006-11-14	26	85	3,7	6,4	17	8	5		7		0
2008-10-23	36	1825	2,7	6,2	19	8	9	obetydlig	6	svag	3 allmänt

ARTLISTA		Provpunkt		Mo02 Bjällerbäcken, Fridafors							
Provt.datum 2008-10-23				Provtagningskvalitet							92
				Delprov (ant ind)					Summa		
Känslighetsgrad/funktion	A	B	C	D	1	2	3	4	5	ant ind	%
GLATTMASKAR											
Oligochaeta övriga		2			203	151	37	59	51	501	27,5
Eiseniella tetraedra		2	2	3			1	1		2	0,1
IGLAR											
Hirudinea		3									
Helobdella stagnalis		2	3	1	1					1	0,1
MUSSLOR											
Bivalvia											
Pisidium sp.		1	1	2				1		1	0,1
KRÄFTDJUR											
Crustacea											
Trichoniscus sp?						1				1	0,1
Pacifastacus leniusculus		3					2			2	0,1
VATTENKVALSTER											
Hydracarina		1	3	2	1	1				2	0,1
DAGSLÄNDOR											
Ephemeroptera											
Heptagenia sulphurea		2	4	4	1				1	2	0,1
Baetis niger		2	4	3	7	39	7	8	7	68	3,7
Baetis rhodani		2	4	2	2	5	3	2	4	16	0,9
BÄCKSLÄNDOR											
Plecoptera											
Taeniopteryx nebulosa		1	5	4		1				1	0,1
Nemoura avicularis		1	5	4	3	1		1	3	8	0,4
Nemoura cinerea		1	5	2		4	1		2	7	0,4
Leuctra hippopus		1	5	4	2	9	7	1	5	24	1,3
Leuctra nigra		1	5	4		3	2	2	1	8	0,4
Isoperla difformis		1	3	4	1	6	3	1	1	12	0,7
Isoperla grammica		1	3	3					2	2	0,1
Isoperla sp.		1	3	3		2	1	2	2	7	0,4
TROLLSLÄNDOR											
Odonata											
Cordulegaster boltoni		1	3	4			1			1	0,1
SKALBAGGAR											
Coleoptera											
Orectochilus villosus		3	3	2	1	2	3	2	2	10	0,5
Elmis aenea		2	4	4		1	3			4	0,2
Oulimnius tuberculatus		3	4	3		1			1	2	0,1
Oulimnius sp.		3	4	3	8	19	7	10	12	56	3,1
MEGALOPTERA											
Sialis sp.		2	3	3				1		1	0,1
NATTSLÄNDOR											
Trichoptera											
Plectrocnemia conspersa		1	1	3			1			1	0,1
Polycentropus flavomaculatus		1	1	3	2	9	4	3		18	1,0
Polycentropus irroratus		1	1	3		1				1	0,1
Hydropsyche angustipennis		2	1	3		3	8	1	2	14	0,8
Hydropsyche saxonica		4	1	3	5			1		1	0,1
Hydropsyche siltalai		1	1	2			1			1	0,1
Lepidostoma hirtum		2	5	3					1	1	0,1
Limnephilidae		1	5	2			1			1	0,1
Sericostoma personatum		1	5	3				1		1	0,1
TVÄVINGAR											
Diptera											
Eloeophila sp.		3			1					1	0,1
Dicranota sp.		1	3	2	2			1		3	0,2
Simuliidae		1	1	2	150	252	25	51	51	529	29,0
Chironomidae		1	2	1	151	251	2	5	53	462	25,3
Ceratopogonidae		1	3	1	50	2				52	2,8
ANTAL TAXA (exkl sökprov)											
ANTAL TAXA (inkl sökprov)											
INDIVIDANTAL											
Individantal/m²					586	764	120	154	201	1825	100

Vattensystem: MÖRRUMSÅN	Vattendrag/namn: Hejasjöbäcken, Härnäs	Provpunktsbeteckning: BLE-Mo11
Provdatum: 2008-10-23	Koordinater x: 6245830 y: 1432610	Kommun: Karlshamn
Lokaltyp: Bäck Naturligt/grävt: naturligt Läge: Härnäs - 20-30 m upp bro		



Lokal lämplig för provtagning: mycket bra	Påverkan A: styrka: 0
Provet representativt för den provtagna åsträckan: ja	Påverkan B: styrka: 0
Övriga iakttagelser i fält:	Påverkan C: styrka: 0

Bedömning av prov från 2008-10-23

Allmänt	Försurningspåverkan: obetydlig	Föroreningspåverkan: svag	Naturvärde: allmänt
Artantal: högt Individtäthet: måttlig Shannonindex: mycket högt ASPT-index: måttligt EPT-index: måttligt Surhetsindex: högt DFI-index: högt Dominerande taxa: Hydropsyche siltalai, 16% Leuctra hippopus, 15% Chironomidae, 15%	Kriteriepoäng (max 14): 7p ----- Antal taxa: 1p Försurn.känslig sländart: 3p Gammarus: - Bäckbaggar: 1p Iglar: - Musslor: 1p Snäckor: 1p B/P index: -	Indikatorgrupper, renvatten: 4 bäcksländesläkten 2 dagslände familjer 2 familjer husbyggare Elodes, Rhyacophila, Elmia aenea, Limnium volckmari Indikatorgrupper, smutsvatten: Asellus aquaticus, Sialis, Radix, Psychodidae	Kriteriepoäng - totalt: 4p Ovanliga arter: Hydropsyche saxonica, 3p Övriga kriterier: Shannon index: 1 poäng

Kommentarer:
Lokalen uppvisade bra förhållanden och med obetydlig försurningspåverkan. Känsligare sländarter var visserligen få, men artantalet och förekomsten av de flesta andra indikatorgrupperna motiverar bedömningen. Föroreningsgraden var svag och naturvärdet allmänt. Den ovanliga nattsländan Hydropsyche saxonica hittades i proverna.


Jämfört med tidigare har lokalen inte förändrats nämnvärt, t ex vad gäller försurningspåverkan.

Jämförelse med tidigare resultat

Datum	Artantal inkl kval	Individantal per m2	Shannon- index	ASPT- index	EPT- index	BpHI- max	Surhets- index	Försurnings- påverkan	DFI- index	Förorenings- påverkan	Naturvärde index värde
1998-11-26	35	845	4,0	6,6	21	8	7		7		4
1999-11-11	36	1151	4,2	6,5	19	8	5		7		3
2001-10-31	39	1255	3,9	6,4	20	8	9	obetydlig	7	obetydlig	1 allmänt
2004-10-07	46	2623	3,5	6,4	25	8	9	obetydlig	7	obetydlig	9 högt
2008-10-23	38	1246	4,0	6,0	20	8	7	obetydlig	6	svag	4 allmänt

ARTLISTA		Provpunkt		Mo11 Hejasjöbäcken, Härnäs							
Provt.datum 2008-10-23				Provtagningskvalitet						98	
				Delprov (ant ind)				Summa			
Känslighetsgrad/funktion	A	B	C	D	1	2	3	4	5	ant ind	%
GLATTMASKAR					3	2	2	25	25	57	4,6
<i>Oligochaeta</i> övriga	2										
MUSSLOR											
<i>Bivalvia</i>											
<i>Pisidium</i> sp.	1	1	2			8	4			12	1,0
SNÄCKOR											
<i>Gastropoda</i>	3	4	2								
<i>Radix balthica</i> /labiata	3	4	2		1	3	3			7	0,6
KRÄFTDJUR											
<i>Crustacea</i>											
<i>Asellus aquaticus</i>	1	5	2		3	1	6	2	2	14	1,1
DAGSLÄNDOR											
<i>Ephemeroptera</i>											
<i>Leptophlebia marginata</i>	1	4	2					4	1	5	0,4
<i>Leptophlebia</i> sp.	1	4	3		2					2	0,2
<i>Baetis niger</i>	2	4	3		6		4	10	3	23	1,8
<i>Baetis rhodani</i>	2	4	2		14	6	3	11	30	64	5,1
BÄCKSLÄNDOR											
<i>Plecoptera</i>											
<i>Brachyptera risi</i>	2	4	4			1				1	0,1
<i>Nemoura avicularis</i>	1	5	4			3	4	2	1	10	0,8
<i>Nemoura cinerea</i>	1	5	2		5					5	0,4
<i>Nemoura</i> sp.	1	5	3						3	3	0,2
<i>Leuctra hippopus</i>	1	5	4		46	39	22	44	42	193	15,5
<i>Isoperla difformis</i>	1	3	4		2	3	1	4	5	15	1,2
<i>Isoperla grammatica</i>	1	3	3		1			2		3	0,2
<i>Isoperla</i> sp.	1	3	3		1	1		4		6	0,5
TROLLSLÄNDOR											
<i>Odonata</i>											
<i>Cordulegaster boltoni</i>	1	3	4		1	1	1	4	2	9	0,7
SKALBAGGAR											
<i>Coleoptera</i>											
<i>Orectochilus villosus</i>	3	3	2		2	1			2	5	0,4
<i>Hydraena gracilis</i>	3	5	3		5	3	2	7	4	21	1,7
<i>Hydraena riparia</i>	5							2	2	4	0,3
<i>Elodes</i> sp.	2	4	2		1					1	0,1
<i>Elmis aenea</i>	2	4	4		3	15	12	31	11	72	5,8
<i>Limnius volckmari</i>	2	4	4		6	34	22	4	19	85	6,8
<i>Oulimnius tuberculatus</i>	3	4	3			1	1			2	0,2
<i>Oulimnius</i> sp.	3	4	3		2	3	3	2		10	0,8
MEGALOPTERA											
<i>Sialis</i> sp.	2	3	3		1					1	0,1
NATTSLÄNDOR											
<i>Trichoptera</i>											
<i>Rhyacophila nubila</i>	1	3	4			1	1			2	0,2
<i>Lype phaeopa</i>	2	2	4		1			1	1	3	0,2
<i>Plectrocnemia conspersa</i>	1	1	3		8		1	1	1	11	0,9
<i>Polycentropus flavomaculatus</i>	1	1	3		3	5	4	5	4	21	1,7
<i>Polycentropus irroratus</i>	1	1	3		1		1		1	3	0,2
<i>Hydropsyche angustipennis</i>	2	1	3				2	5	2	9	0,7
<i>Hydropsyche saxonica</i>	4	1	3	5		9		2	2	13	1,0
<i>Hydropsyche siltalai</i>	1	1	2		25	65	32	34	41	197	15,8
<i>Limnephilidae</i>	1	5	2		5	1	1	1	1	9	0,7
<i>Glyptotaelius pellucidus</i>	1	5	3		2			1		3	0,2
<i>Potamophylax cingulatus</i>	1	5	2		1				1	2	0,2
<i>Sericostoma personatum</i>	1	5	3		16	12	8	1		37	3,0
TVÄVINGAR											
<i>Diptera</i>											
<i>Dicranota</i> sp.	1	3	2			25	1		3	29	2,3
<i>Pericomini</i>	3	3	1		1					1	0,1
<i>Simuliidae</i>	1	1	2		4	3	1	28	54	90	7,2
<i>Chironomidae</i>	1	2	1		6	32	40	51	55	184	14,8
<i>Ceratopogonidae</i>	1	3	1			1	1			2	0,2
ANTAL TAXA (exkl sökprov)										38	
ANTAL TAXA (inkl sökprov)										38	
INDIVIDANTAL					178	279	183	288	318	1246	100
Individantal/m ²										1246	

Vattensystem: MÖRRUMSÅN/SKRÄBE	Vattendrag/namn: Bäck fr. Skinsagylet, Värhult	Provpunktsbeteckning: BLE-Or11BF
Provdatum: 2008-10-23	Koordinater x: 6230346 y: 1424583	Kommun: Sölvesborg
Lokaltyp: Bäck Naturligt/grävt: naturligt Läge: 0-10 m ned bro		



Lokal lämplig för provtagning: måttlig - lågt flöde + organiskt material	Påverkan A:	styrka: 0
Provet representativt för den provtagna åsträckan: ja	Påverkan B:	styrka: 0
Övriga iakttagelser i fält:	Påverkan C:	styrka: 0

Bedömning av prov från 2008-10-23

Allmänt	Försurningspåverkan: stark - mkt stark	Föroreningspåverkan: obetydlig	Naturvärde: allmänt
Artantal: lågt Individtäthet: måttlig Shannonindex: måttligt ASPT-index: lågt EPT-index: lågt Surhetsindex: mycket lågt DFI-index: lågt Dominerande taxa: Chironomidae, 31% Oligochaeta övriga, 29% Nemoura cinerea, 14%	Kriteriepoäng (max 14): 2p ----- Antal taxa: - Försurn.känslig sländart: 1p Gammarus: - Bäckbaggar: - Iglar: - Musslor: 1p Snäckor: - B/P index: -	Indikatorgrupper, renvatten: 2 bäcksländesläkten 1 dagsländefamilj 1 familj husbyggare Indikatorgrupper, smutsvatten: >100 Oligochaeta Asellus aquaticus, Sialis, Psychodidae	Kriteriepoäng - totalt: 0p

Kommentarer:
Lokalen uppvisade dåliga naturliga förutsättningar med lågt flöde och organisk pålagring. Försurningspåverkan bedömdes som stark, beroende på den låga indexpoängen. Inga känsligare arter hittades i proverna och den enda indikatorgruppen var musslor. Föroreningsgraden är troligen obetydlig, men indexet påverkas negativt av försurningspåverkan och de dåliga naturliga förutsättningarna.

Lokalen har inte förändrats nämnvärt under tre besök och försurningspåverkan har varit stark.


Jämförelse med tidigare resultat

Datum	Artantal inkl kval	Individantal per m2	Shannon- index	ASPT- index	EPT- index	BpHI- max	Surhets- index	Försurnings- påverkan	DFI- index	Förorenings- påverkan	Naturvärde index värde
1999-11-12	16	855	2,8	5,2	4	0	2		4		0
2001-10-30	18	3075	2,4	5,6	8	0	4		4		0
2005-11-16	18	380	2,5	5,5	8	10	5	betydlig	4	obetydlig	0 allmänt
2007-10-30	20	963	2,8	5,3	6	8	3	stark - mkt stark	5	måttlig	0 allmänt
2008-10-23	21	951	2,7	5,3	9	0	2	stark - mkt stark	4	obetydlig	0 allmänt

ARTLISTA		Provpunkt	Or11BF Bäck från Skinsagylet, Värhult						
Provt.datum 2008-10-23			Provtagningskvalitet 100						
		Delprov (ant ind)					Summa		
Känslighetsgrad/funktion	A B C D	1	2	3	4	5	ant ind	%	
GLATTMASKAR									
<i>Oligochaeta</i> övriga	2	26	25	25	100	100	276	29,0	
MUSSLOR									
<i>Bivalvia</i>									
<i>Pisidium</i> sp.	1 1 2		1		2	11	14	1,5	
KRÄFTDJUR									
<i>Crustacea</i>									
<i>Asellus aquaticus</i>	1 5 2	1	2	1	4	2	10	1,1	
DAGSLÄNDOR									
<i>Ephemeroptera</i>									
<i>Leptophlebia marginata</i>	1 4 2	1	3	2	5		11	1,2	
<i>Leptophlebia vespertina</i>	1 4 3		11	14	12	7	44	4,6	
BÄCKSLÄNDOR									
<i>Plecoptera</i>									
<i>Nemoura cinerea</i>	1 5 2	5	44	33	25	25	132	13,9	
<i>Isoperla difformis</i>	1 3 4		3	1	2	1	7	0,7	
<i>Isoperla</i> sp.	1 3 3			1	3	1	5	0,5	
SKALBAGGAR									
<i>Coleoptera</i>									
<i>Colymbetinae</i>	3			1			1	0,1	
MEGALOPTERA									
<i>Sialis</i> sp.	2 3 3			1		1	2	0,2	
NATTLÄNDOR									
<i>Trichoptera</i>									
<i>Polycentropodidae</i>	1 1 2	1					1	0,1	
<i>Plectrocnemia conspersa</i>	1 1 3	4	33	23	21	13	94	9,9	
<i>Polycentropus flavomaculatus</i>	1 1 3	4	1			1	6	0,6	
<i>Hydropsyche angustipennis</i>	2 1 3	1					1	0,1	
<i>Limnephilidae</i>	1 5 2		3	4	1		8	0,8	
<i>Glyptotendipes pellucidus</i>	1 5 3					2	2	0,2	
<i>Limnephilus extricatus?</i>	2 5 3			1			1	0,1	
TVÄVINGAR									
<i>Diptera</i>									
<i>Eloeophila</i> sp.	3		1	1	1		3	0,3	
<i>Pilaria</i> sp.	3				1		1	0,1	
<i>Dicranota</i> sp.	1 3 2	1		2			3	0,3	
<i>Pericomini</i>	3 3 1	1					1	0,1	
<i>Simuliidae</i>	1 1 2		4	25	3		32	3,4	
<i>Chironomidae</i>	1 2 1	3	6	114	115	57	295	31,0	
<i>Tabanidae</i>	3 3 2	1					1	0,1	
ANTAL TAXA (exkl sökprov)							21		
ANTAL TAXA (inkl sökprov)							21		
INDIVIDANTAL		49	137	249	295	221	951	100	
Individantal/m ²							951		

ARTLISTA		Provpunkt		Or30 Ö. Orlundsån, Mynningen							
Provt.datum 2008-11-05				Provtagningskvalitet 94							
				Delprov (ant ind)				Summa			
Känslighetsgrad/funktion	A	B	C	D	1	2	3	4	5	ant ind	%
GLATTMASKAR											
Oligochaeta övriga	2				5	4	52	25	50	136	11,0
Eiseniella tetraedra	2	2	3		1		1			2	0,2
MUSSLOR											
Bivalvia											
Pisidium sp.	1	1	2			1				1	0,1
KRÄFTDJUR											
Crustacea											
Pacifastacus leniusculus	3				1					1	0,1
VATTENKVALSTER											
Hydracarina	1	3	2				2			2	0,2
DAGSLÄNDOR											
Ephemeroptera											
Heptagenia fuscogrisea	1	4	3				1	1		2	0,2
Heptagenia sulphurea	2	4	4		31	18	34	27	37	147	11,9
Leptophlebia marginata	1	4	2		3					3	0,2
Leptophlebia vespertina	1	4	3		1			1		2	0,2
Leptophlebia sp.	1	4	3			1			1	2	0,2
Baetis niger	2	4	3		13	6	11	2	35	67	5,4
Baetis rhodani	2	4	2		39	39	118	27	74	297	24,1
BÄCKSLÄNDOR											
Plecoptera											
Brachyptera risi	2	4	4					1		1	0,1
Protonemura meyeri	1	5	4				1		1	2	0,2
Leuctra hippopus	1	5	4		3				1	4	0,3
SKALBAGGAR											
Coleoptera											
Hydraena riparia	5				1					1	0,1
Elmis aenea	2	4	4		1					1	0,1
Limnius volckmari	2	4	4			1	2			3	0,2
NATTSLÄNDOR											
Trichoptera											
Rhyacophila nubila	1	3	4		1		1			2	0,2
Tinodes pallidulus	4			5			1		1	2	0,2
Tinodes sp.	2	4	2		1		2			3	0,2
Polycentropus irroratus	1	1	3		1					1	0,1
Hydropsyche saxonica	4	1	3	5	10	16	30	19	19	94	7,6
Agapetus ochripes	2	4	3		1					1	0,1
Ithytrichia sp.	3	4	4		1					1	0,1
TVÄVINGAR											
Diptera											
Tipula sp.						1				1	0,1
Eloeophila sp.	3				1					1	0,1
Dicranota sp.	1	3	2		7	3	9	8	31	58	4,7
Pericomini	3	3	1						1	1	0,1
Simuliidae	1	1	2		4	5	86	25	67	187	15,2
Chironomidae	1	2	1		61	5	32	25	57	180	14,6
Empididae	2	3	3					1	25	26	2,1
ANTAL TAXA (exkl sökprov)										30	
ANTAL TAXA (inkl sökprov)										30	
INDIVIDANTAL					187	100	383	162	400	1232	100
Individantal/m²										1232	

Vattensystem: SKRÅBEÅN	Vattendrag/namn: Örsjöån, Järnvägen	Provpunktsbeteckning: BLE-Sk19
Provdatum: 2008-10-23	Koordinater x: 6249321 y: 1413932	Kommun: Olofström
Lokaltyp: Bäck	Naturligt/grävt: naturligt	Läge: 10-20 m ned vägbro



Lokal lämplig för provtagning: mycket bra	Bottentyp: hård	Påverkan A: styrka: 0
Provet representativt för den provtagna åsträckan: ja	Kvalprov substr.: kantsten	Påverkan B: styrka: 0
Övriga iakttagelser i fält:	Övrigt utanför delprov:	Påverkan C: styrka: 0

Bedömning av prov från 2008-10-23											
Allmänt			Försurningspåverkan: obetydlig			Föroreningspåverkan: svag			Naturvärde: allmänt		
Artantal:	måttligt		Kriteriepoäng (max 14):	8p		Indikatorgrupper, renvatten:			Kriteriepoäng - totalt:	3p	
Individtäthet:	måttlig		Antal taxa:	1p		3 bäcksländesläkten			Ovanliga arter:		
Shannonindex:	måttligt		Försurn.känslig sländart:	3p		2 dagsländedefamiljer			Hydropsyche saxonica, 3p		
ASPT-index:	måttligt		Gammarus:	-		1 familj husbyggare					
EPT-index:	måttligt		Bäckbaggar:	1p		Rhyacophila, Limnius volckmari					
Surhetsindex:	högt		Iglar:	-		Indikatorgrupper, smutsvatten:					
DFI-index:	högt		Musslor:	1p		Asellus aquaticus, Sialis					
Dominerande taxa:			Snäckor:	-							
Simuliidae, 65%			B/P index:	2p							
Baetis niger, 9%											
Chironomidae, 6%											

Kommentarer:

Artantalet var måttligt. Av de viktigare djurgrupperna saknades snäckor och iglar. Knottlarven Simuliidae dominerade bottenfaunasamhället, dessa kan tillfälligt finnas i stor mängd för att sedan minska i antal. En försurningskänslig nattslända, Hydropsyche saxonica noterades med en individ. I övrigt saknades försurningskänsliga sländarter. Lokalen bedömdes med viss tvekan vara obetydligt försurningspåverkad, resultatet var något svagt. Lokalen bedömdes vara svagt påverkad av organisk/eutrofierande förorening. En ovanlig art noterades; nattsländan Hydropsyche saxonica. Naturvärdet bedömdes vara allmänt.


Jämförelse med tidigare resultat

Datum	Artantal inkl kval	Individantal per m2	Shannon-index	ASPT-index	EPT-index	BpHI-max	Surhets-index	Försurnings-påverkan	DFI-index	Förorenings-påverkan	Naturvärde index värde
2008-10-23	30	1077	2,2	5,8	16	8	8	obetydlig	6	svag	3 allmänt

ARTLISTA		Provpunkt		Sk19 Örsjöån, Järnvägen							
Provdatum 2008-10-23				Provtagningskvalitet						88	
				Delprov				(ant ind)		Summa	
Känslighetsgrad/funktion	A	B	C	D	1	2	3	4	5	ant ind	%
GLATTMASKAR											
<i>Oligochaeta</i> övriga		2			2	2	1		1	6	0,6
<i>Eiseniella tetraedra</i>		2	2	3		1		1	3	5	0,5
MUSSLOR											
<i>Bivalvia</i>											
<i>Pisidium</i> sp.		1	1	2		4		2		6	0,6
KRÄFTDJUR											
<i>Crustacea</i>											
<i>Asellus aquaticus</i>		1	5	2					1	1	0,1
<i>Pacifastacus leniusculus</i>			3					3		3	0,3
HOPPSTJÄRTAR											
<i>Collembola</i>		1	3	1		2	1			3	0,3
DAGSLÄNDOR											
<i>Ephemeroptera</i>											
<i>Leptophlebia marginata</i>		1	4	2		2	2	2		9	0,8
<i>Leptophlebia vespertina</i>		1	4	3			5			5	0,5
<i>Leptophlebia</i> sp.		1	4	3		1				1	0,1
<i>Baetis niger</i>		2	4	3		23	35	31	5	2	96
<i>Baetis rhodani</i>		2	4	2		6	4	6	1	7	24
BÄCKSLÄNDOR											
<i>Plecoptera</i>											
<i>Nemoura avicularis</i>		1	5	4		9	11	6		6	32
<i>Nemoura cinerea</i>		1	5	2		1	11		3		15
<i>Nemoura</i> sp.		1	5	3			3	4		4	11
<i>Leuctra hippopus</i>		1	5	4		6	8	4	2	13	33
<i>Isoperla difformis</i>		1	3	4		2		2	1		5
<i>Isoperla grammatica</i>		1	3	3		2	4	6	1		13
<i>Isoperla</i> sp.		1	3	3			1				1
SKALBAGGAR											
<i>Coleoptera</i>											
<i>Limnius volckmari</i>		2	4	4			1	1	1	2	5
<i>Oulimnius tuberculatus</i>		3	4	3				2			2
<i>Oulimnius</i> sp.		3	4	3			1			2	3
MEGALOPTERA											
<i>Sialis lutaria</i>		1	3	2				2			2
NATTSLÄNDOR											
<i>Trichoptera</i>											
<i>Rhyacophila nubila</i>		1	3	4			1				1
<i>Plectrocnemia conspersa</i>		1	1	3		1	3	1			5
<i>Polycentropus flavomaculatus</i>		1	1	3			2				2
<i>Polycentropus irroratus</i>		1	1	3				2		1	3
<i>Hydropsyche angustipennis</i>		2	1	3		1			2		3
<i>Hydropsyche saxonica</i>		4	1	3	5	1					1
<i>Limnephilidae</i>		1	5	2				1			1
TVÄVINGAR											
<i>Diptera</i>											
<i>Eloeophila</i> sp.		3						3			3
<i>Pilaria</i> sp.		3					1				1
<i>Dicranota</i> sp.		1	3	2			3	1	1		5
<i>Simuliidae</i>		1	1	2		57	153	110	101	280	701
<i>Chironomidae</i>		1	2	1		4	9		6	51	70
ANTAL TAXA (exkl sökprov)											30
ANTAL TAXA (inkl sökprov)											30
INDIVIDANTAL					122	263	182	134	376		100
Individantal/m ²										1077	1077

ARTLISTA		Provpunkt		Sk22 Byemålaån, vid väg 585								
Provt.datum 2008-10-23				Provtagningskvalitet							93	
				Delprov		(ant ind)			Summa			
Känslighetsgrad/funktion		A	B	C	D	1	2	3	4	5	ant ind %	
GLATTMASKAR												
Oligochaeta övriga		2					1		3		4	0,3
IGLAR												
Hirudinea		3										
Erpobdella octoculata		1	3	2		1	2		1	1	5	0,3
MUSSLOR												
Bivalvia												
Pisidium sp.		1	1	2		4	49	14	20	21	108	7,5
Sphaerium sp.		2	1	2			1				1	0,1
SNÄCKOR												
Gastropoda		3	4	2								
Radix balthica/labiata		3	4	2			1				1	0,1
KRÄFTDJUR												
Crustacea												
Asellus aquaticus		1	5	2		28	2	3	2	2	37	2,6
Ostracoda		3	1	2				1		1	2	0,1
DAGSLÄNDOR												
Ephemeroptera												
Leptophlebia marginata		1	4	2		21	14	23	20	21	99	6,9
Leptophlebia sp.		1	4	3		3			2		5	0,3
Baetis niger		2	4	3		2		6	1	1	10	0,7
Baetis rhodani		2	4	2						1	1	0,1
BÄCKSLÄNDOR												
Plecoptera												
Nemoura avicularis		1	5	4		6	4		8	5	23	1,6
Nemoura cinerea		1	5	2		10	2	11	11	12	46	3,2
Nemoura sp.		1	5	3				3			3	0,2
Leuctra hippopus		1	5	4		3	1	6		6	16	1,1
Isoperla difformis		1	3	4		12	7	17	10	43	89	6,2
Isoperla sp.		1	3	3				4	5	37	46	3,2
TROLLSLÄNDOR												
Odonata												
Onychogomphus forcipatus		2	3	4						1	1	0,1
SKALBAGGAR												
Coleoptera												
Hydraena riparia		5			1	1		1			3	0,2
Elmis aenea		2 4 4			1						1	0,1
Oulimnius tuberculatus		3 4 3							1		1	0,1
Oulimnius sp.		3 4 3			3	1	1	4	25		34	2,4
MEGALOPTERA												
Sialis lutaria		1	3	2		1	3	2		1	7	0,5
NATTSLÄNDOR												
Trichoptera												
Rhyacophila nubila		1	3	4			1		1	2	4	0,3
Lype phaeopa		2	2	4						1	1	0,1
Neureclipsis bimaculata		1	1	2		6	1	1	1		9	0,6
Polycentropus flavomaculatus		1	1	3		5	9		27	11	52	3,6
Polycentropus irroratus		1	1	3		5		1	1	1	8	0,6
Hydropsyche angustipennis		2	1	3		113	60	50	74	62	359	25,0
Hydropsyche siltalai		1	1	2				1			1	0,1
Lepidostoma hirtum		2	5	3				1	1		2	0,1
Limnephiliidae		1	5	2		1		3		1	5	0,3
Glyptotaelius pellucidus		1	5	3					1		1	0,1
Limnephilus sp.		1	5	2		2					2	0,1
Athripsodes aterrimus		2	5	2						1	1	0,1
Athripsodes cinereus		3	5	3			1				1	0,1
Athripsodes sp.		2	5	3			1	1			2	0,1
TVÄVINGAR												
Diptera												
Simuliidae		1	1	2		5		2		3	10	0,7
Chironomidae		1	2	1		57	10	23	110	125	325	22,6
Ceratopogonidae		1	3	1		30	1	3	51	25	110	7,7
Limnophora sp.		3	5	3						1	1	0,1
ANTAL TAXA (exkl sökprov)										35		
ANTAL TAXA (inkl sökprov)										35		
INDIVIDANTAL					320 173 177 356 411					1437		
Individantal/m²										1437 100		

Vattensystem: SKRÅBEÅN	Vattendrag/namn: Vilshultsån, Flyborgstorpet	Provpunktsbeteckning: BLE-Sk33
Provdatum: 2008-10-23	Koordinater x: 6245396 y: 1419131	Kommun: Olofström
Lokaltyp: Bäck	Naturligt/grävt: naturligt	Läge: 0-10 m uppströms gångbro



Provtagning: Jan Pröjts	Antal prov: 5	Tid/prov (s): 60
Sortering: Maja Holmström	Separerade prover: Ja	Provsträcka (m): 1
Artbestämning: Cecilia Holmström	Metod: Handbok för miljöövervakn. 1996	

Lokalens längd (normalt 10 m):	10 m	Vattenhastighet (0-3):	3
Lokalens bredd (provyta, uppsk):	4 m	Vattennivå:	medel
Vattendragsbredd (våtyta):	6 m	Grumlighet:	klart
Lokalens medeldjup (provyta):	0,3 m	Färg:	färgat
Lokalens maxdjup (provyta):	0,5 m	Vattentemperatur:	9 °C

Bottensubstrat och vegetation på provytan

	Dom	Täck		Dom	Täck		Dom	Täck	Dom.art
Findetritus:		0	Finsediment:		0	Överv.veg:		0	
Grovdetritus:	D1	3	Sand:		0	Flytbladsveg:		0	
Fin död ved:	D2	2	Grus:		0	Långskottsveg:		0	
Grov död ved:	D3	1	Fin sten:		1	Rosettväxter:		0	
Utfällningar:		0	Grov sten:	D2	2	Mossor:	D1	2	fontinalis
			Fina block:	D1	3	Makroalger:		0	
			Grova block:	D3	1				
			Häll:		0				

Bottentyp: hård**Kvalprov substr.:** kantblock + mossa**Veg utanför delprov:****Övrigt utanför delprov:****Närmiljö 0-30m bredd, 50m sträcka****Strandzon 0-5m, 50m sträcka**

	Dom	Täck		Dom	Täck		Dom	Dom.art	Subdom.art
Lövskog:		0	Gräs/äng:	D2	2	Träd:	D1	al	gran
Barrskog:		0	Hed:		0	Buskar:	D3		
Blandskog:	D1	2	Hällmark:		0	Gräs/halvgräs:	D2		
Kalhygge:		0	Blockmark:		0	Annan veg:			
Våtmark:		0	Artif mark:	D3	2	Övrigt:			
Aker:		0			0				

Beskuggning (0-3): 1**Dom. markanvändning:** skogsbygd**Tätortsmiljö:** Nej**Lokal lämplig för provtagning:** mycket bra**Provet representativt för den provtagna åsträckan:** ja**Övriga iakttagelser i fält:****Påverkan A:** styrka: 0**Påverkan B:** styrka: 0**Påverkan C:** styrka: 0**Bedömning av prov från 2008-10-23**

Underlag för bedömningar redovisas under respektive kolumn (se förklaringar under Metodik)

Allmänt	Försurningspåverkan: obetydlig	Föroreningspåverkan: obetydlig	Naturvärde: allmänt
Artantal: måttligt Individtäthet: måttlig Shannonindex: högt ASPT-index: högt EPT-index: måttligt Surhetsindex: högt DFI-index: mycket högt Dominerande taxa: Simuliidae, 28% Baetis rhodani, 20% Oligochaeta övriga, 9%	Kriteriepoäng (max 14): 7p ----- Antal taxa: 1p Försurn.känslig sländart: 2p Gammarus: - Bäckbaggar: 1p Iglar: - Musslor: 1p Snäckor: - B/P index: 2p	Indikatorgrupper, renvatten: 5 bäcksländesläkten 2 dagslände familjer 6 familjer husbyggare Rhyacophila, Elmia aenea, Limnius volckmari Indikatorgrupper, smutsvatten: >100 Oligochaeta Sialis	Kriteriepoäng - totalt: 0p

Kommentarer:

Artantalet var måttligt, 33 taxa. Av de viktigare djurgrupperna saknades iglar och snäckor. Riktigt försurningskänsliga sländarter saknades, nattsländan Chimarra marginata som noterades i fjor återfanns tyvärr inte. Några mindre känsliga nattsländor noterades dock; Agapetus ochripes, lthytrichia sp. och Oecetis testacea. Lokalen bedömdes med viss tvekan vara obetydligt försurningspåverkad, resultatet var något svagt. Det är samma bedömning som gjorts tidigare på lokalen. Flera renvattenkrävande arter noterades, därmed bedömdes lokalen vara obetydligt föroreningspåverkad..


Inga rödlistade eller ovanliga arter noterades. Naturvärdet var allmänt.

Jämförelse med tidigare resultat

Datum	Artantal inkl kval	Individantal per m2	Shannon- index	ASPT- index	EPT- index	BpHI- max	Surhets- index	Försurnings- påverkan	DFI- index	Förorenings- påverkan	Naturvärde index värde
2001-10-31	43	4977	3,4	6,0	21	10	8		7		1
2002-11-20	42	1202	3,6	6,0	20	10	10		7		1
2007-10-30	28	1695	3,0	5,8	14	8	8	obetydlig	7	obetydlig	0 allmänt
2008-10-23	33	1987	3,3	6,7	20	8	7	obetydlig	7	obetydlig	0 allmänt

ARTLISTA		Provpunkt		Sk33 Vilshultsån, Flyborgstorpet							
Provt.datum 2008-10-23				Provtagningskvalitet							91
				Delprov (ant ind)					Summa		
Känslighetsgrad/funktion	A	B	C	D	1	2	3	4	5	ant ind	%
GLATTMASKAR											
Oligochaeta övriga		2			4	50	50	50	25	179	9,0
Eiseniella tetraedra	2	2	3			1	1			2	0,1
MUSSLOR											
Bivalvia											
Pisidium sp.	1	1	2		1	1	28	3	2	35	1,8
KRÄFTDJUR											
Crustacea											
Pacifastacus leniusculus		3				1				1	0,1
HOPPSTJÄRTAR											
Collembola	1	3	1							X	
DAGSLÄNDOR											
Ephemeroptera											
Heptagenia sulphurea	2	4	4		4	22	40	18	8	92	4,6
Baetis niger	2	4	3		38	51	40	3	2	134	6,7
Baetis rhodani	2	4	2		88	74	150	50	45	407	20,5
BÄCKSLÄNDOR											
Plecoptera											
Protonemura meyeri	1	5	4		1	3	5	6	3	18	0,9
Amphinemura sulcicollis	1	5	3		4	7	35	17	12	75	3,8
Nemoura cinerea	1	5	2						1	1	0,1
Leuctra hippopus	1	5	4		28	35	30	5	4	102	5,1
Isoperla difformis	1	3	4		3	2	3		1	9	0,5
Isoperla sp.	1	3	3		2	3	6	2		13	0,7
TROLLSLÄNDOR											
Odonata											
Onychogomphus forcipatus	2	3	4				1	4		5	0,3
SKALBAGGAR											
Coleoptera											
Orectochilus villosus	3	3	2			1		1		2	0,1
Elmis aenea	2	4	4		2	11	7	12	6	38	1,9
Limnius volckmari	2	4	4		7	20	46	6	7	86	4,3
Oulimnius sp.	3	4	3		1	3	10	4	1	19	1,0
MEGALOPTERA											
Sialis lutaria	1	3	2		1					1	0,1
NATTSLÄNDOR											
Trichoptera											
Rhyacophila nubila	1	3	4			2		3		5	0,3
Lype phaeopa	2	2	4				1			1	0,1
Neureclipsis bimaculata	1	1	2			1				1	0,1
Polycentropus flavomaculatus	1	1	3		1		1			2	0,1
Hydropsyche pellucidula	1	1	3		1	4		5	4	14	0,7
Hydropsyche siltalai	1	1	2		2	37	25	74	27	165	8,3
Agapetus ochripes	2	4	3			2	2			4	0,2
Ithytrichia sp.	3	4	4				2			2	0,1
Lepidostoma hirtum	2	5	3			1	2			3	0,2
Limnephilidae	1	5	2		2		1		1	5	0,3
Sericostoma personatum	1	5	3					1		1	0,1
Oecetis testacea	3	5	4				1			1	0,1
TVÄVINGAR											
Diptera											
Simuliidae	1	1	2		107	100	151	103	102	563	28,3
Limnophora sp.	3	5	3			1				1	0,1
ANTAL TAXA (exkl sökprov)										32	
ANTAL TAXA (inkl sökprov)										33	
INDIVIDANTAL					297	433	638	368	251	1987	100
Individantal/m ²										1987	

Vattensystem: SKRÅBEÅN	Vattendrag/namn: Ulvsbäck, Norra Holje	Provpunktsbeteckning: BLE-Sk34
Provdatum: 2008-10-23	Koordinater x: 6245289 y: 1419256	Kommun: Olofström
Lokaltyp: Bäck Naturligt/grävt: naturligt Läge: 0-10 m uppströms trumma		



Lokal lämplig för provtagning: mycket bra	Bottentyp: hård	Påverkan A: styrka: 0
Provet representativt för den provtagna åsträckan: ja	Kvalprov substr.: block, mossa	Påverkan B: styrka: 0
Övriga iakttagelser i fält:	Övrigt utanför delprov:	Påverkan C: styrka: 0

Bedömning av prov från 2008-10-23											
Allmänt			Försurningspåverkan: måttlig			Föroreningspåverkan: svag			Naturvärde: allmänt		
Artantal:	måttligt		Kriteriepoäng (max 14):	6p		Indikatorgrupper, renvatten:			Kriteriepoäng - totalt:	0p	
Individtäthet:	måttlig		Antal taxa:	1p		6 bäcksländesläkten					
Shannonindex:	högt		Försurn.känslig sländart:	1p		3 dagsländefamiljer					
ASPT-index:	måttligt		Gammarus:	-		1 familj husbyggare					
EPT-index:	måttligt		Bäckbaggar:	1p		Elmis aenea					
Surhetsindex:	måttligt		Iglar:	-		Indikatorgrupper, smutsvatten:					
DFI-index:	högt		Musslor:	1p		>100 Oligochaeta					
			Snäckor:	-		Asellus aquaticus					
Dominerande taxa:			B/P index:	2p							
Oligochaeta övriga, 22%											
Baetis niger, 21%											
Simuliidae, 11%											

Kommentarer:
Artantalet var måttligt, 30 taxa. Av de viktigare djurgrupperna saknades snäckor och iglar. Försurningskänsliga sländarter saknades och lokalen bedömdes vara måttligt försurningspåverkad. Föroreningspåverkan bedömdes vara svag.

Inga rödlistade eller ovanliga arter noterades. Naturvärdet bedömdes vara allmänt.

Jämförelse med tidigare resultat

Datum	Artantal inkl kval	Individantal per m2	Shannon-index	ASPT-index	EPT-index	BpHI-max	Surhets-index	Försurnings-påverkan	DFI-index	Förorenings-påverkan	Naturvärde index värde
2001-10-31	32	781	3,9	6,2	21	8	4		7		1
2005-11-15	35	1069	3,8	6,1	22	8	6		7		0
2008-10-23	30	632	3,6	6,0	17	8	6	måttlig	6	svag	0 allmänt

ARTLISTA				Provpunkt		Sk34 Ulvsbäck, Norra Holje						
Provdatum 2008-10-23					Provtagningskvalitet						100	
					Delprov (ant ind)					Summa		
Känslighetsgrad/funktion	A	B	C	D	1	2	3	4	5	ant ind	%	
GLATTMASKAR												
<i>Oligochaeta</i> övriga	2				28	29	30	26	25	138	21,8	
MUSSLOR												
<i>Bivalvia</i>												
<i>Pisidium</i> sp.	1	1	2			11	12	2	5	30	4,7	
KRÄFTDJUR												
<i>Crustacea</i>												
<i>Asellus aquaticus</i>	1	5	2					2		2	0,3	
HOPPSTJÄRTAR												
<i>Collembola</i>	1	3	1							X		
DAGSLÄNDOR												
<i>Ephemeroptera</i>												
<i>Heptagenia sulphurea</i>	2	4	4		3	1				4	0,6	
<i>Leptophlebia marginata</i>	1	4	2						1	1	0,2	
<i>Leptophlebia</i> sp.	1	4	3				1			1	0,2	
<i>Baetis niger</i>	2	4	3		38	33	14	20	30	135	21,4	
<i>Baetis rhodani</i>	2	4	2		10	3	3	2	8	26	4,1	
BÄCKSLÄNDOR												
<i>Plecoptera</i>												
<i>Brachyptera risi</i>	2	4	4						1	1	0,2	
<i>Taeniopteryx nebulosa</i>	1	5	4						10	10	1,6	
<i>Protonemura meyeri</i>	1	5	4						2	2	0,3	
<i>Nemoura avicularis</i>	1	5	4					7	9	16	2,5	
<i>Nemoura cinerea</i>	1	5	2		4	4	8	2	2	20	3,2	
<i>Leuctra hippopus</i>	1	5	4			1	2	7	18	28	4,4	
<i>Isoperla difformis</i>	1	3	4					2	9	11	1,7	
<i>Isoperla</i> sp.	1	3	3			2	1	2	7	12	1,9	
TROLLSLÄNDOR												
<i>Odonata</i>												
<i>Cordulegaster boltoni</i>	1	3	4				1			1	0,2	
SKALBAGGAR												
<i>Coleoptera</i>												
<i>Hydraena gracilis</i>	3	5	3				2		2	4	0,6	
<i>Elmis aenea</i>	2	4	4		3	2		1	6	12	1,9	
<i>Oulimnius tuberculatus</i>	3	4	3						1	1	0,2	
<i>Oulimnius</i> sp.	3	4	3		2	3		1	1	7	1,1	
NATTSÄNDOR												
<i>Trichoptera</i>												
<i>Cyrtus trimaculatus</i>	1	1	3				1			1	0,2	
<i>Plectrocnemia conspersa</i>	1	1	3			1	1		5	7	1,1	
<i>Polycentropus flavomaculatus</i>	1	1	3		1	1		2		4	0,6	
<i>Hydropsyche pellucidula</i>	1	1	3		1					1	0,2	
<i>Hydropsyche siltalai</i>	1	1	2				1	2	9	12	1,9	
<i>Limnephilidae</i>	1	5	2						1	1	0,2	
TVÄVINGAR												
<i>Diptera</i>												
<i>Tipula</i> sp.					1					1	0,2	
<i>Dicranota</i> sp.	1	3	2						2	2	0,3	
<i>Simuliidae</i>	1	1	2			1	40	3	27	71	11,2	
<i>Chironomidae</i>	1	2	1		4	2	27	33	2	68	10,8	
<i>Ceratopogonidae</i>	1	3	1				2			2	0,3	
ANTAL TAXA (exkl sökprov)												
										29		
ANTAL TAXA (inkl sökprov)												
										30		
INDIVIDANTAL												
Individantal/m ²					95	94	146	114	183	632	100	
										632		

Bilaga 1. Metodik

Undersökningen har utförts av Ekologgruppen i Landskrona där Jan Pröjts och Håkan Björklund stått för provtagningen. Maja Holmström utförde sorteringsarbetet. Cecilia Holmström har utfört de taxonomiska bestämningarna och Ann Nilsson har sammanställt resultaten. Ekologgruppen är ackrediterat för bottenfaunaundersökningar (metod SS EN 27 828:1 och Naturvårdsverkets "Handledning för miljöövervakning, sjöar och vattendrag - bottenfauna tidsserier", ackred nr 1279).

Undersökningen har omfattat 20 provpunkter i rinnande vatten. Bottenfaunaproverna togs den 23 oktober och 11 november 2008 med den sk sparkmetoden (efter SIS-metod SS-028191). Metodiken följer "Handledning för miljöövervakning, sjöar och vattendrag - bottenfauna tidsserier". Vid varje provpunkt i vattendragen togs 5 sparkprov över en sträcka av vardera 1 m under 60 sekunder. Proven togs över likartade substrat, företrädesvis över hårda bottnar med inslag av block, sten, grus och sand. Delproven har hållits isär. Utöver sparkproven togs ett kvalitativt sökprov under 10 minuter i de miljöer som fanns på lokalen, men som inte blivit representerade i sparkproverna. I praktiken innebar detta ofta att sökprovet riktades mot vegetation i kanten, block, grenar och/eller håvning över ren sandbotten.

Proven konserverades i fält med etanol (80 %) till en koncentration av ca 70 %. En skiss över lokalen och platserna för de enskilda delproven ritades in på en fältblankett. Varje lokal fotograferades och fotopunkt markerades på skissen. På blanketten noterades även uppgifter om bredd, provdjup, flöde, bottensubstrat, vattenvegetation, kantvegetation, beskuggning, anslutande markanvändning samt övriga kommentarer (t ex bedömning av provplatsens lämplighet som bottenfaunalokal och något om de djur som iakttogs direkt i fält). Provpunkternas lämplighet för bottenfaunaprovtagning kommenteras också. Med bra lokal eller bra prov menas i detta sammanhang en lokal med hård botten där olika substrat finns representerade (sand, grus, sten och block) och att djup och vattenflöde inte är större än att man kan gå ut i ån med sjöstövlar. Med en dålig lokal avses en lokal där botten är av annan karaktär t ex mjuk och dyg eller bara består av större block och/eller där det på djup eller flöde ej går att komma ut i åfåran. Sorteringsarbetet har skett på laboratorium under starkt ljus och förstoring.

En sortering och noggrann utplockning av allt insamlat material har skett. För räkning av vissa mikroskopiska djur, som ibland förekommer i så stora mängder att det är orimligt att plocka ut dem (t ex *Chironomidae*, *Simuliidae* och *Oligochaeta*) har 20 % av provet tagits ut och räknats i mikroskop. Artbestämningsarbetet har utförts under preparer- och ljusmikroskop.

Bilaga 2. Resultatbehandling

Art- och individantal

Antalet påträffade taxa (arter) för varje lokal har räknats fram både exklusive och inklusive sökprovets arter. Vid utvärderingen har antalet taxa angivits inklusive sökprovets arter. En beräkning har också gjorts av antalet individer per lokal och per kvadratmeter. Dessa uppgifter skall dock endast ses som mycket grova skattningar, eftersom metoden inte är helt kvantitativ.

Vid utvärderingen kommenteras antal taxa och antal individer med följande begrepp:

	mycket lågt	lågt/litet	måttligt	högt	mycket högt
antal taxa	<15	15 – 24	25 - 34	35 - 45	>45
antal individer/m ²	<100	100 – 500	510 - 2000	2000 - 4000	>4000

Funktionella grupper

Beroende på hur djuren samlar in sin föda kan de delas in i så kallade funktionella grupper:

1. **Filtrerare:** Lever av plankton och detritus från den fria vattenmassan, som de fångar genom att filtrera vattnet med nät eller tentakler.
2. **Detritusätare:** Äter detritus (halvnedbrutet organiskt material med mikrober) på botten.
3. **Predatorer:** Rovdjur som lever av andra djur.
4. **Skrapare:** Äter påväxtorganismer som skrapas loss från botten och vattenväxter.
5. **Sönderdelare:** Lever av grovt organiskt material t ex växtdelar.

Proportionerna mellan de olika funktionella grupperna kan användas som ett index för bottenfaunasamhällets struktur. I ett vattensystem övre delar (bäckar och mindre vattendrag) är sönderdelare (t ex bäcksländor) och skrapare (t ex många nattsländor och dagsländor) vanligare, medan de nedre delarna i vattendraget med mer nedbrutet organiskt material har fler filtrerande och detritusätande djur. Många av de försumningskänsliga djuren är skrapare. I artlistan anges varje taxas funktionella grupp.

Försumningsindex

Försumningspåverkan har angivits för varje lokal enligt försumningsindex (Henriksson & Medin 1990). En bedömning av lokalens hela art- och individsammansättning samt naturliga förutsättningar görs dock alltid för att se så att indexet ger en rättvis bild av lokalens försumningspåverkan. I de fall bedömningen inte följer försumningsindex motiveras det i texten. Indexet har 8 kriterier som vardera ger 1 - 3 poäng. Den sammanlagda poängen för lokalen bedöms i en 3-gradig skala där 0-4 poäng ger bedömningen stark eller mycket stark påverkan, 4-6 poäng ger betydlig påverkan och 6 poäng eller mer ger bedömningen ingen eller obetydlig påverkan. Tanken bakom de flytande gränserna är att poäng, som utdelats för t ex förekomst av någon försumningskänslig dagsländeart, inte skall tillmätas alltför stor betydelse om arten endast påträffas i enstaka exemplar. Ett annat exempel är att om flera kriterier tyder på avsaknad av försumningspåverkan, men t ex antal taxa är för lågt för att ge tillräckligt hög poäng vid fasta poänggränser kan ändå lokalen bedömas som icke påverkad. Kriterierna i försumningsindexet är:

1. Försumningskänsligaste (se artlista, kolumn "A") arten bland dag-, bäck- och nattsländor. Känslighet anges efter Degerman et al 1994 (med något undantag). Kan ge max 3 poäng.
Kritiskt pH-intervall: >5,4 ger 3 p; 5,4 – 5,0 ger 2 p; 4,9 - 4,5 ger 1 p
2. Förekomst av iglar ger 1 poäng
3. Förekomst av skalbaggsfamiljen *Elmidae* ger 1 poäng
4. Förekomst av snäckor ger 1 poäng
5. Förekomst av musslor ger 1 poäng
6. Kvoten mellan antalet individer av dagsländesläktet *Baetis** och antalet bäcksländeindivider, *Baetis/Plecoptera* index > 1,0 ger 2 p; 1,0-0,75 ger 1 p och <0,75 ger ingen poäng.
7. Antal taxa. Över 25 taxa (inkl sökprov)** ger 1 poäng och mer än 40 taxa*** ger 2 poäng.
8. Förekomst av märkräftan *Gammarus sp* ger 3 poäng.

Modifiering

Beteckningen ”ingen eller obetydlig påverkan” har ändrats till ”obetydlig påverkan”. Dessutom är klassindelningen något modifierad. Provpunkter med 6-7 indexpoäng benämns måttligt påverkade och gränsen för ”obetydlig påverkan” har ändrats från ≥ 6 till ≥ 7 , vilket ger följande klassindelning:

0-4 p = stark-mkt stark försumningspåverkan

4-6 p = betydlig påverkan

6-7 p = måttlig påverkan

≥ 7 p = obetydlig påverkan

Föroreningsindex – Dansk faunaindex (DFI)

Påverkan av organisk/eutrofierande förorening har angivits för varje lokal. Som underlag har Dansk Faunaindex använts (Naturvårdsverkets Rapport 4913. Bedömningsgrunder för miljö kvalitet. Sjöar och vattendrag). En bedömning av lokalens hela art- och individsammansättning samt naturliga förutsättningar görs alltid för att se så att indexet ger en rättvis bild av föroreningspåverkan. Vid de lokaler som är försurningspåverkade, blir bedömningen av organisk/eutrofierande påverkan svår, eftersom försurningen slår ut arter som även är viktiga indikatorarter för organisk påverkan. Försvårande för utvärderingen är också om lokalen ligger nära sjöutlopp, där det naturligt utvecklas samhällen med många filtrerande organismer. Detta kan i hög grad påminna om de samhällen som utvecklas nedströms en del punkttutsläpp innehållande organiskt material. En annan yttre faktor som kan vara av betydelse i små vattendrag är risken för uttorkning under torrperioder och bottenfrysning under sträng kyla. Risken för detta är störst på lokaler med mycket små tillrinningsområden.

Dansk faunaindex består av två delar. Först räknar man ut differensen mellan antalet positiva (renvatten) och negativa (smutsvatten) indikatorarter/grupper.

- **Positiva** arter/grupper är: virvelmaskar, släktet *Gammarus*, varje bäcksländesläkte, varje dagslände familj, skalbaggesläktet *Helodes*, och arterna *Elmis aenea* och *Limnius volckmari*, nattsländesläktet *Rhyacophila*, varje familj husbyggande nattsländor, snäckan *Ancylus fluviatilis*.
- **Negativa** indikatorarter/grupper är *Oligochaeta* om 100 eller fler individer hittats, iglarna *Helobdella stagnalis* och *Erpobdella*, sötvattensgråsugga (*Asellus aquaticus*), sävsländesläktet *Sialis*, och av Diptera: familjen *Psychodidae* och släktena *Chironomus* och *Eristalis*, musselsläktet *Sphaerium* och snäcksläktet *Lymnaea*. Eftersom flertalet snäckor i släktet *Lymnaea* numera benämns *Radix*, har vi valt att ersätta *Lymnaea* med *Radix* i indexet.

Det räcker med en individ för att indikatorarten/gruppen skall få poäng. När differensen mellan positiva och negativa indikatorarter/grupper beräknats går man in i en tabell för att få faunaindexet. Differensen avgör i vilken kolumn man går in i. Avgörande för indexvärdet är också vilken rad man går in på. På raderna rangordnas djur i nyckelgrupper där de djur som indikerar den renaste miljön står på översta raden (nyckelgrupp 1). För att få gå in på den översta raden måste mer än en av arterna/grupperna i nyckelgrupp 1 finnas på lokalen. Dessutom måste minst 2 individer av arten/gruppen finnas för att få räknas. Om ingen av nyckelgrupp 1 arterna/grupperna finns på lokalen så går man vidare ner i tabellen till nyckelgrupp 2. För att få gå in på denna raden får inte antalet individer av *Asellus aquaticus* och/eller *Chironomidae* överstiga 4. Andra villkor gäller för några andra rader.

Indexet kan anta ett värde mellan 1 – 7, där klass 7 betecknar den mest opåverkade miljön. Vi har även namnsatt klasserna för **organisk/eutrofierande föroreningspåverkan** enligt nedan. I vissa fall, t ex vid starkt försurningspåverkade lokaler, följs dock inte indexvärdets beteckning.

7 = obetydlig påverkan	3 = stark påverkan
6 = svag påverkan	2 = stark - mycket stark påverkan
5 = måttlig påverkan	1 = mycket stark påverkan
4 = betydlig påverkan	

Naturvärdesindex

Indexet (efter Nilsson, C. et al 2001) har konstruerats för att belysa ett vattendrags naturvärde, främst med hjälp av kriterierna biologisk mångformighet och raritet. En total bedömning av lokalens status ligger dock alltid till grund för den slutgiltiga naturvärdesbedömningen.

Kriteriepoäng ges på följande sätt:

- **Rödlistade arter** (se nedan) i kategori RE, CR, EN och VU ger 16 poäng/art, kategori NT och DD ger 6 p/art.

- **Antal taxa vattendrag:** 41-45 ger 1 p, 46-50 ger 3 p, >50 ger 10 p
- **Antal taxa sjölitoral:** 31-33 ger 1 p, 34-35 ger 3 p, >35 ger 10 p
- **Diversitet (Shannon) vattendrag:** >3,85-4,15 ger 1 p, >4,15 ger 3 p
- **Diversitet (Shannon) sjölitoral:** >3,80-4,00 ger 1 p, >4,00 ger 3 p
- **Raritet:** Varje ovanlig art (se nedan under rödlistade arter) ger 3 p

Poängskala för bedömning av naturvärde:

- ≥ 16 **Mycket högt naturvärde**
- 6-16 **Högt naturvärde**
- 0-6 **Allmänt naturvärde**

Rödlistade arter

Rödlistade arter har klassificerats enligt Gärdenfors (2005) ”Rödlistade arter i Sverige 2005” Artdatabanken, SLU. Kategorierna anges nedan:

Den svenska rödlistans kategorier:

- RE** Regionally Extinct (Försvunnen)
- CR** Critically Endangered (Akut Hotad)
- EN** Endangered (Starkt Hotad)
- VU** Vulnerable (Sårbar)
- NT** Near Threatened (Missgynnad)
- DD** Kunskapsbrist

Alla arter som förts till någon av ovanstående kategorier är för närvarande **rödlistade** i Sverige. De arter som tillhör någon av kategorierna **CR**, **EN** eller **VU** definieras som **hotade**.

För bottenfaunan har även redovisats ”ovanliga” arter. Som underlag vid bedömningen av ”ovanliga” arter har använts Degerman, E. (1994), där resultatet från 5445 skilda lokaler redovisas (Limnodatas databas). För att en art skall klassas som ovanlig måste den förekomma vid mindre än 5 % av dessa lokaler. Även fynddata från Ekologgruppens databas med för närvarande 1506 lokaler från södra Sverige har vägts in vid bedömningen.

Shannons diversitetsindex

Diversitetsindex tar i beaktande både antal arter (taxa) och deras relativa förekomst, dvs hur många individer det finns av en viss art och hur detta antal förhåller sig till det totala individantalet i provet. Ett högre indexvärde anger en högre diversitet och ett mer varierat bottenfaunasamhälle. Däremot tas ingen hänsyn till de förekommande arternas miljökrav. Diversitetsindexet kan ibland, t ex på individfattiga lokaler, bli relativt högt trots att miljön är påverkad. Det tillämpade indexet, **Shannons diversitetsindex (H')** har beräknats enligt följande formel: $H' = -\sum n_i/N \times \log_2 n_i/N$, där n_i = antalet individer av den i:te arten och N = totala antalet individer. Klassningsgränserna beskrivs nedan.

ASPT-index

ASPT-index (average score per taxon) (Armitage m fl 1983) beräknas genom att i provet påträffade organismer identifieras till familjenivå (klass för *Oligochaeta*), varje familj ges ett poängtal som motsvarar dess förorenings tolerans, poängtalerna summeras och poängsumman divideras med det totala antalet ingående familjer. Klassningsgränserna beskrivs nedan.

EPT-index

Detta index redovisar det samlade antalet taxa bland dagsländor (Ephemeroptera), bäcksländor (Plecoptera) samt nattsländor (Trichoptera). Klassningsgränserna beskrivs nedan.

BpHI (BottenpHauna-index)

Det finns flera möjligheter att använda och redovisa BpHI-indexet. Det sätt som använts i denna rapport betecknas som max-BpHI och står för det högsta BpHI-värdet som noterats bland förekommande taxa. Varje taxa har klassats utifrån försurningskänslighet och fått ett indexvärde mellan 1 och 10, där 10 anger det mest försurningskänsliga taxat. I max-BpHI används endast de taxa som har poäng mellan 6 och 10. Om ett sådant taxa har påträffats indikerar det att pH-värdet inte understigit 5,5 under säsongen. För noggrannare beskrivning av indexet, se ”Kalkning av sjöar och vattendrag. SNV Handbok 2002:1”.

Bedömning av tillstånd - vattendrag

Tabellen grundar sig på ”Bedömningsgrunder för miljö kvalitet. Sjöar och vattendrag”. SNV Rapport 4913. Undantaget är EPT-index som grundar sig på Nilsson et al 2001.

Klass	Benämning	Shannons diversitets-index	ASPT-index	Surhets-index	Danskt Fauna-index (DFI)	EPT-index
1	Mycket högt index	>3,71	>6,9	>10	7	>29
2	Högt index	2,97-3,71	6,1-6,9	6-10	6	22-29
3	Måttligt högt index	2,22-2,97	5,3-6,1	4-6	5	12-22
4	Lågt index	1,48-2,22	4,5-5,3	2-4	4	7-12
5	Mycket lågt index	≤1,48	≤4,5	≤2	≤3	≤7

Bilaga 3. Litteratur

Referenser

Degerman, E., Fernholm, B. & Lingdell, P-E. 1994. Bottenfauna och fisk i sjöar och vattendrag, Utbredning i Sverige. Naturvårdsverket. SNV Rapport 4345.

Gärdenfors, U. (ed) 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Henricsson, L. & Medin, M. 1990. Bottenfaunan i 20 vattendrag i Jönköpings län – en biologisk försurningsbedömning. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1990:15.

Miljöstyrelsen. Vejledning nr 5 1998. Biologisk bedömning av vandlöbskvalitet. Köpenhamn.

Naturvårdsverket. 2000. Bedömningsgrunder för miljö kvalitet. Sjöar och vattendrag. Rapport 4913.

Naturvårdsverket. 2002. Kalkning av sjöar och vattendrag. 2002:1.

Nilsson, C. et al. 2001. Bottenfauna i Jönköpings län 2000. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2001:42.

Bestämningslitteratur

Brink, P. 1952. Svensk Insektsfauna. Bäcksländor.

Dall, P.C., Iversen, T.M., Kirkegaard, J., Lindegaard, C. & Thorup, J. 1988. En oversigt over danske ferskvandsinvertebrater til brug ved bedømmelse af forureningen i søer og vandløb. Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet og Miljøkontoret, Storstrøms amtskommune. København.

Edington, J.M. & Hildrew, A.G. 1995. A revised key to the caseless caddis larvae of the British Isles. Freshwater Biological Association (FBA), Scient.Publ. nr 53.

Elliot, J.M. 1977. A key to the British freshwater Megaloptera and Neuroptera. Freshwater Biological Association (FBA), Scient.Publ. nr 35.

Elliot, J.M. & Mann, K.H. 1979. A key to the British freshwater leeches. Freshwater Biological Association (FBA), Scient.Publ. nr 40.

Elliot, J.M., Humpesch, U.H. & Macan, T.T. 1988. Larvae of the British Ephemeroptera. Freshwater Biological Association (FBA), Scient.Publ. nr 49.

Enckell, P.H. 1980. Fåltfauna. Kräfdjur. Lund.

Engblom, E., Lingdell, P-E & Nilsson, A. 1990. Sveriges bäckbaggar - artbestämning, utbredning, habitatval och värde som miljöindikatorer. Ent. Tidskrift 111:105-121.

Engblom, E. & Lingdell, P-E. 1990. Kräfdjur som miljöövervakare. SNV Rapport 3811.

Forchhammer, K. 1986. De danske Rhyacophila-arter. Flora og fauna 92:85-88.

Glöer, P. & Meier-Brook, C. 1994. Süßwassermollusken. Ein Bestimmungsschlüssel für die Bundesrepublik Deutschland. Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung.

Glöer, P. 2002. Die Süßwassergastropoden Nord- und Mitteleuropas. Die Tierwelt Deutschlands, 73 Teil. ConchBooks.

Hansen, M. 1987. The Hydrophiloidea (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica. Volym 18.

Hansen, V. 1973. Danmarks Fauna. Biller, band 34, 36 och 44. Dansk Naturhistorisk Forening. København.

Holmen, M. 1987. The aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. I. Gyrinidae, Haliplidae, Hygrobiidae and Noteridae. Fauna Entomologica Scandinavica. Volym 20.

Hubendick, B. 1949. Våra snäckor. Snäckor i sött och bräckt vatten. Stockholm.

Hynes, H.B.N. 1977. A key to the Adults and Nymphs of British Stoneflies. Freshwater Biological Association (FBA), Scient.Publ. nr 17.

Kaiser, E. W. 1977. Aeg og larver af Sialis-arter fra Skandinavien og Finland. Flora og fauna 83:65-79.

Killeen, I., Aldridge, D. & Oliver, G. 2004. Freshwater Bivalves of Britain and Ireland. Field Studies Council. Cambridge.

Lepneva, S.G. 1971. Fauna of the USSR. Trichoptera. Vol 2. Jerusalem.

Lillehammer, A. 1988. Stoneflies (Plecoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica. Volym 21.

Macan, T.T. 1970. A key to the nymphs of the British species of Ephemeroptera. Freshwater Biological Association (FBA), Scient.Publ. nr 20.

Macan, T.T. 1977. A key to the british fresh- and brackish-water Gastropods. Freshwater Biological Association (FBA), Scient.Publ. nr 13.

Nilsson, A. & Cuppen, J.G.M. 1988. The larvae of North European Colymbetes. Ent. Tidskrift 109:87-96.

Nilsson, A. (ed). 1996. Aquatic insects of North Europe. A taxonomic Handbook. Volume 1. Apollo Books, Stenstrup.

Nilsson, A. (ed). 1997. Aquatic insects of North Europe. A taxonomic Handbook. Volume 2. Apollo Books, Stenstrup.

Nilsson, A. & Holmen, M. 1995. The aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. II. Dytiscidae. Fauna Entomologica Scandinavica. Volym 32.

Reynoldson, T. B. 1978. A key to the British species of Freshwater Triclad. Freshwater Biological Association (FBA), Scient.Publ. nr 23.

Sahlén, G. 1996. Sveriges trollsländor (Odonata). Fältbiologerna.

Savage, A.A. 1989. Adults of the British aquatic Hemiptera Heteroptera. Freshwater Biological Association (FBA), Scient.Publ. nr 50.

Svensson, B.S. 1986. Sveriges dagsländor (Ephemeroptera), bestämning av larver. Ent. Tidskrift 107:91-106.

Wallace, I.D. 1977. A key to larvae and pupae of *Sericostoma personatum* and *Notidobia ciliaris* in Britain. Freshwater Biology 7:93-98.

Wallace, B., Wallace, I.D & Philipson, G.N. 1990. A key to the case-bearing caddis larvae of Britain and Ireland. Freshwater Biological Association (FBA), Scient.Publ. nr 51.

Wallace, B., Wallace, I.D & Philipson, G.N. 2003. Keys to the case-bearing caddis larvae of Britain and Ireland. Freshwater Biological Association (FBA), Scient.Publ. nr 61.



**LÄNSSTYRELSEN
BLEKINGE LÄN**

SE-371 86 Karlskrona
Telefon 0455-870 00
E-post: blekinge@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/blekinge