



Länsstyrelsen
GOTLANDS LÄN

Återinventering 2006 av häckande fåglar på gotländska strandängar

Rapporter om natur och miljö – nr 2007: 17



Återinventering 2006 av häckande fåglar på gotländska strandängar

TOMAS JOHANSSON, STELLAN HEDGREN,
TUOMO KOLEHMAINEN & LARS TYDÉN

Omslagsbild: Storspov (*Numenius arquata*)

Samtliga bilder i rapporten – Stellan Hedgren

ISSN 1653-7041

LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN – VISBY 2007

SAMMANFATTNING

För tredje gången genomfördes inventering av häckande fåglar på de gotländska strandängarna. Samtidigt bedömdes hävden enligt en fyrgradig skala. Samtliga ytor inventerades av samma två personer som vid tidigare tillfällen. Utav de utvalda arterna (änder, vadare, trutar, måsar, tärnor och gulärta) häckade totalt knappt 6500 par, vilket innebär en minskning med ca 1500 par jämfört med 1996 och 2001. Denna ca 20%-iga minskning är i sig oroande, men än mer alarmerande är de kraftiga minskningar som skett för några redan ovanliga arter.

Mest kritiskt är det för vadarna brushane, sydlig kärrsnäppa och rödspov. Med den minskningstakt som rått de senaste fem åren kommer dessa arter inte finnas kvar som häckfåglar på Gotland om fem till tio år! Skälet till minskningen är inte alldeles uppenbar utifrån dessa inventeringar. Hävden har inte förändrats de senaste fem åren om man jämför alla inventerade områden. Däremot har vissa områden blivit alltmer välhävdade och där har också, i en del fall, fågeltätheten avtagit. Det finns dock inga tydliga samband mellan hävd och fågeltäthet.

Faktum är dock att för de mest utsatta vadarna torde måttligt hävdade ytor, där tuvor av fjolårsgräs tillåts finnas kvar, vara klart mest lämpade. Alltför hårt betade ytor, vare sig det är bete av nöt eller gås, gynnar endast vissa arter. Predation och inavel kan vara andra anledningar till de minskade antalen vadarfåglar. Bland de arter som glädjande nog uppvisar positiv utveckling märks främst snatterand, grågås och vitkindad gås.

INLEDNING

För att kunna följa och upptäcka eventuella förändringar i fågellivet genomförde Länsstyrelsen 1996 en första omfattande inventering av de gotländska strandängarnas häckfågelfauna (Hedgren m.fl. 1996). En identisk inventering genomfördes 2001 (Johansson m.fl. 2002). Nu, efter ytterligare fem år, återinventerades ånyo samma strandängar. Tanken är att denna typ av strandängsinventering ska återkomma vart femte år. Förhoppningsvis kommer även ett antal områden inventeras årligen för att på så sätt kunna upptäcka eventuella mellanårsvariationer.

Den betade strandängen utgör en av vårt lands allra fågelrikaste miljöer. Samtidigt är det en miljö som på många håll är starkt hotad. Om beteshävdens minskar eller upphör växer strandängen snabbt igen med buskar, sly och högvuxet gräs, något som missgynnar många fågelarter, bl.a. vadare som tofsvipa, större strandpipare, strandskata och skärfläcka. Omvänt kan ett alltför hårt betestryck medföra att häckningsframgången blir betydligt sämre för flera arter. De olika vadararterna har alltså olika preferenser vad gäller växthöjd. Samma art kan dessutom ha behov av olika växthöjder beroende på "aktivitet", t.ex. boet placeras gärna i en högre tuva, adulternas födosök sker i kortare vegetation, samtidigt som de nyligen kläckta ungarna föredrar högt gräs för att där finna lämplig föda. Det är sålunda inte alldeles enkelt att klargöra hur en lämplig strandäng ska hävdas.

Det finns givetvis flera andra parametrar som påverkar häckningsutfall och fåglarnas överlevnad på en strandäng. Predation, och då främst predation på ägg, är alldeles säkert en viktig faktor. På Gotland utgörs predatorerna främst av räv, kråka, trut och mås. Även i detta avseende kan växthöjden vara avgörande – lägre tuvor kan medföra en större risk att äggen hittas. Träd, telefonstolpar och andra höga föremål kan användas som utkiksplatser för de flygande predatorerna. Det finns emellertid delade meningar om huruvida detta verkligen påverkar bopredationen (Johansson 2001; Ottvall 2004).

Små och isolerade populationer riskerar också att dö ut av rena slumpskäl. En plötslig förändring i miljön kan få förödande konsekvenser om det drabbar en population som bara finns inom en begränsad yta. Vidare kan genetiska faktorer ha en avgörande betydelse, såsom genetisk drift och inavel. Den förstnämnda är en långsam process som resulterar i reducerad genetisk variation och därmed ökad risk att drabbas av t.ex. miljöförändringar. Inavel är en betydligt snabbare process och kan medföra bl.a. en nedsatt fortplantningsförmåga. Vid studier av kärnsnäppan på västkusten framkom att den populationen visade tecken på inavel. Högre dödlighet kunde detekteras såväl under fosterutvecklingen som efter kläckningen (Blomqvist & Pauliny 2007). Miljögifter kan vara ytterligare skäl till minskningar bland de strandhäckande arterna. Det fanns emellertid inga signifikanta samband mellan häckningsframgången hos kärnsnäppa och mängden av klorerade kolväten i äggen, dock hade förstakullen högre halter än andrakullen (Blomqvist & Larsson 2007).

Mängden vätar på en strandäng kan också vara av betydelse, detta trots att många torkar ut på försommaren. Vätarna utgör viktiga födoresurser för många arter (se t.ex. Länsstyrelsen i Kalmar län 2004). På Öland har det visat sig att skärfläckan gärna häckar vid vätar en bit upp på strandängen, åtminstone om strandängen är mycket hårt betad (Svensson m.fl. 1999). Vissa hävdar också att de gotländska strandängarna har blivit torrare de senaste decennierna.

METODER

De 119 strandängsområden som valdes ut 1996 återinventerades 2001 och 2006. Detta senaste år tillkom ytterligare ett område (Asunden), så nu var det alltså 120 områden som inventerades. Ungefär hälften av områdena ingår i Natura 2000, EU:s nätverk av skyddade områden. Inventeringen inriktades på följande fågelgrupper (samma som 1996 och 2001): svanar, gäss, simänder, vadare, måsfåglar, tärnor samt gulärta. Inventeringarna har vid alla tre tillfällena genomförts av Tuomo Kolehmainen (TuKo) och Lars Tydén (LaTy). Att det är samma personer som har gjort alla inventeringarna är en stor fördel vid jämförelser mellan olika arter och år. Eventuella individuella skillnader i uppskattning av antalet fåglar minimeras då, ty samma ”fel” görs på alla inventerade ytor och förmodligen även mellan år.

Samtliga områden inventerades minst två gånger under perioden 15 april-15 juni. De områden som uppvisade hög fågeltäthet inventerades dessutom ytterligare en till tre gånger, d.v.s. ända upp till fem gånger, under den angivna perioden. Totalt gjordes 415 besök, vilket innebär att i genomsnitt besöktes varje område vid nästan 3,5 tillfällen. Vid beräkning av antalet häckande par av olika arter användes samma metodik som tidigare (Tabell 1). Utförliga beskrivningar av de olika metoderna återfinns i Naturvårdsverkets handbok ”Biologiska InventeringsNormer (BIN) – Fåglar” (Naturvårdsverket 1978).

Tabell 1. Diverse metoder för att uppskatta olika fågelgrupper/-arter.

Fågelgrupp/-art	Metod
Knölsvan	Boräkning
Övriga andfåglar	Räkning av antalet stationära hanar som antingen (1) håller ihop med en hona (= par), (2) är ensamma eller (3) uppträder i grupp om 2-5 hanar
Brushane	Räkning av antalet observerade honor
Övriga vadare	Boräkning/revirkartering
Måsar och tärnor	Boräkning
Gulärta	Revirkartering

För varje inventeringsområde bedömdes beteshävdens intensitet enligt en fyrgradig skala:

Väl hävdad – Området väl avbetat. Fjolårsgräs samt filt av gräsförna saknas. Träd- och buskvegetation expanderar ej (3 poäng).

Måttligt hävdad – Måttligt hårt bete. Ruggar av fjolårsgräs finns kvar. Viss gräsförnafilt finns i delar av området. Buskvegetationen har börjat att expandera, och ingen buskröjning tycks ske (2 poäng).

Svagt hävdad – Fjolårsgräs täcker stora delar av området. Förnafilt finns i grässvålen. Busksnår och träd förekommer på den öppna marken (1 poäng).

Ej hävdad – Inga tecken på att området betas eller hävdas på annat sätt. Området täcks av fjolårsgräs och förnafilt samt är delvis igenväxt med höga gräs, buskar och träd (0 poäng).

En genomsnittlig "hävdpoäng" har räknats fram för respektive inventerat område, där 3 poäng är max. Om hävdtilståndet har varierat inom olika delar av ett område, har poängen viktats så att ett område som exempelvis uppskattades vara 25% väl hävdat, 50% måttligt hävdat och 25% svagt hävdat har fått 2,0 "hävdpoäng" ($0,25 * 3 + 0,5 * 2 + 0,25 * 1$).

Rödlistan

I vårt moderna samhälle sker förändringar i allt snabbare takt, vilket också gäller förändringar i miljön. Detta avspeglar sig på att många arter minskat eller helt försvunnit de senaste decennierna. För att analysera tillståndet för alla i Sverige hotade arter har ArtDatabanken, på uppdrag av Naturvårdsverket, tagit fram den s k *rödlistan* (Gärdenfors 2005). Rödlistan redovisar en arts relativa risk att försvinna (Tabell 2).

Tabell 2. Översiktlig definition av rödlistekategorierna. För mer detaljer se Gärdenfors 2005.

EX	(Extinct)	Utdöd
RE	(Regionally Extinct)	Försvunnen
CR	(Critically Endangered)	Akut hotad
EN	(Endangered)	Starkt hotad
VU	(Vulnerable)	Sårbar
NT	(Near Threatened)	Missgynnad
DD	(Data Deficient)	Kunskapsbrist

RESULTAT och DISKUSSION

Skillnader mellan socknar

Inventeringen genomfördes i sammanlagt 22 socknar, varav merparten ligger längs den östra kusten. Utav de 2673 inventerade hektaren stod den östra sidan för knappt 75% (1995,6 hektar). Öja är den socken som har överlägset störst strandängsareal (559,4 hektar, ca 21%), följt av När (286,1 hektar, ca 11%) och Hablingbo (233,4 hektar, ca 9%), (Tabell 3).

Fågeltätheten var även detta år högst i Rone socken (5,89 par/ha), tätt följt av Gothem (5,37 par/ha), därefter Alskog (4,62 par/ha) och Vamlingbo (4,50 par/ha), (Tabell 3). Positiva förändringar skedde främst på Vamlingbos enda lokal (Killingholm), i Gothem och i Alskog (en lokal, norra delen av Lausviken). Påtagligt negativa förändringar var det däremot för socknarna Grötlingbo (minskning med 50% sedan 2001), Fröjel, Näs och Hamra. Skälet till den enorma minskningen i Grötlingbo torde bero på att många bon rövades av den räv som sågs vandra runt på stränderna och ute bland de tidigare så fågelrika skären på södra delen av Grötlingboud.

Anmärkningsvärt är att en så vida berömd fågelsocken som Sundre fortfarande hyser relativt få häckande strandängsfåglar (åtminstone av de arter som inventerades). Detta trots att stora områden har röjts från buskar och snår under senare år. En möjlig förklaring kan vara att det fortfarande är för svagt bete.

Tabell 3. Sockenvis uppdelning av inventerad areal och antalet häckande par/hektar.

Socken	Område	Area (ha) och andel (%)	Par/hektar 1996	Par/hektar 2001	Par/hektar 2006
Rute	0601	58,9 (2,2)	1,49	0,70	0,93
Othem	0201	94,1 (3,5)	-	-	1,35
Gothem	2501-2506	109,7 (4,1)	4,19	3,96	5,37
Västergarn	5601-5602	20,8 (0,8)	3,18	4,51	4,14
Sanda	5701-5702	56,2 (2,1)	2,95	3,22	3,10
Klinte	6101	20,1 (0,8)	3,58	3,53	3,58
Fröjel	6201	13,3 (0,5)	2,93	3,38	2,26
Eksta	6301-6303	62,8 (2,4)	3,74	3,44	3,10
Sproge	6401-6402	53,6 (2,0)	3,83	4,54	3,58
Alskog	6601	13,2 (0,5)	3,18	4,09	4,62
Lau	7001-7002	82,3 (3,1)	1,82	1,40	1,07
När	7101-7111	286,1 (10,7)	1,81	1,71	1,24
Burs	7201-7206	123,3 (4,6)	3,81	4,14	3,22
Rone	7701-7706	118,0 (4,4%)	6,73	6,61	5,89
Hablingbo	8301-8308	233,4 (8,7)	2,48	2,60	2,02
Grötlingbo	8601-8608	138,5 (5,2)	5,30	4,74	2,39
Näs	8701-8708	185,4 (6,9)	4,49	4,51	3,10
Fide	8801-8806	137,8 (5,2)	2,89	1,92	1,36
Öja	8901-8925	559,4 (21,0)	2,69	3,08	2,38
Hamra	9001-9013	156,6 (5,9)	5,42	4,01	2,74
Vamlingbo	9101	31,8 (1,2)	2,20	3,84	4,50
Sundre	9201-9206	117,7 (4,4)	1,77	1,70	1,68

Skillnader mellan områden

De högsta koncentrationerna av häckande strandängsfåglar återfanns längs östra kusten, från Gothem ner till Hamra, med undantag för ett område ute på Näsudden (Tabell 4).

Under 2006 var område 7706 (Sigdesholm/Rone Innerholme) i Rone det område som hade klart högst antal häckande par per hektar. Det var likadant under 2001 och även 1996 hyste området synnerligen höga koncentrationer (Tabell 5). Huvudskälet är de stora kolonierna av fiskmåsar och silvertärnor och i viss mån gråtrut som häckar på ön.

Tabell 4. De tio områdena 2006 med de högsta tätheterna av de inventerade strandängsfåglarna (antal par/hektar).

Par/hektar	Område	Socken	Area (ha)	Hävdpoäng
22,18	7706	Rone	29,4	2,1
11,03	2503	Gothem	3,9	1,2
8,38	9002	Hamra	8,0	2,7
6,90	9011	Hamra	4,2	2,2
6,86	7206	Burs	5,1	1,7
6,51	2501	Gothem	10,9	2,2
6,08	8920	Öja	15,3	2,7
5,64	2504	Gothem	5,5	0,8
5,15	7705	Rone	32,8	2,8
5,02	8707	Näs	24,1	2,0
<i>Medeltal</i>			13,9	2,0

Tabell 5. De tio områdena med de högsta tätheterna av de inventerade strandängsfåglarna vid inventeringarna 1996 och 2001.

1996					2001				
Par/ha	Område	Socken	Areal	Hävd	Par/ha	Område	Socken	Areal	Hävd
24,63	9002	Hamra	8,0	1,6	20,27	7706	Rone	29,4	2,0
16,90	7706	Rone	29,4	2,1	10,45	8603	Grötlingbo	29,1	2,4
13,66	8920	Öja	15,3	2,2	9,00	8919	Öja	3,0	2,0
12,30	8603	Grötlingbo	29,1	1,7	8,69	8708	Näs	13,0	2,6
10,71	9011	Hamra	4,0	0,5	7,93	7202	Burs	5,8	3,0
10,46	8708	Näs	13,0	3,0	7,78	9001	Hamra	16,7	2,5
8,86	9001	Hamra	16,7	2,3	7,38	9011	Hamra	4,2	0
7,84	7206	Burs	5,1	0	7,13	9002	Hamra	8,0	2,5
7,46	8606	Grötlingbo	13,8	1,8	7,06	8920	Öja	15,3	2,0
7,18	2503	Gothem	3,9	2,5	6,85	8707	Näs	24,1	2,8
<i>Medeltal</i>			13,8	1,8	<i>Medeltal</i>			14,9	2,2

Det finns fler områden som vid varje inventeringsår hyst höga koncentrationer, t.ex. område 8920, sydspetsen ute på Faludden (Tabell 5). Orsaken är främst närvaron av en skrattnåskoloni. Den bestod 1996 utav drygt 100 par men har under de senaste åren bestått av 25-30 par. Även område 9011, innanför norra delen av Ajnviken i Hamra, har alltid haft höga tätheter. I detta lilla område är det dock ändarna som dominerar. Ytterligare ett område i Hamra (9002), alldeles söder om Inre Stockviken, har alltid höga tätheter av

strandängsfåglar. Att de högsta koncentrationerna var just här 1996 berodde i huvudsak på en stor skrattnåskoloni (99 par). Denna koloni fanns inte vare sig 2001 eller 2006.


Generellt kan sägas att höga tätheter ofta medför att området också hyser många häckande arter. Detta stämmer väl med områdena 7705, 7706 och 8920 (Tabell 6). En annan viktig parameter är också givetvis områdets storlek. Ett stort område har ofta bättre förutsättningar att innehålla mer varierande förhållanden i t.ex. växthöjd och fuktighet. Denna variation och mångfald av mikrohabitat medför att området lämpar sig för fler arter, då vadarna har olika preferenser på sina livsmiljöer. Antal arter inom ett område kan därför ses som god indikator på områdets kvalitet. En stor variation av mikromiljöer gynnar heller inte bara fågellivet, utan även många arter insekter och växter.

Tabell 6. Områden med 19 eller fler arter.

Antal arter	Område	Socken	Area (ha)	Hävdpoäng
24	7706	Rone	29,4	2,1
23	0201	Othem	94,1	2,5
23	8916	Öja	60,0	2,4
20	7705	Rone	32,8	2,8
20	8915	Öja	42,8	2,5
20	9101	Vamlingbo	31,8	1,5
19	8920	Öja	15,3	2,7
<i>Medeltal</i>			43,7	2,4

Hävden

Mellan 1996 och 2001 blev de inventerade områdena betydligt mer välhävdade (Figur 1, $N=119$, t-test $p < 0,01$). Det var dock ingen som helst skillnad mellan 2001 och 2006 (Figur 1, $N=119$, t-test $p > 0,8$).




Figur 1. Jämförelse i hävd mellan de tre inventeringsåren. De inventerade områdena blev signifikant mer välhävdade mellan 1996 och 2001. Mellan 2001 och 2006 var det ingen skillnad. Felstaplarna motsvarar 95%-igt konfidensintervall.


Det är dock inte alla de inventerade arterna som trivs bäst i alltför välhävdade omgivningar. Detta återspeglas i det faktum att de områden som hyste flest arter och hade högsta fågelkoncentrationerna hade i genomsnitt mellan 1,8 och 2,4 i hävdpoäng, (utav maximala 3 poäng, Tabell 4-6). Det är alltså inte de områden som var mest hävdade som har flest fåglar, utan de områden som är måttligt hävdade, eller har en stor variation av hävden inom området.

Förmodligen är det även många fler faktorer som avgör storleken och utseendet av ett områdes fågelfauna. Många av änderna och en del vadare, t.ex. brushane, rödspov och storspov, enkelbeckasin och rödbena vill ha ruggar av fjolårsgräs att häcka i. För många vadares ungar fungerar dessutom högre gräs som skydd och som lämpliga födoplatser.


Delas inventeringsområdena upp i mindre geografiska enheter och man studerar hur fågeltäthet och hävd förhåller sig till varandra finner man inga gemensamma samband. Inom vissa områden korrelerar hävdstatusen med fågeltätheten, ibland inte (Figur 2-10).




Figur 2. Fågeltätheten ökade markant senaste fem åren, samtidigt som hävden kontinuerligt har blivit lägre.




Figur 3. Ingen större skillnad i fågeltätheten. Hävden har dock varierat något under tioårsperioden.




Figur 4. En viss samstämmighet kan skönjas – lägre fågeltäthet vid mindre hävd.




Figur 5. Här är förhållandet tvärtom – fågeltätheten avtog då områdena blev något mer välhävdade.




Figur 6. Fågeltätheten har minskat något och hävden likaså.




Figur 7. Fågeltätheten minskade dramatiskt 2006. Hävden har återgått till 1996-års nivå efter en relativt kraftig ökning.



Figur 8. En mycket kraftfull minskning 2006! Samtidigt har hävden successivt ökat för varje inventeringsomgång och Grötlingbo är numer mycket välhävdad.



Figur 9. I dessa tre sydostliga socknar minskar fågeltätheten medan strandängarna blir alltmer välhävdade.



Figur 10. Fågeltätheten har varit konstant låg. Hävden är till och med lägre än för tio sedan, efter en ökning 2001.

Skälet till den enorma minskningen av strandängsfåglar i Grötlingbo (Figur 8) beror sannolikt på att många bon och kanske även vuxna fåglar tagits av räv. Vid flera inventeringstillfällen sågs räv ströva omkring i delområdena.

Att hävden har blivit betydligt högre i de sydostliga socknarna Grötlingbo-Fide-Öja-Hamra kan bero på de vitkindade gässen som årligen under främst april-maj rastar i mycket stora antal på strandängarna. Även om inte gässen är huvudorsaken till det högre betestrycket kan de i kombination med övriga betesdjur, framförallt nöt, bidra till att vadarna får sämre förutsättningar för sin fortlevnad. Det kan vara så paradoxalt att de vitkindade gässen, för vilka fredade områden har skapats på Faludden, bidrar till ett alltför hårt bete. Samtidigt måste dock nämnas att i andra gästata socknar, t.ex. Lau-När-Burs, finns inte alls samma ökning av hävden.

Det kan tyckas som om en hävdpoäng på ungefär 2 (måttlig hävd), ger den högst fågeltätheten. Vid både högre och lägre hävd tenderar fågeltätheten att minska (Figur 3, 4, 6 och 9). Man ska dock inte dra alltför långtgående slutsatser utifrån den uppskattade hävdpoängen, då inga egentliga mätningar har gjorts utan de består av en relativt grov bedömning. De allra flesta områden utgörs trots allt av åtminstone en viss variation i växthöjd.

En annan parameter som nästan försvunnit som hävdmetod på strandängarna är slåttorn. För bara 50 år sedan slogs många av dagens strandbeten. Det är inte alls otroligt att detta kan vara en viktig orsak till flera arters vikande populationsutveckling. Försök borde göras där betet ersätts med slåtter. Ett stort bekymmer är att slåttorn är betydligt mer tids- och kostnadskrävande.

Antal häckande arter och individer

Under inventeringen 2006 påträffades 31 häckande arter tillhörande någon av de fågelgrupper som inventeringen avsåg att omfatta (se ovan), vilket var samma antal som 2001 (Tabell 7). Det var däremot ytterligare en art 1996. Den saknade arten var dvärgmåss som för tio år sedan häckade med ett par på Faludden.

Det var 2006 betydligt färre häckande par än tidigare år (6462 st v/s 8085 resp 8066 st). För många arter var det därför påtagligt lägre antal. Det är sålunda en dyster utveckling som skett senaste fem åren. För detaljerade uppgifter för respektive art, se ”Artpresentationer” på kommande sidor.

Mest tragiskt torde vara att sällsynta arter som brushane, kärrsnäppa och rödspov uppvisar så alarmerande låga antal. Med samma minskningstakt är dessa tre arter ett minne blott i den gotländska häckfågelfaunan inom endast fem till tio år! Samma enormt dåliga förutsättningar gäller för gulärlan, som nu bara häckade med ett enda par på strandängarna.

Tre av andarterna har minskat i numerär - kricka, stjärtand och årta. För de två sistnämnda är det oroväckande då de redan tidigare klassats som missgynnad respektive sårbar (Gärdenfors 2005). Stabila populationer tycks det vara för gräsand, skedand och gravand.

Tabell 7. Artvis jämförelse mellan de tre inventeringsåren.

Art	Häckande par 1996	Häckande par 2001	Häckande par 2006	Par/ha 1996	Par/ha 2001	Par/ha 2006	Antal (andel) omr. 1996	Antal (andel) omr. 2001	Antal (andel) omr. 2006
Knölsvan	71	99	79	0,03	0,04	0,03	48 (40%)	46 (39%)	48 (40%)
Grågås	105	145	321	0,04	0,06	0,12	26 (22%)	41 (34%)	71 (59%)
Vitkindad gås	61	183	233	0,02	0,07	0,09	10 (8%)	3 (3%)	2 (2%)
Gravand	550	790	569	0,21	0,31	0,22	96 (81%)	104 (87%)	104 (87%)
Snatterand	24	46	57	0,01	0,02	0,02	21 (18%)	36 (30%)	35 (29%)
Kricka	238	189	131	0,09	0,07	0,05	68 (57%)	65 (55%)	60 (50%)
Gräsand	243	323	299	0,09	0,13	0,12	79 (66%)	102 (86%)	97 (80%)
Stjärtand	24	31	13	0,01	0,01	0,005	13 (11%)	20 (17%)	9 (8%)
Årta	63	27	21	0,02	0,01	0,01	41 (34%)	24 (20%)	17 (14%)
Skedand	210	213	220	0,08	0,08	0,09	80 (67%)	69 (58%)	84 (70%)
Strandskata	724	698	534	0,28	0,27	0,21	116 (97%)	117 (98%)	116 (97%)
Skärfläcka	427	514	193	0,17	0,20	0,07	83 (70%)	72 (61%)	56 (47%)
St. strandpipare	674	611	470	0,26	0,24	0,18	105 (88%)	101 (85%)	101 (84%)
Ljungpipare	3	1	11	0,001	0,000	0,004	3 (3%)	1 (1%)	7 (6%)
Tofsvipa	948	1001	722	0,37	0,39	0,28	115 (97%)	111 (93%)	111 (93%)
Kärnsnäppa	35	23	8	0,01	0,01	0,003	19 (16%)	13 (11%)	6 (5%)
Brushane	109	111	7	0,04	0,04	0,003	33 (28%)	24 (20%)	5 (4%)
Enkelbeckasin	265	351	254	0,10	0,14	0,10	93 (78%)	97 (82%)	87 (73%)
Rödspov	33	31	8	0,01	0,01	0,003	19 (16%)	18 (15%)	5 (4 %)
Storspov	98	76	51	0,04	0,03	0,02	61 (51%)	56 (47%)	33 (28%)
Rödbena	721	615	621	0,28	0,24	0,24	117 (98%)	114 (96%)	118 (98%)

Art	Häckande par 1996	Häckande par 2001	Häckande par 2006	Par/ha 1996	Par/ha 2001	Par/ha 2006	Antal (andel) omr. 1996	Antal (andel) omr. 2001	Antal (andel) omr. 2006
Roskarl	258	174	153	0,10	0,07	0,06	77 (65%)	73 (61%)	65 (54%)
Dvärgmåå	1	0	0	0,000	0,000	0,000	1 (0,8%)	0 (0%)	0 (0%)
Skrattmåå	400	129	123	0,16	0,05	0,05	25 (21%)	14 (12%)	11 (9%)
Fiskmåå	626	585	507	0,24	0,23	0,20	86 (72%)	82 (69%)	85 (71%)
Gråtrut	177	193	119	0,07	0,08	0,04	13 (11%)	8 (7%)	8 (7%)
Havstrut	22	31	23	0,01	0,011	0,01	8 (7%)	12 (10%)	11 (9%)
Kentsk tårna	7	4	6	0,003	0,002	0,002	6 (5%)	2 (2%)	5 (4%)
Fisktårna	165	65	29	0,06	0,03	0,01	44 (37%)	20 (17%)	16 (13%)
Silvertårna	663	674	577	0,26	0,26	0,22	85 (71%)	97 (82%)	89 (74%)
Småtårna	130	128	102	0,05	0,05	0,04	69 (58%)	67 (56%)	55 (46%)
Gulårla	11	5	1	0,004	0,002	0,000	6 (5%)	3 (3%)	1 (1%)
Totalt	8085	8066	6462	3,14	3,13	2,51			

Den enda andarten som uppvisar stigande kurva är snatteranden. Snatteranden återfinns främst längs Östersjökusten, från Öland och Gotland till norra Uppland, men häckar även lokalt i några av de rikaste fågelsjöarna (Svensson m.fl. 1999). Den var tidigare rödlistad men har nu bedömts ha en livskraftig population.

Bland vadarna, förutom för de tre arterna som nämnts ovan, har det skett minskningar även för strandskata, större strandpipare, tofsvipa, skärfläcka, storspov och roskarl. De tre förstnämnda arterna är typiskt vanliga arter. Det är alltså inte bara ovanliga arter som gått tillbaka utan även de vanliga. Anledningen till att minskningar skett är givetvis svårt att uttala sig om. Både strandskata och tofsvipa är långlivade arter vilket kan innebära att ett återkommande misslyckande av häckningar får genomslag först när de vuxna fåglarna slutligen efter 15-20 (eller kanske t.o.m. 30 år) dör. Det kan alltså vara en långsam process som skett för flera decennier sedan som man först nu ser resultatet av.

För "vitfåglarna" ser det mest dystert ut för fisktärnan. Även gråtrut och småtärna har haft en negativ utveckling. För övriga arter tycks populationerna vara stabila. Detta gäller även för skrattnåsen som haft en låg med stabil population de senaste fem åren. Det svenska beståndet av skrattnås har dock minskat kraftigt under de senaste decennierna (Svensson m.fl. 1999). På Gotland häckade knappt 19 000 par 1965 för att 1995 vara nere i ca 4 000 par (Martinsson 1997).

Förutom snatteranden har stora ökningar skett för grågås och vitkindad gås. För de båda gåsararterna har det varit synnerligen positiv populationsutveckling, inte bara på Gotland utan även i riket totalt. Enligt den svenska häckfågeltaxeringen har populationerna två- till tredubblats under senaste tio åren (www.biol.lu.se/zooekologi/birdmonitoring).

ARTPRESENTATIONER


Presentation av respektive inventerad art. Under artens namn finns i förekommande fall uppgifter om hotkategori. Klassningen är hämtad från "Rödlistade arter i Sverige 2005" (Gärdenfors 2005, se vidare under Metoder). I den övre tabellen finns uppgifter om det totala antalet funna häckande par 1996, 2001 och 2006 (åskådliggörs också i grafen under), samt i hur många av de 120 inventerade områdena som arten bedömdes häcka. Observera att det ofta är olika skala på respektive arts y-axel.

I den undre tabellen listas de områden med respektive arts högsta tätheter 2006, uttryckt som par/hektar, d.v.s. antalet funna par delat med respektive områdes storlek. Mellan tabellerna finns en kortare sammanställning av populationsutvecklingen.

Knölsvan (*Cygnus olor*)

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	71	99	79
Antal områden	48	46	48



Knölsvanen har gått tillbaka till samma numerär som för tio år sedan. Det har dock hela tiden rört sig om ungefär samma antal områden. Den uppträder i ca 40% av alla områden men allt som oftast bara med ett eller några par.



Områden med de högsta tätheterna

<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
0,50	4	9002	Hamra
0,27	12	8301	Hablingbo
0,24	1	9011	Hamra
0,20	1	7206	Burs
0,18	2	2501	Gothem

Grågås (*Anser anser*)

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	105	145	321
Antal områden	26	41	71



Grågåsen ökar - mer än en fördubbling sedan 2001 års inventering. Grågåsen återfanns nu i 71 av de 120 områdena (59%). I likhet med gravanden (se nedan) kan grågåsen häcka långt från stranden, och åtskilliga av de par som "bokförts" på något av de inventerade strandängsområdena har säkert häckat betydligt längre inåt land.


Områden med de högsta tätheterna

<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
1,32	20	5602	Västergarn
1,28	5	2503	Gothem
1,27	7	2504	Gothem
1,13	9	9002	Hamra
1,01	11	2501	Gothem

Vitkindad gås (*Branta leucopsis*)

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	61	183	233
Antal områden	10	3	2



Av de inventerade områdena återfinns den vitkindade gåsen som häckfågel endast i två områden i Rone - på öarna Getorskär och Sigdesholm (Rone Innerholme). Arten fortsätter dock att öka. För övrigt häckar drygt 5000 par på Laus holmar, vilka ej ingick i denna inventering.


Områden med de högsta tätheterna

<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
6,05	178	7706	Rone
1,68	55	7705	Rone

Gravand (*Tadorna tadorna*)

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	550	790	569
Antal områden	96	104	104



En återgång till det antal som rådde för tio år sedan. Gravanden är fortfarande den i särklass talrikaste av de inventerade andfåglarna. Många av de gravandspar som förts till något av de inventerade områdena häckar, i likhet med grågåsen, dock i själva verket inte inom respektive område utan längre in i land, i vissa fall flera kilometer från stranden.

Gotlands västra sida hade proportionellt sett betydligt fler gravänder än den östra sidan. Samtliga delområden (utom ett) i de västra kustsocknarna hyste åtminstone ett par, de flesta betydligt fler.



Områden med de högsta tätheterna

<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
1,90	8	9011	Hamra
1,54	6	2503	Gothem
1,36	18	6601	Alskog
1,18	6	7206	Burs
1,08	31	8308	Hablingbo

Snatterand (*Anas strepera*)

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	24	46	57
Antal områden	21	36	35



Ökningen fortsätter, dock inte i samma takt. Den enda andarten som uppvisar en tydlig ökning. Snatteranden är dock sällan talrik i något område, utan återfinns ofta med ett eller två par. Den tycks föredra västra sidan (Västergarn-Sproge) framför den östra. Snatteranden är inte längre rödlistad, utan populationen bedöms nu vara livskraftig.


Områden med de högsta tätheterna

<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
0,38	3	9002	Hamra
0,31	4	8708	Näs
0,23	4	5701	Sanda
0,20	3	5602	Västergarn
0,20	1	7206	Burs

Kricka (*Anas crecca*)

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	238	189	131
Antal områden	68	65	60



Oroväckande stor minskning – kurvan fortsätter oförändrat nedåt. Nu är det bara drygt hälften av de häckande paren kvar, jämfört med 1996. Även antalet områden med häckande krickor minskar, om än inte i alls lika hög takt. Till skillnad från snatteranden kan krickan betraktas som mer ”sydlig” i sin utbredning på Gotland.

Det är dock mycket få krickor som häckar på strandängar, utan den största delen av det svenska beståndet häckar vid sjöar och småvatten i inlandet (Svensson m.fl. 1999).


Områden med de högsta tätheterna

<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
1,00	8	9002	Hamra
0,71	3	9011	Hamra
0,40	9	8925	Öja
0,27	4	7701	Rone
0,26	1	2503	Gothem

Gräsand (*Anas platyrhynchos*)

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	243	323	299
Antal områden	79	102	97



Gräsanden tycks ha en relativt stabil population på ön. Noterbart är att tre av de fem tätaste områdena är längs Gothemskusten.

Gräsanden är Sveriges i särklass vanligaste simand och återfinns allmänt till tämligen allmänt över hela landet (Svensson m.fl. 1999).

Områden med de högsta tätheterna


<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
0,88	7	9002	Hamra
0,85	4	2502	Gothem
0,81	15	6402	Sproge
0,77	3	2503	Gothem
0,73	4	2504	Gothem

Stjärtand (*Anas acuta*)

Missgynnad, NT

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	24	31	13
Antal områden	13	20	9



En stor minskning! Nu är det bara 13 konstaterade häckande par vilket är alarmerande lågt. Stjärtanden är numer den mest sällsynta simanden på Gotland. För drygt 25 år sedan uppskattades antalet häckande stjärtänder vara ca 150 par (Gustafsson & Högström 1981).

De högsta tätheterna blir missvisande då det är så få häckande par – det ”gynnar” små områden. Klart är dock att Furilden och Kyrkbingegrund är i topp med tre häckande par. I övrigt återfinns stjärtanden endast på och runt Faludden i sydost!


Områden med de högsta tätheterna

<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
0,26	1	2503	Gothem
0,13	1	9002	Hamra
0,05	3	2505	Gothem
0,04	1	8903	Öja
0,04	1	8923	Öja

Årta (*Anas querquedula*)
Sårbar, VU

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	63	27	21
Antal områden	41	24	17



Årtan fortsätter att minska, dock inte alls i samma höga takt som under den tidigare femårsperioden. Nu var det dock bara fyra områden innehållande mer än ett häckande par, varav tre är belägna i Västergarn och ett i Fröjel.

Årtorna på Gotland återfinns nästan uteslutande längs den västra kusten. Är tillsammans med stjärtanden den mest sällsynta simanden på Gotland. Årtan ställer höga krav på sin häckningsmiljö (Svensson m.fl. 1999). Den vill gärna ha grunda näringsrika sjöar omgivna av strandängar eller tuviga mader.

Områden med de högsta tätheterna


<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
0,35	2	5601	Västergarn
0,26	1	2503	Gothem
0,18	1	2504	Gothem
0,13	2	5602	Västergarn
0,13	1	9002	Hamra

Skedand (*Anas clypeata*)

Missgynnad, NT

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	210	213	220
Antal områden	80	69	84



Ingen förändring i antalet häckande skedänder och antalet områden är i princip samma antal som 1996. Skedanden är efter gräsanden den vanligaste simanden på Gotland. Tre av de fem högsta tätheterna återfinns i Gothem (i trakterna av Botvaldevik).



Områden med de högsta tätheterna

<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
1,28	5	2503	Gothem
1,25	10	9002	Hamra
0,53	3	5601	Västergarn
0,46	5	2501	Gothem
0,43	2	2502	Gothem

Strandskata (*Haematopus ostralegus*)

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	724	698	534
Antal områden	116	117	116



Funnen i 97% av de inventerade områdena (alla utom fyra). Det var dock nu 2006 betydligt färre par än föregående inventeringar, en minskning med ca 25%. Strandskatan var tidigare efter tofsvipan den talrikaste av strandängens vadare, men har nu passerats av rödbenan.



Områden med de högsta tätheterna

<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
0,71	3	8917	Öja
0,63	5	9002	Hamra
0,59	3	7201	Burs
0,55	6	2501	Gothem
0,54	23	8915	Öja
0,54	16	8708	Rone

Skärfläcka (*Recurvirostra avosetta*)

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	427	514	193
Antal områden	83	72	56



En halvering av antalet skärfläckor under de senaste fem åren. Läget ser en smula dystert ut för denna karaktärsart för Gotland, för vilken de gotländska strandängarna utgör ett av kärnområdena. Skärfläcka är en förhållandevis lätttrörlig art som inte sällan byter häckningslokal mellan olika år. De häckar dock oftast på strandängar, så om de varit kvar i trakten borde de ändå ha kommit med i inventeringen. Nu var det enbart mindre kolonier – ingen större än tolv par att jämföra med 78 par vid Vekten (Habblingbo) 2001. Nu, 2006, fanns där inga häckande skärfläckor alls!

Skärfläcka är inte längre rödlistad, men det kanske var ett förhastat beslut?



Områden med de högsta tätheterna

<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
0,91	12	6601	Alskog
0,51	2	2503	Gothem
0,38	5	9005	Hamra
0,37	10	8303	Habblingbo
0,37	4	2501	Gothem

Större strandpipare (*Charadrius hiaticula*)

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	674	611	470
Antal områden	105	101	101



Även för större strandpiparen har det skett en alltför påtaglig minskning. Detta är en oroande utveckling. Fortfarande dock häckande i 101 av de 120 delområdena (84%). Minskningen har sålunda bestått i att tätheterna har minskat i många områden. Är alltså den fjärde talrikaste av de gotländska vadarna.


Områden med de högsta tätheterna

<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
1,03	4	2503	Gothem
0,83	9	2501	Gothem
0,68	9	9005	Hamra
0,61	26	8915	Öja
0,59	3	7206	Burs

Ljungpipare (*Pluvialis apricaria*)

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	3	1	11
Antal områden	3	1	7



Nu häckade det hela elva par att jämföra med något enstaka par 1996 och 2001. Samtliga, utom två par på Asunden, återfanns ute på Faludden med omnejd.

Ljungpiparen är ingen egentlig strandängsvadare, utan trivs bättre på magrare mark såsom alvarmarker, vilka inte ingår i denna inventering.

Huvuddelen av de svenska ljungpiparna återfinns i fjällkedjan och de fjällnära områdena i Norrland (Svensson m.fl. 1999).



Samtliga områden med häckande ljungpipare

<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
0,12	1	8902	Öja
0,07	3	8915	Öja
0,06	2	8907	Öja
0,04	1	8923	Öja
0,03	1	8901	Öja
0,03	1	8918	Öja
0,02	2	0201	Othem

Tofsvipa (*Vanellus vanellus*)

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	948	1001	722
Antal områden	115	111	111



Fortfarande talrikast av de fågelarter som omfattas av inventeringen, trots den relativt stora minskningen (ca 25%). Inte heller tofsvipan har tappat i utbredning (= den finns fortfarande i lika många områden), men tätheten har minskat. Det är oroande att även vanliga arter har minskat så påtagligt under de senaste fem åren. De tätaste förekomsterna är fortfarande på Faludden (Öja) samt i Gothem och i Västergarnsviken.

Områden med de högsta tätheterna


<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
1,28	5	2503	Gothem
1,19	5	8917	Öja
1,05	6	5601	Västergarn
1,03	62	8916	Öja
1,03	44	8915	Öja

Sydlig kärrsnäppa (*Calidris alpina schinzii*)

Starkt hotad, EN

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	35	23	8
Antal områden	19	13	6



Med den här minskningstakten är den sydliga rasen av kärrsnäppa inom kort utgången som gotländsk häckfågel! I årets inventering hittades bara åtta häckande par, vilket är ett katastrofalt lågt antal. Alla funna par häckade i de sydostliga socknarna, förutom ett par i Hablingbo. Möjligen fanns även något häckande par på Asunden.

Kärrsnäppan är en av de vadararter som ställer högst krav på välbetade strandängar, dessutom vill den gärna för sitt födosök ha dyga stränder, skonor och vattenpölar. Boet däremot placeras gärna i en lite högra tuva, gärna med fjolårsgräs. Det är svårt att uttala sig om varför kärrsnäppan minskar så påtagligt. Minskningen sker emellertid även i övriga södra svenska landskap, vilket i och för sig är en klen tröst. Åtminstone på Gotland känns det inte som om att det skulle vara brist på lämpliga habitat. Har tyvärr "avancerat" på rödlistan.

Samtliga områden med häckande kärrsnäppa



<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
0,15	2	9005	Hamra
0,05	2	8915	Öja
0,04	1	8903	Öja
0,02	1	8301	Hablingbo
0,02	1	7108	När
0,02	1	7204	Burs

Brushane (*Philomachus pugnax*)

Sårbar, VU

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	109	111	7
Antal områden	33	24	5



Nu var det plötsligt bara sju ”par” kvar. Katastrof! För en lekande art som brushanen går det givetvis inte att undvika att arten försvinner då antalet blivit så här lågt. Eller går det hoppas på en mirakelvändning? Utanför de inventerade områdena är det möjligt att brushanen häckar på några av öarna utanför den gotländska ostkusten, samt på Norsholmen på Fårö.


Samtliga områden med häckande brushane

<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
0,24	1	8917	Öja
0,05	3	8916	Öja
0,03	1	7706	Rone
0,02	1	7204	Burs
0,01	1	0201	Othem

Enkelbeckasin (*Gallinago gallinago*)

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	265	351	254
Antal områden	93	97	87



En smärre minskning har skett de senaste fem åren, men i princip är det samma antal som för tio år sedan. Enkelbeckasinen har en påtaglig förskjutning åt söder i sin gotländska utbredning.

Påträffades i något färre områden är tidigare, dock häckar den inte bara på strandängar utan även på flera typer av våtmarker, varför de funna paren sannolikt bara utgör en mindre del av det gotländska beståndet. Viss försiktighet bör också iakttas vid jämförelser mellan år och områden, ty enkelbeckasinen utgör en av de mer svårinventerade arterna då den ofta "trycker" och inte alltid så lätt låter sig skrämmas upp. Enkelbeckasinen är dock uppeendeväckande då hanarna under våren drar fram spelandes över kvällshimlen.

Områden med de högsta tätheterna



<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
0,77	3	2503	Gothem
0,75	6	9002	Hamra
0,44	9	8914	Öja
0,39	3	9008	Hamra
0,33	5	8920	Öja

Rödspov (*Limosa limosa*)

Sårbar, VU

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	33	31	8
Antal områden	19	18	5



Utvecklingen för rödspoven är heller inte någon framgångssaga, utan utgörs av en smärre tragedi! Kvar finns nu bara åtta par i fem områden – alla på Faludden. Mönstret känns dessvärre igen från både kärnsnäppa och brushane. Vid mer ingående studier av rödspovarna på Faludden 1995-2001 uppskattades dess antal till ca 35 par (Johansson 2001).

Skälet till denna enorma minskning är svår att uttala sig om. Förmodligen är det en kombination av orsaker, där alltför väl hävdade marker säkerligen är en parameter. Då vegetationen blir för låg blir det svårt att gömma äggen i boet, dessutom minskar födotillgången för de nykläckta ungarna då dessa söker mat i högre gräs. Utöver dessa få par häckar en handfull par på Fårö.

Samtliga områden med häckande rödspov



<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
0,48	2	8917	Öja
0,06	2	8918	Öja
0,04	1	8923	Öja
0,04	1	8912	Öja
0,03	2	8916	Öja

Storspov (*Numenius arquata*)

Missgynnad, NT

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	98	76	51
Antal områden	61	56	33



Även för storspovarna har det skett en stor minskning på de inventerade strandängarna. Nu är det bara ca hälften kvar mot för tio år sedan. Kan den ökade hävden även för denna art förklara det lägre antalet. Arten har minskat starkt i många delar av Syd- och Mellansverige men är fortfarande förhållandevis vanlig på vissa delar av Gotland och främst då i Faludden/Stockvikenområdet samt på Fårö. Storspoven ökade dock mellan åren 1984 och 1999 och beståndet på Gotland uppskattades till 350-400 par (Martinsson 2000).

Till skillnad från rödspoven häckar storspoven inte bara på naturbetesmarker utan även på åkermark, främst betes- och slåttervallar. Storspovens krav på stora revir återspeglas i de förhållandevis låga tätheterna.



Områden med de högsta tätheterna

<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
0,10	1	8922	Öja
0,09	8	0201	Othem
0,09	2	8911	Öja
0,09	1	9010	Öja
0,08	1	8601	Grötlingbo

Rödbena (*Tringa totanus*)

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	721	615	621
Antal områden	117	114	118



Det har varit en stabil utveckling under de tio åren, eller kanske snarare senaste fem åren. Häckar i nästan alla områden (98%). Är numer den näst vanligaste vadaren på de gotländska strandängarna. De högsta tätheterna återfanns i de relativt små områdena längs Gothems kusten.

Områden med de högsta tätheterna



<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
1,28	5	2503	Gothem
0,91	5	2504	Gothem
0,88	5	5601	Västergarn
0,83	9	2501	Gothem
0,80	2	7107	När

Roskarl (*Arenaria interpres*)

Sårbar, VU

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	258	174	153
Antal områden	77	73	65



Antalet roskarlar fortsätter att minska, om än inte lika hastigt som tidigare. Det kan tyckas märkligt då den nästan uteslutande håller till längs klippiga eller steniga stränder - en miljö som gärna uppfattas som stabil. Kan minskningen bero på ändrade förhållanden i vinterkvarteren?

Roskarlen häckar även längs klippkuster, områden som ej inventerades i denna undersökning. Frågan huruvida dessa individer har minskat eller ökat kvarstår.


Områden med de högsta tätheterna

<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
0,59	3	7206	Burs
0,34	10	7706	Rone
0,33	4	8702	Näs
0,33	1	8919	Öja
0,31	4	8708	Näs

Dvärgmås (*Larus minutus*)

Antal par och områden			
	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	1	0	0
Antal områden	1	0	0


1996 häckade ett par dvärgmås i en skrattnåskoloni ute på Faludden (omr. 8920). Detta enda par häckade varken 2001 eller 2006, dessutom minskade skrattnåskolonin från 115 par (1996) till knappt 30 par (2006). Dvärgmåsen har under de senaste årtiondena minskat starkt på Gotland och häckar numera regelbundet bara på Fårö.



Skrattmåå (*Larus ridibundus*)

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	400	129	123
Antal områden	25	14	11



Den kraftiga tillbakagången av antalet skrattmåå har upphört, men det är trots det dåligt med häckande individer. Skrattmååen är i huvudsak kolonihäckande, vilket innebär att det är många områden som saknar häckningar.

Numera består den största kolonin av de knappt 50 paren på Sigdesholm, att jämföra med den största kolonin på ca 100 par för tio år sedan.

Längs den västra kusten häckade skrattmååen bara i ett enda inventerat område, Killingholm i Vamlingbo, 29 par.



Områden med de högsta tätheterna

<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
1,89	29	8920	Öja
1,60	47	7706	Rone
0,91	29	9101	Vamlingbo
0,57	4	8921	Öja
0,15	3	8602	Grötlingbo

Fiskmås (*Larus canus*)

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	626	585	507
Antal områden	86	82	85



En fortsatt smärre minskning för varje inventeringsomgång men fiskmåsen häckade i lika många områden (ca 70% av de 120 strandängsområdena). Den i särklass största kolonin fanns, liksom 2001, på Sigdesholm (Rone Innerholme).


Områden med de högsta tätheterna

<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
5,56	166	7706	Rone
0,86	5	7202	Burs
0,67	22	7705	Rone
0,62	15	8707	Näs
0,58	8	8606	Grötlingbo

Gråtrut (*Larus argentatus*)

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	177	193	119
Antal områden	13	8	8



En relativt markant minskning av antalet par har skett de senaste fem åren, dock har det inte varit någon förändring i antalet områden – det är fortfarande åtta stycken. Nära nog samtliga gråtrutar (liksom havstrutar, se nästa sida) häckar på öar och mindre stenrevlar utanför själva stranden.


Områden med de högsta tätheterna

<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
1,84	54	7706	Rone
0,85	28	7705	Rone
0,38	17	8301	Hablingbo
0,21	6	8603	Grötlingbo
0,19	6	9101	Vamlingbo

Havstrut (*Larus marinus*)

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	22	31	23
Antal områden	8	12	11



En återgång till 1996 vad gäller antalet par. Antalet områden är likvärdigt med 2001. Nära nog samtliga havstrutar häckade på öar, mindre sandrevlar eller enstaka block utanför själva stranden. Detta innebär att många havstrutar inte inventerades, vilket medför att de drygt 20 observerade paren endast utgör en del av det gotländska beståndet.

Områden med de högsta tätheterna


<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
0,17	5	7706	Rone
0,15	5	7705	Rone
0,11	2	9205	Sundre
0,09	4	8301	Hablingbo
0,07	1	6302	Eksta

Kentsk tärna (*Sterna sandvicensis*)

Sårbar, VU

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	7	4	6
Antal områden	6	2	5



Endast sex par i fem områden påträffades, vilket är försumbart högre än föregående inventering. Den kentska tärnan är dock en nyckfull art som ofta byter häckningsområden och då inte alltid väljer strandängar.

Häckar nästan uteslutande längs kusten på små öar och skär. Under båda inventeringsåren 2001 och 2006 häckade t.ex. flera par utanför Gnismvårds hamn (Tofta) – ett område som inte tidigare använts som häckningsplats. Under 2007 sågs dessutom flera individer landa med fisk i näbben i skrattnåskolonin i dammen på Kronholmens golfbana! Det är synnerligen sensationellt att några par har valt en "inlandslokal" (golfbanan) som boplats.



Samtliga områden med häckande kentsk tärna

<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
0,04	1	2506	Gothem
0,03	1	5702	Sanda
0,02	2	0201	Othem
0,02	1	7001	Lau
0,02	1	2505	Gothem

Fisktärna (*Sterna hirundo*)

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	165	65	29
Antal områden	44	20	16



En synnerligen kraftig tillbakagång av antalet fisktärnor. Vid 1996 års inventering var silvertärnan fyra gånger så talrik som fisktärnan, 2001 var förhållandet tio gånger, nu är silvertärnan 20 gånger vanligare! I område 8603 (södra Grötlingboud) häckade 1996 45 par fisktärna, 2001 var det 22 par, nu 2006 var antalet nere i två par! Denna kraftiga tillbakagång kan dock mycket väl hänga samman med predation av räv, ty samma nedåtgående trend gäller för silvertärnan i just detta område.

Fisktärnan, jämfört med silvertärnan, häckar gärna även i inlandet och är därmed den tärnart i Sverige som har den största utbredningen (Svensson m.fl. 1999). Enligt den svenska häckfågeltaxeringen tycks inte fisktärnan ha minskat de senaste 20 åren, snarare tvärtom (www.biol.lu.se/zooekologi/birdmonitoring).



Områden med de högsta tätheterna

<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
0,18	1	5601	Västergarn
0,14	2	8606	Grötlingbo
0,13	6	8301	Hablingbo
0,12	2	9001	Hamra
0,08	3	5702	Sanda

Silvertärna (*Sterna paradisaea*)

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	663	674	577
Antal områden	85	97	89



En smärre minskning i antalet silvertärnor men utbredningen tycks i princip vara densamma som för tio år sedan. Den överlägset högsta koncentrationen är fortfarande på Sigdesholm (Rone Innerholme) med imponerande drygt 100 häckande par. Flera områden, främst på ostkusten, hyste också höga antal.

Områden med de högsta tätheterna



<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
3,50	103	7706	Rone
1,14	8	8921	Öja
1,12	27	8707	Rone
0,98	15	8920	Öja
0,98	5	7206	Burs

Småtärna (*Sterna albifrons*)

Sårbar, VU

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	103	128	102
Antal områden	69	67	55



Även för småtärnan är populationstrenden något vikande. Detta är oroväckande då Gotland hyser en betydande del av det svenska beståndet (Svensson m.fl. 1999). De högsta tätheterna återfinns i de sydliga socknarna.


Områden med de högsta tätheterna

<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
0,62	8	8708	Näs
0,42	7	9001	Hamra
0,33	1	8919	Öja
0,24	3	8601	Grötlingbo
0,24	1	9011	Hamra

Gulärla (*Motacilla flava flava*)

Antal par och områden

	<u>1996</u>	<u>2001</u>	<u>2006</u>
Antal par	11	5	1
Antal områden	6	3	1



Gulärulan är inte längre rödlistad, men det kan inte hänga samman med utvecklingen på de gotländska strandängarna, ty här finns bara ett enda par kvar! För tio år sedan fanns elva par vilket var väl lågt men nu är sålunda läget än värre. Detta enda par häckade i Ugnens fågelskyddsområde längs Ekstakusten.

Gulärulan häckar främst på naturliga ängsmarker som fortfarande hävdas med slåtter men kan även häcka på betade strandängar med kortvuxen och tuvig vegetation (Svensson m.fl. 1999). Det kan sålunda finnas ytterligare några par på Gotland.

Enda området med häckande gulärla

<u>Täthet</u>	<u>Antal par</u>	<u>Område</u>	<u>Socken</u>
0,07	1	6302	Eksta

REFERENSER

- Blomqvist, D. & Larsson, H. 2007. Miljögifter i ägg av sydlig kärrsnäppa (*Calidris alpina schinzii*) från Båtafjorden, Halland. Länsstyrelsen i Hallands län, Meddelande 2007:18.
- Blomqvist, D. & Pauliny, A. 2007. Inavel och förlust av genetisk variation hos sydlig kärrsnäppa (*Calidris alpina schinzii*) på svenska Västkusten. Länsstyrelsen i Hallands län, Meddelande 2007:17.
- Gustafsson, L. & Högröm, S. 1981. Hur många fåglar häckar på Gotland? Bläcku 7: 81-138.
- Gärdenfors, U. (ed.) 2005. *Rödlistade arter i Sverige 2005 – The 2005 Red List of Swedish Species*. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
- Hedgren, S., Kolehmainen, T. & Tydén, L. 1996. Inventering av häckande fåglar på gotländska strandängar 1996. Länsstyrelsen i Gotlands län, Rapport nr 6 1996.
- Johansson, T. 2001. Habitat selection, nest predation and conservation biology in a Black-tailed Godwit (*Limosa limosa*) population. Doktorsavhandling, Uppsala universitet.
- Johansson, T., Hedgren, S., Kolehmainen, T. & Tydén, L. 2002. Återinventering 2001 av häckande fåglar på gotländska strandängar. Länsstyrelsen i Gotlands län, Rapport nr 1 2002.
- Länsstyrelsen i Kalmar län. 2004. Miljöövervakning i Kalmar län 2002. Meddelande 2004:12.
- Martinsson, M. 1997. Inventering av skrattnås *Larus ridibundus* på Gotland 1995. Bläcku 23: 3-10.
- Martinsson, M. 2000. Riksinventering av storspov *Numenius arquata* på Gotland 1999. Bläcku 26: 90-95.
- Naturvårdsverket. 1978. Biologiska InventeringsNormer (BIN). Stockholm.
- Ottvall, R. 2004. Population ecology and management of waders breeding on coastal meadows. Doktorsavhandling, Lunds universitet.
- www.biol.lu.se/zooekologi/birdmonitoring

BILAGA

OMRÅDESBESKRIVNINGAR

Genomgång av respektive strandängsområdes fågelfauna,
hävdstatus samt kommentarer.

Inventerat den: 28/4, 17/5, 2/6, 11/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	35% väl, 65% måttligt	2,4
2001	30% väl, 70% måttligt	2,3
2006	50% väl, 50% måttligt	2,5

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
18	16	17	88	41	55	1,49	0,70	0,93

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1			0,02			Brushane						
Grågås	2	2	3	0,03	0,03	0,05	Enkelbeckasin		3	4		0,05	0,07
Vitk. gås	2			0,03			Rödspov						
Gravand	2	2	2	0,03	0,03	0,03	Storspov	2	3	1	0,03	0,05	0,02
Snatrand							Rödbena	13	6	8	0,22	0,10	0,14
Kricka	9	1	3	0,15	0,02	0,05	Roskarl		1	1		0,02	0,02
Gräsand	1	2	2	0,02	0,03	0,03	Dvärgmås						
Stjärtand	1			0,02			Skrattmås	25		1	0,42		0,02
Årta							Fiskmås	2	2	2	0,03	0,03	0,03
Skedand	2	1	3	0,03	0,02	0,05	Gråtrut						
Strandskata	10	7	7	0,17	0,12	0,12	Havstrut		1			0,02	
Skärfläcka							Kentsk tärna						
St. strandpip.	5	3	5	0,08	0,05	0,08	Fisktärna	1		1	0,02		0,02
Ljungpipare							Silvertärna	4	1	2	0,07	0,02	0,03
Tofsvipa	6	4	8	0,10	0,07	0,14	Småtärna	1	2	2	0,02	0,03	0,03
Kärnsnäppa							Gulärta						



Norra delen av ön Furilden

Kommentarer

Inga stora förändringar sedan förra inventeringen. Halveringen av antalet häckande par mellan 1996 och 2001 berodde främst på att de 25 paren skratmås försvann.

Hävdnen har varit likvärdig de senaste tio åren.

Natura 2000-område som är avsatt som fågelskyddsområde med tillträdesförbud under tiden 15 mars-30 juni.

SOCKEN: Othem

OMRÅDE NR: 0201

TOTAL AREAL: 94,1 ha

Inventerat den: 15/4, 28/4, 9/5, 26/5, 11/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996		
2001		
2006	60% väl, 30% måttligt, 10% svagt	2,5

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
		23			127			1,35

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan			1			0,01	Brushane			1			0,01
Grågås			3			0,03	Enkelbeckasin			8			0,09
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand			10			0,11	Storspov			8			0,09
Snatterand							Rödbena			9			0,10
Kricka			8			0,09	Roskarl			2			0,02
Gräsand			5			0,05	Dvärgmås						
Stjärtand			3			0,03	Skrattmås			3			0,03
Årta			1			0,01	Fiskmås			4			0,04
Skedand			2			0,02	Gråtrut						
Strandskata			15			0,16	Havstrut						
Skärfläcka			3			0,03	Kentsk tärna			2			0,02
St. strandpip.			14			0,15	Fisktärna						
Ljungpipare			2			0,02	Silvertärna			7			0,07
Tofsvipa			13			0,14	Småtärna			3			0,03
Kärnsnäppa							Gulärta						



Nordvästra halvan av ön Asundan

Kommentarer

Natura 2000-område på nordvästra delen av Asunden. Detta är första gången som området var med i dessa inventeringar.

Asunden utgör tillsammans med ett område på Faludden (8916) de näst artrikaste områdena längs Gotlandskusten. Tätheterna är dock inte särskilt höga men det beror på att området är väldigt stort. Undantaget är storspov som är inventeringens näst högsta.

Inventerat den: 21/4, 3/5, 28/5, 7/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% måttligt	2,0
2001	60% väl, 40% måttligt	2,6
2006	30% väl, 60% måttligt, 10%svagt	2,2

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
16	16	12	48	55	71	4,40	5,05	6,51

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1	1	2	0,09	0,09	0,18	Brushane						
Grågås			11			1,01	Enkelbeckasin	2	4		0,18	0,37	
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	6	6	6	0,55	0,55	0,55	Storspov						
Snatterand			1			0,09	Rödbena	5	4	9	0,46	0,37	0,83
Kricka	1	4		0,09	0,37		Roskarl						
Gräsand	3	4	4	0,27	0,37	0,37	Dvärgmås						
Stjärtand	1	2		0,09	0,18		Skrattmås						
Årta	1	1		0,09	0,09		Fiskmås	4			0,37		
Skedand	3	4	5	0,27	0,37	0,46	Gråtrut						
Strandskata	4	4	6	0,37	0,37	0,55	Havstrut						
Skärfläcka	2	4	4	0,18	0,37	0,37	Kentsk tärna						
St. strandpip.	4	7	9	0,37	0,64	0,83	Fisktärna		1			0,09	
Ljungpipare							Silvertärna	5	3	7	0,46	0,27	0,64
Tofsvipa	5	5	7	0,46	0,46	0,64	Småtärna	1	1		0,09	0,09	
Kärnsnäppa							Gulärta						



Norr om fiskehamnen Botvaldevik

Kommentarer

Fler par men färre arter nu 2006. Noterbart att många änder samt enkelbeckasinen har försvunnit.

Området drabbades i november 2004 av ett oljeutsläpp. Detta tycks glädjande nog inte ha påverkat fågelfaunan nämnvärt. Området har sjätte högsta totala tätheten.

För enskilda arter var det höga tätheter av:
Större strandpipare – näst högsta,
Rödbena – fjärde högsta,
Grågås – femte högsta.

Inga större förändringar i hävden.

SOCKEN: Gothem

OMRÅDE NR: 2502

TOTAL AREAL: 4,7 ha

Inventerat den: 3/5, 28/5 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% svagt	1,0
2001	60% svagt, 60 % ej	0,4
2006	10% väl, 50% måttligt, 30% svagt, 10% ej	1,6

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
10	5	10	18	12	20	3,83	2,55	4,26

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1			0,21			Brushane						
Grågås							Enkelbeckasin	2	6	1	0,43	1,28	0,21
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	2	1	2	0,43	0,21	0,43	Storspov						
Snatrand							Rödbena	4	2	3	0,85	0,43	0,64
Kricka	1			0,21			Roskarl						
Gräsand			4			0,85	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta							Fiskmås						
Skedand	1		2	0,21		0,43	Gråtrut						
Strandskata	1		1	0,21		0,21	Havstrut						
Skärfläcka			1			0,21	Kentsk tärna						
St. strandpip.	1	2	1	0,21	0,43	0,21	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	1	1	1	0,21	0,21	0,21
Tofsvipa	4		4	0,85		0,85	Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Söder om fiskehamnen Botvaldevik

Kommentarer

Efter en tillfällig (?) minskning 2001 är området nu likställt med 1996. Noterbart är t.ex. att tofsvipan häckade med fyra par -96, inga par -01, och åter fyra par -06. Arter kan uppenbarligen fluktuera.

Detta område i likhet med föregående (2501) drabbades av oljeutsläpp i november 2004. Den relativt fattiga fågelfaunan har dock inte blivit fattigare därefter. En art som utmärker sig positivt är gräsanden som har den näst högsta tätheten.

Området har blivit något mer välhävdad.

Inventerat den: 21/4, 3/5, 28/5 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	50% väl, 50% måttligt	2,5
2001	60% väl, 20% måttligt, 20%svagt	2,4
2006	40% måttligt, 40% svagt, 20% ej	1,2

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
15	13	14	28	25	43	7,18	6,14	11,03

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1			0,26			Brushane						
Grågås		2	5		0,51	1,28	Enkelbeckasin	1		3	0,26		0,77
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	5	4	6	1,28	1,03	1,54	Storspov						
Snatterand							Rödbena	2	2	5	0,51	0,51	1,28
Kricka	1	1	1	0,26	0,26	0,26	Roskarl						
Gräsand	1	5	3	0,26	1,28	0,77	Dvärgmås						
Stjärtand		1	1		0,26	0,26	Skrattmås						
Årta	1	2	1	0,26	0,51	0,26	Fiskmås	2			0,51		
Skedand	2	1	5	0,51	0,26	1,28	Gråtrut						
Strandskata	2	2	1	0,51	0,51	0,26	Havstrut						
Skärfläcka	1	1	2	0,26	0,26	0,51	Kentsk tärna						
St. strandpip.	2	1	4	0,51	0,26	1,03	Fisktärna	1			0,26		
Ljungpipare							Silvertärna	2	1	1	0,51	0,26	0,26
Tofsvipa	4	2	5	1,03	0,51	1,28	Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Norr om Medeby bodar

Kommentarer

Nästan en fördubbling av antalet häckande par – till det höga 11,03 par/hektar, vilket är 2006 års näst högsta. Det är dock inte någon särskild art som står för ökningen, utan det är jämnt utspritt. Samtidigt har hävden minskat i motsvarande grad.

Inventeringens högsta tätheter var det för stjärtand (dock bara ett par), skedand, större strandpipare, tofsvipa, enkelbeckasin och rödbena.

De näst högsta tätheterna var det för grågås, gravand, årta och skärfläcka. Slutligen, var det fjärde högsta tätheten av gräsand.

Inventerat den: 3/5, 28/5 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	40% väl, 30% svagt, 30% ej	1,5
2001	40% svagt, 60% ej	0,4
2006	20 % måttligt, 40% svagt, 40% ej	0,8

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
10	13	11	24	24	31	4,36	4,36	5,64

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane						
Grågås		1	7		0,18	1,27	Enkelbeckasin	2	3		0,36	0,55	
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	4	5	4	0,73	0,91	0,73	Storspov						
Snatrand		1			0,18		Rödbena	3	2	5	0,55	0,36	0,91
Kricka	4	1		0,73	0,18		Roskarl						
Gräsand	2	3	4	0,36	0,55	0,73	Dvärgmås						
Stjärtand		1			0,18		Skrattmås						
Årta			1			0,18	Fiskmås						
Skedand		1	1		0,18	0,18	Gråtrut						
Strandskata	3	2	1	0,55	0,36	0,18	Havstrut						
Skärfläcka			2			0,36	Kentsk tärna						
St. strandpip.	1		2	0,18		0,36	Fisktärna	1			0,18		
Ljungpipare							Silvertärna	2	2	2	0,36	0,36	0,36
Tofsvipa	2	1	2	0,36	0,18	0,36	Småtärna		1			0,18	
Kärnsnäppa							Gulärta						



Söder om Medeby bodar

Kommentarer

Ungefär likvärdig artsammansättning alla tre tillfällena. Den lilla ökningen 2006 utgörs av de sju paren grågäss (tredje högsta tätheten). Noterbart är att inga enkelbeckasiner finns kvar. Årta (tredje högsta tätheten) och skärfläcka har tillkommit. Värt att nämna är också att tätheten är inventeringens åttonde högsta, rödbenan har sin näst högsta täthet här längs Gothems kusten, och gräsanden har femte högsta tätheten.

Endast små vegetationsförändringar i ett svagt hävdad område.

SOCKEN: Gothem

OMRÅDE NR: 2505

TOTAL AREAL: 60,0 ha

Inventerat den: 21/4, 3/5, 28/5 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	20% väl, 50% måttligt, 30% ej	1,6
2001	40% väl, 20% måttligt, 40% svagt	2,0
2006	10% väl, 30% måttligt, 40% svagt, 20% ej	1,3

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
18	20	18	114	128	110	1,90	2,13	1,83

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	2	1	2	0,03	0,02	0,03	Brushane						
Grågås		3	11		0,05	0,18	Enkelbeckasin	3	2	1	0,05	0,03	0,02
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	9	17	16	0,15	0,28	0,27	Storspov	3	1	2	0,05	0,02	0,03
Snatterand		1			0,02		Rödbena	17	10	16	0,28	0,17	0,27
Kricka	2	5	5	0,03	0,08	0,08	Roskarl	1	3		0,02	0,05	
Gräsand	2	8	6	0,03	0,13	0,10	Dvärgmås						
Stjärtand		2	3		0,03	0,05	Skrattmås						
Årta	1			0,02			Fiskmås	8	8	7	0,13	0,13	0,12
Skedand	4	3	5	0,07	0,05	0,08	Gråtrut						
Strandskata	11	12	10	0,18	0,20	0,17	Havstrut			1			0,02
Skärfläcka	4	9		0,07	0,15		Kentsk tärna			1			0,02
St. strandpip.	15	7	4	0,25	0,12	0,07	Fisktärna	3	1		0,05	0,02	
Ljungpipare							Silvertärna	8	11	10	0,13	0,18	0,17
Tofsvipa	19	22	9	0,32	0,37	0,15	Småtärna	2	2	1	0,03	0,03	0,02
Kärnsnäppa							Gulärta						



Kyrkbingegrunn

Kommentarer

Artsammansättning och antal nästan identiskt under de senaste tio åren. Ett orosmoln är dock att de vanliga arterna större strandpipare och tofsvipa minskar.

Tredje högsta tätheten av stjärtand, som aldrig har höga tätheter.

SOCKEN: Gothem

OMRÅDE NR: 2506

TOTAL AREAL: 24,7 ha

Inventerat den: 21/4, 3/5, 28/5 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% väl	3,0
2001	80% väl, 20% måttligt	2,8
2006	30% väl, 60% måttligt, 10%svagt	2,2

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
17	18	18	86	80	73	3,48	3,24	2,96

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1	1		0,04	0,04		Brushane						
Grågås	1	2	6	0,04	0,08	0,24	Enkelbeckasin	2	6	1	0,08	0,24	0,04
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	9	11	6	0,36	0,45	0,24	Storspov						
Snatterand			1			0,04	Rödbena	12	5	7	0,49	0,20	0,28
Kricka	1	2	2	0,04	0,08	0,08	Roskarl	2	3	1	0,08	0,12	0,04
Gräsand	6	7	9	0,24	0,28	0,36	Dvärgmås						
Stjärtand		1			0,04		Skrattmås						
Årta		1	1		0,04	0,04	Fiskmås	8	7	1	0,32	0,28	0,04
Skedand	5	4	6	0,20	0,16	0,24	Gråtrut						
Strandskata	6	6	6	0,24	0,24	0,24	Havstrut						
Skärfläcka	2			0,08			Kentsk tärna			1			0,04
St. strandpip.	6	5	4	0,24	0,20	0,16	Fisktärna	2	1	2	0,08	0,04	0,08
Ljungpipare							Silvertärna	8	6	9	0,32	0,24	0,36
Tofsvipa	14	11	9	0,57	0,44	0,36	Småtärna	1	1	1	0,04	0,04	0,04
Kärnsnäppa							Gulärta						



Från Sinkriv till Hangrebod

Kommentarer

Området är inte längre lika väl hävdad, men detta har inte medfört några nämnvärda förändringar i fågellivet.

Ett av fem områden med kentsk tärna – detta enda par innebar den högsta tätheten, med andra ord var detta område det minsta med häckande kentsk tärna.

Inventerat den: 20/4, 15/5, 26/6, 6/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	50% måttligt, 50% svagt	1,5
2001	40% väl, 30% måttligt, 30% svagt	2,1
2006	10% måttligt, 60% svagt, 30% ej	0,8

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
17	18	16	59	75	64	3,91	4,97	4,24

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1	1	1	0,07	0,07	0,07	Brushane						
Grågås		2	20		0,13	1,32	Enkelbeckasin	1	1	1	0,07	0,07	0,07
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	7	21	3	0,46	1,39	0,20	Storspov						
Snatrand	2	2	3	0,13	0,13	0,20	Rödbena	5	4	6	0,33	0,26	0,39
Kricka	2	2	1	0,13	0,13	0,07	Roskarl	1	2		0,07	0,13	
Gräsand	4	3	4	0,26	0,20	0,26	Dvärgmåås						
Stjärtand							Skrattmåås						
Årta	3	3	2	0,20	0,20	0,13	Fiskmåås						
Skedand	1	4	1	0,07	0,26	0,07	Gråtrut						
Strandskata	7	6	3	0,46	0,40	0,20	Havstrut						
Skärfläcka	7	7	2	0,46	0,46	0,13	Kentsk tärna						
St. strandpip.	4	5	7	0,26	0,33	0,46	Fisktärna	2	1		0,13	0,07	
Ljungpipare							Silvertärna	5	1	2	0,33	0,07	0,13
Tofsvipa	5	8	7	0,33	0,53	0,46	Småtärna	2	2	1	0,13	0,13	0,07
Kärnsnäppa							Gulärta						



Svältholmen och Västergarnsviken

Kommentarer

Snarlik artsammansättning men något färre antal par jämfört med 2001. Stor minskning av antalet gravänder. Grågässen har dock ökat markant de senaste tio åren och nu hyser detta område den högsta tätheten.

Hävden har minskat betydligt.

SOCKEN: Sanda

OMRÅDE NR: 5701

TOTAL AREAL: 17,5 ha

Inventerat den: 15/4, 15/5, 30/5 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	50% måttligt, 50% svagt	1,5
2001	40% väl, 40% måttligt, 20% svagt	2,2
2006	20% måttligt, 30% svagt, 50% ej	0,7

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
14	13	16	55	51	60	3,14	2,91	3,43

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1	2	1	0,06	0,11	0,06	Brushane						
Grågås		8	7		0,46	0,40	Enkelbeckasin	1			0,06		
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	4	8	6	0,23	0,46	0,34	Storspov						
Snatrand	1	2	4	0,06	0,11	0,23	Rödbena	6	2	6	0,34	0,11	0,34
Kricka	4	1		0,23	0,06		Roskarl						
Gräsand	6	9	3	0,34	0,51	0,17	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta			2			0,11	Fiskmås	8	4	3	0,46	0,23	0,17
Skedand	1	3	3	0,06	0,17	0,17	Gråtrut						
Strandskata	8	6	7	0,46	0,34	0,40	Havstrut						
Skärfläcka			3			0,17	Kentsk tärna						
St. strandpip.	2	1	4	0,11	0,06	0,23	Fisktärna			1			0,06
Ljungpipare							Silvertärna	6	4	3	0,34	0,23	0,17
Tofsvipa	6		6	0,34		0,34	Småtärna	1	1	1	0,06	0,06	0,06
Kärnsnäppa							Gulärta						



Strax norr om Kovik

Kommentarer

Inte mycket har hänt, möjligtvis en smärre förbättring. Grågässen tycks ha kommit för att stanna. Glädjande med de nya två paren årta. Tofsviporna och rödbenor har, efter en minskning, åter samma antal som 1996. Tredje högsta tätheten av snatterand.

Hävden har minskat mycket.

SOCKEN: Sanda

OMRÅDE NR: 5702

TOTAL AREAL: 38,7 ha

Inventerat den: 15/4, 28/4, 195, 6/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	70% väl, 30% ej	2,1
2001	80% väl, 20% måttligt	2,8
2006	60% väl, 30% måttligt, 10% svagt	2,5

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
17	19	18	107	137	107	2,76	3,54	2,76

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	2	1	2	0,05	0,03	0,05	Brushane						
Grågås			8			0,21	Enkelbeckasin						
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	15	23	18	0,39	0,59	0,47	Storspov						
Snatterand	1	2	5	0,03	0,05	0,13	Rödbena	6	6	7	0,16	0,16	0,18
Kricka	3	2	3	0,08	0,05	0,08	Roskarl	3	3	3	0,08	0,08	0,08
Gräsand	5	8	7	0,13	0,21	0,18	Dvärgmås						
Stjärtand		1			0,03		Skrattmås		3			0,08	
Årta	1	1		0,03	0,03		Fiskmås	11	10	4	0,28	0,26	0,10
Skedand	4	4	5	0,10	0,10	0,13	Gråtrut						
Strandskata	15	10	8	0,39	0,26	0,21	Havstrut						
Skärfläcka	8	23	6	0,21	0,59	0,16	Kentsk tärna			1			0,03
St. strandpip.	6	14	7	0,16	0,36	0,18	Fisktärna	1	1	3	0,03	0,03	0,08
Ljungpipare							Silvertärna	14	10	10	0,36	0,26	0,26
Tofsvipa	9	14	7	0,23	0,36	0,18	Småtärna	3	1	3	0,08	0,03	0,08
Kärnsnäppa							Gulärta						



Vivesholm med Sagholmen och Räveln

Kommentarer

Liknande fågelliv och hävd 2006 som tidigare. Nytt är de åtta paren grågäss.

Flera arter som ökade 2001 har återgått i antal, t.ex. skärfläcka, större strandpipare och tofsvipa. Ett av fem områden med häckande kentsk tärna (näst högsta tätheten, trots bara ett par).

Inventerat den: 15/4, 28/4, 19/5, 6/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	50% väl, 50% måttligt	2,5
2001	80% väl, 20% måttligt	2,8
2006	70% väl, 30% måttligt, 10% svagt	2,8

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
16	16	14	72	71	71	3,58	3,53	3,58

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1	3		0,05	0,15		Brushane						
Grågås		6	6		0,30	0,30	Enkelbeckasin						
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	5	11	8	0,25	0,55	0,40	Storspov						
Snatterand			3			0,15	Rödbena	7	2	6	0,35	0,10	0,30
Kricka	1	4		0,05	0,20		Roskarl	2	2	3	0,10	0,10	0,15
Gräsand	2	6	6	0,10	0,30	0,30	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta	2		2	0,10		0,10	Fiskmås	7	10	6	0,35	0,50	0,30
Skedand	2	1	3	0,10	0,05	0,15	Gråtrut						
Strandskata	4	4	5	0,20	0,20	0,25	Havstrut						
Skärfläcka	19	1	3	0,95	0,05	0,15	Kentsk tärna						
St. strandpip.	7	5	5	0,35	0,25	0,25	Fisktärna	1	1		0,05	0,05	
Ljungpipare							Silvertärna	5	8	9	0,25	0,40	0,45
Tofsvipa	5	6	6	0,35	0,30	0,30	Småtärna	2	1		0,10	0,05	
Kärnsnäppa							Gulärta						



Gannarveskär och Gannarveviken

Kommentarer

Närmast identisk hävd och snarlik artsammansättning. Sedan 1996 har dock någon art tillkommit (snatterand), någon har återkommit (årta) och några har försvunnit (knölsvan, kricka, fisk- och småtärna).

Natura 2000-område.

SOCKEN: Fröjel

OMRÅDE NR: 6201

TOTAL AREAL: 13,3 ha

Inventerat den: 15/4, 28/4, 19/5, 6/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	50% måttligt, 50% svagt	1,5
2001	40% väl, 40% måttligt, 20% svagt	2,2
2006	10% väl, 50% måttligt, 20% svagt, 20% ej	1,5

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
13	12	8	39	45	30	2,93	3,38	2,26

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1	1	1	0,08	0,08	0,08	Brushane						
Grågås							Enkelbeckasin	2	4	3	0,15	0,30	0,23
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	5	7	10	0,38	0,53	0,75	Storspov						
Snatterand		1			0,08		Rödbena	4	4	6	0,30	0,30	0,45
Kricka		2			0,15		Roskarl						
Gräsand		4	2		0,30	0,15	Dvärgmås						
Stjärtand	1			0,08			Skrattmås						
Årta							Fiskmås	3	2		0,23	0,15	
Skedand			3			0,23	Gråtrut						
Strandskata	5	5	1	0,38	0,38	0,08	Havstrut						
Skärfläcka	2			0,08			Kentsk tärna						
St. strandpip.	6	3		0,45	0,23		Fisktärna	1			0,08		
Ljungpipare							Silvertärna	6	6		0,45	0,45	
Tofsvipa	2	6	4	0,15	0,45	0,30	Småtärna	1			0,08		
Kärnsnäppa							Gulärta						



Söder om Gannarveviken

Kommentarer

Ett område där antalet fåglar minskar. Ytterst noterbart är att varken tärnor eller måsar längre häckar inom området! Detta kan bero på det ökande antalet badande. För det är tveksamt om svaret på minskningen ligger i ändrad hävdintensitet.

Natura 2000-område.

Inventerat den: 16/4, 28/4, 21/5, 6/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	50% väl, 50% måttligt	2,5
2001	80% väl, 20% måttligt	2,8
2006	20% väl, 70% måttligt, 10% svagt	2,1

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
15	15	12	114	88	63	5,04	3,89	2,79

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan		2			0,09		Brushane						
Grågås							Enkelbeckasin	2			0,09		
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	10	14	12	0,44	0,62	0,53	Storspov						
Snatterand		1	1		0,04	0,04	Rödbena	12	6	10	0,53	0,27	0,44
Kricka	1	1		0,04	0,04		Roskarl	2	2		0,09	0,09	
Gräsand	7	3	7	0,31	0,13	0,31	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta	1			0,04			Fiskmås	3	4	2	0,13	0,18	0,09
Skedand	6	3	1	0,27	0,13	0,04	Gråtrut						
Strandskata	10	15	5	0,44	0,66	0,22	Havstrut						
Skärfläcka	26	10	4	1,15	0,44	0,18	Kentsk tärna						
St. strandpip.	14	8	6	0,62	0,35	0,27	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	4	8	4	0,18	0,35	0,18
Tofsvipa	14	9	9	0,62	0,40	0,40	Småtärna	1	2	2	0,04	0,09	0,09
Kärnsnäppa							Gulärla						



Kommentarer

Minskningen av strandängsfåglar fortsätter! Nu fattas vanliga arter som kricka och roskarl. Stora minskningar har skett för skedand, strandskata och större strandpipare. Anledningen är svårt att uttala sig om.

Området är inte längre lika väl hävdad.

Natura 2000-område och fågelskyddsområde.
Tillträdesförbud 15 mars-30 juni.

SOCKEN: Eksta

OMRÅDE NR: 6302

TOTAL AREAL: 14,5 ha

Inventerat den: 16/4, 21/5, 6/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% måttligt	2,0
2001	100% svagt	1,0
2006	30% måttligt, 70% svagt	1,3

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
16	12	18	53	63	65	3,66	4,34	4,48

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan		1	1		0,07	0,07	Brushane						
Grågås			8			0,55	Enkelbeckasin	1		1	0,07		0,07
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	9	20	9	0,62	1,38	0,62	Storspov						
Snatterand			1			0,07	Rödbena	3	4	6	0,21	0,28	0,41
Kricka	1		1	0,07		0,07	Roskarl	2	2		0,14	0,14	
Gräsand	6	7	5	0,41	0,48	0,34	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta	2			0,14			Fiskmås	4	1	4	0,28	0,07	0,28
Skedand	2		2	0,14		0,14	Gråtrut						
Strandskata	4	4	5	0,28	0,28	0,34	Havstrut			1			0,07
Skärfläcka	3	8	4	0,21	0,55	0,28	Kentsk tjärna						
St. strandpip.	4	5	3	0,28	0,34	0,21	Fisktjärna	1			0,07		
Ljungpipare							Silvertjärna	2	3	6	0,14	0,21	0,41
Tofsvipa	8	7	6	0,55	0,48	0,41	Småtjärna	1	1	1	0,07	0,07	0,07
Kärnsnäppa							Gulärla			1			0,07



Kommentarer

Marginellt fler arter. Liksom föregående område saknas numer roskar, men annars inga påtagliga försämringar. Inventeringens enda strandängshäckande par av gulärta!!!!

Natura 2000-område och fågelskyddsområde.
Tillträdesförbud 15 mars-30 juni.

*Mellersta delen av Ugnens fågelskydds-
område, söder om Fuldye*

SOCKEN: Eksta

OMRÅDE NR: 6303

TOTAL AREAL: 25,7 ha

Inventerat den: 16/4, 15/5, 30/5 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% ej	0
2001	20% svagt, 80% ej	0,2
2006	100% ej	0

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
15	15	16	65	54	52	2,53	2,10	2,02

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1	2	2	0,04	0,08	0,08	Brushane						
Grågås		4	10		0,16	0,39	Enkelbeckasin	1	1	3	0,04	0,04	0,12
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	14	18	6	0,54	0,70	0,23	Storspov						
Snatrand	1	1	2	0,04	0,04	0,08	Rödbena	5	5	5	0,19	0,19	0,19
Kricka	2	2	2	0,08	0,08	0,08	Roskarl			2			0,08
Gräsand	8	2	8	0,31	0,08	0,31	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta			1			0,04	Fiskmås	3	1		0,12	0,04	
Skedand	3	1	2	0,12	0,04	0,08	Gråtrut						
Strandskata	5	3	3	0,19	0,12	0,12	Havstrut			1			0,04
Skärfläcka	3	3		0,12	0,12		Kentsk tärna						
St. strandpip.	4	6	2	0,16	0,23	0,08	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	5	2	2	0,19	0,08	0,08
Tofsvipa	4	3	1	0,16	0,12	0,04	Småtärna	1			0,04		
Kärnsnäppa							Gulärta						



Mellersta delen av Ugnens fågelskyddsområde

Kommentarer

Inte mycket har förändrats under dessa tio år – hävden är obefintlig och artantalet konstant. Två par häckande roskarlar har tillkommit, möjligtvis kommer de från området norrom. Mest uppseendeväckande är kanske minskningen av gravänder.

Natura 2000-område och fågelskyddsområde.
Tillträdesförbud 15 mars-30 juni.

Inventerat den: 25/4, 15/5, 30/5, 6/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	40% måttligt, 60% ej	0,8
2001	30% väl, 30% måttligt, 40% ej	1,5
2006	50% måttligt, 30% svagt, 20% ej	1,3

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
17	18	15	83	104	86	2,36	2,96	2,45

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1	2	2	0,03	0,06	0,06	Brushane						
Grågås		3	10		0,09	0,28	Enkelbeckasin	4	4	5	0,11	0,11	0,14
Vitk. gås							Rödspov				0,06		
Gravand	8	32	12	0,23	0,91	0,34	Storspov	2					
Snatrand			1			0,03	Rödbena	9	6	10	0,25	0,17	0,28
Kricka	1	3		0,03	0,09		Roskarl	1	1		0,03	0,03	
Gräsand	14	8	5	0,40	0,23	0,14	Dvärgmås						
Stjärtand		1			0,03		Skrattmås						
Årta	2	1	1	0,06	0,03	0,03	Fiskmås	1	2	2	0,03	0,06	0,06
Skedand	2	5	4	0,06	0,14	0,11	Gråtrut						
Strandskata	2	5	2	0,06	0,14	0,06	Havstrut						
Skärfläcka	17	6	7	0,48	0,17	0,20	Kentsk tärna						
St. strandpip.	8	10	7	0,23	0,28	0,20	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	4	1	2	0,11	0,03	0,06
Tofsvipa	6	13	16	0,17	0,37	0,46	Småtärna		1			0,03	
Kärnsnäppa	1			0,03			Gulärta						



Norr om Klase fiskeläge

Kommentarer

Inga stora förändringar bland de flesta arterna. Antalet tofsvipor har dock nästan tredubblats på tio år men gräsanden har minskat i samma utsträckning. Grågässen har tillkommit, samtidigt har kricka och roskarl försvunnit. Hävden är likvärdig.

Natura 2000-område och fågelskyddsområde.
Tillträdesförbud 15 mars-30 juni.

Inventerat den: 25/4, 15/5, 30/5 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	20% väl, 50% måttligt, 30% svagt	1,9
2001	20% väl, 80% måttligt	2,2
2006	70% måttligt, 30% svagt	1,7

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
16	19	16	98	113	87	5,30	6,11	4,70

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1	4	1	0,05	0,22	0,05	Brushane						
Grågås		1	14		0,05	0,76	Enkelbeckasin	1	1		0,05	0,05	
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	17	23	10	0,92	1,24	0,54	Storspov						
Snatrand		1	1		0,05	0,05	Rödbena	11	8	10	0,59	0,43	0,54
Kricka	5	3		0,27	0,16		Roskarl	1	1	3	0,05	0,05	0,16
Gräsand	9	11	15	0,49	0,59	0,81	Dvärgmås						
Stjärtand		1			0,05		Skrattmås						
Årta	3		1	0,16		0,05	Fiskmås	3	5	1	0,16	0,27	0,05
Skedand	6	5	4	0,32	0,27	0,22	Gråtrut						
Strandskata	9	13	8	0,49	0,70	0,43	Havstrut		1	1		0,05	0,05
Skärfläcka	8	12		0,43	0,65		Kentsk tärna						
St. strandpip.	6	7	6	0,32	0,38	0,32	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	7	8	5	0,38	0,43	0,27
Tofsvipa	10	7	6	0,54	0,38	0,32	Småtärna	1	1	1	0,05	0,05	0,05
Kärnsnäppa							Gulärta						



Sydligaste delen av Ugnens fågelskyddsområde, söder om Klase fiskeläge

Kommentarer

Även i detta område har grågåsen tillkommit som häckande art – dess framfart på de gotländska strandängarna är tydlig. Skärfläckorna har försvunnit och gravänderna minskar, i övrigt har det inte skett några större förändringar. Tredje högsta tätheten av gräsand.


Natura 2000-område och fågelskyddsområde.
Tillträdesförbud 15 mars-30 juni.

Inventerat den: 19/4, 17/5, 1/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	30% måttligt, 70% svagt	1,3
2001	70% väl, 30% måttligt	2,7
2006	40% väl, 40% måttligt, 20% ej	2,0

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
12	11	12	42	54	61	3,18	4,09	4,62

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan		1	1		0,08	0,08	Brushane						
Grågås			1			0,08	Enkelbeckasin	2	3		0,15	0,23	
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	6	18	18	0,45	1,36	1,36	Storspov						
Snatrand							Rödbena	6	5	5	0,45	0,38	0,38
Kricka	1			0,08			Roskarl						
Gräsand	5	4	3	0,38	0,30	0,23	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta							Fiskmås						
Skedand	1		3	0,08		0,23	Gråtrut						
Strandskata	2	4	2	0,15	0,30	0,15	Havstrut						
Skärfläcka		2	12		0,15	0,91	Kentsk tärna						
St. strandpip.	6	3	3	0,45	0,23	0,23	Fisktärna	1			0,08		
Ljungpipare							Silvertärna	2	2	4	0,15	0,15	0,30
Tofsvipa	9	10	7	0,68	0,76	0,53	Småtärna	1	1	2	0,08	0,08	0,15
Kärnsnäppa							Gulärta						



Norr om Lausviken, söder om Ljugarn

Kommentarer

En smärre ökning i antal häckande par vart femte år. Det mest glädjande nu 2006 torde vara de tolv paren skärfläcka (högsta tätheten). Det stora antalet gravänder utgör inventeringens tredje högsta.

Hävderna har varierat mellan de olika inventeringsåren.

SOCKEN: Lau

OMRÅDE NR: 7001

TOTAL AREAL: 44,4 ha

Inventerat den: 19/4, 17/5, 1/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	10% måttligt, 20% svagt, 70% ej	0,4
2001	20% måttligt, 30% svagt, 50% ej	0,7
2006	20% måttligt, 20% svagt, 60% ej	0,6

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
12	9	13	46	54	40	1,04	1,22	0,90

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1			0,02			Brushane						
Grågås			5			0,11	Enkelbeckasin	5	9	3	0,11	0,20	0,07
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	9	19	5	0,20	0,43	0,11	Storspov						
Snatterand			1			0,02	Rödbena	7	4	9	0,16	0,09	0,20
Kricka	1		3	0,02		0,07	Roskarl						
Gräsand	9	5	2	0,20	0,11	0,05	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta							Fiskmås						
Skedand		2	2		0,05	0,05	Gråtrut						
Strandskata	3	3	1	0,07	0,07	0,02	Havstrut						
Skärfläcka							Kentsk tärna			1			0,02
St. strandpip.	6		2	0,14		0,05	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	1	2	1	0,02	0,05	0,02
Tofsvipa	1	7	5	0,02	0,16	0,11	Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Lausviken, från Tutens fiskeläge ned till skjutbanan

Kommentarer

Inga påtagliga förändringar, varken vad gäller hävd eller antal häckande arter. Möjligtvis finns en trend att fågellivet avtar. Grågås har även tillkommit i detta område.

Natura 2000-område.

SOCKEN: Lau

OMRÅDE NR: 7002

TOTAL AREAL: 37,9 ha

Inventerat den: 19/4, 30/4, 20/5, 1/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	60% väl, 40% ej	1,8
2001	60% väl, 10% måttligt, 30% svagt	2,3
2006	20 % måttligt, 60%svagt, 20% ej	1,0

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
10	12	9	98	60	47	2,59	1,58	1,24

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane						
Grågås	3	3	10	0,08	0,08	0,26	Enkelbeckasin	5	10	8	0,13	0,26	0,21
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	13	11	5	0,34	0,29	0,13	Storspov						
Snatrand							Rödbena	16	6	8	0,43	0,16	0,21
Kricka	2			0,05			Roskarl						
Gräsand	12	3	5	0,32	0,08	0,13	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta			1			0,03	Fiskmås						
Skedand		1			0,03		Gråtrut						
Strandskata	6	6	3	0,16	0,16	0,08	Havstrut						
Skärfläcka		5			0,13		Kentsk tärna						
St. strandpip.	17	6	1	0,45	0,16	0,03	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	4	1		0,11	0,03	
Tofsvipa	20	7	6	0,53	0,18	0,16	Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta		1			0,03	



Lauviken, från skjutbanan ned till Närkåns mynning

Kommentarer

En halvering av antalet häckande par sedan 1996, dock har inte antalet arter minskat nämnvärt. Noterbart är att de 17 paren större strandpipare nu bara består av ett enda par! Gulärta är borta. Även i detta område har grågåsen ökat.

Natura 2000-område som numer inte alls lika väl hävdats.

SOCKEN: När

OMRÅDE NR: 7101


TOTAL AREAL: 27,2 ha

Inventerat den: 24/4, 17/5, 1/6, 8/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	60% väl, 40% måttligt	2,6
2001	20% väl, 60% måttligt, 20% svagt	2,0
2006	20% väl, 30% måttligt, 30% svagt, 20% ej	1,5

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
15	16	14	52	60	61	1,91	2,21	2,24

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan		1	1		0,04	0,04	Brushane						
Grågås			1			0,04	Enkelbeckasin	1	3	3	0,04	0,11	0,11
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	8	23	14	0,29	0,85	0,51	Storspov	1	1		0,04	0,04	
Snatrand	1	1		0,04	0,04		Rödbena	6	3	5	0,22	0,11	0,18
Kricka	5	1	1	0,18	0,04	0,04	Roskarl						
Gräsand	3	2	5	0,11	0,07	0,18	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta	2	1		0,07	0,04		Fiskmås	1		1	0,04		0,04
Skedand	3	1	7	0,11	0,04	0,26	Gråtrut						
Strandskata	3	4	7	0,11	0,15	0,26	Havstrut						
Skärfläcka							Kentsk tärna						
St. strandpip.	5	4	6	0,18	0,15	0,22	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	3	4	2	0,11	0,15	0,07
Tofsvipa	8	9	7	0,29	0,33	0,26	Småtärna	2	1	1	0,07	0,04	0,04
Kärnsnäppa							Gulärta		1			0,04	



Lausviken, från Närkåns mynning till Hallsarvebods fiskeläge

Kommentarer

Här har det inte skett några dramatiska förändringar de senaste tio åren. Smärre variationer inom vissa arter och gulärta har tyvärr även försvunnit från detta område.

De allra mesta är avsatt som Natura 2000-område. Hävden har minskat något.

SOCKEN: När

OMRÅDE NR: 7102

TOTAL AREAL: 16,4 ha

Inventerat den: 19/4, 17/5, 1/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	50% väl, 30% måttligt, 20% ej	2,1
2001	30% måttligt, 50% svagt, 20% ej	1,1
2006	40% väl, 40% måttligt, 20% svagt	2,2

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
10	9	7	42	17	19	2,56	1,04	1,16

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane						
Grågås							Enkelbeckasin	5	2	2	0,30	0,12	0,12
Vitk. gås							Rödspov	1			0,06		
Gravand	8	2	2	0,49	0,12	0,12	Storspov	1	1		0,06	0,06	
Snatterand							Rödbena	6	3	3	0,37	0,18	0,18
Kricka							Roskarl						
Gräsand		1	2		0,06	0,12	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta	1	1		0,06	0,06		Fiskmås						
Skedand	2	3	2	0,12	0,18	0,12	Gråtrut						
Strandskata	5	1	3	0,30	0,06	0,18	Havstrut						
Skärfläcka	6			0,37			Kentsk tärna						
St. strandpip.							Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna						
Tofsvipa	7	3	5	0,43	0,18	0,30	Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Innanför Lillvik

Kommentarer

Under de senaste fem åren har inte mycket hänt – det är fortfarande betydligt färre häckande strandängsfåglar än för tio år sedan. Detta trots (?) att hävden åter är jämförbar med hur det var då.

SOCKEN: När

OMRÅDE NR: 7103


TOTAL AREAL: 22,3 ha

Inventerat den: 30/4, 1/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% måttligt	2,0
2001	30% väl, 70% måttligt	2,3
2006	30% måttligt, 60%svagt, 10% ej	1,2

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
9	10	8	42	35	21	1,88	1,57	0,94

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane	1			0,04		
Grågås							Enkelbeckasin	4	10	5	0,18	0,45	0,22
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand			1			0,04	Storspov	1	1		0,04	0,04	
Snatrand							Rödbena	9	3	3	0,40	0,13	0,13
Kricka							Roskarl						
Gräsand		2	1		0,09	0,04	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta	1			0,04			Fiskmås	4	1		0,18	0,04	
Skedand		1	3		0,04	0,13	Gråtrut						
Strandskata	6	4	2	0,27	0,18	0,09	Havstrut						
Skärfläcka							Kentsk tärna						
St. strandpip.	2	1		0,09	0,04		Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna		1	2		0,04	0,09
Tofsvipa	14	11	4	0,63	0,49	0,18	Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Pavals, norr om Austerviken

Kommentarer

Området är inte längre alls lika väl hävdat. Kan detta förklara den fortsatta minskningen av häckande par? Generellt är det ont om änder. Tofsviporna består nu endast av fyra par, att jämföra med de 14 som häckade i området 1996.

Natura 2000-område.

SOCKEN: När

OMRÅDE NR: 7104


TOTAL AREAL: 13,5 ha

Inventerat den: 30/4, 1/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	50% väl, 50% svagt	2,0
2001	60% väl, 40% måttligt	2,6
2006	50% väl, 30% måttligt, 20 svagt	2,3

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
10	9	4	20	20	8	1,48	1,48	0,59

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane						
Grågås			2			0,15	Enkelbeckasin	1	6		0,07	0,44	
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	2	1	4	0,15	0,07	0,30	Storspov	1	1		0,07	0,07	
Snatrand							Rödbena	5	2	1	0,37	0,15	0,07
Kricka							Roskarl						
Gräsand	1	2		0,07	0,15		Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta							Fiskmås	1			0,07		
Skedand	2	1	1	0,15	0,07	0,07	Gråtrut						
Strandskata	1	2		0,07	0,15		Havstrut						
Skärfläcka							Kentsk tärna						
St. strandpip.	2	1		0,15	0,07		Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna						
Tofsvipa	4	4		0,30	0,30		Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Innersta delen av Austerviken

Kommentarer

Trots oförändrad hävd har antalet häckande arter och par halverats sedan 2001! De enda häckande vadarna utgörs numer av ett par rödbena. Nytt är två par grågäss.

SOCKEN: När

OMRÅDE NR: 7105


TOTAL AREAL: 10,6 ha

Inventerat den: 30/4, 1/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	40% svagt, 60% ej	0,4
2001	100% ej	0
2006	100% ej	0

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
2	0	1	2	0	1	0,19	0	0,09

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane						
Grågås							Enkelbeckasin	1			0,09		
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand							Storspov						
Snatterand							Rödbena	1		1	0,09		0,09
Kricka							Roskarl						
Gräsand							Dvärgmåsar						
Stjärtand							Skrattmåsar						
Årta							Fiskmåsar						
Skedand							Gråtrut						
Strandskata							Havstrut						
Skärfläcka							Kentsk tärna						
St. strandpip.							Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna						
Tofsvipa							Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Innersta delen av Austerviken

Kommentarer

Ett ohävdad område sedan minst fem år. Synnerligen uselt med häckande "strandängsfåglar".

SOCKEN: När

OMRÅDE NR: 7106


TOTAL AREAL: 6,4 ha

Inventerat den: 30/4, 1/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% väl	3,0
2001	90% väl, 10% ej	2,7
2006	10% väl, 30% måttligt, 40% svagt, 20% ej	1,3

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
9	5	5	16	14	8	2,50	2,19	1,25

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane						
Grågås			1			0,16	Enkelbeckasin	1				0,16	
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	1	3		0,16	0,47		Storspov	1			0,16		
Snatterand							Rödbena	2	2	2	0,31	0,31	0,31
Kricka							Roskarl						
Gräsand		1	2		0,16	0,31	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta	1			0,16			Fiskmås						
Skedand	2		1	0,31		0,16	Gråtrut						
Strandskata	3	7		0,47	1,09		Havstrut						
Skärfläcka	2			0,31			Kentsk tärna						
St. strandpip.	2			0,31			Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna						
Tofsvipa	2		2	0,31		0,31	Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Innersta delen av Austerviken, till Fluntingsbod i öster

Kommentarer

Ytterligare ett område som utarmas på fågel. Hävden har avtagit betydligt de senaste åren. Bland vadarna häckar numer endast tofsvipa och rödbena.

SOCKEN: När

OMRÅDE NR: 7107


TOTAL AREAL: 2,5 ha

Inventerat den: 30/4, 1/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% svagt	1,0
2001	100% ej	0
2006	20% måttligt, 40% svagt, 40% ej	0,8

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
3	5	3	3	5	4	1,20	2,00	1,60

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane						
Grågås							Enkelbeckasin						
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand		1			0,40		Storspov	1			0,40		
Snatterand							Rödbena	1	1	2	0,40	0,40	0,80
Kricka							Roskarl						
Gräsand							Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta							Fiskmås						
Skedand		1			0,40		Gråtrut						
Strandskata		1	1		0,40	0,40	Havstrut						
Skärfläcka							Kentsk tärna						
St. strandpip.	1	1		0,40	0,40		Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna						
Tofsvipa			1			0,40	Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Från Fluntingsbod till Närsholmens naturreservat

Kommentarer

Ett art- och individfattigt litet område, där det inte sker stora förändringar. Det mest positiva kan kanske vara att de två paren rödbena utgör den femte högsta tätheten.

Inventerat den: 24/4, 4/5, 25/5 8/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	30% väl, 70% måttligt	1,6
2001	60% väl, 20% måttligt, 20% svagt	2,4
2006	20% väl, 20% måttligt, 60% svagt	1,6

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
17	19	18	126	142	101	2,72	3,06	2,18

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan			2			0,04	Brushane	2	5		0,04	0,11	
Grågås			2			0,04	Enkelbeckasin	3	8	3	0,06	0,17	0,06
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	4	6	11	0,09	0,13	0,24	Storspov	4	2	1	0,09	0,04	0,02
Snatterand							Rödbena	8	7	11	0,17	0,15	0,24
Kricka		2	2		0,04	0,04	Roskarl	6	3	3	0,13	0,06	0,06
Gräsand	3	2	4	0,06	0,04	0,09	Dvärgmås						
Stjärtand		1			0,02		Skrattmås						
Årta		1			0,02		Fiskmås	20	14	5	0,43	0,30	0,11
Skedand	2	8	6	0,04	0,17	0,13	Gråtrut						
Strandskata	15	10	12	0,32	0,22	0,26	Havstrut						
Skärfläcka	8	26	6	0,17	0,56	0,13	Kentsk tärna						
St. strandpip.	13	9	5	0,28	0,19	0,11	Fisktärna	1			0,02		
Ljungpipare							Silvertärna	15	12	15	0,32	0,26	0,32
Tofsvipa	17	21	11	0,37	0,45	0,24	Småtärna	3	3	1	0,06	0,06	0,02
Kärnsnäppa	2	2	1	0,04	0,04	0,02	Gulärta						



Norra delen av Närsholmens naturreservat

Kommentarer

Inga dramatiska förändringar. På pluskontot återfinns knölsvan och grågås. Arter som numer inte häckar i området är årta, stjärtand, och brushane. Dessutom har det skett en stor minskning i antalet fiskmåsar – varför? Området hyser dock fortfarande ett par av den sydliga kärnsnäppan, vilket är glädjande.

Oförändrad hävd jämfört med för tio år sedan.

Naturreseptat och Natura 2000-område. Merparten omfattas av tillträdesförbud under tiden 15 mars-15 juli.

SOCKEN: När

OMRÅDE NR: 7109

TOTAL AREAL: 66,1 ha

Inventerat den: 24/4, 4/5, 29/5 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% väl	3,0
2001	70% väl, 30% måttligt	2,7
2006	40% väl, 60% måttligt	2,4

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
12	14	8	48	60	28	0,73	0,91	0,42

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane		9			0,14	
Grågås							Enkelbeckasin	3	4	3	0,05	0,06	0,05
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand			3		0,05		Storspov	5	4	2	0,08	0,06	0,03
Snatterand							Rödbena	5		2	0,08		0,03
Kricka							Roskarl	1	1		0,02	0,02	
Gräsand	1	1	1	0,02	0,02	0,02	Dvärgmåås						
Stjärtand							Skrattmåås						
Årta			1		0,02		Fiskmåås	4	7	6	0,06	0,11	0,09
Skedand	1	1	1	0,02	0,02	0,02	Gråtrut						
Strandskata	13	8	6	0,20	0,12	0,09	Havstrut						
Skärfläcka							Kentsk tärna						
St. strandpip.			1		0,02		Fisktärna	1			0,02		
Ljungpipare							Silvertärna	3	5		0,05	0,08	
Tofsvipa	10	14	7	0,15	0,21	0,11	Småtärna	1	1		0,02	0,02	
Kärnsnäppa							Gulärta						



Östra och centrala delarna av Närs-holmens naturreservat

Kommentarer

Två tredjedelar av antalet häckande par har försvunnit sedan senaste inventeringen! Nu finns det inte längre några häckande tärnor i området. Borta är också brushanespelet. Hävden har blivit marginellt något mindre.

Naturreseptat och Natura 2000-område.

SOCKEN: När

OMRÅDE NR: 7110

TOTAL AREAL: 23,9 ha

Inventerat den: 24/4, 4/5, 29/5 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% väl	3,0
2001	80% väl, 20% måttligt	2,8
2006	20% väl, 70% måttligt, 10 svagt	2,1

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
14	13	11	65	57	52	2,72	2,38	2,18

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan			3			0,13	Brushane	3			0,13		
Grågås			1			0,04	Enkelbeckasin	2			0,08		
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	4	5	3	0,17	0,21	0,13	Storspov						
Snatrand							Rödbena	8	2	5	0,33	0,08	0,21
Kricka		5			0,21		Roskarl	2	2		0,08	0,08	
Gräsand	3	6	2	0,13	0,25	0,08	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås	4			0,17		
Årta		1			0,04		Fiskmås	5	6	3	0,21	0,25	0,13
Skedand	1	3	4	0,04	0,13	0,17	Gråtrut						
Strandskata	8	8	6	0,33	0,33	0,25	Havstrut						
Skärfläcka							Kentsk tärna						
St. strandpip.	6	4	7	0,25	0,17	0,29	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	6	6	13	0,25	0,25	0,54
Tofsvipa	11	8	5	0,46	0,33	0,21	Småtärna	2	1		0,08	0,04	
Kärnsnäppa							Gulärta						



Västra delen av Närsholmens naturreservat

Kommentarer

Minskningen fortsätter, om än inte i en alarmerande takt. Ett glädjeämne torde emellertid vara dubblingen av antalet silvertärnor, men samtidigt har de få paren småtärna försvunnit.

Naturreservat och Natura 2000-område.

Hävdn har minskat något vid varje inventeringsomgång.

SOCKEN: När

OMRÅDE NR: 7111

TOTAL AREAL: 50,8 ha

Inventerat den: 24/4, 4/5, 25/5, 8/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	80% väl, 20% måttligt	2,8
2001	100% väl	3,0
2006	40% väl, 40% måttligt, 20% svagt	2,2

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
13	16	14	101	101	49	1,99	1,99	0,96

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	2	1	1	0,04	0,02	0,02	Brushane						
Grågås							Enkelbeckasin	2			0,04		
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	5	9	5	0,10	0,18	0,10	Storspov	2	1	1	0,04	0,02	0,02
Snatrand							Rödbena	6	4	4	0,12	0,08	0,08
Kricka		1			0,02		Roskarl	4	1		0,08	0,02	
Gräsand	1	5	4	0,02	0,10	0,08	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta							Fiskmås	15	9	4	0,30	0,18	0,08
Skedand		1	1		0,02	0,02	Gråtrut						
Strandskata	9	12	7	0,18	0,24	0,14	Havstrut			1			0,02
Skärfläcka	15	17	6	0,30	0,33	0,12	Kentsk tärna						
St. strandpip.	11	8	2	0,22	0,16	0,04	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	18	21	10	0,35	0,41	0,20
Tofsvipa	10	7	2	0,20	0,14	0,04	Småtärna	3	2	1	0,06	0,04	0,02
Kärnsnäppa							Gulärta						



Södra delen av Närsholmens naturreservat

Kommentarer

Antalet arter är oförändrat men antalet häckande par har halverats. Stora minskningar har drabbat vanliga arter såsom större strandpipare, tofsvipa, fiskmås och silvertärna.

Naturreservat och Natura 2000-område. Kroksriv (och viken Krokan) omfattas av tillträdesförbud 15 mars-15 juli.

SOCKEN: Burs

OMRÅDE NR: 7201

TOTAL AREAL: 124 ha

Inventerat den: 1/5, 2/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% ej	0
2001	100% ej	0
2006	100% ej	0

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
9	7	10	16	21	26	1,29	1,69	2,10

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan			1			0,08	Brushane						
Grågås			1			0,08	Enkelbeckasin	2			0,16		
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	3	6	5	0,24	0,48	0,40	Storspov						
Snatterand							Rödbena	4	4	7	0,32	0,32	0,56
Kricka							Roskarl						
Gräsand	1	3	1	0,08	0,24	0,08	Dvärgmå						
Stjärtand							Skrattmå						
Årta							Fiskmå	1		4	0,08		0,32
Skedand	1	1	3	0,08	0,08	0,24	Gråtrut						
Strandskata	1	3	1	0,08	0,24	0,08	Havstrut						
Skärfläcka	2			0,16			Kentsk tärna						
St. strandpip.	1		1	0,08		0,08	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	2			0,16		
Tofsvipa		2	2		0,16	0,16	Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Kommentarer

En smärre ökning av fågelantalet trots att området fortfarande är ohävdad.

Från Krakstädar till Ajstagrinn (som ej ingår)

SOCKEN: Burs

OMRÅDE NR: 7202

TOTAL AREAL: 5,8 ha

Inventerat den: 1/5, 2/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% väl	3,0
2001	100% väl	3,0
2006	80% måttligt, 20% svagt	1,8

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
11	13	8	25	46	23	4,31	7,93	3,97

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan		1			0,17		Brushane						
Grågås			4			0,69	Enkelbeckasin						
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	3	13	6	0,52	2,24	1,03	Storspov	1			0,17		
Snatrand							Rödbena	3	2	3	0,52	0,34	0,52
Kricka	3	3	1	0,52	0,52	0,17	Roskarl		1			0,17	
Gräsand	3	6	1	0,52	1,03	0,17	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta		1			0,17		Fiskmås	1	8	5	0,17	1,38	0,86
Skedand	2	4	2	0,34	0,69	0,34	Gråtrut						
Strandskata	2	2	1	0,34	0,34	0,17	Havstrut						
Skärfläcka	2			0,34			Kentsk tärna						
St. strandpip.	1	1		0,17	0,17		Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna		2			0,34	
Tofsvipa	4	2		0,69	0,34		Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Norra delen av Bandlundaviken

Kommentarer

Området är inte längre alls lika väl hävdad. Artantalet är dock tillbaka till "normala" (?) förhållanden. De stora ökningarna 2001 för vissa arter t.ex. gravand och fiskmås halverades igen. Trots det är detta fiskmåsens näst högsta täthet.

Flera vanliga vadare har försvunnit (större strandpipare och tofsvipa). Fyra par grågäss har tillkommit.

SOCKEN: Burs

OMRÅDE NR: 7203

TOTAL AREAL: 11,0 ha

Inventerat den: 18/4, 1/5, 2/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% väl	3,0
2001	100% väl	3,0
2006	30% väl, 70% måttligt	2,3

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
9	8	9	23	29	22	2,09	2,64	2,00

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane						
Grågås			1			0,09	Enkelbeckasin			1			0,09
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	4	4	7	0,36	0,36	0,64	Storspov						
Snatterand							Rödbena	6	5	2	0,55	0,45	0,18
Kricka							Roskarl						
Gräsand		4	2		0,36	0,18	Dvärgmå						
Stjärtand							Skrattmå						
Årta							Fiskmå	2	3	5	0,18	0,27	0,45
Skedand	1		2	0,09		0,18	Gråtrut						
Strandskata	1	6	1	0,09	0,55	0,09	Havstrut						
Skärfläcka	3			0,27			Kentsk tärna						
St. strandpip.	3	3	1	0,27	0,27	0,09	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	2	2		0,18	0,18	
Tofsvipa	1	2		0,09	0,18		Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Inre delen av Bandlundaviken

Kommentarer

Endast smärre förändringar. Noterbart är kanske att det är synnerligen ont om häckande vadare, trots att området fortfarande är välhävdad. Möjligtvis är området för smalt.

SOCKEN: Burs

OMRÅDE NR: 7204

TOTAL AREAL: 58,5 ha

Inventerat den: 18/4, 1/5, 20/5, 2/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% väl	3,0
2001	70% väl, 30% måttligt	2,7
2006	30% väl, 50% måttligt, 20% svagt	2,1

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
19	16	18	246	199	146	4,21	3,40	2,50

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	2		1	0,03		0,02	Brushane	2	7	1	0,03	0,12	0,02
Grågås			2			0,03	Enkelbeckasin		1	4		0,02	0,07
Vitk. gås							Rödspov	1	1		0,02	0,02	
Gravand	10	15	19	0,17	0,26	0,32	Storspov	4	1	1	0,07	0,02	0,02
Snatrand							Rödbena	17	12	14	0,29	0,21	0,24
Kricka	3			0,05			Roskarl	12	8	9	0,21	0,14	0,15
Gräsand	3	7	6	0,05	0,12	0,10	Dvärgmås				0,48		
Stjärtand							Skrattmås	28					
Årta							Fiskmås	30	32	14	0,51	0,55	0,24
Skedand	1		1	0,02		0,02	Gråtrut						
Strandskata	17	16	12	0,29	0,27	0,21	Havstrut						
Skärfläcka	22	10	7	0,38	0,17	0,12	Kentsk tärna						
St. strandpip.	16	23	12	0,27	0,39	0,21	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	45	28	20	0,77	0,48	0,34
Tofsvipa	27	32	20	0,46	0,55	0,34	Småtärna	4	4	2	0,07	0,07	0,03
Kärnsnäppa	2	2	1	0,03	0,03	0,02	Gulärta						



Nordöstra delen av Hummelbosholms fågelskyddsområde

Kommentarer

Artantalet har varit i princip konstant under de senaste tio åren, däremot har antalet häckande fåglar minskat betydligt. Största minskningar har drabbat skärfläcka, större strandpipare och fiskmås. Området hyser fortfarande ett par kärnsnäppa men rödspovsparet har försvunnit. Hävden har minskat något.

Natura 2000-område och fågelskyddsområde med tillträdesförbud från 15 mars till 15 juli.

SOCKEN: Burs

OMRÅDE NR: 7205

TOTAL AREAL: 30,5 ha

Inventerat den: 18/4, 1/5, 20/5, 2/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	40% väl, 60% svagt	1,8
2001	20% väl, 30% måttligt, 50% svagt	1,7
2006	20% väl, 20% måttligt, 30% svagt, 30% ej	1,3

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
18	17	15	95	82	58	3,11	2,69	1,90

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane	6	4		0,20	0,13	
Grågås							Enkelbeckasin	2	3	5	0,07	0,10	0,16
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	2	7	1	0,07	0,23	0,03	Storspov	1	1		0,03	0,03	
Snatrand	1		1	0,03		0,03	Rödbena	10	4	6	0,33	0,13	0,20
Kricka	1	5	2	0,03	0,16	0,07	Roskarl	6	1	2	0,20	0,03	0,07
Gräsand		6	1		0,20	0,03	Dvärgmås						
Stjärtand	1			0,03			Skrattmås						
Årta							Fiskmås	4	4	4	0,13	0,13	0,13
Skedand	1	2	1	0,03	0,07	0,03	Gråtrut						
Strandskata	10	5	6	0,33	0,16	0,20	Havstrut						
Skärfläcka	9	7	8	0,30	0,23	0,26	Kentsk tärna						
St. strandpip.	14	4	3	0,46	0,13	0,10	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	5	6	7	0,16	0,20	0,23
Tofsvipa	19	17	8	0,62	0,56	0,26	Småtärna	2	4	3	0,07	0,13	0,10
Kärnsnäppa	1	2		0,03	0,07		Gulärta						



Södra delen av Hummelbosholms
fågelskyddsområde

Kommentarer

Fågellivet utarmas på denna förnämliga lokal. Sedan 2001 har båda de ovanliga arterna kärnsnäppa och brushane försvunnit och tofsvipebeståndet har halverats. Glädjande är dock att skärfläckekolonin är stabil, trots sin ringa storlek.

Hävden har varit i princip oförändrad de senaste tio åren.

Natura 2000-område och fågelskyddsområde med tillträdesförbud från 15 mars till 15 juli.

SOCKEN: Burs

OMRÅDE NR: 7206

TOTAL AREAL: 5,1 ha

Inventerat den: 18/4, 1/5, 20/5, 2/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% ej	0
2001	100% ej	0
2006	10% väl, 60% måttligt, 20% svagt, 10% ej	1,7

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
17	12	14	40	33	35	7,84	6,47	6,86

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1	2	1	0,20	0,39	0,20	Brushane						
Grågås			3			0,59	Enkelbeckasin	1			0,20		
Vitk. gås							Rödspov				0,20		
Gravand	4	8	6	0,78	1,57	1,18	Storspov	1			0,20		
Snatrand	1	1	1	0,20	0,20	0,20	Rödbena	5	2	3	0,98	0,39	0,59
Kricka	3	4		0,59	0,78		Roskarl	2	1	3	0,39	0,20	0,59
Gräsand	2	3	2	0,39	0,59	0,39	Dvärgmås						
Stjärtand		1			0,20		Skrattmås						
Årta							Fiskmås	2	2	1	0,39	0,39	0,20
Skedand			1			0,20	Gråtrut						
Strandskata	3	3	3	0,59	0,59	0,59	Havstrut						
Skärfläcka	4			0,78			Kentsk tärna	1			0,20		
St. strandpip.	2	3	3	0,39	0,59	0,59	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	5	3	5	0,98	0,59	0,98
Tofsvipa	2		2	0,39		0,39	Småtärna	1		1	0,20		0,20
Kärnsnäppa							Gulärta						



Sydligaste delen av Hummelbosholms
fågelskyddsområde, inkl ön Flusen

Kommentarer

Endast smärre förändringar. Att området numer hävdas återspeglas inte i någon ökning av strandängsfåglarna (åtminstone inte ännu). Även här har grågåsen etablerats sig (tre par). Kanske är det något uppseende- väckande att inga krickor längre häckar.

Området hyser femte högsta totala tätheten.

För enskilda arter gäller:

- högsta tätheten av roskarl,
- tredje högsta tätheten av strandskata,
- fjärde högsta tätheten av gravand,
- femte högsta tätheten av större strandpipare och silvertärna.

Natura 2000-område och fågelskyddsområde med tillträdesförbud från 15 mars till 15 juli.

SOCKEN: Rone

OMRÅDE NR: 7701


TOTAL AREAL: 14,6 ha

Inventerat den: 20/4, 24/5, 9/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	15% väl, 55% måttligt, 30% svagt	1,9
2001	100% ej	0
2006	30% väl, 40% måttligt, 30% svagt	2,0

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
21	20	17	81	85	41	5,55	5,82	2,81

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan		2	1		0,14	0,07	Brushane	2	2		0,14	0,14	
Grågås	2	5	4	0,14	0,34	0,27	Enkelbeckasin	2	4	1	0,14	0,27	0,07
Vitk. gås	3			0,21			Rödspov						
Gravand	3	4	6	0,21	0,27	0,41	Storspov						
Snatrand		1			0,07		Rödbena	8	9	3	0,55	0,62	0,21
Kricka	6	5	4	0,41	0,34	0,27	Roskarl	3	2	2	0,21	0,14	0,14
Gräsand	4	4	2	0,27	0,27	0,14	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås	6		1	0,41		0,07
Årta	1	1		0,07	0,07		Fiskmås	5	6	4	0,34	0,41	0,27
Skedand	3	3	2	0,21	0,21	0,14	Gråtrut						
Strandskata	4	5	1	0,27	0,34	0,07	Havstrut						
Skärfläcka	4	6	2	0,27	0,41	0,14	Kentsk tärna						
St. strandpip.	11	12	1	0,75	0,82	0,07	Fisktärna	2			0,14		
Ljungpipare							Silvertärna	2	3	2	0,14	0,21	0,14
Tofsvipa	7	8	3	0,48	0,55	0,21	Småtärna	1	2	2	0,07	0,14	0,14
Kärnsnäppa	2	1		0,14	0,07		Gulärta						



Nordost om Tomtbods fiskeläge

Kommentarer

Ett område som förvånar! Antalet häckande par har halverats sedan 2001. Varför är det bara ett par större strandpipare kvar, då det var drygt tio par för fem år sedan? Detsamma gäller tofsvipan, från 7-8 par ner till tre. Hävden har samtidigt gått från ohävdad till relativt välhävdad? Båda dessa arter trivs bäst i välbetade områden.

Den norra delen ingår i Hummelbosholms fågelskyddsområde där det råder tillträdesförbud från 15 mars till 15 juli.

SOCKEN: Rone

OMRÅDE NR: 7702


TOTAL AREAL: 12,8 ha

Inventerat den: 20/4, 24/5, 9/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% ej	0
2001	50% måttligt, 50% svagt	1,5
2006	75% väl, 15% måttligt, 10% svagt	2,7

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
17	14	16	75	47	35	5,86	3,67	2,73

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan		2			0,16		Brushane						
Grågås	2	1	2	0,16	0,08	0,16	Enkelbeckasin	8	7	4	0,63	0,55	0,31
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	2	4	3	0,16	0,31	0,23	Storspov						
Snatrand	1	1	1	0,08	0,08	0,08	Rödbena	12	7	4	0,94	0,55	0,31
Kricka	7	4	2	0,55	0,31	0,16	Roskarl	1	1	1	0,08	0,08	0,08
Gräsand	4	2	1	0,31	0,16	0,08	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås	3			0,23		
Årta	1			0,08			Fiskmås	6		1	0,47		0,08
Skedand	4	3	1	0,31	0,23	0,08	Gråtrut						
Strandskata	5	4	2	0,39	0,31	0,16	Havstrut						
Skärfläcka			1			0,08	Kentsk tärna						
St. strandpip.	5	4	3	0,39	0,31	0,23	Fisktärna	2			0,16		
Ljungpipare							Silvertärna	5		2	0,39		0,16
Tofsvipa	7	6	6	0,55	0,47	0,47	Småtärna		1	1		0,08	0,08
Kärnsnäppa							Gulärta						



Sydväst om Tomtebods fiskeläge

Kommentarer

Området är numer välhävdad men antalet häckande par har halverats sedan 1996. Det är dock ingen större skillnad i artsammansättningen – det är ungefär samma arter som häckar år efter år, men i generellt lägre numerär.

SOCKEN: Rone

OMRÅDE NR: 7703

TOTAL AREAL: 19,5 ha

Inventerat den: 20/4, 24/5, 9/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	90% väl, 10% måttligt	2,9
2001	90% väl, 10% måttligt	2,9
2006	85% väl, 10% måttligt, 5% svagt	2,8

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
18	13	13	80	32	30	4,10	1,64	1,54

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	4		1	0,21		0,05	Brushane						
Grågås		2	2		0,10	0,10	Enkelbeckasin	4	2	1	0,21	0,10	0,05
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	2		3	0,10		0,15	Storspov	1			0,05		
Snatrand							Rödbena	9	4	3	0,46	0,21	0,15
Kricka	10	1	1	0,51	0,05	0,05	Roskarl	6	2	1	0,31	0,10	0,05
Gräsand	2	1	3	0,10	0,05	0,15	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta							Fiskmås	12	5	9	0,62	0,26	0,46
Skedand	2			0,10			Gråtrut						
Strandskata	1	2	2	0,05	0,10	0,10	Havstrut	1			0,05		
Skärfläcka	2	1		0,10	0,05		Kentsk tärna						
St. strandpip.	8	5	2	0,41	0,26	0,10	Fisktärna	4			0,21		
Ljungpipare							Silvertärna	1	1	1	0,05	0,05	0,05
Tofsvipa	10	5	1	0,51	0,26	0,05	Småtärna	1	1		0,05	0,05	
Kärnsnäppa							Gulärta						



Mellan fiskelägena Tomtbod och Hus

Kommentarer

Den stora minskningen av antalet par har avstannat. Det finns dock bara 10% av bestånden kvar av vipor och krickor jämfört med 1996. Området är fortfarande välhävdad.

SOCKEN: Rone

OMRÅDE NR: 7704

TOTAL AREAL: 8,9 ha

Inventerat den: 20/4, 24/5, 9/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% väl	3,0
2001	100% väl	3,0
2006	90% väl, 10% måttligt	2,9

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
13	12	4	35	20	8	3,93	2,25	0,90

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane						
Grågås							Enkelbeckasin	2	1	1	0,22	0,11	0,11
Vitk. gås	2			0,22			Rödspov						
Gravand	1	2	3	0,11	0,22	0,34	Storspov						
Snatrand							Rödbena	5	3		0,56	0,34	
Kricka	4	3		0,45	0,34		Roskarl	2	1		0,22	0,11	
Gräsand		1			0,11		Dvärgmås						
Stjärtand	1			0,11			Skrattmås						
Årta							Fiskmås		2	3		0,22	0,34
Skedand	1			0,11			Gråtrut						
Strandskata	3	3		0,34	0,34		Havstrut						
Skärfläcka							Kentsk tärna						
St. strandpip.	5	1		0,56	0,11		Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	3	1	1	0,34	0,11	0,11
Tofsvipa	5	1		0,56	0,11		Småtärna	1	1		0,11	0,11	
Kärnsnäppa							Gulärta						



Norr om Hus fiskeläge

Kommentarer

Katastrofminskning! Nu är det bara ¼ av fågelbeståndet kvar. Endast gravand bland häckande änder, och ett par enkelbeckasin bland vadarna. Hävdintensiteten är oförändrat hög.

Inventerat den: 21/4, 8/5, 18/5, 12/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	40% väl, 60% måttligt	2,4
2001	40% väl, 60% måttligt	2,4
2006	80% väl, 15% måttligt, 5% svagt	2,8

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
19	22	20	132	197	169	4,02	6,01	5,15

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	2	3	2	0,07	0,09	0,07	Brushane						
Grågås	9	15	15	0,27	0,46	0,46	Enkelbeckasin	3	1		0,09	0,03	
Vitk. gås	4	28	55	0,12	0,85	1,68	Rödspov						
Gravand	3	5	3	0,09	0,15	0,09	Storspov		1			0,03	
Snatrand							Rödbena	7	7	2	0,23	0,23	0,07
Kricka	5	6	1	0,15	0,18	0,03	Roskarl	5	5	4	0,15	0,15	0,12
Gräsand	2	4	2	0,07	0,12	0,07	Dvärgmås						
Stjärtand	1	2		0,03	0,07		Skrattmås		8	2		0,24	0,07
Årta							Fiskmås	16	18	22	0,49	0,55	0,67
Skedand	9	11	6	0,27	0,34	0,18	Gråtrut	23	29	28	0,70	0,88	0,85
Strandskata	9	8	2	0,27	0,24	0,07	Havstrut	2	4	5	0,07	0,12	0,15
Skärfläcka			2			0,07	Kentsk tärna						
St. strandpip.	10	11	2	0,30	0,34	0,07	Fisktärna	6	4		0,18	0,12	
Ljungpipare							Silvertärna	10	14	12	0,30	0,43	0,37
Tofsvipa	7	8	1	0,21	0,24	0,03	Småtärna	2	3	2	0,07	0,09	0,07
Kärnsnäppa							Gulärta						



Del av Ålärve naturreservat inkl Getorskärr

Kommentarer

Det är fortsatt hög täthet (nionde högsta), mycket beroende på det stora antalet gäss och i viss mån kolonierna av mås och trut,

- näst högsta tätheten av gråtrut och havstrut och
- tredje högsta tätheten av fiskmås.

De 20 häckande arterna utgör inventeringens fjärde högsta antal. Noterbart är dock att vanliga arter såsom större strandpipare, tofsvipa och rödbena minskat de senaste fem åren.

Ett av två områden som hyser häckande vitkindade gäss.

Naturreservat och Natura 2000-område.

SOCKEN: Rone

OMRÅDE NR: 7706

TOTAL AREAL: 29,4 ha

Inventerat den: 21/4, 8/5, 18/5, 12/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	10% väl, 90% måttligt	2,1
2001	100% måttligt	2,0
2006	30% väl, 50% måttligt, 20% svagt	2,1

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
20	23	24	497	596	652	16,90	20,27	22,18

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	2	3	3	0,07	0,10	0,10	Brushane	1	3	1	0,03	0,10	0,03
Grågås	6	7	9	0,20	0,24	0,31	Enkelbeckasin		1	1		0,03	0,03
Vitk. gås	41	154	178	1,39	5,24	6,05	Rödspov						
Gravand	3	6	8	0,10	0,20	0,27	Storspov	2	2	2	0,07	0,07	0,07
Snatrand			1			0,03	Rödbena	8	13	12	0,27	0,44	0,41
Kricka		1	1		0,03	0,07	Roskarl	15	11	10	0,51	0,37	0,34
Gräsand		2	2		0,07	0,07	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås	12	16	47	0,41	0,54	1,60
Årta							Fiskmås	177	165	166	6,02	5,61	5,65
Skedand	6	5	6	0,20	0,17	0,20	Gråtrut	59	63	54	2,01	2,14	1,84
Strandskata	21	15	16	0,71	0,51	0,54	Havstrut	5	4	5	0,17	0,14	0,17
Skärfläcka	3	4	3	0,10	0,14	0,10	Kentsk tärna						
St. strandpip.	12	10	13	0,41	0,34	0,44	Fisktärna	15	9	2	0,51	0,31	0,07
Ljungpipare							Silvertärna	106	96	103	3,61	3,27	3,50
Tofsvipa	1	3	4	0,03	0,10	0,14	Småtärna	2	3	4	0,07	0,10	0,14
Kärnsnäppa							Gulärta						



Sigdesholm (Rone Innerholme)

Kommentarer

Ett område som går mot strömmen – fågelantalet ökar! Området hyser den i särklass högsta totala tätheten, samt högsta antalet arter utav alla inventerade områden. Det är inga enorma ökningar men det mest glädjande torde vara att skratmåsarna har blivit 2-3 gånger fler. Det är också fortsatt stora kolonier av fiskmås och silvertärna. Tillsammans med föregående område de enda som har häckande vitkindade gäss. Den enda egentliga minskningen gäller fisktärnan.

Högsta tätheten av fiskmås, gråtrut, havstrut och silvertärna. Näst högsta tätheten av roskarl och skratmås. Tredje högsta tätheten av brushane (trots bara ett par) - ett av fem områden med brushane.


Hävdan har varit oförändrad under de senaste tio åren, inom detta Natura 2000-område.

Inventerat den: 17/4, 27/4, 11/5, 30/5, 6/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	50% väl, 50% måttligt	2,5
2001	20% väl, 50% måttligt, 30% svagt	1,9
2006	20% måttligt, 80% svagt	1,2

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
20	21	18	158	176	97	3,52	3,92	2,16

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	4	16	12	0,09	0,36	0,27	Brushane						
Grågås			6			0,13	Enkelbeckasin	3	2		0,07	0,04	
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	5	5	5	0,11	0,11	0,11	Storspov	1	1		0,02	0,02	
Snatterand	1	2	2	0,02	0,04	0,04	Rödbena	10	5	4	0,22	0,11	0,09
Kricka		4			0,09		Roskarl	5	5	2	0,11	0,11	0,04
Gräsand	2	9	2	0,04	0,20	0,04	Dvärgmåås						
Stjärtand							Skrattmåås						
Årta		1			0,02		Fiskmåås	3	5	5	0,07	0,11	0,11
Skedand	3	4	2	0,07	0,09	0,04	Gråtrut	50	52	17	1,11	1,16	0,38
Strandskata	11	10	7	0,24	0,22	0,16	Havstrut	5	4	4	0,11	0,09	0,09
Skärfläcka	9	12		0,20	0,27		Kentsk tärna						
St. strandpip.	14	13	7	0,31	0,29	0,16	Fisktärna	1		6	0,02		0,13
Ljungpipare							Silvertärna	12	8	8	0,27	0,18	0,18
Tofsvipa	15	12	6	0,33	0,27	0,13	Småtärna	2	3	1	0,04	0,07	0,04
Kärnsnäppa	2	3	1	0,04	0,07	0,02	Gulärta						



Söder om Petesvik, inkl öarna Grunnen och Skäret

Kommentarer

En minskning har skett. De största förlorarna är skärfläcka (försvunnit), tofsvipa, rödbena men framförallt gråtruten – nu återstår bara drygt 1/3 av kolonin.

Detta är dock en av de få områden som fortfarande hyser häckande sydlig kärnsnäppa på de gotländska strandängarna. Glädjande är också ökningen av antalet fisktärnor, nu till sex häckande par (tredje högsta tätheten).

Näst högsta tätheten av knölsvan och tredje högsta tätheten av gråtrut.


Största delen av området ingår i Natura 2000.

Inventerat den: 17/4, 2/5, 11/5, 31/5 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	50% måttligt, 50% svagt	1,5
2001	40% väl, 40% måttligt, 20% svagt	2,2
2006	20% måttligt, 60% svagt, 20% ej	1,0

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
20	18	17	171	221	76	2,09	2,70	0,93

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	3	1		0,04	0,01		Brushane						
Grågås			1			0,01	Enkelbeckasin	7	3	3	0,09	0,04	0,04
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	7	15	6	0,09	0,18	0,07	Storspov	6	3	3	0,07	0,04	0,04
Snatrand	1	2	1	0,01	0,02	0,01	Rödbena	13	9	7	0,16	0,11	0,09
Kricka	2	8	1	0,02	0,10	0,01	Roskarl	3	4	2	0,04	0,05	0,02
Gräsand	4	5	4	0,05	0,06	0,05	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta	2		1	0,02		0,01	Fiskmås	11	9	10	0,13	0,11	0,12
Skedand	3		2	0,04		0,02	Gråtrut	15	23	4	0,18	0,28	0,05
Strandskata	16	17	8	0,20	0,21	0,10	Havstrut	2	2		0,02	0,02	
Skärfläcka	8	78		0,10	0,95		Kentsk tärna						
St. strandpip.	12	13	5	0,15	0,16	0,06	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	40	15	12	0,49	0,18	0,15
Tofsvipa	14	13	6	0,17	0,16	0,07	Småtärna	2	1		0,02	0,01	
Kärnsnäppa							Gulärta						



Vakten samt skäret Gjauseåden

Kommentarer

Antalet häckande par har minskat med ca 70% på de senaste fem åren! Största skillnaden utgörs av den försvunna kolonin med skärfläckor (78 par) och de numer bara fyra paren gråtrut (tidigare ca 20 par).

Halveringar har skett för gravand, strandskata, större strandpipare och tofsvipa. Hävden har minskat betydligt.

Området närmast havet (ca 100 m) ingår i Natura 2000.

Inventerat den: 17/4, 14/5, 31/5 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	40% väl, 20% måttligt, 40% svagt	2,0
2001	50% väl, 50% måttligt	2,5
2006	40% väl, 50% måttligt, 10% svagt	2,3

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
15	16	12	64	61	48	2,40	2,28	1,80

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1		1	0,04		0,04	Brushane						
Grågås							Enkelbeckasin	1	2		0,04	0,07	
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	8	10	1	0,30	0,37	0,04	Storspov		1			0,04	
Snatterand							Rödbena	7	3	4	0,26	0,11	0,15
Kricka		2			0,07		Roskarl	4	3	2	0,15	0,11	0,07
Gräsand	2	3	1	0,07	0,11	0,04	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta	1	1		0,04	0,04		Fiskmås	5	4	3	0,19	0,15	0,11
Skedand	1	2		0,04	0,07		Gråtrut						
Strandskata	9	9	8	0,34	0,34	0,30	Havstrut						
Skärfläcka	2	3	10	0,07	0,11	0,37	Kentsk tärna						
St. strandpip.	9	7	3	0,34	0,26	0,11	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	7	3	6	0,26	0,11	0,22
Tofsvipa	6	6	4	0,22	0,22	0,15	Småtärna	1	2	5	0,04	0,07	0,19
Kärnsnäppa							Gulärta						



Mellan Alsviks fiskeläge och Holmuddarna

Kommentarer

Smärre försämring bland fågelpopulationen. Dock stor minskning för gravanden (från tio till ett par) och större strandpipare (från sju till tre par). Glädjande ökningar noteras för skärfläcka (näst störst kolonin) och småtärna. Båda dessa arter kan sägas utgöra "ansvarsarter" för Gotland.


Hävden har varit oförändrad under senaste tio åren.

TOTAL AREAL: 13,6 ha

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% måttligt	2,0
2001	80% väl, 20% måttligt	2,8
2006	30% väl, 50% måttligt, 20% svagt	2,1

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
11	13	13	26	27	32	1,91	1,99	2,35

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan		1	1		0,07	0,07	Brushane						
Grågås			1			0,07	Enkelbeckasin	1	1		0,07	0,07	
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	1	4	4	0,07	0,29	0,29	Storspov						
Snatterand							Rödbena	2	1	2	0,15	0,07	0,15
Kricka		2			0,15		Roskarl	1	2	2	0,07	0,15	0,15
Gräsand			2			0,15	Dvärgmåås						
Stjärtand							Skrattmåås						
Årta			1			0,07	Fiskmåås	2	4	5	0,15	0,29	0,37
Skedand	2			0,15			Gråtrut						
Strandskata	6	4	3	0,44	0,29	0,22	Havstrut		1			0,07	
Skärfläcka	2	2	3	0,15	0,15	0,22	Kentsk tärna						
St. strandpip.	4		3	0,29		0,22	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	3	2	2	0,22	0,15	0,15
Tofsvipa	2	2	3	0,15	0,15	0,22	Småtärna		1			0,07	
Kärnsnäppa							Gulärta						



Endast mindre förändringar i antal arter, antal häckande par och hävd.

98

SOCKEN: Hablingbo

OMRÅDE NR: 8305

TOTAL AREAL: 17,7 ha

Inventerat den: 17/4, 14/5, 31/5 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	20% väl, 80% ej	0,6
2001	60% väl, 20% måttligt, 20% svagt	2,4
2006	10% väl, 40% måttligt, 20% svagt, 30% ej	1,3

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
14	11	11	43	31	29	2,43	1,75	1,64

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan		1			0,06		Brushane						
Grågås			6			0,34	Enkelbeckasin	1	3	1	0,06	0,17	0,06
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	7	6	3	0,40	0,34	0,17	Storspov						
Snatrand			1			0,06	Rödbena	4	2	4	0,23	0,11	0,23
Kricka	4			0,23			Roskarl	3	1	1	0,17	0,06	0,06
Gräsand	2	1	3	0,11	0,06	0,17	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta							Fiskmås	2			0,11		
Skedand	3			0,17			Gråtrut						
Strandskata	5	4	3	0,28	0,23	0,17	Havstrut						
Skärfläcka	3	6		0,17	0,34		Kentsk tärna						
St. strandpip.	3	3	1	0,17	0,17	0,06	Fisktärna	1			0,06		
Ljungpipare							Silvertärna	2	1	3	0,11	0,06	0,17
Tofsvipa	3	3	3	0,17	0,17	0,17	Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Innanför västra delen av Mjauviken

Kommentarer

I princip är det oförändrad fågelfauna de senaste fem åren. Noterbart är att minst hävd gav flest häckande arter och flest häckande par.

SOCKEN: Hablingbo

OMRÅDE NR: 8306

TOTAL AREAL: 12,1 ha

Inventerat den: 25/4, 16/5, 31/5 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% väl	3,0
2001	70% väl, 30% måttligt	2,7
2006	60% väl, 40% måttligt	2,6

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
11	13	10	26	21	26	2,15	1,74	2,15

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan		1			0,08		Brushane						
Grågås							Enkelbeckasin						
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	3	1	3	0,25	0,08	0,25	Storspov						
Snatrand							Rödbena	2	2	2	0,17	0,17	0,17
Kricka		1			0,08		Roskarl	3	2	2	0,25	0,17	0,17
Gräsand	1	1	2	0,08	0,08	0,17	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta		1			0,08		Fiskmås	2			0,17		
Skedand	1		1	0,08		0,08	Gråtrut						
Strandskata	3	3	3	0,25	0,25	0,25	Havstrut						
Skärfläcka	2	2	1	0,17	0,17	0,08	Kentsk tärna						
St. strandpip.	4	1	2	0,33	0,08	0,17	Fisktärna		1			0,08	
Ljungpipare							Silvertärna	2	3	5	0,17	0,25	0,41
Tofsvipa	3	2	5	0,25	0,17	0,41	Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Innanför mellersta delen av Mjauviken

Kommentarer

Endast smärre förändringar i antalet arter och par mellan de tre inventeringarna. Hävden har också varit densamma.

SOCKEN: Hablingbo

OMRÅDE NR: 8307


TOTAL AREAL: 7,7 ha

Inventerat den: 25/4, 16/5, 31/5 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% ej	0
2001	100% ej	0
2006	20% svagt, 80% ej	0,2

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
11	6	6	18	18	8	2,34	2,34	1,04

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1			0,13			Brushane						
Grågås			1			0,13	Enkelbeckasin						
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	5	6	3	0,65	0,78	0,39	Storspov						
Snatrand		1	1		0,13	0,13	Rödbena	2		1	0,26		0,13
Kricka		2	1		0,26	0,13	Roskarl	1			0,13		
Gräsand	2	3		0,26	0,39		Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta	1			0,13			Fiskmås						
Skedand	1	1		0,13	0,13		Gråtrut						
Strandskata	2	5	1	0,26	0,65	0,13	Havstrut						
Skärfläcka	1			0,13			Kentsk tärna						
St. strandpip.	1			0,13			Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	1			0,13		
Tofsvipa							Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Innanför mellersta delen av Mjauviken

Kommentarer


Ett i princip fortfarande ohävdad område. Stor minskning av antalet häckande par under de senaste fem åren. Antalet arter är oförändrat lågt.

Inventerat den: 23/4, 2/5, 25/5, 6/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	60% väl, 20% svagt, 20% ej	2,0
2001	60% väl, 20% måttligt, 20% svagt	2,4
2006	40% väl, 20% måttligt, 20% svagt, 20% ej	1,8

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
17	19	16	87	117	117	3,03	4,08	4,08

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	2	4		0,07	0,14		Brushane						
Grågås			8			0,28	Enkelbeckasin	1	2		0,03	0,07	
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	10	17	31	0,35	0,59	1,08	Storspov						
Snatterand	1	1		0,03	0,03		Rödbena	8	4	6	0,28	0,14	0,21
Kricka		5	2		0,17	0,07	Roskarl	4	5	4	0,14	0,17	0,14
Gräsand	6	8	7	0,21	0,28	0,24	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta	1	1	1	0,03	0,03	0,03	Fiskmås	6	4	7	0,21	0,14	0,24
Skedand	2	10	7	0,07	0,35	0,24	Gråtrut						
Strandskata	9	12	8	0,31	0,42	0,28	Havstrut		2			0,07	
Skärfläcka	8	3	2	0,28	0,10	0,07	Kentsk tärna	1			0,03		
St. strandpip.	7	14	10	0,24	0,49	0,35	Fisktärna	2	2		0,07	0,07	
Ljungpipare							Silvertärna	8	10	11	0,28	0,35	0,38
Tofsvipa	11	11	9	0,38	0,38	0,31	Småtärna	1	3	2	0,03	0,10	0,07
Kärnsnäppa							Gulärta						



Innanför östligaste delen av Mjauviken,
samt innanför Nisseviken

Kommentarer

Fortsatt hög täthet – lika många häckande par som 2001. Antalet gravänder har tredubblats (femte högsta tätheten) jämfört med 1996 och de åtta paren grågäss är nya sedan förra inventeringen. Fisktärna och snatterand har dessvärre försvunnit.

Hävdan är i princip oförändrad.

Inventerat den: 19/4, 2/5, 29/5, 15/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	30% väl, 70% måttligt	2,3
2001	65% väl, 35% måttligt	2,7
2006	70% väl, 30% måttligt	2,7

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
17	17	16	59	65	43	4,72	5,20	3,44

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane						
Grågås	2	2	5	0,16	0,16	0,40	Enkelbeckasin	1	2	2	0,08	0,16	0,16
Vitk. gås							Rödspov		1			0,08	
Gravand	1	3	4	0,08	0,24	0,32	Storspov	1		1	0,08		0,08
Snatteband							Rödbena	5	6	3	0,40	0,48	0,24
Kricka	8	6	2	0,64	0,48	0,16	Roskarl	1	2	2	0,08	0,16	0,16
Gräsand	1	2	2	0,08	0,16	0,16	Dvärgmås						
Stjärtand	1	1		0,08	0,08		Skrattmås	2			0,16		
Årta							Fiskmås	2	2	1	0,16	0,16	0,08
Skedand	2	2	2	0,16	0,16	0,16	Gråtrut						
Strandskata	8	4	3	0,64	0,32	0,24	Havstrut						
Skärfläcka	2	6	3	0,16	0,48	0,24	Kentsk tärna						
St. strandpip.	8	7	3	0,64	0,56	0,24	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna		4	4		0,32	0,32
Tofsvipa	12	12	4	0,96	0,96	0,32	Småtärna	2	3	2	0,16	0,24	0,16
Kärnsnäppa							Gulärta						



Yttersta delen av Grötlingboudd

Kommentarer

Smärre försämring i fågeltätheten. Mest noterbara minskningar utgörs av kricka, större strandpipare och framförallt tofsvipa. Hävden har varit i princip oförändrad de senaste tio åren.

Ingår i naturreservatet Grötlingboholme, i CW-området* Gotlands ostkust, samt i Natura 2000.

* CW-område = Convention of Wetlands of International Importance, även kallat Ramsar-område. En global naturvårdskonvention om att skydda och bevara våtmarker och vattenmiljöer och deras livsformer och använda dem på ett hållbart sätt. Sverige har förbundit sig att följa dessa direktiv.

Inventerat den: 19/4, 2/5, 29/5, 15/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% väl	3,0
2001	60% väl, 40% måttligt	2,6
2006	80% väl, 20% måttligt	2,8

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
21	16	17	99	96	59	4,88	4,73	2,91

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1			0,05			Brushane						
Grågås	2	2	7	0,10	0,10	0,34	Enkelbeckasin		2	2		0,10	0,10
Vitk. gås							Rödspov				0,05		
Gravand	2	6	6	0,10	0,30	0,30	Storspov	1			0,05		
Snatrand	1	1		0,05	0,05		Rödbena	7	5	2	0,34	0,25	0,10
Kricka	6	7	2	0,30	0,34	0,10	Roskarl	7	1	1	0,34	0,05	0,05
Gräsand	1	2	5	0,05	0,10	0,25	Dvärgmås						
Stjärtand	2			0,10			Skrattmås	19		3	0,94		0,15
Årta							Fiskmås		3	2		0,15	0,10
Skedand	4	5	4	0,20	0,25	0,20	Gråtrut						
Strandskata	8	7	4	0,40	0,34	0,20	Havstrut						
Skärfläcka	3	18	2	0,15	0,89	0,10	Kentsk tärna	1			0,05		
St. strandpip.	11	13	6	0,54	0,64	0,30	Fisktärna	3		1	0,15		0,05
Ljungpipare							Silvertärna	9	11	8	0,44	0,54	0,39
Tofsvipa	9	12	3	0,44	0,59	0,15	Småtärna	1	1	1	0,05	0,05	0,05
Kärnsnäppa	1			0,05			Gulärta						



Sydöstra delen av Grötlingboud,
från reservatsgräns till Själång

Kommentarer

Betydligt lägre täthet – det har skett en halvering i antalet häckande par. På minuskontot återfinns kricka (från sju till två par), större strandpipare (från 13 till sex par), tofsvipa (från tolv till tre par) och rödbena (från fem till två par). Ökning har skett för grågås och gräsand. Ingen skillnad i hävd mellan inventeringsåren.

Området ingår i CW-området* Gotlands ostkust och i Natura 2000.

* se sid 101.

Inventerat den: 19/4, 2/5, 12/5, 29/5, 15/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	10% väl, 50% måttligt, 40% svagt	1,7
2001	70% väl, 30% svagt	2,4
2006	75% väl, 25% måttligt	2,8

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
24	27	18	358	304	89	12,30	10,45	3,06

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	4	4	2	0,14	0,14	0,07	Brushane		1			0,03	
Grågås	15	11	3	0,52	0,38	0,10	Enkelbeckasin		1	1		0,03	0,03
Vitk. gås	4	1		0,14	0,03		Rödspov	1	1		0,03	0,03	
Gravand	4	10	4	0,14	0,34	0,14	Storspov						
Snatterand	2	1	3	0,07	0,03	0,10	Rödbena	15	17	3	0,52	0,58	0,10
Kricka	20	11	1	0,69	0,38	0,03	Roskarl	14	8	6	0,48	0,27	0,21
Gräsand	4	6	2	0,14	0,21	0,07	Dvärgmås						
Stjärtand	6	4		0,21	0,14		Skrattmås	40	28		1,37	0,96	
Årta							Fiskmås	39	31	13	1,34	1,07	0,45
Skedand	26	14	7	0,89	0,48	0,24	Gråtrut	16	11	6	0,55	0,38	0,21
Strandskata	15	15	7	0,52	0,52	0,24	Havstrut	5	8		0,17	0,27	
Skärfläcka	11	24	3	0,38	0,82	0,10	Kentsk tärna	1	2		0,03	0,07	
St. strandpip.	24	15	5	0,82	0,52	0,17	Fisktärna	45	22	2	1,55	0,76	0,07
Ljungpipare							Silvertärna	29	37	14	1,00	1,27	0,48
Tofsvipa	15	14	2	0,52	0,48	0,07	Småtärna	3	5	3	0,10	0,17	0,03
Kärnsnäppa		2			0,07		Gulärta						



Södra delen av Grötlingboud - Austerviken och Tuttar

Kommentarer

Katastrofal minskning i fågelantal! Mindre än 30% finns kvar. Minskningen gäller alla olika "typer" av strandängsfåglarna; änder, vadare, trut- och måsfåglar. Området har blivit något mer välhävdat men det kan knappast vara den enda förklaringen till den enorma minskningen. Det är lätt att tänka sig att predation från främst räv kan vara den största orsaken.

Området ingår i CW-området* Gotlands ostkust och i Natura 2000.


* se sid 101.

Inventerat den: 19/4, 2/5, 29/5 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	80% väl, 20% måttligt	2,8
2001	80% väl, 20% måttligt	2,8
2006	90% väl, 10% måttligt	2,9

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
14	16	12	68	58	23	5,00	4,26	1,69

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan		1			0,07		Brushane						
Grågås		2			0,15		Enkelbeckasin	2	1		0,15	0,07	
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand		5	3		0,37	0,22	Storspov						
Snatrand							Rödbena	7	2	1	0,51	0,15	0,07
Kricka	3			0,22			Roskarl	3	1	1	0,22	0,07	0,07
Gräsand	1	2	1	0,07	0,15	0,07	Dvärgmås						
Stjärtand	1			0,07			Skrattmås	2	4		0,15	0,29	
Årta							Fiskmås	3	5	5	0,22	0,37	0,37
Skedand	3			0,22			Gråtrut						
Strandskata	3	7	2	0,22	0,51	0,15	Havstrut						
Skärfläcka	10	9	1	0,74	0,66	0,07	Kentsk tärna						
St. strandpip.	15	5	2	1,10	0,37	0,15	Fisktärna	4	2		0,29	0,15	
Ljungpipare							Silvertärna		4	3		0,29	0,22
Tofsvipa	9	4	1	0,66	0,29	0,07	Småtärna	4	3	2	0,29	0,22	0,15
Kärnsnäppa							Gulärta						



Bankvät, samt intilliggande strandängar

Kommentarer

Det återstår bara 30-40% av fågelfaunan. Under de senaste tio åren har skärfläcka, större strandpipare, rödbena och tofsvipa minskat med 85-90%. Liksom för föregående område kan man misstänka att predation från räv är den främsta orsaken till minskningarna.

Hävden är oförändrad.

Området ingår i CW-området* Gotlands ostkust och i Natura 2000.


* se sid 101.

Inventerat den: 19/4, 2/5, 29/5 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	60% väl, 40% måttligt	2,6
2001	60% väl, 40% måttligt	2,6
2006	70% väl, 30% måttligt	2,7

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
12	11	11	39	32	13	2,10	1,72	0,70

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane						
Grågås		2			0,11		Enkelbeckasin	3	2	1	0,16	0,11	0,05
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	1	2	2	0,05	0,11	0,11	Storspov						
Snatterand							Rödbena	5	4	1	0,27	0,22	0,05
Kricka	1			0,05			Roskarl	3	1	1	0,16	0,05	0,05
Gräsand	1	1	1	0,05	0,05	0,05	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås	1			0,05		
Årta							Fiskmås	1	2	1	0,05	0,11	0,05
Skedand			1			0,05	Gråtrut						
Strandskata	3	4	1	0,16	0,22	0,05	Havstrut						
Skärfläcka							Kentsk tärna						
St. strandpip.	8	6	1	0,43	0,32	0,05	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	1	2	2	0,05	0,11	0,11
Tofsvipa	11	6	1	0,59	0,32	0,05	Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Kommentarer

Antalet häckande arter har varit konstant, däremot återstår bara en 1/3 av antalet häckande par. Störst minskningar för de vanliga arterna större strandpipare och tofsvipa.

Inga förändringar i hävd.

Området ingår i CW-området* Gotlands ostkust och i Natura 2000.

* se sid 101.


Mellan Flutings fiskeläge och Bankvät

Inventerat den: 19/4, 2/5, 29/5, 15/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	10% väl, 60% måttligt, 30% svagt	1,8
2001	10% väl, 80% måttligt, 10% svagt	2,0
2006	80% väl, 20% måttligt	2,8

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
22	19	17	103	75	48	7,46	5,43	3,48

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1	2	1	0,07	0,14	0,07	Brushane						
Grågås	5	4	1	0,36	0,29	0,07	Enkelbeckasin	2	1		0,14	0,07	
Vitk. gås	2			0,14			Rödspov						
Gravand	10	6	6	0,72	0,43	0,43	Storspov						
Snatrand	1	1		0,07	0,07		Rödbena	7	7	1	0,51	0,51	0,07
Kricka	4	2	2	0,29	0,14	0,14	Roskarl	11	6	4	0,80	0,43	0,29
Gräsand	3	2	1	0,22	0,14	0,07	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås	2			0,14		
Årta	1			0,07			Fiskmås	7	6	8	0,51	0,43	0,58
Skedand	1	2	2	0,07	0,14	0,14	Gråtrut	3	1		0,22	0,07	
Strandskata	7	4	3	0,51	0,29	0,22	Havstrut	1			0,07		
Skärfläcka	6	3	3	0,43	0,22	0,22	Kentsk tärna						
St. strandpip.	11	9	3	0,80	0,65	0,22	Fisktärna	5	2	2	0,36	0,14	0,14
Ljungpipare							Silvertärna	6	5	5	0,43	0,36	0,36
Tofsvipa	8	9	3	0,58	0,65	0,22	Småtärna	1	2	2	0,07	0,14	0,14
Kärnsnäppa							Gulärta						



Norr om Flutings fiskeläge samt Dovgrunn

Kommentarer

Fågeltätheten har minskat i takt med att området har blivit mer välhävdad. Även här har det skett betydande minskningar bland de vanliga arterna strandskata, större strandpipare, tofsvipa och rödbena. Det är emellertid höga tätheter för fisktärna (näst högsta) och fiskmås (femte högsta).

Området ingår i CW-området* Gotlands ostkust och i Natura 2000.

* se sid 101.

SOCKEN: Grötlingbo

OMRÅDE NR: 8607


TOTAL AREAL: 10,6 ha

Inventerat den: 19/4, 2/5, 15/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	20% måttligt, 80% svagt	1,2
2001	20% måttligt, 80% svagt	1,2
2006	30% väl, 50% måttligt, 20 svagt	2,1

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
14	12	13	29	27	16	2,74	2,55	1,51

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1			0,09			Brushane						
Grågås	2	3	1	0,19	0,28	0,09	Enkelbeckasin						
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	4	4	2	0,38	0,38	0,19	Storspov						
Snatrand							Rödbena	2	3	1	0,19	0,28	0,09
Kricka	1	1	1	0,09	0,09	0,09	Roskarl	1		1	0,09		0,09
Gräsand	2	1	1	0,19	0,09	0,09	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta							Fiskmås	3	2	1	0,28	0,19	0,09
Skedand							Gråtrut						
Strandskata	2	2	1	0,19	0,19	0,09	Havstrut						
Skärfläcka	2	1	1	0,19	0,09	0,09	Kentsk tärna						
St. strandpip.	4	3	1	0,38	0,28	0,09	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	1	1	2	0,09	0,09	0,19
Tofsvipa	3	4	1	0,28	0,38	0,09	Småtärna	1	2	2	0,09	0,19	0,19
Kärnsnäppa							Gulärta						



Väster om Flutings fiskeläge

Kommentarer

Relativt kraftig minskning av antalet häckande par.
Området har samtidigt blivit betydligt mer välhävdad.
Korrelation?

SOCKEN: Grötlingbo

OMRÅDE NR: 8608

TOTAL AREAL: 20,0 ha

Inventerat den: 19/4, 3/5, 14/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	60% måttligt, 40% svagt	1,6
2001	85% väl, 15% måttligt	2,9
2006	70% väl, 30% måttligt	2,7

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
17	15	16	64	71	47	3,20	3,55	2,35

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1	1	1	0,05	0,05	0,05	Brushane						
Grågås	1	3	1	0,05	0,15	0,05	Enkelbeckasin	2	3	1	0,10	0,15	0,05
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	8	7	5	0,40	0,35	0,25	Storspov						
Snatrand							Rödbena	8	14	6	0,40	0,70	0,30
Kricka	6	1	2	0,30	0,05	0,10	Roskarl	4	1	2	0,20	0,05	0,10
Gräsand	1	2	2	0,05	0,10	0,10	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås	2			0,10		
Årta							Fiskmås	3	2	3	0,15	0,10	0,15
Skedand			1			0,05	Gråtrut	1			0,05		
Strandskata	2	7	3	0,10	0,35	0,15	Havstrut						
Skärfläcka	6	4	4	0,30	0,20	0,20	Kentsk tärna						
St. strandpip.	4	9	4	0,20	0,45	0,20	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	4	5	4	0,20	0,25	0,20
Tofsvipa	9	10	6	0,45	0,50	0,30	Småtärna	2	2	2	0,10	0,10	0,10
Kärnsnäppa							Gulärta						



Från Stapeludden och 1,8 km norrut

Kommentarer

Liksom ovanstående område har tätheten minskat något, medan antalet par har varit konstant. Hävden är oförändrat hög sedan 2001.

SOCKEN: Näs

OMRÅDE NR: 8701


TOTAL AREAL: 13,4 ha

Inventerat den: 16/4, 16/5, 2/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	50% måttligt, 50% svagt	1,5
2001	90% väl, 10% måttligt	2,9
2006	40% väl, 40% måttligt, 20% svagt	2,2

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
12	13	9	40	54	37	2,99	4,03	2,76

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane						
Grågås							Enkelbeckasin						
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	3	8	5	0,22	0,60	0,37	Storspov						
Snatrand		1			0,07		Rödbena	5	3	3	0,37	0,22	0,22
Kricka							Roskarl	3	2		0,22	0,15	
Gräsand	1	4	4	0,07	0,30	0,30	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta		1			0,07		Fiskmås	4	5	5	0,30	0,37	0,37
Skedand	1	4	1	0,07	0,30	0,07	Gråtrut						
Strandskata	3	3	5	0,22	0,22	0,37	Havstrut						
Skärfläcka	2	3		0,15	0,22		Kentsk tärna						
St. strandpip.	7	8	4	0,52	0,60	0,30	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	3	5	4	0,22	0,37	0,30
Tofsvipa	7	7	6	0,52	0,52	0,45	Småtärna	1			0,07		
Kärnsnäppa							Gulärta						



Från Nissevikens mynning ned mot Grundården

Kommentarer

Smärre försämringar har skett. Några arter har försvunnit som häckfåglar såsom snatterand, skärfläcka och roskarl. Hävden har minskat något sedan 2001, och i detta område korrelerar ett högre antal häckande par med välhävd.

SOCKEN: Näs

OMRÅDE NR: 8702

TOTAL AREAL: 12,1 ha

Inventerat den: 16/4, 16/5, 2/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	40% väl, 20% måttligt, 40% svagt	2,0
2001	60% väl, 30% måttligt, 10% svagt	2,5
2006	60% väl, 30% måttligt, 10%svagt	2,5

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
16	15	13	67	72	49	5,54	5,95	4,05

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1	2	1	0,08	0,17	0,08	Brushane						
Grågås			1			0,08	Enkelbeckasin	2			0,17		
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	5	8	5	0,41	0,66	0,41	Storspov						
Snatrand		1			0,08		Rödbena	8	3	4	0,66	0,25	0,33
Kricka	1			0,08			Roskarl	6	4	4	0,50	0,33	0,33
Gräsand	3	1	4	0,25	0,08	0,33	Dvärgmås						
Stjärtand		1			0,08		Skrattmås						
Årta	1			0,08			Fiskmås	5	5	4	0,41	0,41	0,33
Skedand	3	2	1	0,25	0,17	0,08	Gråtrut						
Strandskata	5	6	6	0,41	0,50	0,41	Havstrut						
Skärfläcka	2	16	4	0,17	1,32	0,33	Kentsk tärna						
St. strandpip.	11	7	4	0,91	0,58	0,33	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	8	7	9	0,66	0,58	0,74
Tofsvipa	6	7	2	0,50	0,58	0,17	Småtärna	1			0,08		
Kärnsnäppa	1			0,08			Gulärta						



Grundården

Kommentarer

Fortfarande ett fågelrikt område trots att det har skett vissa minskningar i fågeltätheten. Hävden är oförändrad.

Tredje högsta tätheten av roskarl.

SOCKEN: Näs

OMRÅDE NR: 8703

TOTAL AREAL: 33,5 ha

Inventerat den: 23/4, 16/5, 26/5, 2/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	30% väl, 30% måttligt, 40% ej	1,5
2001	50% väl, 50% ej	1,5
2006	30% väl, 20% måttligt, 20% svagt, 30% ej	1,5

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
15	14	13	104	91	68	3,10	2,72	2,03

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1		1	0,03		0,03	Brushane						
Grågås			3			0,09	Enkelbeckasin	1	4	4	0,03	0,12	0,12
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	17	14	7	0,51	0,42	0,21	Storspov	2	1		0,06	0,03	
Snatrand							Rödbena	14	9	8	0,42	0,27	0,24
Kricka			2			0,06	Roskarl	3	2		0,09	0,06	
Gräsand	3	6	5	0,09	0,18	0,15	Dvärgmåås						
Stjärtand							Skrattmåås						
Årta							Fiskmåås	7	7	7	0,21	0,21	0,21
Skedand	2	3	2	0,06	0,09	0,06	Gråtrut						
Strandskata	13	11	6	0,39	0,33	0,18	Havstrut						
Skärfläcka	9	8	8	0,27	0,24	0,24	Kentsk tärna						
St. strandpip.	15	8	8	0,45	0,24	0,24	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	4	3		0,12	0,09	
Tofsvipa	12	14	7	0,36	0,42	0,21	Småtärna		1			0,03	
Kärnsnäppa	1			0,03			Gulärta						



Innanför Linnviken

Kommentarer

Ungefär 1/3 av de häckande paren är borta sedan 2001, men det är ingen enskild art som drabbats särskilt hårt. Noterbart är dock att det inte häckade några tärnor i området 2006. Hävden helt oförändrad under de tio senaste åren.

SOCKEN: Näs

OMRÅDE NR: 8704

TOTAL AREAL: 31,8 ha

Inventerat den: 23/4, 16/5, 2/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	60% väl, 40% måttligt	2,6
2001	90% väl, 10% måttligt	2,9
2006	50% väl, 50% måttligt	2,5

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
16	13	12	102	96	87	3,21	3,02	2,74

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1			0,03			Brushane						
Grågås							Enkelbeckasin	2			0,06		
Vitk. gås							Rödspov				0,03		
Gravand	10	18	8	0,31	0,57	0,25	Storspov	1			0,03		
Snatteand		1			0,03		Rödbena	13	7	9	0,41	0,22	0,28
Kricka		1			0,03		Roskarl	7	3	7	0,22	0,09	0,22
Gräsand	1	5	3	0,03	0,16	0,09	Dvärgmåås						
Stjärtand							Skrattmåås						
Årta	1			0,03			Fiskmåås	6	8	4	0,19	0,25	0,13
Skedand	3		1	0,09		0,03	Gråtrut						
Strandskata	13	13	11	0,41	0,41	0,35	Havstrut						
Skärfläcka	8	7	9	0,25	0,22	0,28	Kentsk tärna						
St. strandpip.	15	11	12	0,47	0,35	0,38	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	7	7	9	0,22	0,22	0,28
Tofsvipa	12	14	13	0,38	0,44	0,41	Småtärna	2	1	1	0,06	0,03	0,03
Kärnsnäppa							Gulärta						



Mellan Vaktården och Klasårdén

Kommentarer

Endast smärre försämring i fågeltätheten. Fortsatt goda förekomster av flera arter vidare. Oförändrad hävd.

SOCKEN: Näs

OMRÅDE NR: 8705

TOTAL AREAL: 38,7 ha

Inventerat den: 26/4, 14/5, 26/5, 4/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	30% väl, 60% måttligt, 10 % svagt	2,2
2001	70% väl, 20% måttligt, 10% svagt	2,6
2006	20% väl, 50% måttligt, 20% svagt, 10% ej	1,8

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
15	19	17	79	110	87	2,04	2,84	2,25

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan		1	1		0,03	0,03	Brushane		2			0,05	
Grågås			11			0,28	Enkelbeckasin	3	7	8	0,08	0,18	0,21
Vitk. gås							Rödspov			1	0,05		0,03
Gravand	8	13	6	0,21	0,34	0,16	Storspov	2					
Snatrand		1	1		0,03	0,03	Rödbena	15	9	14	0,39	0,23	0,36
Kricka	1	2		0,03	0,05		Roskarl	2	2	2	0,05	0,05	0,05
Gräsand	1	5	5	0,03	0,13	0,13	Dvärgmås						
Stjärtand		2	1		0,05	0,03	Skrattmås						
Årta	2	1	1	0,05	0,03	0,03	Fiskmås	5	7	4	0,13	0,18	0,10
Skedand	1	4	2	0,03	0,10	0,05	Gråtrut						
Strandskata	10	8	4	0,26	0,21	0,10	Havstrut						
Skärfläcka	1	5		0,03	0,13		Kentsk tärna						
St. strandpip.	12	10	11	0,31	0,26	0,28	Fisktärna		1			0,03	
Ljungpipare							Silvertärna	4	8	7	0,10	0,21	0,18
Tofsvipa	12	22	8	0,31	0,57	0,21	Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Inre, nordvästra delen av Burgsviken

Kommentarer

Något sämre jämfört med 2001, men något bättre än 1996. Nytt är elva par grågäss. Borta är kricka och skärfläcka. Området är något mindre hävdad jämfört med både 2001 och 1996.

Större delen (drygt södra halvan) ingår i Natura 2000.

SOCKEN: Näs

OMRÅDE NR: 8706


TOTAL AREAL: 18,8 ha

Inventerat den: 2/5, 14/5, 26/5 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	50% väl, 50% måttligt	2,5
2001	90% väl, 10% måttligt	2,9
2006	20% väl, 60% måttligt, 20% svagt	2,0

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
14	13	11	43	37	24	2,29	1,97	1,28

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1	1	1	0,05	0,05	0,05	Brushane						
Grågås		3			0,16		Enkelbeckasin	1	2		0,05	0,11	
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	4	3	4	0,21	0,16	0,21	Storspov		1			0,05	
Snatterand			1			0,05	Rödbena	4	1	3	0,21	0,05	0,16
Kricka							Roskarl	4		1	0,21		0,05
Gräsand	1	1	1	0,05	0,05	0,05	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta							Fiskmås	4	4	3	0,21	0,21	0,16
Skedand	1	2	2	0,05	0,11	0,11	Gråtrut						
Strandskata	6	5	4	0,32	0,27	0,21	Havstrut						
Skärfläcka	3	4		0,16	0,21		Kentsk tärna						
St. strandpip.	6		3	0,32		0,16	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	4	4	1	0,21	0,21	0,05
Tofsvipa	3	6		0,16	0,32		Småtärna	1			0,05		
Kärnsnäppa							Gulärta						



Mellersta, västra delen av Burgsviken,
från Sandskallen till Kasträng

Kommentarer

Trenden är tydlig – området blir något sämre för vart femte år som går, samtidigt har hävden varierat mellan inventeringstillfällena. Ett av få områden som inte hyser några häckande tofsvipor.

Natura 2000-område.

SOCKEN: Näs

OMRÅDE NR: 8707


TOTAL AREAL: 24,1 ha

Inventerat den: 26/4, 14/5, 26/5, 4/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% ej	0
2001	80% väl, 20% måttligt	2,8
2006	20% väl, 60% måttligt, 20% svagt	2,0

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
17	17	15	151	165	121	6,27	6,85	5,02

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	2	2	1	0,08	0,08	0,04	Brushane	1			0,04		
Grågås							Enkelbeckasin	5	6	1	0,21	0,25	0,04
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	30	15	19	1,24	0,62	0,79	Storspov	1			0,04		
Snatterand		2	2		0,08	0,08	Rödbena	9	10	10	0,37	0,41	0,41
Kricka							Roskarl	6	5	6	0,25	0,21	0,25
Gräsand	2	10	7	0,08	0,41	0,29	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås		7			0,29	
Årta		1			0,04		Fiskmås	15	17	15	0,62	0,71	0,62
Skedand	3	5	2	0,12	0,21	0,08	Gråtrut						
Strandskata	7	14	8	0,29	0,58	0,33	Havstrut						
Skärfläcka	29	17	7	1,20	0,71	0,29	Kentsk tärna						
St. strandpip.	14	11	11	0,58	0,46	0,46	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	18	28	27	0,75	1,16	1,12
Tofsvipa	6	13	4	0,25	0,54	0,17	Småtärna	2	2	1	0,08	0,08	0,04
Kärnsnäppa	1			0,04			Gulärla						



Kommentarer

Liten minskning i fågeltäthet, men fortsatt mycket höga koncentrationer av fiskmås (fjärde högsta) och silvertärna (tredje högsta). Skratmmåsarna är åter borta.

Största delen är avsatt som Natura 2000-område.

Sydöstra delen av Näsuddens, inklusive ön Tvärård

SOCKEN: Näs

OMRÅDE NR: 8708


TOTAL AREAL: 13,0 ha

Inventerat den: 26/4, 14/5, 26/5, 4/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% väl	3,0
2001	60% väl, 40% måttligt	2,6
2006	20% väl, 60% måttligt, 20% svagt	2,0

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
18	18	16	136	113	61	10,46	8,69	4,69

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	2	2	1	0,15	0,15	0,08	Brushane	1	4		0,08	0,31	
Grågås							Enkelbeckasin	3	2	2	0,23	0,15	0,15
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	10	6	6	0,77	0,46	0,46	Storspov	2	1	1	0,15	0,08	0,08
Snatterand		2	4		0,15	0,31	Rödbena	8	7	5	0,62	0,54	0,38
Kricka			1			0,08	Roskarl	9	5	4	0,69	0,38	0,31
Gräsand	2	3	6	0,15	0,23	0,46	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta	1			0,08			Fiskmås	10	8	1	0,77	0,62	0,08
Skedand	2	6	2	0,15	0,46	0,15	Gråtrut						
Strandskata	10	8	7	0,77	0,62	0,54	Havstrut						
Skärfläcka	8	5		0,62	0,38		Kentsk tärna						
St. strandpip.	14	8	7	1,08	0,62	0,54	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	36	26	7	2,77	2,00	0,54
Tofsvipa	9	11	6	0,69	0,85	0,46	Småtärna	7	8	1	0,54	0,62	0,08
Kärnsnäppa	2	1		0,15	0,08		Gulärta						



Sydligaste delen av Näsudden

Kommentarer

Det har skett en stor minskning av fågellivet på detta tidigare mycket fågeltäta område. Trots det har området tionde högsta totala tätheten. Den största minskningen utgörs av de båda tärnarterna; silvertärna (från 26 till sju par) och småtärna (från åtta till ett par).

De båda hotade arterna kärnsnäppa och brushane saknas numer som häckfåglar. Bland änderna har inga större förändringar skett. Det förekommer dock höga tätheter också t.ex. snatterand – näst högsta och strandskata – femte högsta.

Hävden har avtagit något.

SOCKEN: Fide

OMRÅDE NR: 8801

TOTAL AREAL: 35,9 ha

Inventerat den: 21/4, 3/5, 23/5, 14/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	10% väl, 90% måttligt	2,1
2001	80% väl, 20% måttligt	2,8
2006	40% väl, 60% måttligt	2,4

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
20	18	17	83	88	67	2,31	2,45	1,87

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan		2	2		0,06	0,06	Brushane	3			0,08		
Grågås	3	10	9	0,08	0,28	0,25	Enkelbeckasin	2	5	4	0,06	0,14	0,11
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	9	10	8	0,25	0,28	0,22	Storspov						
Snatterand	1	1	1	0,03	0,03	0,03	Rödbena	9	11	5	0,25	0,31	0,14
Kricka	6	4	3	0,17	0,11	0,08	Roskarl	2	1	2	0,06	0,03	0,06
Gräsand	1	4	2	0,03	0,11	0,06	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta	2	1		0,06	0,03		Fiskmås	2	2	2	0,06	0,06	0,06
Skedand	1	1	2	0,03	0,03	0,06	Gråtrut						
Strandskata	6	6	4	0,17	0,17	0,11	Havstrut						
Skärfläcka	8	1	1	0,22	0,03	0,03	Kentsk tärna						
St. strandpip.	9	11	9	0,25	0,31	0,25	Fisktärna	1			0,03		
Ljungpipare							Silvertärna	2	4	5	0,06	0,11	0,14
Tofsvipa	13	13	7	0,36	0,36	0,19	Småtärna	1	1	1	0,03	0,03	0,03
Kärnsnäppa							Gulärta	2			0,06		



Söder om Stapeludden, i anslutning till Tuviken

Kommentarer

Smärre försämringar de senaste fem åren. Inga dramatiska minskningar hos vissa arter utan det är mer eller mindre jämnt fördelat. Det har endast varit mindre skillnader i hävden under de tio åren.

Natura 2000-område.

SOCKEN: Fide

OMRÅDE NR: 8802


TOTAL AREAL: 23,3 ha

Inventerat den: 21/4, 3/5, 23/5, 14/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	30% väl, 70% måttligt	2,3
2001	50% väl, 50% måttligt	2,5
2006	80% väl, 15% måttligt, 5% svagt	2,8

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
20	12	14	89	39	47	3,82	1,67	2,02

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane	3			0,13		
Grågås	5	2	5	0,21	0,09	0,21	Enkelbeckasin	2	3	2	0,09	0,13	0,09
Vitk. gås	1			0,04			Rödspov						
Gravand	10	5	2	0,43	0,21	0,09	Storspov						
Snatrand							Rödbena	9	7	6	0,39	0,30	0,26
Kricka	8	2	3	0,34	0,09	0,13	Roskarl	3		1	0,13		0,04
Gräsand	4	3	5	0,17	0,13	0,21	Dvärgmås						
Stjärtand							Skratmås						
Årta	1			0,04			Fiskmås	2		1	0,09		0,04
Skedand	1	1	2	0,04	0,04	0,09	Gråtrut						
Strandskata	8	6	3	0,34	0,26	0,13	Havstrut						
Skärfläcka	5	1		0,21	0,04		Kentsk tärna						
St. strandpip.	5	3	7	0,21	0,13	0,30	Fisktärna	1			0,04		
Ljungpipare							Silvertärna	3	2	2	0,13	0,09	0,09
Tofsvipa	13	4	7	0,56	0,17	0,30	Småtärna	3		1	0,13		0,04
Kärnsnäppa							Gulärta	2			0,09		



Från Tubod i norr till i höjd med Gylvät i söder

Kommentarer

En liten förbättring jämfört med 2001, men inte lika bra som för tio år sedan. Stor minskning av bl.a. gravand, men samtidigt har ökning skett för större strandpipare.

Området blir mer och mer välhävdad. Natura 2000-område.

SOCKEN: Fide

OMRÅDE NR: 8803


TOTAL AREAL: 28,2 ha

Inventerat den: 20/4, 4/5, 23/5, 10/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	15% väl, 85% måttligt	2,2
2001	50% måttligt, 50% svagt	1,5
2006	75% väl, 25% måttligt	2,8

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
18	12	12	76	27	28	2,70	0,96	0,99

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1			0,04			Brushane	4			0,14		
Grågås	3		2	0,11		0,07	Enkelbeckasin	7	3	2	0,25	0,11	0,07
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	3	3	3	0,11	0,11	0,11	Storspov						
Snatrand							Rödbena	7	2	2	0,25	0,07	0,07
Kricka	7		1	0,25		0,04	Roskarl	1	1	1	0,04	0,04	0,04
Gräsand	3	3		0,11	0,11		Dvärgmås						
Stjärtand		2			0,07		Skrattmås						
Årta							Fiskmås	2	1	1	0,07	0,04	0,04
Skedand	2	2	2	0,07	0,07	0,07	Gråtrut						
Strandskata	5	3	2	0,18	0,11	0,07	Havstrut						
Skärfläcka	7			0,25			Kentsk tärna						
St. strandpip.	4	2	4	0,14	0,07	0,14	Fisktärna	1			0,04		
Ljungpipare							Silvertärna	5	2	2	0,18	0,07	0,07
Tofsvipa	12	3	6	0,43	0,11	0,21	Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta	2			0,07		



Söder om Gylvät och norr om Grunnet

Kommentarer

Närmast identisk fågelsammansättning jämfört med 2001, vilket innebär att den enorma minskningen åtminstone har avstannat. Området är mer välhävdad än vad det var 1996.

Allra största delen är avsatt som Natura 2000-område.

SOCKEN: Fide

OMRÅDE NR: 8804


TOTAL AREAL: 25,8 ha

Inventerat den: 20/4, 4/5, 23/5, 10/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	10% väl, 75% måttligt, 15% svagt	2,0
2001	100% måttligt	2,0
2006	80% väl, 20% måttligt	2,8

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
18	12	7	67	35	15	2,60	1,36	0,58

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane	8			0,31		
Grågås	5			0,19			Enkelbeckasin	5	3		0,19	0,12	
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	6	2	2	0,23	0,08	0,08	Storspov	1	1		0,04	0,04	
Snatrand							Rödbena	3	4	2	0,12	0,16	0,08
Kricka	5			0,19			Roskarl	4	1		0,16	0,04	
Gräsand	1		2	0,04		0,08	Dvärgmåås						
Stjärtand	3			0,12			Skrattmåås						
Årta	1			0,04			Fiskmåås	1	2	1	0,04	0,08	0,04
Skedand	3			0,12			Gråtrut						
Strandskata	4	5	4	0,16	0,19	0,16	Havstrut						
Skärfläcka	4	2		0,16	0,08		Kentsk tärna						
St. strandpip.	6	5	3	0,23	0,19	0,12	Fisktärna	1			0,04		
Ljungpipare							Silvertärna		2			0,08	
Tofsvipa	6	7	1	0,23	0,27	0,04	Småtärna		1			0,04	
Kärnsnäppa							Gulärta						



Innanför Grunnet

Kommentarer

Raset fortsätter! Nu är det bara 20-25% kvar av fågelsamhället jämfört med för tio år sedan. Under de senaste fem åren har området blivit än mer välhävdad, men detta har definitivt inte gett mer strandängsfåglar.

Natura 2000-område.

SOCKEN: Fide

OMRÅDE NR: 8805


TOTAL AREAL: 14,5 ha

Inventerat den: 20/4, 4/5, 23/5, 10/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	10% måttligt, 45% svagt, 45% ej	0,7
2001	100% ej	0
2006	20% väl, 20% måttligt, 60% svagt	1,6

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
16	15	15	38	38	22	2,62	2,62	1,52

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane						
Grågås	1	3	1	0,07	0,21	0,07	Enkelbeckasin	1	3	1	0,07	0,21	0,07
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	10	8	2	0,69	0,55	0,14	Storspov	1	1	1	0,07	0,07	0,07
Snatterand	1		1	0,07		0,07	Rödbena	2	3	2	0,14	0,21	0,14
Kricka	2	2	2	0,14	0,14	0,14	Roskarl	1	1		0,07	0,07	
Gräsand	2	2	1	0,14	0,14	0,07	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta	1			0,07			Fiskmås	2	2	2	0,14	0,14	0,14
Skedand			2			0,14	Gråtrut						
Strandskata	6	3	2	0,41	0,21	0,14	Havstrut						
Skärfläcka	1	2	1	0,07	0,14	0,07	Kentsk tärna						
St. strandpip.	4	4	2	0,28	0,28	0,14	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna		1			0,07	
Tofsvipa	2	2	1	0,14	0,14	0,07	Småtärna	1	1	1	0,07	0,07	0,07
Kärnsnäppa							Gulärta						



Grunnet

Kommentarer

Artsammansättningen är snarlik, däremot är det numer färre par. Det är dock inga dramatiska förändringar. Hävdstatusen har ökat, från ohävd (2001) till i princip måttligt.

Natura 2000-område.

SOCKEN: Fide

OMRÅDE NR: 8806


TOTAL AREAL: 10,1 ha

Inventerat den: 20/4, 4/5, 23/5, 10/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	50% måttligt, 50% svagt	1,5
2001	100% måttligt	2,0
2006	80% väl, 20% måttligt	2,8

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
14	15	8	33	25	12	3,27	2,48	1,19

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane						
Grågås	2	2	1	0,20	0,20	0,10	Enkelbeckasin	2	2	1	0,20	0,20	0,10
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	2	2	1	0,20	0,20	0,10	Storspov	1	1		0,10	0,10	
Snatrand							Rödbena	2	2	2	0,20	0,20	0,20
Kricka	3	1		0,30	0,10		Roskarl	2	1		0,20	0,10	
Gräsand		1			0,10		Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta							Fiskmås	5	2	1	0,50	0,20	0,10
Skedand							Gråtrut						
Strandskata	3	1	1	0,30	0,10	0,10	Havstrut						
Skärfläcka	1	2		0,10	0,20		Kentsk tärna						
St. strandpip.	3	2	3	0,30	0,20	0,30	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	3	2		0,30	0,20	
Tofsvipa	3	3	2	0,30	0,30	0,30	Småtar	1	1		0,10	0,10	
Kärnsnäppa							Gulärta						



Sydväst om Grunnet

Kommentarer

Stor minskning jämfört med de två tidigare inventeringarna. Bland änderna häckar bara ett par gravand och bland "vitfåglarna" återfinns bara ett par fiskmås (borta är sålunda alla tärnor). Hävdstatusen har ökat successivt.

Natura 2000-område.

SOCKEN: Öja

OMRÅDE NR: 8901


TOTAL AREAL: 39,9 ha

Inventerat den: 24/4, 5/5, 24/5, 6/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	15% väl, 60% måttligt, 25% svagt	1,9
2001	100% måttligt	2,0
2006	40% väl, 50% måttligt, 10% svagt	2,3

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
14	13	14	63	32	53	1,58	0,80	1,33

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan			1			0,03	Brushane						
Grågås	2			0,05			Enkelbeckasin	13	2		0,33	0,05	
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	3	4	2	0,08	0,10	0,05	Storspov	1	1		0,03	0,03	
Snatrand							Rödbena	5	1	6	0,13	0,03	0,15
Kricka	3	2	2	0,08	0,05	0,05	Roskarl	3	1	2	0,08	0,03	0,05
Gräsand	1	1	1	0,03	0,03	0,03	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta							Fiskmås	5	2	4	0,13	0,05	0,10
Skedand			1			0,03	Gråtrut						
Strandskata	4	5	7	0,10	0,13	0,18	Havstrut						
Skärfläcka		1	1		0,03	0,03	Kentsk tärna						
St. strandpip.	6	4	10	0,15	0,10	0,25	Fisktärna	2			0,05		
Ljungpipare			1			0,03	Silvertärna	5	3	1	0,13	0,08	0,03
Tofsvipa	10	5	14	0,25	0,13	0,35	Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Strax söder om Grunnet

Kommentarer

Efter en svacka 2001 är nu fågeltätheten i paritet med 1996. Ökningar för större strandpipare och tofsvipa. Märkligt att inga av de 13 paren enkelbeckasin från 1996 längre finns kvar. Hävden i princip likvärdig under de tio åren.

Allra största delen är upptagen som Natura 2000-område.

SOCKEN: Öja

OMRÅDE NR: 8902


TOTAL AREAL: 16,2 ha

Inventerat den: 24/4, 11/5, 6/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	25% väl, 45% måttligt, 30% svagt	2,0
2001	100% måttligt	2,0
2006	75% väl, 25% måttligt	2,8

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
11	11	10	25	36	32	1,54	2,22	1,98

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane						
Grågås			2			0,12	Enkelbeckasin	4	2		0,25	0,12	
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	2	2	1	0,12	0,12	0,06	Storspov		2	1		0,12	0,06
Snatrand							Rödbena	1	4	5	0,06	0,25	0,31
Kricka			3			0,19	Roskarl	2	1		0,12	0,06	
Gräsand	1	1		0,06	0,06		Dvärgmå						
Stjärtand							Skrattmå						
Årta							Fiskmå						
Skedand							Gråtrut						
Strandskata	4	5	6	0,25	0,31	0,37	Havstrut						
Skärfläcka	2			0,12			Kentsk tärna						
St. strandpip.	3	5	3	0,19	0,31	0,19	Fisktärna	1			0,06		
Ljungpipare			1			0,12	Silvertärna		2			0,12	
Tofsvipa	5	9	8	0,31	0,56	0,49	Småtärna	2	1		0,12	0,06	
Kärnsnäppa	2			0,12			Gulärta						



Mellan Grunnet och Unghanseskär

Kommentarer

Den lilla ökning som skedde 2001, höll i princip i sig (något färre häckande par 2006). Noterbart är att det inte längre häckar några tärnor i området, (måsar har det inte häckat alls under några av inventeringsåren). Något högre hävdstatus.

Högsta tätheten av ljungpipare (dock bara ett par).

Natura 2000-område.

SOCKEN: Öja

OMRÅDE NR: 8903


TOTAL AREAL: 26,9 ha

Inventerat den: 24/4, 11/5, 6/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	20% väl, 80% måttligt	2,2
2001	95% väl, 5% svagt	2,9
2006	80% väl, 20% måttligt	2,8

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
16	15	13	33	46	45	1,23	1,71	1,67

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane	1			0,04		
Grågås		2			0,07		Enkelbeckasin	2	2	1	0,07	0,07	0,04
Vitk. gås							Rödspov		1			0,04	
Gravand	1	4	2	0,04	0,15	0,07	Storspov	1	2	1	0,04	0,07	0,04
Snatrand							Rödbena	3	2	7	0,11	0,07	0,26
Kricka	1	2	2	0,04	0,07	0,07	Roskarl	2	1	1	0,07	0,04	0,04
Gräsand		2			0,07		Dvärgmås						
Stjärtand			1			0,04	Skrattmås						
Årta							Fiskmås	2	1	1	0,07	0,04	0,04
Skedand			1			0,04	Gråtrut						
Strandskata	6	8	7	0,22	0,30	0,26	Havstrut						
Skärfläcka	2			0,07			Kentsk tärna						
St. strandpip.	3	3	8	0,11	0,11	0,30	Fisktärna	1			0,04		
Ljungpipare	1			0,04			Silvertärna		1			0,04	
Tofsvipa	5	13	12	0,19	0,48	0,45	Småtärna						
Kärnsnäppa	1	2	1	0,04	0,07	0,04	Gulärta	1			0,04		



Norr om Unghanseskär

Kommentarer

Inga dramatiska förändringar sedan förra inventeringen. Några nytillskott (stjärtand och skedand) och några ej längre häckande (grågås, gräsand, rödspov och silvertärna). Ett av sex områden som fortfarande hyser häckande kärnsnäppa (tredje högsta tätheten). Glädjande är också att tofsvipan fortfarande häckar i stort antal.

Oförändrat hög hävdstatus.

Natura 2000-område.

SOCKEN: Öja

OMRÅDE NR: 8904


TOTAL AREAL: 31,1 ha

Inventerat den: 24/4, 5/5, 24/5, 6/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	15% väl, 60% måttligt, 25% svagt	1,9
2001	90% måttligt, 10% svagt	1,9
2006	60% väl, 30% måttligt, 10% svagt	2,5

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
17	12	13	61	42	41	1,96	1,35	1,32

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane	5			0,16		
Grågås							Enkelbeckasin	3	4	4	0,10	0,13	0,13
Vitk. gås	1			0,03			Rödspov						
Gravand	5	6	5	0,16	0,19	0,16	Storspov	1	1	1	0,03	0,03	0,03
Snatrand							Rödbena	7	5	3	0,23	0,16	0,10
Kricka	2		3	0,06		0,10	Roskarl	2	1	1	0,06	0,03	0,03
Gräsand	2	2	1	0,06	0,06	0,03	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås	2			0,06		
Årta							Fiskmås	3	3	2	0,10	0,10	0,06
Skedand							Gråtrut						
Strandskata	8	5	5	0,26	0,16	0,16	Havstrut						
Skärfläcka	2			0,06			Kentsk tärna						
St. strandpip.	3	4	5	0,10	0,13	0,16	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	3	1	1	0,10	0,03	0,03
Tofsvipa	10	8	9	0,32	0,26	0,29	Småtärna	2	2	1	0,06	0,06	0,03
Kärnsnäppa							Gulärta						



Unghanseskär

Kommentarer

Mycket snarlik sammansättning och antal par som 2001. Hävdstatusen har ökat något.

Natura 2000-område.

SOCKEN: Öja

OMRÅDE NR: 8905

TOTAL AREAL: 15,3 ha

Inventerat den: 24/4, 11/5, 6/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	40% måttligt, 60% svagt	1,4
2001	40% måttligt, 60% svagt	1,4
2006	30% väl, 65% måttligt, 5% svagt	2,3

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
14	14	14	36	33	46	2,35	2,14	3,01

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane						
Grågås			5			0,33	Enkelbeckasin	2	3	2	0,13	0,20	0,13
Vitk. gås							Rödspov		1			0,07	
Gravand	5	4	3	0,33	0,26	0,20	Storspov	1	1		0,07	0,07	
Snatterand							Rödbena	4	3	7	0,26	0,20	0,46
Kricka	1	1	2	0,07	0,07	0,13	Roskarl	1		1	0,07		0,07
Gräsand	1	1		0,07	0,07		Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta							Fiskmås	5		3	0,33		0,20
Skedand		1	2		0,07	0,13	Gråtrut						
Strandskata	3	2	4	0,20	0,13	0,26	Havstrut						
Skärfläcka	2	4	1	0,13	0,26	0,07	Kentsk tärna						
St. strandpip.	2	4	2	0,13	0,26	0,13	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	5	4	5	0,33	0,26	0,33
Tofsvipa	3	3	8	0,20	0,20	0,53	Småtärna	1	1	1	0,07	0,07	0,07
Kärnsnäppa							Gulärta						



Söder om Unghanseskär och viken Skärshaken

Kommentarer

Hävdstatusen har ökat och antalet häckande par likaså. Förbättringarna utgörs främst av de fem nya paren grågås, samt ökningen av tofsvipor och rödbenor.


Natura 2000-område.

Inventerat den: 24/4, 11/5, 6/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	30% väl, 70% måttligt	2,3
2001	100% måttligt	2,0
2006	20% väl, 80% måttligt	2,2

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
15	8	12	50	28	29	2,42	1,35	1,40

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane	4			0,19		
Grågås		1	1		0,05	0,05	Enkelbeckasin	3		3	0,14		0,14
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	3	1		0,14	0,05		Storspov	2		1	0,10		0,05
Snatterand							Rödbena	7	3	5	0,34	0,14	0,24
Kricka			2			0,10	Roskarl	1		1	0,05		0,05
Gräsand							Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta	1			0,05			Fiskmås	1		1	0,05		0,05
Skedand	2		1	0,10		0,05	Gråtrut						
Strandskata	6	4	3	0,29	0,19	0,14	Havstrut						
Skärfläcka	3			0,14			Kentsk tärna						
St. strandpip.	4	4	3	0,19	0,19	0,14	Fisktärna	1			0,05		
Ljungpipare							Silvertärna	1	2	1	0,05	0,10	0,05
Tofsvipa	11	12	7	0,53	0,58	0,34	Småtärna		1			0,05	
Kärnsnäppa							Gulärla						



Kommentarer

Det är fler arter än 2001 men alltså jämnt lika klen med häckande par i jämförelse med för tio år sedan. Hävden har inte skilt sig särskilt mycket mellan inventeringstillfällena.

Största delen utgörs av Natura 2000.

SOCKEN: Öja

OMRÅDE NR: 8907


TOTAL AREAL: 33,5 ha

Inventerat den: 24/4, 11/5, 6/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% måttligt	2,0
2001	100% måttligt	2,0
2006	40% väl, 60% måttligt	2,4

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
8	6	7	20	12	24	0,60	0,36	0,72

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane	1			0,03		
Grågås		3			0,09		Enkelbeckasin		1	2		0,03	0,06
Vitk. gås							Rödspov	1			0,03		
Gravand							Storspov	1		1	0,03		0,03
Snatterand							Rödbena	2	1	7	0,06	0,03	0,21
Kricka							Roskarl						
Gräsand							Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta							Fiskmås						
Skedand							Gråtrut						
Strandskata	3	2	3	0,09	0,06	0,09	Havstrut						
Skärfläcka							Kentsk tärna						
St. strandpip.	2		1	0,06		0,03	Fisktärna						
Ljungpipare			2			0,06	Silvertärna						
Tofsvipa	9	4	8	0,27	0,12	0,24	Småtärna						
Kärnsnäppa	1	1		0,03	0,03		Gulärta						



Södra delen av Austerum

Kommentarer

En fågelfattig alvarliknande betesmark utan kontakt med havet. Fågelantalet är, efter minskningen 2001, åter som det var 1996 (t.o.m. något bättre). Noterbart är att det inte häckar vare sig änder eller "vitfåglar". Dessvärre har även enda paret kärnsnäppa försvunnit.

Det är emellertid ett av två områden med fler än ett par ljungpipare (tredje högsta tätheten), vilket ytterligare visar på att området mer är att betrakta som en alvarmark än en strandäng.

Området har blivit något mer hävdad.

SOCKEN: Öja

OMRÅDE NR: 8908


TOTAL AREAL: 24,4 ha

Inventerat den: 26/4, 11/5, 5/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% måttligt	2,0
2001	100% måttligt	2,0
2006	10% väl, 90% måttligt	2,1

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
7	6	7	17	8	14	0,70	0,33	0,57

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane	2			0,08		
Grågås							Enkelbeckasin	2	1	2	0,08	0,04	0,08
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand							Storspov	1	1	1	0,04	0,04	0,04
Snatterand							Rödbena	2	1	3	0,08	0,04	0,12
Kricka							Roskarl						
Gräsand			1			0,04	Dvärgmå						
Stjärtand							Skrattmå						
Årta							Fiskmå		1				0,04
Skedand							Gråtrut						
Strandskata	1	1	2	0,04	0,04	0,08	Havstrut						
Skärfläcka							Kentsk tärna						
St. strandpip.	2	1		0,08	0,04		Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna						
Tofsvipa	7	3	4	0,29	0,12	0,16	Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Sydligaste delen av Austerum

Kommentarer

I likhet med ovanstående område en alvarliknande betesmark utan kontakt med havet. Ytterligare en likhet är att fågelmängden också i detta område (nästan) ökade till 1996 års numerär. Hävden har varit densamma vid samtliga tre inventeringstillfällen.

SOCKEN: Öja

OMRÅDE NR: 8909


TOTAL AREAL: 18,8 ha

Inventerat den: 26/4, 11/5, 5/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	30% väl, 40% måttligt, 30% svagt	2,0
2001	100% måttligt	2,0
2006	75% väl, 25% måttligt	2,8

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
11	12	9	26	24	21	1,38	1,28	1,12

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane						
Grågås							Enkelbeckasin	2	1	2	0,11	0,05	0,11
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	3	2	2	0,16	0,11	0,11	Storspov	1	2		0,05	0,11	
Snatrand							Rödbena	1	2	5	0,05	0,11	0,27
Kricka	1	1		0,05	0,05		Roskarl						
Gräsand	1	2	2	0,05	0,11	0,11	Dvärgmå						
Stjärtand							Skrattmå						
Årta							Fiskmå		1			0,05	
Skedand	1			0,05			Gråtrut						
Strandskata	3	2	2	0,16	0,11	0,11	Havstrut						
Skärfläcka	4	1		0,21	0,05		Kentsk tärna						
St. strandpip.	6	6	2	0,32	0,32	0,11	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna			1			0,05
Tofsvipa	3	3	4	0,16	0,16	0,21	Småtärna		1	1		0,05	0,05
Kärnsnäppa							Gulärta						



Norr om Sandar

Kommentarer

Ett område som i likhet med flertalet övriga strandbetesmarker på Austerum inte hyser någon speciellt rik fågelfauna. Endast små förändringar mellan inventeringstillfällena, något färre arter nu 2006.

Natura 2000-område.

SOCKEN: Öja

OMRÅDE NR: 8910

TOTAL AREAL: 15,8 ha

Inventerat den: 26/4, 5/5, 24/5, 5/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	50% väl, 50% måttligt	2,5
2001	30% väl, 40% måttligt, 30% svagt	2,0
2006	60% väl, 30% måttligt, 10% svagt	2,5

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
15	16	13	53	66	39	3,35	4,18	2,47

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane	6	5		0,38	0,32	
Grågås	3	3	1	0,19	0,19	0,06	Enkelbeckasin	3	5	3	0,19	0,32	0,19
Vitk. gås							Rödspov	1	2		0,06	0,13	
Gravand	6	10	3	0,38	0,63	0,19	Storspov	2	1		0,13	0,06	
Snatrand							Rödbena	5	13	8	0,32	0,82	0,51
Kricka	2	3	2	0,13	0,19	0,13	Roskarl	2	1	1	0,13	0,06	0,06
Gräsand	3	3	2	0,19	0,19	0,13	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås	2			0,13		
Årta							Fiskmås						
Skedand			1			0,06	Gråtrut						
Strandskata	4	3	5	0,25	0,19	0,32	Havstrut						
Skärfläcka	1	1		0,06	0,06		Kentsk tärna						
St. strandpip.	5	6	3	0,32	0,38	0,19	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna		2	2		0,13	0,13
Tofsvipa	8	7	6	0,51	0,44	0,38	Småtärna	1	2		0,06	0,13	
Kärnsnäppa							Gulärta						



Sandar

Kommentarer

Ett relativt fågelrikt område som nu tyvärr förlorat häckande arter såsom brushane, rödspov och storspov. Det finns trots det fortfarande gott om vadare.

Natura 2000 och fågelskyddsområde med tillträdesförbud 15 mars-30 juni och 1 oktober-15 november.

SOCKEN: Öja

OMRÅDE NR: 8911


TOTAL AREAL: 21,3 ha

Inventerat den: 26/4, 11/5, 5/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	65% måttligt, 35% svagt	1,7
2001	50% väl, 50% måttligt	2,5
2006	50% väl, 50% måttligt	2,5

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
4	6	7	15	15	17	0,70	0,70	0,80

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane						
Grågås							Enkelbeckasin	2	3	3	0,09	0,14	0,14
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	2	3	3	0,09	0,14	0,14	Storspov			2			0,09
Snatterand							Rödbena		2	2		0,09	0,09
Kricka							Roskarl						
Gräsand		1	1		0,05	0,05	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta							Fiskmås						
Skedand							Gråtrut						
Strandskata	3	1	1	0,14	0,05	0,05	Havstrut						
Skärfläcka							Kentsk tärna						
St. strandpip.							Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna						
Tofsvipa	8	5	5	0,37	0,23	0,23	Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Söder om Sandar

Kommentarer

Ett fortsatt synnerligen art- och individfattigt område, utan kontakt med havet. Nytilskott är två par storspov (tredje högsta tätheten).

Norra spetsen ingår i Natura 2000.

SOCKEN: Öja

OMRÅDE NR: 8912


TOTAL AREAL: 28,5 ha

Inventerat den: 17/4, 16/5, 8/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% måttligt	2,0
2001	100% måttligt	2,0
2006	40% väl, 60% måttligt	2,4

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
16	16	17	69	67	58	2,42	2,35	2,04

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane	3	3		0,11	0,11	
Grågås			2			0,07	Enkelbeckasin	7	11	7	0,25	0,39	0,25
Vitk. gås							Rödspov	4	3	1	0,14	0,11	0,04
Gravand	3	4		0,11	0,14		Storspov	2	1	2	0,07	0,04	0,07
Snatrand							Rödbena	7	5	7	0,25	0,18	0,25
Kricka	2		1	0,07		0,04	Roskarl	2	1	1	0,07	0,04	0,04
Gräsand	2	1	1	0,07	0,04	0,04	Dvärgmås						0,04
Stjärtand							Skrattmås	1					0,04
Årta							Fiskmås	1	1	5	0,04	0,04	0,18
Skedand	2	1	1	0,07	0,04	0,04	Gråtrut						
Strandskata	6	8	8	0,21	0,28	0,28	Havstrut						
Skärfläcka	2	2	2	0,07	0,07	0,07	Kentsk tärna						
St. strandpip.	6	7	5	0,21	0,25	0,17	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	1	2	1	0,04	0,07	0,04
Tofsvipa	19	16	12	0,67	0,56	0,42	Småtärna		1	1		0,04	0,04
Kärnsnäppa							Gulärta						



Västra delen av norra Faludden

Kommentarer

Något färre häckande par och dessvärre utgörs en del av denna minskning utav brushane (från tre till noll par) och rödspov (från tre till ett par, tredje högsta tätheten). Ett av fem områden som hyser häckande rödspov. Tofsvipan tycks tappa något eller några par varje år – från 19 par 1996, via 16 par 2001, till nu 12 par 2006.

Området har blivit något mer välhävdad.

Natura 2000 och fågelskyddsområde med tillträdesförbud 15 mars-30 juni och 1 oktober-15 november.

SOCKEN: Öja

OMRÅDE NR: 8913


TOTAL AREAL: 15,3 ha

Inventerat den: 17/4, 16/5, 8/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% måttligt	2,0
2001	100% måttligt	2,0
2006	30% väl, 70% måttligt	2,3

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
6	6	7	16	20	18	1,05	1,31	1,18

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane	2			0,13		
Grågås							Enkelbeckasin	3	5	3	0,20	0,33	0,20
Vitk. gås							Rödspov	1	2		0,07	0,13	
Gravand							Storspov	1	2	1	0,07	0,13	0,07
Snatrand							Rödbena		3	3		0,20	0,20
Kricka			1			0,07	Roskarl						
Gräsand			1			0,07	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta							Fiskmås						
Skedand							Gråtrut						
Strandskata	2	3	3	0,13	0,20	0,20	Havstrut						
Skärfläcka							Kentsk tärna						
St. strandpip.							Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna						
Tofsvipa	7	5	6	0,46	0,33	0,39	Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Västra delen av norra Faludden

Kommentarer

Ett tämligen artfattigt område. Inga stora förändringar mellan de tre inventeringarna, dock saknas de tidigare två paren rödspov. Nytt är ett par av vardera kricka och gräsand.


Fågelskyddsområde med tillträdesförbud 15 mars-30 juni och 1 oktober-15 november.

Inventerat den: 17/4, 27/4, 16/5, 8/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% måttligt	2,0
2001	100% måttligt	2,0
2006	30% väl, 70% måttligt	2,3

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
17	20	17	50	62	61	2,46	3,05	3,00

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1	1	1	0,05	0,05	0,05	Brushane	2	2		0,10	0,10	
Grågås		2	1		0,10	0,05	Enkelbeckasin	7	6	9	0,34	0,30	0,44
Vitk. gås							Rödspov	2	1		0,10	0,05	
Gravand		3	3		0,15	0,15	Storspov	1	1	1	0,05	0,05	0,05
Snatterand							Rödbena	4	9	7	0,20	0,44	0,34
Kricka	2	1	2	0,10	0,05	0,10	Roskarl	2	1	1	0,10	0,05	0,05
Gräsand		1	1		0,05	0,05	Dvärgmåås						
Stjärtand							Skrattmåås	1			0,05		
Årta							Fiskmåås	1	2	3	0,05	0,10	0,15
Skedand		2	1		0,10	0,05	Gråtrut						
Strandskata	5	5	7	0,25	0,25	0,34	Havstrut						
Skärfläcka	2	2	3	0,10	0,10	0,15	Kentsk tärna						
St. strandpip.	2	7	5	0,10	0,34	0,25	Fisktärna	1			0,05		
Ljungpipare							Silvertärna		2	2		0,10	0,10
Tofsvipa	13	12	13	0,64	0,59	0,64	Småtärna	2	1	1	0,10	0,05	0,05
Kärnsnäppa	2	1		0,10	0,05		Gulärkla						



Centrala delen av norra Faludden

Kommentarer

Lika många häckande par som 2001, men dessvärre har området förlorat de kritiska, och synnerligen sårbara, arterna kärrsnäppa, brushane och rödspov. Fortsatt hög täthet av tofsvipa och enkelbeckasin (tredje högsta tätheten).

Natura 2000 och fågelskyddsområde med tillträdesförbud 15 mars-30 juni och 1 oktober-15 november.

SOCKEN: Öja

OMRÅDE NR: 8915


TOTAL AREAL: 42,8 ha

Inventerat den: 17/4, 27/4, 16/5, 8/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	30% väl, 45% måttligt, 25% svagt	2,1
2001	100% måttligt	2,0
2006	50% väl, 50% måttligt	2,5

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
19	22	20	134	212	183	3,13	4,95	4,28

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan		1			0,02		Brushane	6	11		0,14	0,26	
Grågås							Enkelbeckasin	8	14	9	0,19	0,33	0,21
Vitk. gås							Rödspov	4	2		0,09	0,05	
Gravand	3	4	5	0,07	0,09	0,12	Storspov	2	2	2	0,05	0,05	0,05
Snatterand		1	1		0,02	0,02	Rödbena	15	33	30	0,35	0,77	0,70
Kricka		1	1		0,02	0,02	Roskarl	4	3	4	0,09	0,07	0,09
Gräsand		1	1		0,02	0,02	Dvärgmås						
Stjärtand			1			0,02	Skrattmås	2	14		0,05	0,33	
Årta							Fiskmås	11	20	8	0,26	0,47	0,19
Skedand		4	5		0,09	0,12	Gråtrut	1			0,02		
Strandskata	13	15	23	0,30	0,35	0,54	Havstrut						
Skärfläcka	1	5	3	0,02	0,12	0,07	Kentsk tärna						
St. strandpip.	12	18	26	0,28	0,42	0,61	Fisktärna	11	3	1	0,26	0,07	0,02
Ljungpipare	1		3	0,02		0,07	Silvertärna	6	24	12	0,14	0,56	0,28
Tofsvipa	28	31	44	0,65	0,72	1,03	Småtärna	1	3	2	0,02	0,07	0,05
Kärnsnäppa	5	2	2	0,12	0,05	0,05	Gulärta						



Centrala delen av norra Faludden

Kommentarer

Art- och fågelrikt område (fjärde högsta antalet arter). För tio år sedan häckade elva arter vidare. Fem år senare försvann ljungpiparen. 2006 häckade tyvärr inte längre de skyddsvärda arterna brushane och rödspov, men ljungpiparen kom tillbaka med tre par (näst högsta tätheten).

Glädjande att kärnsnäppan fortfarande häckar i området (ett av sex områden, näst högsta tätheten). Det är fortsatt höga tätheter av strandskata och större strandpipare (fjärde högsta tätheterna), tofsvipa (femte högsta tätheten) och rödbena. De två förstnämnda har även ökat i antal med minst 25%. Skrattmåskolonin är borta. Det är numer överlag ont om trutar, måsar och tärnor.

Inventerat den: 18/4, 27/4, 15/5, 8/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	25% väl, 45% måttligt, 30% svagt	2,0
2001	100% måttligt	2,0
2006	40% väl, 60% måttligt	2,4

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
19	21	23	227	264	243	3,78	4,40	4,05

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan			1			0,02	Brushane	10	16	3	0,17	0,27	0,05
Grågås		1	1		0,02	0,02	Enkelbeckasin	10	18	15	0,17	0,30	0,25
Vitk. gås							Rödspov	7	6	2	0,12	0,10	0,03
Gravand	3	6	3	0,05	0,10	0,05	Storspov	3	2	4	0,05	0,03	0,07
Snatrand		2	1		0,03	0,02	Rödbena	26	18	33	0,43	0,30	0,55
Kricka	6	5	3	0,10	0,08	0,05	Roskarl	5	6	5	0,08	0,10	0,08
Gräsand			2			0,03	Dvärgmås						
Stjärtand		2	1		0,03	0,02	Skrattmås	25	5	3	0,42	0,08	0,05
Årta							Fiskmås	7	6	4	0,12	0,10	0,07
Skedand	4	4	3	0,07	0,07	0,05	Gråtrut						
Strandskata	29	37	28	0,65	0,62	0,47	Havstrut						
Skärfläcka	8	12	8	0,13	0,20	0,13	Kentsk tärna						
St. strandpip.	7	17	25	0,12	0,28	0,42	Fisktärna	20	2	1	0,33	0,03	0,02
Ljungpipare							Silvertärna	3	26	29	0,05	0,43	0,48
Tofsvipa	38	67	62	0,63	1,12	1,03	Småtärna	5	6	6	0,08	0,10	0,10
Kärnsnäppa	1			0,02			Gulärta						



Centrala delen av norra Faludden

Kommentarer

Näst högsta i antalet häckande arter. Det är dock inte riktigt lika många häckande par som för fem år sedan. Fortsatt höga tätheter av strandskata, större strandpipare, tofsvipa (fjärde högsta) och rödbena. Tyvärr ingen ökning av antalet skrattmåsar. Även för rödspoven och brushanen (näst högsta tätheten och det enda området med mer än ett par) och ser utvecklingen dystert ut. Intressant att iaktta hur fisk- och silvertärnans olika beståndsutveckling har sett sig de senaste tio åren – fisktärnan har minskat katastrofalt medan silvertärnan ökar (vilket skedde redan för fem år sedan). För småtärnan, tycks beståndet vara fortsatt stabilt. Det har inte skett några större förändringar i hävden, möjligtvis något mer homogent jämfört med för tio år sedan. Natura 2000 och fågelskyddsområde med tillträdesförbud 15 mars–30 juni och 1 oktober–15 november.

SOCKEN: Öja

OMRÅDE NR: 8917

TOTAL AREAL: 4,2 ha

Inventerat den: 18/4, 27/4, 15/5, 8/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% måttligt	2,0
2001	100% måttligt	2,0
2006	20% väl, 80% måttligt	2,2

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
9	9	10	18	24	20	4,29	5,71	4,76

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane	3	3	1	0,71	0,71	0,24
Grågås							Enkelbeckasin	1		1	0,24		0,24
Vitk. gås							Rödspov	2	2	2	0,48	0,48	0,48
Gravand		1	1	0,24	0,24		Storspov	1			0,24		
Snatterand							Rödbena	1	3	3	0,24	0,71	0,71
Kricka							Roskarl						
Gräsand							Dvärgmå						
Stjärtand							Skrattmå						
Årta							Fiskmå	1	1		0,24	0,24	
Skedand							Gråtrut						
Strandskata	3	4	3	0,71	0,95	0,71	Havstrut						
Skärfläcka	3		1	0,71		0,24	Kentsk tärna						
St. strandpip.		1	2		0,24	0,48	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna		1	1		0,24	0,24
Tofsvipa	3	8	5	0,71	1,90	1,19	Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Centrala delen av norra Faludden

Kommentarer

Fortsatt stabilt, fågelrikt, litet område, som inte betas av nöt eller får utan årligen slås. Bete sker utförs dock av de rastande vitkindade gässen. Mycket höga tätheter av flera vadare, (vilket delvis kan bero på områdets ringa storlek), såsom:

- strandskata (högsta tätheten),
- tofsvipa (näst högsta),
- rödspov (högsta tätheten, ett av fem områden med häckande rödspov) och
- brushane (högsta tätheten, dock bara ett par).

Fågelskyddsområde med tillträdesförbud 15 mars-30 juni och 1 oktober-15 november.

SOCKEN: Öja

OMRÅDE NR: 8918

TOTAL AREAL: 30,8 ha

Inventerat den: 18/4, 27/4, 15/5, 8/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	30% väl, 60% måttligt, 10% svagt	2,2
2001	100% måttligt	2,0
2006	50% väl, 50% måttligt	2,5

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
14	19	16	70	200	85	2,27	6,49	2,76

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane	2	9		0,06	0,29	
Grågås	1			0,03			Enkelbeckasin	1	6	4	0,03	0,19	0,13
Vitk. gås							Rödspov	1	3	2	0,03	0,10	0,06
Gravand		4	1		0,13	0,03	Storspov	1	2		0,03	0,06	
Snatrand		2			0,06		Rödbena	1	28	6	0,03	0,91	0,19
Kricka	3	3	2	0,10	0,1	0,06	Roskarl		5	4		0,16	0,13
Gräsand	1	2	1	0,03	0,06	0,03	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta							Fiskmås		11	6		0,36	0,19
Skedand	3	3	3	0,10	0,01	0,10	Gråtrut						
Strandskata	22	26	13	0,71	0,84	0,42	Havstrut						
Skärfläcka	2	4	6	0,06	0,13	0,19	Kentsk tärna						
St. strandpip.	6	17	13	0,19	0,55	0,42	Fisktärna		8			0,26	
Ljungpipare			1			0,03	Silvertärna		20	4		0,65	0,13
Tofsvipa	25	43	15	0,81	1,40	0,49	Småtärna	1	4	4	0,03	0,13	0,13
Kärnsnäppa							Gulärta						



Östra delen av norra Faludden

Kommentarer

Efter den stora ökningen 2001 återgick fågeltätheten till 1996 års nivå. De två häckande paren rödspov innebär näst högsta tätheten. Jämfört med för fem år sedan har det skett stora minskningar för strandskata, tofsvipa, brushane (försvunnit), rödbena och silvertärna.

Området är något mer välhävdad. Detta område, i likhet med flera av de föregående, betas hårt av de rastande vitkindade gässen.

Natura 2000 och fågelskyddsområde med tillträdesförbud 15 mars-30 juni och 1 oktober-15 november.

SOCKEN: Öja

OMRÅDE NR: 8919

TOTAL AREAL: 3,0 ha

Inventerat den: 18/4, 27/4, 15/5, 8/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	50% måttligt, 50% svagt	1,5
2001	100% måttligt	2,0
2006	65% väl, 35% måttligt	2,7

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
11	11	8	16	27	12	5,33	9,00	4,00

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane	2	2		0,67	0,67	
Grågås							Enkelbeckasin	1			0,33		
Vitk. gås							Rödspov	1	1		0,33	0,33	
Gravand							Storspov	1	1		0,33	0,33	
Snatrand							Rödbena	1	9	2	0,33	3,00	0,67
Kricka							Roskarl		1	1		0,33	0,33
Gräsand							Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta	1			0,33			Fiskmås						
Skedand	1	2	1	0,33	0,67	0,33	Gråtrut						
Strandskata	2	2	1	0,67	0,67	0,33	Havstrut						
Skärfläcka							Kentsk tärna						
St. strandpip.	2	2	1	0,67	0,67	0,33	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna		1	2		0,33	0,67
Tofsvipa	3	5	3	1,00	1,67	1,00	Småtärna	1	1	1	0,33	0,33	0,33
Kärnsnäppa							Gulärta						



Ostligaste delen av norra Faludden

Kommentarer

Ytterligare ett område som har förlorat brushane och rödspov som häckande arter. Det enda paret småtärna utgör ändå högsta tätheten för arten.

Hävdstatusen har ökat markant de senaste tio åren, vilket inte har medfört fler strandängsfåglar. Det ökade betetrycket ansvarar främst de rastande gässen för.

Natura 2000 och fågelskyddsområde med tillträdesförbud 15 mars-30 juni och 1 oktober-15 november.

SOCKEN: Öja

OMRÅDE NR: 8920

TOTAL AREAL: 15,3 ha

Inventerat den: 18/4, 27/4, 15/5, 8/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	20% väl, 80% måttligt	2,2
2001	100% måttligt	2,0
2006	70% väl, 30% måttligt	2,7

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
21	21	19	209	108	93	13,66	7,06	6,08

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1		1	0,07		0,07	Brushane	3	4		0,20	0,26	
Grågås							Enkelbeckasin	3	5	5	0,20	0,33	0,33
Vitk. gås							Rödspov		1			0,07	
Gravand	5	5	4	0,33	0,33	0,26	Storspov	1	1	1	0,07	0,07	0,07
Snatrand		1			0,07		Rödbena	8	8	2	0,52	0,52	0,13
Kricka	1	3	2	0,07	0,20	0,13	Roskarl	3	3	3	0,20	0,20	0,20
Gräsand		2	2		0,13	0,13	Dvärgmås	1			0,07		
Stjärtand	1	1		0,07	0,07		Skrattmås	115	24	29	7,52	1,57	1,89
Årta							Fiskmås	14	8	8	0,92	0,52	0,52
Skedand	4	3	3	0,26	0,20	0,20	Gråtrut	2		2	0,13		0,13
Strandskata	5	7	3	0,33	0,46	0,20	Havstrut						
Skärfläcka	2	3	2	0,13	0,20	0,13	Kentsk tärna						
St. strandpip.	3	5	3	0,20	0,33	0,20	Fisktärna	6	1	1	0,39	0,07	0,07
Ljungpipare							Silvertärna	20	13	15	1,31	0,85	0,98
Tofsvipa	5	8	3	0,33	0,52	0,20	Småtärna	6	2	4	0,39	0,13	0,26
Kärnsnäppa							Gulärta						



Ostligaste delen av södra Faludden

Kommentarer

Sjunde högsta antalet arter resp tätheten. Inga större försämringar sedan 2001, men tyvärr finns inte brushanen kvar i området. Skrattmåskolonin har varit liten men stabil (högsta tätheten). Fjärde högsta tätheten av silvertärna.

Hävden har ökat något.

Natura 2000 och fågelskyddsområde med tillträdesförbud 15 mars-30 juni och 1 oktober-15 november.

SOCKEN: Öja

OMRÅDE NR: 8921

TOTAL AREAL: 7,0 ha

Inventerat den: 18/4, 15/5, 8/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% måttligt	2,0
2001	100% måttligt	2,0
2006	35% väl, 65% måttligt	2,4

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
11	11	11	25	44	25	3,57	6,28	3,57

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane						
Grågås							Enkelbeckasin	1	2	2	0,14	0,29	0,29
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand		1	1		0,14	0,14	Storspov	1	1		0,14	0,14	
Snatterand							Rödbena	1	2	1	0,14	0,29	0,14
Kricka							Roskarl	2	2	2	0,29	0,29	0,29
Gräsand			1			0,14	Dvärgmåås						
Stjärtand							Skrattmåås		12	4		1,71	0,57
Årta							Fiskmåås	2	2	2	0,29	0,29	0,29
Skedand							Gråtrut						
Strandskata	2	2	2	0,29	0,29	0,29	Havstrut						
Skärfläcka							Kentsk tärna						
St. strandpip.	2	2	1	0,29	0,29	0,14	Fisktärna	2			0,29		
Ljungpipare							Silvertärna	8	14	8	1,14	2,00	1,14
Tofsvipa	2	4	1	0,29	0,57	0,14	Småtärna	2			0,29		
Kärnsnäppa							Gulärta						



Östra delen av södra Faludden

Kommentarer

Var det en tillfällig ökning 2001? Nu 2006 är i alla fall fågeltätheten identisk med hur den var för tio år sedan. Områdets främsta kvaliteter torde vara den lilla skrattmåskolonin, samt den höga tätheten av silvertärna (näst högsta).

Fågelskyddsområde med tillträdesförbud 15 mars-30 juni och 1 oktober-15 november.

SOCKEN: Öja

OMRÅDE NR: 8922


TOTAL AREAL: 10,0 ha

Inventerat den: 21/4, 12/5, 5/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	10% väl, 60% måttligt, 30% svagt	1,8
2001	100% måttligt	2,0
2006	20% väl, 80% måttligt	2,2

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
5	6	7	18	23	12	1,80	2,30	1,20

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane						
Grågås							Enkelbeckasin	3	3	2	0,30	0,30	0,20
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand							Storspov	2	2	1	0,20	0,20	0,10
Snatterand							Rödbena	3		1	0,30		0,10
Kricka							Roskarl						
Gräsand		1			0,10		Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta							Fiskmås		1	1		0,10	0,10
Skedand							Gråtrut						
Strandskata	3	2	3	0,30	0,20	0,30	Havstrut						
Skärfläcka							Kentsk tärna						
St. strandpip.			1			0,10	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna						
Tofsvipa	7	14	3	0,70	1,40	0,30	Småtärna						
Kärtsnäppa							Gulärla						



Centrala delen av södra Faludden

Kommentarer

Ett förhållandevis artfattigt område beläget ca 300 m från stranden, men det enda paret storspov utgör artens högsta täthet utav de inventerade områdena.

Tofsvipan utgör här ännu ett exempel hur en art kan variera kraftigt mellan olika inventeringstillfällen, 7 – 14 – 3 par. Annars har det inte varit några större förändringar bland de övriga arterna.

SOCKEN: Öja

OMRÅDE NR: 8923


TOTAL AREAL: 27,0 ha

Inventerat den: 21/4, 3/5, 18/5, 5/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	15% väl, 60% måttligt, 25% svagt	1,9
2001	50% väl, 50% måttligt	2,5
2006	80% väl, 20% måttligt	2,8

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
17	16	18	48	60	59	1,78	2,22	2,19

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane	2	1		0,07	0,04	
Grågås	1			0,04			Enkelbeckasin	5	6	6	0,19	0,22	0,22
Vitk. gås							Rödspov	1	1	1	0,04	0,04	0,04
Gravand	2	3	3	0,07	0,11	0,11	Storspov	2	1	1	0,07	0,04	0,04
Snatteand							Rödbena	6	8	9	0,22	0,30	0,33
Kricka			1			0,04	Roskarl	1	1	1	0,04	0,04	0,04
Gräsand		1	1		0,04	0,04	Dvärgmås						
Stjärtand		1	1		0,04	0,04	Skrattmås	1			0,04		
Årta	1			0,04			Fiskmås	2	2	2	0,07	0,07	0,07
Skedand			2			0,07	Gråtrut	1			0,04		
Strandskata	8	5	4	0,30	0,19	0,15	Havstrut						
Skärfläcka	2	4	3	0,07	0,15	0,11	Kentsk tärna						
St. strandpip.	2	3	2	0,07	0,11	0,07	Fisktärna						
Ljungpipare			1			0,04	Silvertärna		2	2		0,07	0,07
Tofsvipa	10	20	18	0,37	0,74	0,67	Småtärna	1	1	1	0,04	0,04	0,04
Kärnsnäppa							Gulärta						



Norra delen av Yttre Stockviken

Kommentarer

Ökningen av tofsviporna 2001 var ingen tillfällighet – antalet var ungefär lika stort nu 2006. Området hyser elva arter vidare, däribland ett par rödspov (tredje högsta tätheten), men dessvärre har de fåtal paren brushane nu helt försvunnit.

Hävdstatusen har ökat för varje inventeringstillfälle.

Natura 2000-område (förutom nordvästra hörnet).

SOCKEN: Öja

OMRÅDE NR: 8924


TOTAL AREAL: 8,7 ha

Inventerat den: 21/4, 3/5, 18/5, 5/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% måttligt	2,0
2001	100% måttligt	2,0
2006	70% väl, 30% måttligt	2,7

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
3	7	5	12	27	17	1,38	3,10	1,95

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane						
Grågås							Enkelbeckasin	2	2		0,23	0,23	
Vitk. gås							Rödspov		1			0,11	
Gravand							Storspov						
Snatrand							Rödbena	2	6	3	0,23	0,69	0,34
Kricka							Roskarl						
Gräsand		1			0,11		Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta							Fiskmås						
Skedand							Gråtrut						
Strandskata	2	3	2	0,23	0,34	0,23	Havstrut						
Skärfläcka							Kentsk tärna						
St. strandpip.		2	2		0,23	0,23	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna						
Tofsvipa	8	12	8	0,92	1,38	0,92	Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Nordvästra delen av Yttre Stockviken

Kommentarer

Ett relativt artfattigt område som numer endast hyser häckande vadare. Tofsvipebeståndet är betydande.

Natura 2000-område.

Hävdstatusen har ökat något sedan senaste inventeringen.

SOCKEN: Öja

OMRÅDE NR: 8925


TOTAL AREAL: 22,6 ha

Inventerat den: 21/4, 3/5, 18/5, 5/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	10% väl, 70% måttligt, 20% svagt	1,9
2001	100% väl	3,0
2006	20% väl, 80% måttligt	2,2

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
13	13	9	59	54	44	2,61	2,39	1,95

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1	1		0,04	0,04		Brushane						
Grågås	10		4	0,40		0,18	Enkelbeckasin	3	5	5	0,13	0,22	0,22
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	12	9	10	0,53	0,40	0,44	Storspov	2	2		0,09	0,09	
Snatrand		2			0,09		Rödbena	3	5	4	0,13	0,22	0,18
Kricka	9	8	9	0,40	0,35	0,40	Roskarl						
Gräsand	6	6	5	0,27	0,27	0,22	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås	2	2		0,08	0,08	
Årta	2	1		0,09	0,04		Fiskmås						
Skedand	1	4	2	0,04	0,18	0,09	Gråtrut						
Strandskata	2	4	2	0,09	0,18	0,09	Havstrut						
Skärfläcka							Kentsk tärna						
St. strandpip.							Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna						
Tofsvipa	6	5	3	0,27	0,22	0,13	Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Norr om Inre Stockviken

Kommentarer

Mindre försämringar har skett senaste fem åren. Krickan uppvisar här sin tredje högsta täthet. Årta, storspov och skrattmås häckar inte längre i området.

Betetrycket har varierat mellan inventeringstillfällena.

Inventerat den: 25/4, 10/5, 22/5, 31/5, 13/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	40% väl, 50% måttligt, 10% svagt	2,3
2001	50% väl, 50% måttligt	2,5
2006	85% väl, 15% måttligt	2,9

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
22	21	17	148	130	67	8,86	7,78	4,01

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan		2	1		0,12	0,06	Brushane						
Grågås		1	1		0,06	0,06	Enkelbeckasin	3	1		0,18	0,06	
Vitk. gås							Rödspov	1	1		0,06	0,06	
Gravand	4	4	4	0,24	0,24	0,24	Storspov						
Snatrand	1	1	1	0,06	0,06	0,06	Rödbena	9	8	4	0,54	0,48	0,24
Kricka	6	1	4	0,36	0,06	0,24	Roskarl	6	4	3	0,36	0,24	0,18
Gräsand	5	1		0,30	0,06		Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås	3	4		0,18	0,24	
Årta	5			0,30			Fiskmås	7	9	8	0,42	0,54	0,48
Skedand	3	1	1	0,18	0,06	0,06	Gråtrut	3	4	2	0,18	0,24	0,12
Strandskata	14	9	6	0,84	0,54	0,36	Havstrut	1	1		0,06	0,06	
Skärfläcka	10	24	1	0,60	1,44	0,06	Kentsk tärna	1			0,06		
St. strandpip.	24	21	7	1,44	1,26	0,06	Fisktärna			2			0,12
Ljungpipare							Silvertärna	14	16	10	0,84	0,96	0,60
Tofsvipa	15	10	7	0,90	0,60	0,42	Småtärna	8	7	5	0,48	0,42	0,30
Kärnsnäppa	5			0,30			Gulärta						



Från Inre Stockviken ut till Aurriv

Kommentarer

På dessa låglänta strandängar har det skett en halvering av antalet häckande par! Dock är det näst högsta tätheten av småtärna.

Stora minskningar för skärfläcka och större strandpipare. Området har trots det relativt hög fågeltäthet. Det stora antalet änder som fanns för tio år sedan har inte återkommit.

Betetrycket har successivt ökat något.


Natura 2000 och fågelskyddsområde med tillträdesförbud 15 mars-30 juni och 1 oktober-15 november.

Inventerat den: 25/4, 10/5, 22/5, 13/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	60% måttligt, 40% svagt	1,6
2001	50% väl, 50% måttligt	2,5
2006	70% väl, 30% måttligt	2,7

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
18	14	13	197	57	67	24,63	7,13	8,38

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	3	4	4	0,38	0,50	0,50	Brushane	7	2		0,88	0,25	
Grågås	16	10	9	2,00	1,25	1,13	Enkelbeckasin	5		6	0,63		0,75
Vitk. gås							Rödspov	1			0,13		
Gravand	8	5	3	1,00	0,63	0,38	Storspov						
Snatterand	2	1	3	0,25	0,13	0,38	Rödbena	4	3	5	0,50	0,38	0,63
Kricka	10	8	8	1,25	1,00	1,00	Roskarl						
Gräsand	9	3	7	1,13	0,38	0,88	Dvärgmås						
Stjärtand	5	2	1	0,63	0,25	0,13	Skrattmås	99			12,38		
Årta	7	1	1	0,88	0,13	0,13	Fiskmås						
Skedand	5	11	10	0,63	1,38	1,25	Gråtrut						
Strandskata	3	2	5	0,38	0,25	0,63	Havstrut						
Skärfläcka							Kentsk tärna						
St. strandpip.	2	1		0,25	0,13		Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna						
Tofsvipa	9	4	5	1,13	0,50	0,63	Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärla	2			0,25		



Kommentarer

Inga större förändringar sedan förra inventeringstillfället, vilket innebär att området var betydligt bättre för tio år sedan. En orsak till detta var den stora skrattnåskolonin.

Området hyser dock fortfarande höga tätheter (tredje högsta) av främst änder, såsom


- högsta tätheten av snatterand, kricka och gräsand,
- näst högsta tätheten av stjärtand, skedand, strandskata och enkelbeckasin,
- högsta tätheten av knölsvan och
- fjärde högsta tätheten av grågås.

Inventerat den: 25/4, 10/5, 22/5, 13/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	35% väl, 65% måttligt	2,4
2001	40% väl, 60% måttligt	2,4
2006	90% väl, 10% måttligt	2,9

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
13	12	9	48	48	19	2,35	2,35	0,93

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane		1			0,05	
Grågås							Enkelbeckasin	6	5	1	0,29	0,25	0,05
Vitk. gås							Rödspov	1			0,05		
Gravand							Storspov	2	1	1	0,10	0,05	0,05
Snatrand							Rödbena	6	8	3	0,29	0,39	0,15
Kricka	1	1		0,05	0,05		Roskarl	3			0,15		
Gräsand		1	1		0,05	0,05	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta							Fiskmås			1			0,05
Skedand							Gråtrut						
Strandskata	5	3	3	0,25	0,15	0,15	Havstrut						
Skärfläcka	2	2		0,10	0,10		Kentsk tärna						
St. strandpip.	4	6	1	0,20	0,29	0,05	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	2	2	2	0,10	0,10	0,10
Tofsvipa	12	16	6	0,59	0,78	0,29	Småtärna	2			0,10		
Kärnsnäppa	2	2		0,10	0,10		Gulärta						



Sydost om Inre Stockviken

Kommentarer

Dramatisk minskning sedan förra inventeringen – antalet häckande par har mer än halverats. Kärnsnäpporna och brushanarna är borta. Av de större strandpiparna, tofsviporna och enkelbeckasinerna återstår bara en bråkdel.

Området har blivit än mer välhävdad, vilket knappast kan vara enda orsaken till minskningarna.

Norra halvan utgörs av Natura 2000-område.

SOCKEN: Hamra

OMRÅDE NR: 9004

TOTAL AREAL: 8,7 ha

Inventerat den: 25/4, 10/5, 22/5, 13/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% måttligt	2,0
2001	20% väl, 80% måttligt	2,2
2006	50% väl, 50% måttligt	2,5

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
8	10	7	30	34	9	3,45	3,91	1,03

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane	5	2		0,57	0,23	
Grågås							Enkelbeckasin	5	7	2	0,57	0,80	0,23
Vitk. gås							Rödspov	1			0,11		
Gravand			1			0,11	Storspov		1			0,11	
Snatrand							Rödbena	4	5		0,46	0,57	
Kricka	1	1	1	0,11	0,11	0,11	Roskarl						
Gräsand		1	1		0,11	0,11	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta							Fiskmås						
Skedand	1	1		0,11	0,11		Gråtrut						
Strandskata	5	4	1	0,57	0,46	0,11	Havstrut						
Skärfläcka		2			0,23		Kentsk tärna						
St. strandpip.			1			0,11	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna						
Tofsvipa	8	10	2	0,92	1,15	0,23	Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Centralt på Norrgårde

Kommentarer


Ytterligare ett område med mycket negativ utveckling. Nu återstår bara nio häckande par, jämfört med drygt 30 för några år sedan. Det mest olyckliga är att även här har brushanen försvunnit som häckfågel. Det har även varit stora minskningar för strandskata, tofsvipa och rödbena. Den sistnämnda har också helt försvunnit, efter att tidigare ha häckat med 4-5 par. Området har blivit något mer välhävdad.

Fågelskyddsområde med tillträdesförbud 15 mars-30 juni och 1 oktober-15 november.

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% måttligt	2,0
2001	70% väl, 30% måttligt	2,7
2006	90% väl, 10% måttligt	2,9

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
14	15	13	71	75	42	5,34	5,64	3,16

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane	5	10		0,38	0,75	
Grågås							Enkelbeckasin	2	4	2	0,15	0,30	0,15
Vitk. gås	1			0,08			Rödspov	1	1		0,08	0,08	
Gravand			1			0,08	Storspov	1			0,08		
Snatterand							Rödbena	7	13	3	0,53	0,98	0,23
Kricka							Roskarl	1	1	1	0,08	0,08	0,08
Gräsand		1			0,08		Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta							Fiskmås	2	2	2	0,15	0,15	0,15
Skedand							Gråtrut						
Strandskata	9	5	5	0,68	0,38	0,38	Havstrut						
Skärfläcka	11	6	5	0,83	0,45	0,38	Kentsk tärna						
St. strandpip.	4	5	9	0,30	0,38	0,68	Fisktärna	3	1	1	0,23	0,08	0,08
Ljungpipare							Silvertärna	8	3	4	0,60	0,23	0,30
Tofsvipa	16	20	6	1,20	1,50	0,45	Småtärna		1	1		0,08	0,08
Kärnsnäppa		2	2		0,15	0,15	Gulärla						



SOCKEN: Hamra

OMRÅDE NR: 9006

TOTAL AREAL: 10,3 ha

Inventerat den: 25/4, 10/5, 22/5, 31/5, 13/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% måttligt	2,0
2001	80% väl, 20% måttligt	2,8
2006	90% väl, 10% måttligt	2,9

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
15	12	10	43	33	20	4,17	3,20	1,94

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane						
Grågås							Enkelbeckasin	1	1	1	0,10	0,10	0,10
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	2	3	2	0,19	0,29	0,19	Storspov	1	1		0,10	0,10	
Snatterand							Rödbena	4	2	2	0,39	0,19	0,19
Kricka							Roskarl	3		1	0,29		0,10
Gräsand							Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås	1			0,10		
Årta	1			0,10			Fiskmås	3	3	2	0,29	0,29	0,19
Skedand	2	1		0,19	0,10		Gråtrut						
Strandskata	8	7	3	0,78	0,68	0,29	Havstrut						
Skärfläcka	1	1		0,10	0,10		Kentsk tärna						
St. strandpip.	6	7	2	0,58	0,68	0,19	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	2	3	2	0,19	0,29	0,19
Tofsvipa	6	3	3	0,58	0,29	0,29	Småtärna	2	1	2	0,19	0,10	0,19
Kärnsnäppa							Gulärta						



Från Aurriv till Ojmundsbod

Kommentarer

Återigen färre fåglar i detta smala strandängsområde. Relativt stora minskningar för större strandpipare och strandskata.

Nordligaste spetsen (norr om bunkern) utgörs av fågelskyddsområde med tillträdesförbud 15 mars-30 juni och 1 oktober-15 november. Hela området ingår dessutom i Natura 2000.

SOCKEN: Hamra

OMRÅDE NR: 9007


TOTAL AREAL: 9,9 ha

Inventerat den: 25/4, 10/5, 13/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	90% måttligt, 10% svagt	1,9
2001	90% väl, 10% måttligt	2,9
2006	90% väl, 10% måttligt	2,9

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
6	7	5	17	22	10	1,72	2,22	1,01

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane	1	2		0,10	0,20	
Grågås							Enkelbeckasin	7	4	3	0,71	0,40	0,30
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand							Storspov	1	1		0,10	0,10	
Snatrand							Rödbena	2	4	1	0,20	0,40	0,10
Kricka							Roskarl						
Gräsand							Dvärgmå						
Stjärtand							Skrattmå						
Årta							Fiskmå						
Skedand							Gråtrut						
Strandskata	2	3	2	0,20	0,30	0,20	Havstrut						
Skärfläcka							Kentsk tärna						
St. strandpip.		1	1		0,10	0,10	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna						
Tofsvipa	4	7	3	0,40	0,71	0,30	Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Sydvästra delen av Norrgårde

Kommentarer

Området har blivit än mer individ- och artfattigt. Det är endast vadare som häckar, men tyvärr har brushane och storspov försvunnit.

Hävden är identiskt med för fem år sedan, men betydligt högre än 1996.

SOCKEN: Hamra

OMRÅDE NR: 9008


TOTAL AREAL: 7,7 ha

Inventerat den: 25/4, 10/5, 13/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	20% väl, 70% måttligt, 10% svagt	2,1
2001	25% väl, 75% måttligt	2,3
2006	90% väl, 10% måttligt	2,9

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
5	8	6	15	27	16	1,95	3,51	2,08

Art				Antal par			Par/hektar			Art				Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06		
Knölsvan							Brushane		3							0,39			
Grågås							Enkelbeckasin	2	4	3	0,26	0,52	0,39						
Vitk. gås							Rödspov												
Gravand							Storspov		1							0,13			
Snatterand							Rödbena	2	3	2	0,26	0,39	0,26						
Kricka							Roskarl												
Gräsand							Dvärgmås												
Stjärtand							Skrattmås												
Årta							Fiskmås												
Skedand							Gråtrut												
Strandskata	3	4	3	0,39	0,52	0,39	Havstrut												
Skärfläcka	1			0,13			Kentsk tärna												
St. strandpip.		2	2		0,26	0,26	Fisktärna												
Ljungpipare							Silvertärna		1	2					0,13	0,26			
Tofsvipa	7	9	4	0,91	1,17	0,52	Småttärna												
Kärnsnäppa							Gulärta												



Kommentarer

Den lilla ökning som skedde 2001 är ett minne blott – nu var tätheten densamma som för tio år sedan.

Området har successivt blivit betydligt mer välhävdad.
Ingår i Natura 2000.

SOCKEN: Hamra

OMRÅDE NR: 9009


TOTAL AREAL: 23,1 ha

Inventerat den: 25/4, 10/5, 13/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	70% väl, 30% måttligt	2,7
2001	30% väl, 70% måttligt	2,3
2006	50% väl, 50% måttligt	2,5

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
6	9	9	18	19	19	0,78	0,82	0,82

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane						
Grågås							Enkelbeckasin	4	3	3	0,17	0,13	0,13
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand			2			0,09	Storspov	3	2	1	0,13	0,09	0,04
Snatterand							Rödbena	2	1	2	0,09	0,04	0,09
Kricka							Roskarl						
Gräsand		1	1		0,04	0,04	Dvärgmås						
Stjärtand		1			0,04		Skrattmås						
Årta							Fiskmås		1			0,04	
Skedand	1			0,04			Gråtrut						
Strandskata	2	4	3	0,09	0,17	0,13	Havstrut						
Skärfläcka							Kentsk tärna						
St. strandpip.			1			0,04	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna		1	2		0,04	0,09
Tofsvipa	6	5	4	0,26	0,22	0,17	Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Norr om Ojmundsbod

Kommentarer

Endast mycket små förändringar i detta redan tidigare fågelfattiga område.

Drygt östra halvan ingår i Natura 2000.

SOCKEN: Hamra

OMRÅDE NR: 9010

TOTAL AREAL: 10,6 ha

Inventerat den: 26/4, 12/5, 14/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	25% måttligt, 75% svagt	1,3
2001	25% måttligt, 75% svagt	1,3
2006	25% väl, 65% måttligt, 10% svagt	2,2

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
14	15	15	25	39	26	2,36	3,68	2,45

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane						
Grågås							Enkelbeckasin	1	1	1	0,09	0,09	0,09
Vitk. gås							Rödspov		1	1		0,09	0,09
Gravand	3	12	5	0,28	1,13	0,47	Storspov						
Snatterand	1			0,09			Rödbena	2	4	2	0,19	0,38	0,19
Kricka		1	1		0,09	0,09	Roskarl		1	1		0,09	0,09
Gräsand	2	2	2	0,19	0,19	0,19	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta							Fiskmås	1	1	1	0,09	0,09	0,09
Skedand	3	1	1	0,28	0,09	0,09	Gråtrut	1			0,09		
Strandskata	3	4	1	0,28	0,38	0,09	Havstrut						
Skärfläcka	1	1	1	0,09	0,09	0,09	Kentsk tärna						
St. strandpip.	2	6	3	0,19	0,57	0,28	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	1	1	2	0,09	0,09	0,19
Tofsvipa	1	1	1	0,09	0,09	0,09	Småtärna	3	2	3	0,28	0,19	0,28
Kärnsnäppa							Gulärta						



Från Ojmundsbod till den nordligaste delen av Ajnviken (norr om Rumsbod)

Kommentarer

Något sämre än 2001 men likvärdigt med 1996, dock ändå endast små förändringar. Tredje högsta tätheten av småtärna.

Hävdstatusen har ökat betydligt sedan förra inventeringen.

Inventerat den: 26/4, 12/5, 14/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	50% svagt, 50% ej	0,5
2001	100% ej	0
2006	40% väl, 40% måttligt, 20% svagt	2,2

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
18	16	15	45	31	29	10,71	7,38	6,90

Art			Antal par			Par/hektar			Art			Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06
Knölsvan	1		1	0,24		0,24	Brushane										
Grågås	1	1	2	0,24	0,24	0,48	Enkelbeckasin	1	2	1	0,24	0,84	0,24				
Vitk. gås							Rödspov										
Gravand	8	11	8	1,90	2,62	1,90	Storspov		1				0,24				
Snatterand		1			0,24		Rödbena	3	2	3	0,71	0,48	0,71				
Kricka	2		3	0,48		0,71	Roskarl	2	1	1	0,48	0,24	0,24				
Gräsand	2	2	1	0,48	0,48	0,24	Dvärgmås										
Stjärtand							Skrattmås	1			0,24						
Årta							Fiskmås	3	1	2	0,71	0,24	0,48				
Skedand	2	1		0,48	0,24		Gråtrut										
Strandskata	5	2	1	1,19	0,48	0,24	Havstrut										
Skärfläcka	3	2	1	0,71	0,48	0,24	Kentsk tärna										
St. strandpip.	5	1	1	1,19	0,24	0,24	Fisktärna	2			0,48						
Ljungpipare							Silvertärna	2	1	1	0,48	0,24	0,24				
Tofsvipa	1	1	2	0,24	0,24	0,48	Småtärna	1	1	1	0,24	0,24	0,24				
Kärnsnäppa							Gulärla										



Innanför norra delen av Ajnviken

Kommentarer

De senaste fem åren har hävden återupptagits, men detta har inte gett något genomslag i antalet häckande strandfåglar. Detta smala område är trots det ett mycket fågelrikt område (fjärde högsta totala tätheten).

Noterbara tätheter:

- gravand, högsta,
- kricka, näst högsta och
- knölsvan, tredje högsta.

SOCKEN: Hamra

OMRÅDE NR: 9012

TOTAL AREAL: 12,2 ha

Inventerat den: 26/4, 12/5, 14/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	25% väl, 75% måttligt	2,3
2001	30% väl, 70% måttligt	2,3
2006	80% väl, 20% måttligt	2,8

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
10	11	8	21	22	16	1,72	1,80	1,31

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan		1	1		0,08	0,08	Brushane						
Grågås							Enkelbeckasin	1	2	2	0,08	0,16	
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	3	3	3	0,25	0,25	0,25	Storspov	2	1		0,16	0,08	
Snatterand							Rödbena	3	3	4	0,25	0,25	0,33
Kricka			1			0,08	Roskarl						
Gräsand		1	1		0,08	0,08	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta							Fiskmås	2	3	2	0,16	0,25	0,16
Skedand							Gråtrut	2			0,16		
Strandskata	4	3	1	0,33	0,25	0,08	Havstrut						
Skärfläcka	1	1		0,08	0,08		Kentsk tärna						
St. strandpip.	1	2	1	0,08	0,16	0,08	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna						
Tofsvipa	2	2		0,16	0,16		Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Innanför södra delen av Ajnviken

Kommentarer

Något lägre antal arter och häckande par. Ingen konstaterad häckning för skärfläcka, tofsvipa eller storspov. Samtliga dessa tre arter har tidigare häckat i området om än i litet antal. Hävdstatusen har ökat ytterligare.

SOCKEN: Hamra

OMRÅDE NR: 9013

TOTAL AREAL: 11,5 ha

Inventerat den: 26/4, 12/5, 14/6 (LaTy)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	35% väl, 65% måttligt	2,4
2001	20% väl, 80% måttligt	2,2
2006	90% väl, 10% måttligt	2,9

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
13	14	14	28	29	19	2,43	2,52	1,65

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1		1	0,09		0,09	Brushane						
Grågås							Enkelbeckasin		1	1		0,09	0,09
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand		3	1		0,26	0,09	Storspov	1	1		0,09	0,09	
Snatterand		1			0,09		Rödbena	3	3	2	0,26	0,6	0,17
Kricka			1			0,09	Roskarl	2	1	1	0,17	0,09	0,09
Gräsand		1	2		0,09	0,17	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta							Fiskmås	1	2	2	0,09	0,17	0,17
Skedand	2			0,17			Gråtrut						
Strandskata	5	4	2	0,43	0,35	0,17	Havstrut						
Skärfläcka	1	1	1	0,09	0,09	0,09	Kentsk tärna	2	2		0,17	0,17	
St. strandpip.	4	3	1	0,35	0,26	0,09	Fisktärna	1			0,09		
Ljungpipare							Silvertärna	2	2	2	0,17	0,17	0,17
Tofsvipa	3	4	1	0,26	0,35	0,09	Småtärna			1			0,09
Kärnsnäppa							Gulärta						



Sallmundsudd

Kommentarer

Lika många arter som tidigare men färre individer. Det är dock inga dramatiska förändringar. Området är numer än mer välhävdad.

SOCKEN: Vamlingbo

OMRÅDE NR: 9101

TOTAL AREAL: 31,8 ha

Inventerat den: 25/4, 17/5, 8/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	50% måttligt, 50% svagt	1,5
2001	60% väl, 20% måttligt, 20% svagt	2,4
2006	10% väl, 50% måttligt, 20% svagt, 20% ej	1,5

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
16	20	20	70	122	143	2,20	3,84	4,50

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	2	8	5	0,06	0,25	0,16	Brushane						
Grågås		1	11		0,03	0,35	Enkelbeckasin	2	1	4	0,06	0,03	0,13
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	6	12	13	0,19	0,38	0,41	Storspov						
Snatrand			2			0,06	Rödbena	9	6	12	0,28	0,19	0,38
Kricka	3	5	1	0,09	0,16	0,03	Roskarl	2	2	1	0,06	0,06	0,03
Gräsand	6	9	10	0,19	0,28	0,31	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås		1	29		0,03	0,91
Årta	1			0,03			Fiskmås	7	7	7	0,22	0,22	0,22
Skedand	4	4	5	0,13	0,13	0,16	Gråtrut		10	6		0,31	0,19
Strandskata	7	9	10	0,22	0,28	0,31	Havstrut		1	1		0,03	0,03
Skärfläcka		21	1		0,66	0,03	Kentsk tärna						
St. strandpip.	5	5	6	0,16	0,16	0,19	Fisktärna	1	1	2	0,03	0,03	0,06
Ljungpipare							Silvertärna	7	9	7	0,22	0,28	0,22
Tofsvipa	7	9	10	0,22	0,28	0,31	Småtärna	1	1		0,03	0,03	
Kärnsnäppa							Gulärta						



Killingsholm och Snäckvik

Kommentarer

Efter en viss ökning 2001 var hävden åter såsom den var 1996, men mängden strandfågel har ökat vid varje inventeringstillfälle. Nu utgör de 20 olika arterna inventeringens fjärde högsta notering.

Utav etableringen av de 21 paren skärfläckor återstår dock bara ett par. Istället har det tillkommit en skrattnåskoloni (29 par), tredje högsta tätheten.

SOCKEN: Sunde

OMRÅDE NR: 9201


TOTAL AREAL: 20,1 ha

Inventerat den: 22/4, 8/5, 27/5, 7/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	40% väl, 60% svagt	1,8
2001	20% väl, 40% måttligt, 40% svagt	1,8
2006	40% måttligt, 60% svagt	1,4

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
16	12	14	56	52	46	2,79	2,59	2,29

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane						
Grågås			2			0,10	Enkelbeckasin	2	3	4	0,10	0,15	0,20
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	5	5	4	0,25	0,25	0,20	Storspov	1		1	0,05		0,05
Snatterand	1		1	0,05		0,05	Rödbena	6	6	6	0,30	0,30	0,30
Kricka			1			0,05	Roskarl	2	4		0,10	0,20	
Gräsand	2	3	4	0,10	0,15	0,20	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta	1			0,05			Fiskmås	2	1		0,10	0,05	
Skedand	1	2	4	0,05	0,10	0,20	Gråtrut						
Strandskata	8	7	4	0,40	0,35	0,20	Havstrut			1			0,05
Skärfläcka	2	3		0,10	0,15		Kentsk tärna						
St. strandpip.	7	5	5	0,35	0,25	0,25	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	7	6	4	0,35	0,30	0,20
Tofsvipa	8	7	5	0,40	0,35	0,25	Småtärna	1			0,05		
Kärnsnäppa							Gulärta						



Östra delen av Rivviken, samt Udden

Kommentarer

Endast marginella förändringar/försämringar i en relativt ordinär strandängsfågelfauna. Hävden har minskat något.

Natura 2000-område.

SOCKEN: Sunde

OMRÅDE NR: 9202


TOTAL AREAL: 26,3 ha

Inventerat den: 22/4, 8/5, 27/5 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	30% väl, 70% svagt	1,6
2001	20% väl, 30% måttligt, 50% svagt	1,7
2006	10% måttligt, 30% svagt, 60% ej	0,5

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
9	9	9	21	15	15	0,80	0,57	0,57

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan							Brushane						
Grågås			1			0,04	Enkelbeckasin	2	2	1	0,08	0,08	0,04
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	4	2	2	0,15	0,08	0,08	Storspov						
Snatrand							Rödbena	3	2	3	0,11	0,08	0,11
Kricka							Roskarl	1			0,04		
Gräsand		1	1		0,04	0,04	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta							Fiskmås	1	1	3	0,04	0,04	0,11
Skedand							Gråtrut						
Strandskata	3	1	1	0,11	0,04	0,04	Havstrut						
Skärfläcka							Kentsk tärna						
St. strandpip.	2	1		0,08	0,04		Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	2	1	1	0,08	0,04	0,04
Tofsvipa	3	4	2	0,11	0,15	0,08	Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Västligaste delen av Flisviken

Kommentarer

Inga stora skillnader mellan de tre inventeringarna vad gäller artsammansättning och täthet i detta fågelfattiga område. Däremot har hävden nästan upphört.

Största delen utgörs av Natura 2000.

SOCKEN: Sunde

OMRÅDE NR: 9203


TOTAL AREAL: 16,0 ha

Inventerat den: 22/4, 8/5, 27/5 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	50% måttligt, 50% svagt	1,5
2001	10% måttligt, 50% svagt, 40% ej	0,7
2006	70% svagt, 30% ej	0,7

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
7	6	6	11	8	10	0,69	0,50	0,63

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1			0,06			Brushane						
Grågås			1			0,06	Enkelbeckasin	1			0,06		
Vitk. gås							Rödspov		1			0,06	
Gravand	2	3	3	0,12	0,19	0,19	Storspov						
Snatterand							Rödbena	2	1	1	0,12	0,06	0,06
Kricka							Roskarl						
Gräsand		1	1		0,06	0,06	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta							Fiskmås	2	1	3	0,12	0,06	0,19
Skedand							Gråtrut						
Strandskata		1	1		0,06	0,06	Havstrut						
Skärfläcka							Kentsk tärna						
St. strandpip.							Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	2			0,12		
Tofsvipa	1			0,06			Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Västra/centrala delen av Flisviken

Kommentarer

Ett fortsatt mycket fågelfattigt område. Kan den svaga hävden vara en avgörande orsak?

Största delen ingår i Natura 2000.

SOCKEN: Sunde

OMRÅDE NR: 9204


TOTAL AREAL: 21,3 ha

Inventerat den: 22/4, 8/5, 27/5, 7/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	100% svagt	1,0
2001	20% väl, 70% måttligt, 10% svagt	2,1
2006	10% måttligt, 70% svagt, 20% ej	0,9

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
17	15	13	53	52	39	2,49	2,44	1,83

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan			1			0,05	Brushane						
Grågås		4	4		0,19	0,19	Enkelbeckasin	2	5	2	0,09	0,23	0,09
Vitk. gås							Rödspov				0,05		
Gravand	5	13	3	0,23	0,61	0,14	Storspov	1			0,05		
Snatterand	1			0,05			Rödbena	6	2	4	0,28	0,09	0,19
Kricka	1	1		0,05	0,05		Roskarl	2	1	2	0,09	0,05	0,09
Gräsand	2	1	4	0,09	0,05	0,19	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås		1			0,05	
Årta	1			0,05			Fiskmås	4	2	5	0,19	0,09	0,23
Skedand	2	1	3	0,09	0,05	0,14	Gråtrut						
Strandskata	5	4	3	0,23	0,19	0,14	Havstrut						
Skärfläcka	1			0,05			Kentsk tärna						
St. strandpip.	6	7	1	0,28	0,33	0,05	Fisktärna						
Ljungpipare		1			0,05		Silvertärna	6	4	3	0,28	0,19	0,14
Tofsvipa	7	5	4	0,33	0,23	0,19	Småtärna	1			0,05		
Kärnsnäppa							Gulärta						



Centrala delen av Flisviken

Kommentarer

Det fågelrikaste området innanför Flisviken. En smärre försämring har emellertid skett jämfört med de två tidigare inventeringarna. Det mest uppseendeväckande är kanske att större strandpiparen bara häckade med ett par mot tidigare sju. Området var 2001 måttligt hävdad men 2006 var det återigen i princip lika svagt som 1996.

Natura 2000-område.

SOCKEN: Sunde

OMRÅDE NR: 9205


TOTAL AREAL: 18,7 ha

Inventerat den: 22/4, 8/5, 27/5, 7/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	30% väl, 70% svagt	1,6
2001	40% väl, 60% måttligt	2,4
2006	10% väl, 30% måttligt, 30% svagt, 30% ej	1,2

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
15	15	16	36	40	40	1,93	2,14	2,14

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1	1	1	0,05	0,05	0,05	Brushane						
Grågås							Enkelbeckasin	2	4	2	0,11	0,21	0,11
Vitk. gås							Rödspov		1	1		0,05	0,05
Gravand	4	8	6	0,21	0,43	0,32	Storspov					0,11	0,11
Snatrand			1			0,05	Rödbena	5	2	5	0,27	0,11	0,27
Kricka	2			0,11			Roskarl	1	1	1	0,05	0,05	0,05
Gräsand	2	2	5	0,11	0,11	0,27	Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta							Fiskmås	3	2	5	0,16	0,11	0,27
Skedand	1	2	1	0,05	0,11	0,05	Gråtrut						
Strandskata	3	3	2	0,16	0,16	0,11	Havstrut		2	2		0,11	0,11
Skärfläcka	2	2	1	0,11	0,11	0,05	Kentsk tärna						
St. strandpip.	2	4	2	0,11	0,21	0,11	Fisktärna						
Ljungpipare	1			0,05			Silvertärna	5	4	2	0,27	0,21	0,11
Tofsvipa	2	2	3	0,11	0,11	0,16	Småtärna						
Kärnsnäppa							Gulärta						



Östra/centrala delen av Flisviken

Kommentarer

Inga stora förändringar varken med avseende på antal arter eller antal häckande par. Området var betydligt mer hävdad för fem år sedan.

Tredje högsta tätheten av havstrut.

Större delen ingår i Natura 2000.

SOCKEN: Sunde

OMRÅDE NR: 9206


TOTAL AREAL: 15,3 ha

Inventerat den: 22/4, 8/5, 27/5, 7/6 (TuKo)

År	Hävdstatus	Hävdpoäng
1996	20% måttligt, 40% svagt, 40% ej	0,8
2001	20% väl, 40% måttligt, 40% svagt	1,8
2006	10% väl, 50% måttligt, 40% svagt	1,7

Antal häckande arter			Antal häckande par			Antal häckande par/ha		
1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
13	8	12	29	30	40	1,89	1,96	2,61

Art	Antal par			Par/hektar			Art	Antal par			Par/hektar		
	-96	-01	-06	-96	-01	-06		-96	-01	-06	-96	-01	-06
Knölsvan	1			0,07			Brushane						
Grågås			2			0,13	Enkelbeckasin	1	5	4	0,07	0,33	0,26
Vitk. gås							Rödspov						
Gravand	4	9	6	0,26	0,59	0,39	Storspov						
Snatterand							Rödbena	5	4	6	0,33	0,26	0,39
Kricka							Roskarl			1			0,07
Gräsand	1			0,07			Dvärgmås						
Stjärtand							Skrattmås						
Årta	1			0,07			Fiskmås	2		5	0,13		0,33
Skedand			2			0,13	Gråtrut						
Strandskata	4	2	3	0,26	0,13	0,20	Havstrut						
Skärfläcka	1	2	1	0,07	0,13	0,07	Kentsk tärna						
St. strandpip.	3	4	2	0,20	0,26	0,13	Fisktärna						
Ljungpipare							Silvertärna	3	1	2	0,20	0,07	0,13
Tofsvipa	2	3	6	0,13	0,20	0,39	Småtärna	1			0,07		
Kärnsnäppa							Gulärta						



Östra delen av Flisviken

Kommentarer

Något fler häckande par jämfört med tidigare, men sammantaget inga stora skillnader.

Natura 2000-område.

