


2EP

Våtmarker i Örebro län

Södra delen



Länsstyrelsen
Örebro län
Naturvård
Publikation nr 1998:8

Richard Holmberg

Förord

Denna rapport utgör Örebro läns del av den riksomfattande våtmarksinventering som drivits och bekostats av Naturvårdsverket.

Våtmarkerna har naturligt en rik biologisk mångfald som det är angeläget att bevara för kommande generationer. Samtidigt är anspråken på myrarna från olika exploaterande intressen stora. Det är därför angeläget att förekommande våtmarker bedöms och klassificeras från naturvårdssynpunkt vilket sen kan läggas till grund för ställningstaganden i exploateringsärenden och säkerställande frågor.

Inventeringsarbetet har utförts av Yvonne Liliegren, Jönköping. Loise Grundeus vid Länsstyrelsen i Värmlands län och Jenny Lonnstad, Naturvårdsverket har hjälpt till med viss flygbildstolkning. Inventeraren svarar för redovisade bedömningar och klassificeringar av våtmarkerna.

Aida Cardenas, Blaise Comet, Kristina Sandvall, Ann-Marie Wallin och Berit Åhs-Nilsson vid Länsstyrelsen Örebro har tålmodigt arbetat sig igenom ett omfattande digitaliserings- och kartredovisningsarbete i GIS-version där såväl apparatur som arbetsmetoder från början inte var helt anpassade för uppgiften.

Rapporten är publicerad i två delar, södra och norra delen av Örebro län.

Framsidas illustration är ritad av Mikael Holmberg.

Länsstyrelsen i Örebro län

Innehåll

	Sida
1 Inledning	7
2 Metodik	8
2.1 Allmänt	8
2.2 Förarbete	8
2.3 Fältarbete	11
2.4 Naturvärdesbedömning och klassificering	12
2.5 Redovisning	13
2.6 Osäkerhetsfaktorer i våtmarksinventeringen	13
3 Naturgeografiska regioner i Örebro län	14
3.1 Skogslandskapet i Tiveden-Tylöskogen-Kolmården	14
3.2 Svealands sprickdalsterräng med lerslätter och sjöbäcken	14
3.3 Skogslandskapet omedelbart söder om Norrlandsgränsen	15
3.4 Skogslandskapet norr om Norrlandsgränsen	15
3.5 Sydligt boreala kuperade områden	15
3.6 Norrlands vågiga bergkullterräng med mellanboreala skogsområden	16
4 Allmänt om myrar	16
4.1 Myrens bildningssätt	17
4.2 Skillnader i vegetationssammansättningen i mossar och kärr	17
5 Våtmarkstyper	18
5.1 Myrar	19
5.1.1 Mossar	19
5.1.2 Kärr	21
5.1.3 Blandmyrar	22
5.1.4 Sumpskogar	22
5.2 Strandvåtmarker	23
5.2.1 Limnogena våtmarker	23
5.3 Övriga fuktiga till våta områden	24
5.3.1 Öppna fuktiga till våta områden	24
5.3.2 Skogsklädda fuktiga till våta områden	24
5.4 Hydrologiska typer	24
6 Vegetationstyper	26
6.1 Vegetationstyper i öppna kärr	28
6.2 Vegetationstyper i mossar	31
6.3 Skogsklädda vegetationstyper	32
6.4 Vegetationstyper i sjöar	34

	Sida
7 Ornitologiska inventeringar	34
7.1 Fågelmyrar i Örebro län	34
7.2 Madmarker i Örebro län	37
8 Plan- och skyddsstatus	40
8.1 Planstatus	40
8.2 Skyddstatus	41
9 Nyttjandet av våtmarker	41
10 Statistik	43
10.1 Fördelning av våtmarksytan	43
10.2 Objektens storleksfördelning	44
10.3 Fördelning mellan naturvärdesklasserna	45
10.4 Areell fördelning av olika våtmarkstyper	47
11 Förklaringar	48
11.1 Ordförklaringar	48
11.2 Mossornas svenska namn	51
12 Lista över litteratur och uppgiftslämnare	52
13 Katalogdel	55
Askersunds kommun	55
Degerfors kommun	69
Hallsbergs kommun	91
Karlskoga kommun	111
Kumla kommun	133
Laxå kommun	137
Örebro kommun	177

Kartbilaga

Kartor Detaljkartor för Klass 1-myrarna

1 Inledning

Föreliggande rapport är en del av den riksomfattande våtmarksinventeringen som pågått i Sverige sedan drygt tio år.

Upptakten till den rikstäckande inventeringen är ett projekt som redovisades 1979. "Översiktlig inventering av Sveriges våtmarker" som Naturvårdsverket rapporterade till regeringen 1979 med SNV PM 1181-1184, visade att det behövs omfattande ytterligare insatser för inventering, klassificering och bevarande av de återstående svenska våtmarkerna. Inventeringen visade också att stora arealer våtmarker tagits i anspråk för ett intensifierat jord- och skogsbruk alltsedan industrialiseringen på 1800-talet. Skyddsvärda våtmarker hotas bl a av dikning, skogsavverkning, gödsling, torrlägningsföretag, dämning, torvtäkt, vägbyggen, hamnanläggningar och bevattningsanläggningar" (SNV PM 1680).

Som en följd av ovan nämnda rapport påbörjades ett pilotprojekt "Våtmarksinventering i sydvästra Sverige". I pilotprojektet ingick att utarbeta en metodik för inventering av våtmarker. Denna redovisas i SNV PM 1680. Under de år som följt efter pilotprojektet har fortsatta inventeringar av Sveriges våtmarker följt länsvis i det projekt som kallas VMI. Inventeringsmetoden har utvecklats successivt under dessa inventeringar. Idag är det bara Norrbottens län som återstår men som nu har tilldelats medel.

Metodiken som Naturvårdsverket utarbetade ligger till grund för en inventeringen vars mål bl a är att ge en överblick över länets våtmarker (över en viss bestämd storlek), att inventera högt klassade objekt i fält, ge tillgång till ett enhetligt underlag för värdering och naturvårdsplanering samt ge ett beslutsunderlag vid ärendehandläggning. Data från våtmarksinventeringen ska också ingå i det faktaunderlag som fordras för miljöövervakning och naturresursplanering.

I Örebro län fanns sedan tidigare tillgång till en myrinventering, Ingvar Backeus "Värdefulla myrar i Örebro län" (1979). I rapporten beskrivs de ingående objekten grundligt och detaljrikt men den är, med några få undantag, begränsad till stora myrarealer. I den rikstäckande våtmarksinventeringen registrerades ett större antal objekt omfattande även andra typer av våtmarker än myrar. Metodiken är enhetlig och data om varje objekt lagras i en databas som för närvarande finns tillgänglig på Naturvårdsverket.

Våtmarksinventeringen i Örebro län har skett i samarbete mellan Naturvårdsverket, där Michael Löfroth varit projektansvarig, och Länsstyrelsens miljöenhet. Både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har finansierat projektet.

Inventeringen utfördes av Yvonne Liliegren mellan januari 1993 och mars 1994. Louise Grundeus, Länsstyrelsen i Värmlands län, bidrog med utbildning och viss flygbildstolkning. Flera av de potentiella myrskyddsobjekten flygbildstolkades av Jenny Lonnstad, Naturvårdsverket.

Databearbetning av våtmarksmaterialet har utförts av Michael Löfroth som även arrangerade en veckas utbildning för våtmarksinventerare. Examination av ett flertal

mossor har Lars Hedenäs (vitmossor och brunmossor) och Henrik Weibull (levermossor) stått till tjänst med.

Blaise Comet har ansvarat för upprättandet av de digitala kartorna och Ann-Marie Wallin, Kristina Sandvall, Aida Cardenas samt Berit Åhs-Nilsson har renritat och digitaliserat dessa tolkningskartor. Samtliga arbetar på Länsstyrelsen i Örebro län.

2 Metodik

2.1 Allmänt

I Naturvårdsverkets rikstäckande våtmarksinventering, VMI, definieras begreppet våtmark enligt följande: "Våtmark är sådan mark där vatten under en stor del av året finns nära under, i eller strax över markytan samt vegetationstäckta vattenområden... Gränserna för hur nära markytan vattnet kan finnas i en våtmark varierar. I de flesta fall kan vegetationen användas för att skilja våtmark från annan mark. Minst 50% av vegetationen bör vara hydrofil, fuktighetsälskande, för att man ska kunna kalla ett område för våtmark. Ett undantag är tidvis torrlagda bottenområden i sjöar, hav och vattendrag, de räknas till våtmarkerna trots att de kan sakna vegetation".

Våtmarksinventeringen följer den metodik i tre steg som utarbetats av Naturvårdsverket (SNV PM 1680).

- Steg I. Alla objekt med en viss storlek, samt vissa andra mindre objekt som bedöms värdefulla flygbildstolkas och grundläggande data registreras.
- Steg II. Ytterligare information registreras till alla de objekt som inte bedöms vara helt förstörda av ingrepp. I detta steg indelas objekten i delobjekt som i sin tur uppdelas i element.
- Steg III. Slutlig information som registreras vid fältbesök av de objekt som bedöms ha särskilt höga naturvärden. Urvalet av fältobjekt sker med hjälp av VMI-programmet PAN (Poängsättning Av Naturvärde).

2.2 Förarbete


Våtmarksinventeringen bygger i huvudsak på flygbildstolkning. De bilder som använts är infraröda diapositiv i ungefärlig skala 1:30 000. Bildskalan är ett medelvärde och det beror framför allt på grund av höjdskillnader i terrängen. Fotograferingsåren varierar från 1981 till 1988. I vissa perifera delar av länet användes diapositiv i ungefärlig skala 1:60 000, daterade 1978. Bilderna tolkades i tolkningsinstrument, dels ett enklare, märkt TOPOCON, och dels i ett mer avancerat, märkt AVIOPRET.

Alla våtmarker som finns i länet kan inte tolkas i en översiktlig inventering, det skulle ta alltför lång tid i anspråk. Därför har två lägsta storleksgränser använts. I de

naturgeografiska regionerna 23, 24, 26 och 27 tolkades objekt med en storlek av minst tio hektar. I regionerna 28 b och 30 a sattes gränsen till minst tjugo hektar. *Figur 1* visar regionernas utbredning i Örebro län. Undantag för mindre områden har gjorts om information pekat på särskilda värden, t ex botaniska sådana.

NATURGEOGRAFISKA REGIONER ÖREBRO LÄN

- ☐ 30A: Norrlands vågiga bergkulterräng med mellanboreala skogsområden
- ☐ 27: Skogslandskapet norr om Norrlandsgränsen
- ☐ 26: Skogslandskapet omedelbart söder om Norrlandsgränsen
- ☐ 23: Skogslandskapet i Tiveden-Tylöskogen-Kolmården
- ☐ 24: Svealands sprickdalsterräng med lerslättdalar och sjöbäcken
- ☐ 28B: Sydligt boreala kuperade områden



Figur 1. Kartan, på föregående sida, visar de naturgeografiska regionernas utbredning i Örebro län. På kartan är även kommungränserna markerade.

Varje våtmarksområde avgränsas till ett "objekt" i flygbildstolkningen. Avgränsningen går till så att all sammanhängande våtmark förs till ett och samma objekt. Objektets yttre gräns utgörs således alltid av fastmark, eller i vissa fall, öppet vatten. Varje objekt erhåller ett unikt identitetsnummer t ex 09E0A01, där 09E anger inom vilket topografiskt kartblad objektet finns, 0A inom vilket ekonomiskt kartblad och slutligen 01 som är en löpande numrering i det aktuella ekonomiska kartbladet.

En tolkningskarta för varje objekt ritas på transparent film som placeras på flygbilden. På skissen markeras objektets- respektive delobjektets gränser, ingrepp t ex diken, torvtäkter och vägar, ingående eller anslutande vatten, strukturer osv. Intill varje skiss noteras ID nummer och de delobjekt som ingår i objektet. De tolkningskartor som härrör till klass 1 objekten redovisas i rapporten. Alla original förvaras hos Länsstyrelsen i Örebro län.


Steg I

På en datablankett registreras den information som är nödvändig för steg I. Informationen utgörs bl a av flygfotograferingsdatum, våtmarkstyp, kommun, ID-nummer, höjd över havet, förekomst av rinnande vatten, objektsyta, våtmarksyta (objektets yta exklusive ingående fastmark och vatten, dock inte göl) status i naturvårdsplaneringen, typ av skydd och nyckelord (övergripande företeelse). Om ett objekt delas av två kommuner valdes den kommun som har mer än 50% av objektsytan. Objektets namn följer den topografiska kartans namnsättning. Såvida objektet inte är allvarligt skadat av ingrepp fortsatte tolkningen till steg II.

Steg II

Ett objekt består vanligen av flera olika typer av våtmarker, de olika typerna benämns delobjekt.

I steg II görs denna indelning och liksom i föregående fas registreras aktuell information på en datablankett. I ett objekt kan t ex två topogena kärr, tre svagt välvda mossar och en sumpskog ingå. De indelas i tre delobjekt: 1 Topogent kärr, 2 Svagt välvd mosse och 3 Sumpskog. Figuren till höger illustrerar en tolkningskarta. En sådan indelning innebär en viss grad av generalisering och det får förekomma mindre inslag av andra våtmarkstyper i ett delobjekt. Gränserna mellan de olika delobjekten får inte heller ses som strikta, det är fråga om övergångszoner. För att öka detaljeringsgraden i beskrivningarna av delobjektet delas det in i



1. Topogent kärr
2. Svagt välvd mosse
3. Sumpskog

element. Ett delobjekt kan ha ett homogent utseende, t ex en mosse utan några strukturer. Elementet kallas då helt kort plan för mossar och golv för övriga våtmarker.

Vanligare är att delobjektet är sammansatt av ett flertal olika element: hölja, tuva, lagg, bäck och göl är några exempel. Ett annat exempel på indelning i element är då det finns en liten öppen yta i ett skogsdominerat område. Här urskiljs två element, ett större med fullständig krontäckning och ett mindre utan träd. Kombinationsmöjligheterna är många. För varje element registreras dess hydrologiska typ men även vegetationen om den är tolkningsbar. Elementets andel i procent av delobjektet, tydlighet och skogstyp anges också.

Övrig information som registreras i steg II är bl a delobjektets löpnummer, yta, antal enheter, andel ingående öppet vatten, krontäckning, grad av ingrepp och nyckelord. Ingreppsgraden följer fyra steg: svag lokal, stark lokal, svag generell och stark generell.

Utöver flygbildstolkningen har information från tidigare litteratur hämtats. Till Länsstyrelsen inkommer också en mängd information från ideella föreningar och andra intresserade personer. Deras uppgifter har varit till stor hjälp. I övrigt hänvisas till kapitel Litteratur och uppgiftslämnare. Informationen som finns i "Värdefulla myrar i Örebro län" (Backeus 1978) finns, tillsammans med all övrig information från VMI, registrerad i Naturvårdsverkets Våtmarksdatabas.

2.3 Fältarbete

Att få en översiktlig bild över alla våtmarker och de datamängder som registrerats är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, "manuellt". Naturvårdsverket har därför utarbetat ett dataprogram, PAN, som bearbetar de ingående uppgifterna från steg I och II. Denna behandling ger en överblick över det inventerade området och på så sätt kan olika analyser med avseende på t ex våtmarkstyper och ingrepp göras. Programmet rangordnar också objekten och ett underlag för naturvärdesklassificeringen utarbetas.

Bearbetningen utförs med utgångspunkt från de naturgeografiska regionerna. För enkelhetens skull har de naturgeografiska regionerna avgränsats med hjälp av ekonomiska kartblad. Det betyder att ett kartblad som egentligen delas av två regioner namnges efter en av regionerna.

De kriterier som används för att värdera objekten är bl a orördhet, storlek, mångformighet och kontakt med öppet vatten. Efter bearbetningen framkommer bl a våtmarkstypens raritet, representativitet och säregenhet. Till resultatet från databearbetningen läggs övrig information om kända naturvärden.

Steg III

Vid fältinventeringen besöktes objekt som bedömdes hysa särskilt höga naturvärden. Eftersom en vegetationssäsong är kort kunde inte tyvärr inte alla dessa objekt inventeras. Så långt som möjligt inventerades varje delobjekt som ingår i det aktuella objektet. Alla insamlade uppgifter i detta steg III registrerades på datablanketter.

Observeras bör att fältinventeringen är översiktlig och att artlistorna därför långt ifrån är fullständiga.

Observerade kärlväxter och mossor registrerades. Artens frekvens noterades enligt en tre-gradig skala där:

- 1 är riklig förekomst
- 2 är allmänt förekommande
- 3 är enstaka förekomst

Artens karakteristik beskrivs i en två-gradig skala där:

- 1 är en art vars biomassa utgör en så stor del av vegetationstypens biomassa att den dominerar över de övriga arterna. Observeras bör att flera arter kan samdominera.
- 0 i frekvensangivelsen avser en art som inte utgör en dominerande del av vegetationen.

Om artuppgifter fanns noterade från tidigare inventeringar registrerades dessa under särskild rubrik, såvida de inte påträffades under inventeringen. Om dessa arter inte kunde knytas till element eller delobjekt lades de in under respektive objekt. Om arternas frekvens och karakteristik inte kunde utläsas angavs koden 2 0.

Ingående vegetationstyper har beskrivits enligt "Vegetationstyper i Norden" (1984). Vissa av vegetationstyperna har inbördes mycket sällan en avvikande artsammansättning. Då arterna inom en sådan typ noterats ett antal gånger registrerades endast namnet på den aktuella vegetationstypen. Då artsammansättningen inte stämde överens varken med en vegetationstyp eller en variant av densamma angavs steget närmast före i detaljeringsgrad. Hur väl vegetationstypen överensstämde med den angivna i "Vegetationstyper i Norden" registrerades också.

I mångt och mycket följer fältinventeringen flygbildstolkningens uppdelning, bl a i de olika elementen. Om ett element påträffades som inte fanns beskriven i flygbildstolkningen kallades detta för underelement. Det kan t ex vara fastmattehöljor i en mosse med olika vegetationssammansättningar.

Övriga uppgifter som ingår i steg III är bl a datum för fältbesök, lutning, skogstyp, krontäckningsgrad och öppenhetsdiameter.

2.4 Naturvärdesbedömning och klassificering

Vid fältsäsongens slut och efter de revideringar som utförts har den slutliga rangordningen av objekten gjorts. Objekten indelas i fyra naturvärdesklasser, 1, 2, 3 och 4. Objekt i klass 1 har klassats på basis av en välgrundad bedömning, normalt utifrån fältinventering. De objekt som ligger i klass 2 - 4 har oftast klassats helt utifrån flygbildstolkning. Detta innebär att om ny information erhålls om detta objekt, t ex via fältinventering, kan klasserna komma att behöva justeras.

Klass 1 innehåller objekt som är särskilt värdefulla och som har mycket höga naturvärden. Inga ytterligare ingrepp får tillåtas.

Klass 2 innehåller objekt med höga naturvärden. Inte heller här bör arbetsföretag tillåtas.

Klass 3 innehåller objekt som har vissa naturvärden. Gruppen är stor och heterogen. Här kan finnas objekt som har höga naturvärden tillsammans med objekt som är kraftigt skadade.

Klass 4 innehåller objekt utan nämnvärda naturvårdsintressen. Gruppen kan dock hysa objekt som, trots stora ingrepp, t ex har floristiska värden.

2.5 Redovisning

Resultatet av våtmarksinventeringen redovisas i form av texter och kartmaterial.

Alla våtmarksobjekt redovisas kommunvis. Kommunerna följer alfabetisk ordning. Objekten löper därefter i ordningsföljd efter identitetsnummer.

Alla objekt redovisas med en katalogtext som utgår från datamaterialet från steg I och II. För de objekt som fältinventerats redovisas även information från steg III.

Klass 1 objekten redovisas utförligare än de övriga. Förutom katalogtexterna finns en beskrivning i klartext samt detaljkarta över området. Detaljkartorna framställdes genom att tolkningskartorna rektifierades med stöd av Lantmäteriets ekonomiska karta och sedan digitaliserades. Som underlag användes utdrag ur Länsstyrelsens digitala kartdatabas (Röda kartan, skala 1:250 000). Samtliga objekt redovisas på översiktskartor. Översiktskartorna finns redovisade i skala 1:100 000. Överföringarna har lett till att de redovisade objekten kan anses topologiskt dock ej helt geografiskt riktiga. All information som insamlades under inventeringens gång förvaras på Naturvårdsverkets våtmarksdatabas och på Länsstyrelsen i Örebro.

2.6 Osäkerhetsfaktorer i våtmarksinventeringen

Våtmarksinventeringen grundas på flygbildstolkning. Det betyder att bilder tolkas av en betraktare via ett tolkningsinstrument. Hur väl tolkningen sedan överensstämmer med verkligheten beror bl a på bildernas och tolkningsinstrumentets kvalitet samt, naturligtvis, tolkarens erfarenhet.

Vissa våtmarkstyper är relativt enkla att avgränsa och avgöra. Andra typer kan vara besvärligare. Det gäller bl a skogsklädda våtmarkstyper, t ex övergången tallmosse tallsumpskog och skogsklätt kärr/sumpskog. Flertalet av länets sumpskogar har inte kommit med i inventeringen, bl a på grund av kravet på minsta storlek. Information om dessa kan så småningom ges av Skogsvårdsstyrelsen i Örebro län eftersom en rikstäckande sumpskogsinventering pågår.

Störningar i, och i anslutning till, objekten kan också försvåra tolkningen. För varje objekt anges dess störningsgrad. Observeras bör att en lokal störning på ett objekt spänner över ett ganska brett område, från små diken i de perifera delarna till diken över större områden. Dikenas dräneringsförmåga skiljer sig också åt.

3 Naturgeografiska regioner i Örebro län

Varje objekt i våtmarksinventeringen sorterar under en naturgeografisk region och naturvärdesbedömningen görs inom denna region. Ett våtmarksobjekt inom region 24 (södra delen av länet) ställs således inte mot ett objekt i region 30 a (norra delen av länet). Nedan ges en kort beskrivning över de förhållanden som råder i regionerna som helhet. Den är hämtad från "Naturgeografiska regioner i Norden" (1984).

I "Naturgeografiska regioner i Norden" (1984) redovisas sammanlagt 76 olika naturgeografiska regioner. De faktorer man tagit hänsyn till vid indelningen är bl a geologi och landskapsformer, markförhållanden, klimat samt vegetation. *Figur 2* visar förekommande landskapsformer i Södra Sverige. Fem av Sveriges naturgeografiska regioner sträcker sig in i Örebro län, *se figur 1*.

3.1 Skogslandskapet i Tiveden-Tylöskogen-Kolmården, naturgeografisk region 23

Berggrunden domineras av gnejs och granit och det lösa jordtäcket av morän. Större delen av regionen har befunnit sig under högsta kustlinjen. Rundade former spelar större roll än sprickdalar. Sprickdalar finns men är mindre uttalade jämfört med region 24. Norr om Vättern finns ett område med vågig bergkullterräng. Jämfört med närliggande regioner är vintrarna här svalare och nederbörden större. Barrskogsbygder präglar regionen men inslag finns av ädellövskog och ängsmarker. Myrmarkerna är ojämnt fördelade i regionen.

Regionen täcker den sydligaste fjärdedelen av Örebro län.

3.2 Svealands sprickdalsterräng med lerslättdalar och sjöbäcken, naturgeografisk region 24

Varianter på gnejs och graniter dominerar berggrunden. I Breven finns stora diabasgångar. Regionen har legat under högsta kustlinjen. Landskapet är heterogent där bergsplatåer växlar med lerfyllda sänkor. Sprickdalar är karakteristiskt för regionen, de är dock bäst utbildade i Sörmland och Stockholmstrakten. Berg i dagen är ganska vanligt. Klimatet i Mälardalen-Hjälmarenområdet är relativt gynnsamt, våren kommer tidigare än i de närliggande regionerna. Nederbörden är låg. Odlingslandskapen är

dominerande. Med avseende på vegetationen är regionen heterogen. Det finns ett fåtal stora myrar, de flesta är små och förekommer ganska allmänt i barrskogarna.

Regionen finns representerat i länets sydöstra delar.

3.3 Skogslandskapet omedelbart söder om Norrlandsgränsen, naturgeografisk region 26

Berggrunden utgörs främst av graniter. På Närkeslätten finns inslag av kambrosilur med sandsten, alunskiffer och ortoceratitkalksten (ortoceratit - rak bläckfisk med ett centralt placerat sifonrör). Slätten, som tolkas som en del av det subkambriska peneplanet, är regionens karaktärsdrag. I söder finns dock lite sprickdalsterräng. Regionen har legat under högsta kustlinjen. Morän utgör ett dominerande inslag och på Närkeslätten finns de välkända drumlinerna i Hackvad. Temperaturen på vintern är lägre än i intilliggande region 24. Barrskogar är dominerande men även lövträd förekommer. Regionen är relativt myrrik.

Regionen finns som ett sydvästligt-nordöstligt stråk strax nedom mitten av länet.

3.4 Skogslandskapet norr om Norrlandsgränsen, naturgeografisk region 27

Berggrunden domineras huvudsakligen av gnejs i norr och granit i söder. Landskapet karaktäriseras i öster av en berggrundsslätt och väster om norrlandsterrängens gräns av vågig bergkullterräng. Regionen har endast delvis legat under högsta kustlinjen. Den dominerande jordarten är morän. Temperaturerna är likartade dem i regionerna strax söder om norrlandsgränsen. Nederbörden är måttlig. Landskapet närmast norrlandsgränsen (limes norrlandicus) är relativt låglänt och rik på skog och myr. Barrskogar är vanligast men inslag finns av löv.

I länet ligger regionen som ett stråk från Degerfors kommun i sydväst till Lindesberg kommun i nordost.

3.5 Sydligt boreala kuperade områden, naturgeografisk region 28 b

Berggrunden domineras av gnejs och granit men med inslag av leptit och hälleflinta. Mindre områden med urkalksten och urbergssediment finns i Bergslagen. Bergslagen hyser även huvuddelen av Mellansveriges malmer. Gränsen i söder motsvaras av den morfologiska Norrlandsterrängens gräns. Större delen av landskapet utgörs av vågig bergkullterräng med mellanliggande fínsedimentdalar. Moränen är i allmänhet sammanhängande. Temperaturen är lägre i jämförelse med söderut belägna områden. Nederbörden är relativt hög i de västra delarna. Barrskogar dominerar. Regionen är inte särskilt myrrik.


I länet påträffas underregion b: Områden innanför Hälsinge-Gästrikedkusten i Bergslagen och mellersta Värmland till Glåmdalen med omkringliggande skogar.

Regionen upptar en relativt stor yta i norra länsdelen.

3.6 Norrlands vågiga bergkullterräng med mellanboreala skogsområden, naturgeografisk region 30 a

Flera olika typer av gnejs och granit dominerar. Landskapet präglas i stort sett av vågig bergkullterräng men det finns inslag av vågig bergkullslätt. Morän är den vanligaste jordarten. Nederbörden är måttlig, den ökar mot högre liggande partier. Barrskogar dominerar. Inom myrserien förekommer här både strängmyrar och backkärr.

Länet berörs endast längst i norr av regionen.



Figur 2. Kartan visar landskapsformernas utbredning i södra Sverige (Efter Naturgeografisk indelning av Norden 1984).

4 Allmänt om myrar


Myrar är ett samlingsnamn för våtmarker som är, eller har varit, torvbildande. De indelas i mosse, kärr, blandmyr och sumpskog.

4.1 Myrens bildningssätt

Vid inlandsisens tillbakadragande, för ca 8 000 år sedan, fanns det gott om fuktig fastmark och grunda sjöar. Allteftersom landhöjningen fortskred utökades deras andel. Försumpningen fortgår mer eller mindre intensivt, det har bl a att göra med temperatur och nederbörd. Under två tidsperioder, för ca 4 000 och ca 2 600 år sedan, var försumpningen i landet mer aktiv (Magnusson et. al 1963).

Myrar bildas på olika sätt. Det kan vara sjöar som växer igen, fastmark som försumpas eller genom inverkan av ytligt grundvatten. Oftast rör det sig dock om en kombination.

Följande är ett exempel på bildning av ett kärr. I en grund sjö avsätts gyttja på botten. Samtidigt växer den igen från sidorna och in mot mitten med vass, starr eller gungfly. Gytteavsättningen ökar och når slutligen upp till vattenytan. Växtligheten som omgärdar sjön kan nu täcka hela sjöytan. Ett kärrgolv formas så småningom. Ofta vandrar buskar och träd in i det öppna kärret som därvid övergår till ett skogsbevuxet kärr. Ett mossesamhälle utbildas då vattnet i myrens yta förlorar kontakten med fastmarksvatten och mossearter, t ex vitmossor, konkurrerar ut kärrets växter. *Figur 3* visar utvecklingen från en grund sjö till mosse via kärr.




Figur 3 Skissen illustrerar de olika utvecklingsfaserna från en grund sjö till en mosse. Bilden är från Magnusson et. al 1963. 1. Gytta avsätts i botten på en grund sjö. 2. Starr vandrar in och ett kärregolv utbildas. 3. Vitmossor koloniserar kärret och så småningom sker det en övergång till mosse. 4. Mossen tillväxer på höjden och en platåmosse bildas. I laggen växer lövträd och i randskogen tall. Tallen förekommer även på mosseplanet.

4.2 Skillnader i vegetationssammansättningen i mossar och kärr


Vegetationsamhällena i kärr och på mossar skiljer sig helt naturligt åt. Kärren är minerotrofa, vilket innebär att de, förutom vatten från nederbörden, även mottar vatten

från omgivande fastmark. Fastmarksvattnet har vanligen fått ett visst tillskott av mineraler till skillnad från nederbördsvatten.

Vegetationens sammansättning beror till stor del på innehållet i det vatten som tillförs. *Figur 4* ger ett exempel på arter som avlöser varandra i en glidande övergång från ett extremt rikt till ett fattigt kärr. Mossarna är däremot ombrotrofa, de får sitt vatten enbart från nederbörden. De får därför ett mycket litet näringstillskott och det ställs höga krav på de arter som växer i denna miljö. *Figur 5* visar ett exempel på olika arters dominans i skilda delar av en mosse.



Figur 4. Bilden visar olika arter som avlöser varandra i ett kärr från en extremt rik miljö till en fattig. Figuren är hämtad från Sjörs 1971.



Figur 5. Skissen visar olika arters dominans i olika delar av en mosse. Figuren är hämtad från Sjörs 1971.

5 Våtmarkstyper

Inom begreppet våtmark döljs en mängd olika biotoper och vegetationstyper, alla med sina säregna karaktärsdrag. Här lever växter och djur som är bundna till våtmarkernas miljö men också arter som nyttjar dem som komplement. Våtmarkernas näringsstatus,

utseende och biologiska innehåll spänner över ett brett spektrum och det går inte att sätta likhetstecken mellan olika typer.

På mossen, den karga, syns ofta siluetten av en älg som hejdat sig för ett ögonblick. Har man tur kan man även få se myrfåglarnas uppvisningar under våren. Vegetationen är fattig och ofta ensartad, men definitivt inte tråkig. Här sker dramatiska ting långt nere bland mossorna. Det är det lilla sileshåret, som får sin näring genom att äta kött, som står för dramatiken. Den fångar lämpliga insekter med hjälp av klabbiga hår på bladen. När insekten ohjälpligt sitter fast förs den mot bladets ovansida och löses upp av de enzymer som växten producerat. I rikkärren är tätörten sileshårets motsvarighet, den är den andra av Sveriges tre köttätande släkten. Det tredje släktet, bläddrorna, har också våtmarker som sin hemvist men de förekommer i öppna vattenytor.

Den absoluta motsatsen till de näringsfattiga mossarna är extremrikkärren. De har en stor artrikedom med höggradigt specialiserade arter som klarar av att leva i en kalkhaltig miljö.

Ytterligare ett exempel på våtmarkstyper utgörs av mader intill sjöar och vattendrag. Om de översvämmas regelbundet och hävdas utvecklas tydliga vegetationszoner. Genom den goda näringstillförseln och de många småbiotoperna finns förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Mängderna av rastande och häckande fåglar som kan ses på vissa mader är ett exempel på det rika djurlivet. Maderna är också estetiskt tilltalande, de kan vara betagande vackra när vegetationen är tydligt zonerad, från den öppna vattenytan till de torrare markerna.

Alla våtmarkstyper i inventeringen har ett objektsnamn. *Figur 6*, ett schema som är hämtat från SNV PM 1680, visar vilka objekt som kan förekomma samt exempel på delobjekt.


5.1 Myrar

Klassificeringen av myrmarker kan ske på grundval av hydrologiska eller morfologiska kriterier. Vid flygbildstolkningen, som är ett huvudmoment vid inventeringen, används en kombination av hydrologiska, hydrotopografiska och morfologiska kriterier. Kärren indelas efter underlagsrelaterad form. De följer underlagets topografi eller fyller ut en fördjupning i underlaget. Beskrivningarna nedan är hämtade från SNV PM 1680.

5.1.1 Mossar

Mossar, eller ombrotrofa myrar, erhåller sitt vatten enbart från nederbörden och är därför mycket näringsfattiga. De indelas i följande morfologiska typer:

Koncentrisk mosse - välvd med en tydlig central höjdpunkt. Mossen sluttar allsidigt mot kanterna. Om den är perfekt utbildad har den ett mosseplan, bågformiga strängar i utkanten och en randskog innanför laggen.



Knuthöjdsmossen, excentrisk mosse med gölar i Hällefors kommun.


Excentrisk mosse - välvd med ett perifert belägen höjdpunkt. Sluttar åt fler än ett håll, men inte allsidigt som den koncentrisk mossen.




Tydligt välvd mosse, platåmosse - allsidigt välvd i kanten men plan i större delen av ytan. Detta plan utgör den högst liggande ytan och kan liknas vid en platå. Ytformerna är oregelbundet orienterade.



Svagt välvd mosse - planet är mycket svagt välvt. Mossen är ofta mer eller mindre skogstäckt.



Sluttande mosse - sluttar huvudsakligen åt ett håll. Strukturmönstret är tydligt parallellt eller bågformigt.



Komplex av mossar - anges när två eller flera mossetyper ingår i objektet. Till skillnad från ovan nämnda mossetyper, som både kan vara delobjektstyper och objektstyper, används det här begreppet endast på objektsnivå.

5.1.2 Kärr

Kärr, eller minerotrofa myrar, påverkas av yt- eller markvatten från intilliggande fastmark. Vattnet som rinner genom mineraljorden tar upp de mineralämnen som är lösliga. Vilka och hur stor mängd avgör kärrets trofigrad.

Topogent kärr - plant eller svagt sluttande. Vanligt förekommande.



Östra Lomtjärnsmossen, topogent kärr i Degerfors kommun.

Soligent kärr - tydligt sluttande. En lutning med 3% är gränsen vid inventeringen. Vanlig i norra Sverige.




Komplex av kärr - anges då både topogena och soligena kärr ingår i objektet. Till skillnad från ovan nämnda kärrtyper, som både kan vara delobjektstyper och objektstyper, används det här begreppet endast på objektsnivå.

5.1.3 Blandmyrar

Blandmyrar har mossevegetation på strängar eller öar och kärrvegetation i övrigt. Mönstret på strukturerna avgör namnsättningen. Myrtypen är endast allmänt förekommande i Norrland och delar av nordvästra Dalarna. Nedan ges två exempel.

Mosaikblandmyr - Små ytor, "element" av mossevegetation förekommer mosaikartat blandat med kärrvegetation.



Blandmyr av strängtyp - mossevegetation finns på strängar, kärrvegetation i övrigt.



Blandmyrkomplex - anges då två eller flera blandmyrtyper ingår i objektet. Till skillnad från ovan nämnda blandmyrtyper, som både kan vara delobjektstyper och objektstyper, används det här begreppet endast på objektsnivå.

Då två eller flera av huvudtyperna mosse, kärr och blandmyr ingår i ett objekt anges myrkomplex.

5.1.4 Sumpskog

Sumpskogar är skogsklädda våtmarker (mossarna undantagna) med minst 70% krontäckning. I begreppet ingår således skogsklädd kärrmark och icke torvbildande skogsklädd våtmark.

Sumpskog - våtmark med tät krontäckning.

5.2 Strandvåtmarker

Strandvåtmarker är våtmarker med stark influens av limniskt eller marint vatten. Närhet till hav (marin våtmark), sjö eller vattendrag (limnogen våtmark) är förstås ett krav för att en strand ska utbildas. De marina är inte aktuella i detta län, därför beskrivs enbart de limnogena.



Strandvåtmarker vid Vibysjön i Hallsbergs kommun.

5.2.1 Limnogena våtmarker

Limnogena våtmarker kan ibland vara torvbildande. Flera olika vegetationstyper ingår, t ex strandäng, sumpkärr, sumpskog och vassar.

Strand vid sjö - ansluter till sjö. Den vanligaste typen är olika mader, t ex vassar.

Bevuxen sjö - större delen av sjön är täckt med vegetation, vanligen vassar.

Strand vid rinnande vatten - ansluter till rinnande vatten. Vanligaste typerna är å- eller bäckmader och strandsumpskogar.

Limniskt våtmarkskomplex - anges då två eller flera typer av limnogena våtmarker ingår i objektet.

5.3 Övriga fuktiga till våta områden

Rubriken rymmer våtmarker där torvbildningen är mycket svag eller ingen alls och som inte betingas av hav, sjö eller vattendrag. Huvudtyperna är öppna respektive skogstäckta fuktiga marker.

5.3.1 Öppna fuktiga till våta marker

Nedan ges två exempel på objektstyper.

Fukthed - fuktig mark som domineras av risvegetation.

Fuktäng - fuktig mark med ängsvegetation. Typen är vanligen beroende av hävd.

5.3.2 Skogsklädda fuktiga till våta marker

Sumpskog - finns i områden med tidvis höjt grundvatten eller i utflödesområden för rörligt grundvatten. Sumpskogen, om den är torvbildande, sorterar även under myrar.

Då objektet innehåller båda öppna och skogsklädda fuktiga till våta marker anges komplex av fuktiga till våta marker.

Då objektet innehåller två eller flera av huvudgrupperna myrar, stränder eller fuktiga till våta områden anges våtmarkskomplex.

5.4 Hydrologiska typer

Fastmatta - håller normalt att gå på utan att sjunka ner. Fotspåret försvinner ganska snart. Fältskiktet och bottenskiktet är i regel välutvecklade.

Mjukmatta - bär normalt en person men man sjunker ned över anklarna. Fotavtrycket stannar kvar en tid i mattan. Fältskiktet kan vara svagt utbildat eller saknas helt. Bottenskiktet är däremot välutbildat.

Lösbotten - går sällan att gå på. Fältskiktet kan vara utvecklat men är ofta glest. Bottenskiktet saknas.

Gungfly - är vanligen en mjukmatta men finns även som fastmatta och lösbotten. Under vegetationen och det övre torvskiktet finns fritt vatten, det är därför det gungar när man går på ett gungfly.

HUVUDGRUPP	UNDERGRUPP	OBJEKTTYPE	DELOBJEKTTYPE exempel
myr	mosse	koncentrisk mosse excentrisk mosse platåmosse svagt välvd mosse sluttande mosse	koncentrisk mosse excentrisk mosse platåmosse svagt välvd mosse sluttande mosse
		komplex av mossar	
	kärr	topogent kärr soligent kärr	topogent kärr soligent kärr
		komplex av kärr	
	blandmyr	blandmyr av strängtyp mosaikblandmyr blandmyrkomplex myrkomplex	blandmyr av strängtyp mosaikblandmyr
strandområde	limnogen våtmark	strand vid sjö bevuxen sjö våtmark vid rinnande vatten	mad vid sjö strandäng strandskog mad vid rinnande vatten
		limnogen strandkomplex	
övrig fuktig- våt mark	öppen fuktig- våt mark	fuktäng tidvis översvämmad mark övrig öppen fuktig- våt mark	fuktäng tidvis översvämmad mark övrig öppen fuktig- våt mark
	skogsklädd fuktig- våt mark	sumpskog	sumpskog
		komplex av fuktiga-våta marker	
våtmarkskomplex			

Figur 6. Schemat visar förekommande objekttyper samt exempel på delobjekttyper inom våtmarksinventeringen i Örebro län. Översikten är modifierad från SNV PM 168.

6 Vegetationstyper

Vid fältinventeringen beskrevs de ingående växtsamhällena enligt "Vegetationstyper i Norden" (1984). Nedan finns en sammanfattning av de vegetationstyper som påträffades i Örebro län, siffrorna inom parentes anger vegetationstypens kod. Om ett vegetationssamhälle inte stämde överens med någon av de angivna angavs en lägre detaljeringsgrad, se även kapitel Metodik. Efter sammanfattningen ges en kort beskrivning över vegetationssamhällena med de arter som vanligen ingår. Arterna är ett urval av dem som anges i "Vegetationstyper i Norden".

Vegetationstyper i öppna kärr

Fastmattekärr

Fattigkärr

Tuvull-vitmoss-typ (3.6.1.1)

Taggstarr-tuvull-Sphagnum angustifolium-variant (3.6.1.1 a)

Tuvsäv-tuvull-Sphagnum papillosum-compaktum-variant (3.6.1.1 b)

Tuvsäv-blåtåtel-vitmosstyp (3.6.1.2)

Intermediärkärr

Tuvsäv-blåtåtel-vitmoss-brunmoss-typ (3.6.1.3)

Rikkärr

Starr-ört-brunmoss-typ (3.6.1.4)

Mjukmattekärr

Fattigkärr

Starr-vitmoss-typ (3.6.2.1)

Sphagnum fallax-variant (3.6.2.1 a)

Sphagnum papillosum-variant
(3.6.2.1 b)

Kallgräs-vitmoss-variant (3.6.2.1 c)

Intermediärkärr

Starr-vitmoss-brunmoss-typ (3.6.2.2)

Starr-Sphagnum fallax-
subsecundum-variant (3.6.2.2 a)

Ört-starr-vitmoss-brunmoss-typ (3.6.2.3)

Rikkärr

Starr-brunmoss-typ (3.6.2.4)

Ört-starr-brunmoss-typ (3.6.2.5)

Lösbottenkärr

Fattigkärr

Oligotrof mossfattig torvslam-typ
(3.6.3.1)


Intermediärkärr

Intermediär mossfattig torvslam-typ
(3.6.3.2)

Sumpkärr

Rikkärr

Högstarr-ört-typ (3.6.4.1)



Lejakärret, rikkärr i Lindesbergs kommun.

Vegetationstyper i mossar

Skogsmosse

Tallmosse

Tallmosse av skvattram-typ (3.1.2.1)

Tallmosse av ris-typ (3.1.2.2)

Öppen mosse

Ristuvmosse

Ljung-kråkris-Sphagnum fuscum-typ (3.2.1.1)

Ljung-Sphagnum rubellum-typ (3.2.1.2)

Ljung-Sphagnum magellanicum-typ (3.2.1.3)

Fastmattemosse

Tuvull-Sphagnum fuscum-typ (3.2.2.1)

Tuvull-Sphagnum rubellum-typ (3.2.2.2)

Tuvull-Sphagnum balticum-typ (3.2.2.4)

Tuvull-Sphagnum magellanicum-typ (3.2.2.5)

Mjukmattemosse

Vitag-Sphagnum tenellum-typ (3.2.3.2)

Vitag-kallgräs-Sphagnum cuspidatum-typ (3.2.3.3)

Vitag-kallgräs-Sphagnum majus-typ (3.2.3.4)

Höljegöl

Vatten-typ (3.2.5.1)

Skogsklädda vegetationstyper

Sumpskog

Alskog

Klibbalstrandskog (2.2.3.2)

Sumptallskog

Sumpgranskog

Sumpgranskog Skogsfräkenvariant (3.3.2.1 b)

Sumpbjörkskog

Sumpbjörkskog av ris-gräs-typ (3.3.3.1)

Sumpalskog

Sumpalskog av ört-typ (3.3.4.1)

Skogskärr

Gran-björkkärr

Gran-björkkärr av fattig vitmoss-typ (3.4.2.1)

Gran-björkkärr av intermediär vitmoss-typ (3.4.2.2)

Alkärr

Vegetationstyper i sjöar

Dvärgvassar

Vasstarr-typ (6.1.2.4)

Högvassar

Tät bladvass-typ (6.1.3.5)

Vegetationstyper i odlingslandskapet

Ängsvegetation

Fuktäng (5.2.3)

6.1 Vegetationstyper i öppna kärr

Fastmattekärr

Fastmattekärren förekommer i allt från vidsträckta kärrområden till mer begränsade delar. Golvet är ibland glest bevuxet med småträd.

Tuvull-vitmosstyp (3.6.1.1). Samhället är mycket artfattigt, i fältskiktet dominerar tuvull och i bottenskiktet vitmossor. I Örebro län registrerades även två varianter av samhället, taggstarr-tuvull-Sphagnum angustifolium variant (3.6.1.1.a) och tuvsäv-tuvull-Sphagnum papillosum-compactum variant (3.6.1.1.b). Vanliga arter i huvudtypen är:

Kärlväxter

Rosling	Tranbär
Rundsilesår	Tuvull
Taggstarr	

Mossor

<i>Sphagnum magellanicum</i>
<i>Sphagnum papillosum</i>

Tuvsäv-blåttåtel-vitmoss-typ (3.6.1.2). När näringstillgången är något bättre framträder blåttåtel som dominant bland kärlväxterna. Bottenskiktet täcks av vitmossor. I artsammansättningen märks bl a :

Kärlväxter

Blåttåtel	Stjärnstarr
Kärrviol	Tuvsäv
Pors	Tuvull
Rosling	Ängsull

Mossor

<i>Calliergon stramineum</i>
<i>Sphagnum compactum</i>
<i>Sphagnum papillosum</i>
<i>Sphagnum subsecundum</i>

Tuvsäv-blåttåtel-vitmoss-brunmoss-typ (3.6.1.3). Samhället räknas till de intermediära kärren. I fältskiktet kan tuvsäv, blåttåtel, pors eller trädstarr dominera. Olika vitmossor täcker bottenskiktet. Samhället skiljs från 6.6.1.2 genom förekomst av växter som kräver en rikare miljö.

Kärlväxter

Blåttåtel	Strängstarr
Dvärglumner	Trädstarr
Nålstarr	Tuvsäv
Pors	Tuvull
Rosling	Vass
Snip	Vattenklöver

Mossor

<i>Calliergon sarmentosum</i>	<i>Sphagnum subfulvum</i>
<i>Campylium stellatum</i>	<i>Sphagnum teres</i>
<i>Loeskhypnum badium</i>	<i>Sphagnum subnitens</i>
<i>Sphagnum angustifolium</i>	<i>Sphagnum subsecundum</i>
<i>Sphagnum papillosum</i>	<i>Sphagnum warnstorffii</i>

Starr-ört-brunmoss-typ (3.6.1.4). Växtsamhället hör till rikkärren. Fältskiktet domineras av graminider och örter. I bottenskiktet har vitmossorna släppt sitt grepp och det är istället brunmossorna som är framträdande.

Kärlväxter

Axag	Knaggelstarr
Blodrot	Nålstarr
Blåttåtel	Rosling
Dvärgbjörk	Snip
Gräsull	Tranbär
Hirsstarr	Trädstarr

Mossor

<i>Campylium stellatum</i>
<i>Fissidens adianthoides</i>
<i>Paludella squarrosa</i>
<i>Scorpidium spp</i>
<i>Sphagnum warnstorffii</i>
<i>Tomentypnum nitens</i>
<i>Warnstorffia spp</i>

Mjukmattekärr

Mjukmattekärren kan ensamma uppta stora ytor men också finnas insprängda i andra våtmarkstyper. Bottenskiktet är sammanhållet medan fältskiktet vanligen är sporadiskt utbildat.

Starr-vitmoss-typ (3.6.2.1). Samhället är artfattigt. Fältskiktet, som i allmänhet är svagt utvecklat, domineras av graminider. Bottenskiktet utgörs av en heltäckande vitmossmatta. Tre varianter av samhället registrerades i Örebro, *Sphagnum fallax*-variant (3.6.2.1 a), *Sphagnum papillosum*-variant (3.6.2.1 b) och kallgräs-vitmoss-variant (3.6.2.1 c). Bland arterna i huvudtypen märks:

<u>Kärlväxter</u>		<u>Mossor</u>	
Dystarr	Trådstarr	<i>Sphagnum angustifolium</i>	<i>Sphagnum papillosum</i>
Flaskstarr	Tuvsäv	<i>Sphagnum fallax</i>	<i>Sphagnum pulchrum</i>
Rosling	Vattenklöver	<i>Sphagnum lindbergii</i>	
Taggstarr	Ängsull	<i>Sphagnum magellanicum</i>	
Tranbär		<i>Sphagnum majus</i>	

Starr-vitmoss-brunmoss-typ (3.6.2.2). Vegetationstypen hör till de intermediära kärren. Fältskiktet är svagt utvecklat. I bottenskiktet dominerar vitmossor. Det finns inslag av mer näringskrävande vitmossor jämfört med de fattigare kärren dessutom förekommer brunmossor. I Örebro påträffades, förutom huvudtypen, en variant av densamma, *Sphagnum fallax-subsecundum*-variant (3.6.2.2 a).

<u>Kärlväxter</u>		<u>Mossor</u>	
Dystarr	Tranbär	<i>Calliergon sarmentosum</i>	<i>Sphagnum contortum</i>
Flaskstarr	Trådstarr	<i>Calliergon stramineum</i>	<i>Sphagnum fallax</i>
Kråklöver	Vattenklöver	<i>Campylium stellatum</i>	<i>Sphagnum riparium</i>
Rosling	Ängsull	<i>Paludella squarrosa</i>	<i>Sphagnum subsecundum</i>
Strängstarr			
<i>Warnstorfia spp.</i>			

Ört-starr-vitmoss-brunmoss-typ (3.6.2.3). Samhället hör till de intermediära kärren. Det är en övergångstyp mellan sumpkärr och mjukmattekärr. Starr, sjöfräken och kråklöver hör till dominanterna i fältskiktet. Bottenskiktet kan domineras av vitmossor eller brunmossor.

<u>Kärlväxter</u>		<u>Mossor</u>	
Brunven	Topplösa	<i>Calliergon cordifolium</i>	<i>Sphagnum squarrosum</i>
Dystarr	Trådstarr	<i>Pseudobryum cinclidioides</i>	<i>Sphagnum subsecundum</i>
Flaskstarr	Trådtåg	<i>Polytrichum commune</i>	<i>Warnstorfia exannulata</i>
Kabbleka	Vattenmåra	<i>Sphagnum fallax</i>	
Kråklöver	Vattenklöver	<i>Sphagnum majus</i>	
Strängstarr	Ängsull	<i>Sphagnum riparium</i>	

Starr-brunmoss-typ (3.6.2.4). Vegetationstypen räknas till rikkärren. Brunmossor dominerar bottenskiktet, fältskiktet är relativt svagt utbildat. I samhället växer vanligen bl a:

<u>Kärlväxter</u>		<u>Mossor</u>
Dystarr	Trådstarr	<i>Calliergon spp.</i>
Flaskstarr	Vattenklöver	<i>Scorpidium scorpioides</i>
Strängstarr	Ängsull	<i>Warnstorfia spp.</i>
Tranbär		

Ört-starr-brunmoss-typ (3.6.2.5). Arter från övriga brunmossdominerade vegetationstyper varvas med inslag av växter som indikerar yttligt, rörligt grundvatten.

<u>Kärlväxter</u>		<u>Mossor</u>	
Humleblomster	Tranbär	<i>Calliergon spp</i>	<i>Scorpidium scorpioides</i>
Kräkklöver	Ull	<i>Crataneuron spp</i>	<i>Sphagnum teres</i>
Kärrdunört	Vattenklöver	<i>Paludella squarrosa</i>	<i>Sphagnum warnstorffii</i>
Sjöfräken	Vide m fl	<i>Philonotis spp</i>	<i>Tomentypnum nitens</i>
Starr	Älgört	<i>Warnstorffia spp.</i>	

Lösbottenkärr

Vegetationen i lösbottenkärr består inte längre av sammanhållna växtmattor, arterna är företrädesvis glest utspridda

Lösbottenkärr av oligotrof mossfattig torvslam-typ (3.6.3.1). Typen är fattig och de dominerande arterna växlar bl a mellan:

<u>Kärlväxter</u>			<u>Mossor</u>
Dybladbra	Storsileshår	Vitag	<i>Calliergon stramineum</i>
Dystarr	Strängstarr	Ängsull	<i>Sphagnum majus</i>
Flaskstarr	Trådstarr		<i>Sphagnum papillosum</i>
Kallgräs	Tuvsäv		<i>Sphagnum pulchrum</i>
Sjöfräken	Vattenklöver		<i>Warnstorffia fluitans</i>

Intermediär mossfattig torvslam-typ (3.6.3.2). Som den oligotrofa men med växter som kräver en näringsrikare miljö.

<u>Kärlväxter</u>		<u>Mossor</u>	
Dybladbra	Snip	<i>Calliergon spp</i>	<i>Sphagnum teres</i>
Dystarr	Strängstarr	<i>Scorpidium scorpioides</i>	<i>Warnstorffia exannulatus</i>
Dytåg	Trådstarr	<i>Sphagnum lindbergii</i>	<i>Warnstorffia fluitans</i>
Flaskstarr	Vattenklöver	<i>Sphagnum papillosum</i>	
Kallgräs	Vitag	<i>Sphagnum platyphyllum</i>	
Sjöfräken	Ängsull	<i>Sphagnum subsecundum</i>	

Sumpkärr

Sumpkärren utbildas i områden som antingen har ett yttligt rörligt vatten eller är belägna intill sjöar och vattendrag där det sker regelbundna översvämningar. Artsammansättningen skiljer sig kraftigt från område till område, likaså vilken eller vilka arter som dominerar. Sumpkärren övergår utan skarp gräns vid torrare förhållanden till Blandbuskkärr och Videkärr och vid minskad påverkan från yttligt rörligt limnogen vatten till Örtstarrkärr.

Högstarr-ört-typ (3.6.4.1). Artsammansättningen är mycket variabel och det ingår mängder av olika kärlväxter och mossor, både vitmossor och brunmossor.

6.2 Vegetationstyper i mossar

Tallmosse

Som förstås av namnet dominerar tall i trädskiktet. Två typer av tallmossar kan urskiljas, dels skvattramtypen och dels ristypen. Vegetationstypen är mycket vanlig och variationen i artsammansättningen är liten. Dvärgbjörken är en art som ökar i frekvens norrut i länet.

Tallmosse av skvattramtyp (3.1.2.1). Mossetypen är östlig och det är skvattram som dominerar bland bl a nedanstående arter. I länet är också Tallmosse av ristyp vanlig (3.1.2.2).

Kärlväxter

Blåbär
Dvärgbjörk
Hjortron
Kråkbär
Lingon
Ljung
Odon

Rosling
Skvattram
Tall
Tuvull
Tranbär

Mossor

Aulacomnium palustre
Pleurozium schreberi
Polytrichum strictum
Sphagnum angustifolium
Sphagnum fuscum
Sphagnum magellanicum
Sphagnum russowi

Öppen ristuvmosse

Mossetypen är i stort sett öppen men glest med martallar är inte ovanligt. Hela mossar kan vara täckta med ristuvor. I övrigt påträffas vegetationstyperna i mossens strukturer, t ex strängar.

Ljung-kråkris-Sphagnum fuscum-typ (3.2.1.1). I samhället växer bl a nedanstående arter.

Kärlväxter

Dvärgbjörk
Dvärgtranbär
Hjortron
Kråkbär
Ljung

Odon
Rosling
Rundsilesår
Tuvull
Tranbär

Mossor

Mylia anomala *Sphagnum magellanicum*
Pleurozium schreberi
Polytrichum strictum
Sphagnum angustifolium
Sphagnum fuscum

Ljung-Sphagnum rubellum-typen (3.2.1.2) och **Ljung-Sphagnum magellanicum-typen (3.2.1.3)** skiljer sig främst från den beskrivna genom andra mossadominanser. De är inte på långt när lika vanliga i länet som 3.2.1.1.

Fastmattemosse

Vegetationstyperna förekommer på öppna mossar. I så gott som samtliga fall är tuvull den dominerande kärlväxten. De förekommer ofta på mosseplanet, mellan strängar och tuvor, men kan också uppta större områden.

Tuvull-Sphagnum balticum-typ (3.2.2.4). Bland arterna märks framför allt:

Kärlväxter

Hjortron
Rosling
Rundsilesår

Tranbär
Tuvsäv
Tuvull

Mossor

Sphagnum balticum
Sphagnum rubellum

Tuvull-Sphagnum fuscum-typ (3.2.2.1), tuvull-Sphagnum rubellum-typ (3.2.2.2) och tuvull-Sphagnum magellanicum-typ (3.2.2.5) är tre andra vegetationssamhällen som påträffas i länet. Skillnaden dem emellan utgörs främst av olika mossadominans, vilket i sin tur bl a beror på graden av fuktighet. De här vegetationstyperna förekommer inte i så stor utsträckning som 3.2.2.4.

Mjukmattemosse

Vegetationstyperna under ovanstående rubrik förekommer alla i relativt djupa och blöta mossehöljor. Fältskiktet domineras vanligen av vitag och/eller kallgräs. Bottenskiktet domineras av olika vitmossor.

Vitag-Sphagnum cuspidatum-typ (3.2.3.3)

Kärlväxter

Dystarr

Kallgräs

Rosling

Tuvull

Vitag

Mossor

Sphagnum cuspidatum

Sphagnum balticum

Vitag-kallgräs-Sphagnum tenellum-typ (3.2.3.2) och Vitag-kallgräs-Sphagnum majus-typ (3.2.3.4) är andra vegetationstyper i mjukmattehöljorna varav 3.2.3.4 är den vanligaste.

Höljegöl

Förekommer i lösbottenhöljor på mossar. Små och grunda lösbottenhöljor är ofta uttorkade, de övriga är vattenfyllda. Höljorna är vanligen mer eller mindre fria från vegetation.

Vattentyp (3.2.5.1)

Kärlväxter

Dystarr Carex limosa

Kallgräs Scheuchzeria palustri

6.3 Skogsklädda vegetationstyper

För att särskilja skog från annan trädbärande mark, igenväxningsmark, anger "Vegetationstyper i Norden" en gräns på 30 % krontäckning eller mer för skog. Sumpskog och skogskärr skiljs åt med hjälp av bottenskiktets sammansättning. I sumpskog finns de vegetationstyper som har ett markerat inslag av arter som förekommer i friska och torra skogstyper. Skogskärr domineras av arter som endast förekommer i fuktiga skogstyper och i myrvegetation.

Sumpskog

Klibbalstrandskog (2.2.3.2). Utgörs normalt av en smal strandskog utmed en sjö eller ett vattendrag. Följande arter kan ingå i samhället:

Kärlväxter

Besksöta	Kabbleka	Pors	Åkerfräken
Brännässla	Klibbal	Strandklo	Älgört
Hallon	Kärnsilja	Videört	

Sumpgranskog skogsfräken-variant (3.3.2.1 b). Ris förekommer ganska sparsamt i fältskiktet. I botten-skiktet dominerar *Sphagnum girgensohnii*.

Kärlväxter

Blåbär	Skogsfräken
Glasbjörk	Slidstarr
Hjortron	Tall
Klotstarr	
Lingon	

Mossor

<i>Hylocomnium splendens</i>
<i>Pleurozium schreberi</i>
<i>Polytrichum commune</i>
<i>Sphagnum angustifolium</i>
<i>Sphagnum girgensohnii</i>

Sumpbjörkskog av ris-gräs-typ (3.3.3.1). Glasbjörk dominerar trädskiktet, men det är vanligt med inslag av barrträd, videarter och al.

Kärlväxter

Asp	Glasbjörk	Pors
Blåtåtel	Gråal	Svartvide
Klibbal	Hjortron	Sälg
Kråkbär	Odon	Tuvtåtel

Mossor

<i>Sphagnum spp</i>
<i>Polytrichum spp</i>

Sumpalskog av ört-typ (3.3.4.1). Förekommer i terrängsvackor i näringsrik miljö. Alarna utvecklar ofta tydliga socklar. I skogen växer bl a:

Kärlväxter

Glasbjörk	Skogsbräken
Grenrör	Topplösa
Kabbleka	Vattenmåra
Klibbal	Älgört
Majbräken	
Missne	

Mossor

<i>Brachytecium rivulare</i>
<i>Calliergon cordifolium</i>
<i>Climacium dendroides</i>
<i>Mnium hornum</i>
<i>Plagiomnium ellipticum</i>
<i>Sphagnum squarrosum</i>

Skogskärr

Gran-björkkärr av fattig vitmoss-typ (3.4.2.1). Trädskiktet domineras av glashbjörk, ibland med gran som sanddominant. Fast- och mjukmattor dominerar. Artsammansättningen är variabel där bl a följande arter kan ingå:

Kärlväxter

Flaskstarr	Odon
Glasbjörk	Sjöfräken
Gran	Strängstarr
Gråstarr	Sumpstarr

Mossor

<i>Aulacomnium palustre</i>	<i>Sphagnum riparium</i>
<i>Pleurozium schreberi</i>	
<i>Polytrichum commune</i>	
<i>Sphagnum angustifolium</i>	

Hundstarr	Tall	<i>Sphagnum fallax</i>
Kråkklöver	Tranbär	<i>Sphagnum girgensohnii</i>
Lingon	Trådstarr	<i>Sphagnum magellanicum</i>

Gran-björkkärr av intermediär vitmoss-typ (3.4.2.2). Liknar föregående typ men har inslag av arter som kräver en näringsrikare miljö t ex vissa brunmossor.

6.4 Vegetationstyper i sjöar

Vasstarr-typ (6.1.2.4). Vassarna är ofta täta och mer eller mindre artrika. De förekommer på grunt vatten i rika till medelrika sjöar.

<u>Kärlväxter</u>	
Flaskstarr	Sjöfräken
Hästsvans	Vasstarr

Tät bladvass-typ (6.1.3.5)

<u>Kärlväxter (helofyter)</u>	
Jättegröe	Stor igelknopp
Slokstarr	Vass
Smalkaveldun	Vattenmärke
Snårvinda	

7 Ornitologiska inventeringar

Våtmarksinventeringen utfördes under den period av vegetationssäsongen som inte är optimal ur ornitologisk synvinkel. Ett par större ornitologiska inventeringar som gjorts i Örebro län har bidragit med viktig information. Nedan följer ett kort sammandrag av de båda inventeringarna inklusive de våtmarker som bedömdes höra till klass 1 eller klass 2 i dessa inventeringar.

7.1 Fågelmyrar i Örebro län

Närkes Ornitologiska Förening, genom Leif Sandgren, utförde 1981 en omfattande inventering av länets myrar med avseende på fågellivet. Nedan följer ett sammandrag av rapporten innehållande de myrar som bedömdes tillhöra klass 1 och klass 2.

52 myrar med en sammanlagd yta av ca 9 200 hektar inventerades. De flesta av myrarna har en areal som ligger inom intervallet 50 till 500 hektar.

Myrarna klassificerades enligt en tregradig skala där:

Klass 1 är områden som bedömts ha mycket stora ornitologiska värden och som bedömts ha få motsvarigheter i landet eller landsdelen.

Klass 2 är områden som bedömts ha stora ornitologiska värden och som har få motsvarigheter i länet.

Klass 3 är områden som bedömts ha ett visst ornitologiskt värde och som har få motsvarigheter inom kommunen med angränsande områden.

Förekomsten av utvalda nyckelarter, antal arter och antal individer, utgjorde grunden för myrarnas klassificering. Hänsyn togs även till andra arter eller artgrupper. Nyckelarterna uppfyllde följande kriterier:

- de befinner sig i utkanten av sitt utbredningsområde, norrifrån eller söderifrån.
- de har sin huvudsakliga förekomst på myrarna i Örebro län eller i angränsande områden.
- de har av olika anledningar blivit undanträngda från tidigare områden och på myrarna funnit en fristad.

Följande arter utvaldes till nyckelarter:

Smålom - Typisk myrfågel som häckar sparsamt till sällsynt i gölar och mindre fjällsjöar i norra och mellersta Sverige söderut till Dalsland, norra Västergötland, Närke, Västmanland och Gästrikland. I Örebro län förekommer den i kanten av sitt utbredningsområde.

Fiskgjuse - Sparsam vid kuster och sjöar över nästan hela landet.

Trana - Typisk myrfågel som häckar sparsamt till sällsynt på mossar och myrmarker i södra och mellersta Sverige. Allmännare längre norrut.

Ljungpipare - Typisk myrfågel. Utanför fjällområdet är den sparsam till sällsynt på mossar i inlandet. Beståndet i södra och mellersta Sverige har sedan 1800-talet minskat starkt. År 1975 beräknades 800 par häcka i dessa delar av landet.

Grönbena - Typisk myrfågel. Häckar på myrar, mer allmänt i norra Sverige, sparsam eller



sällsynt söder om Norrlandsgränsen.

Gluttsnäppa - Sparsam i anslutning till myrar från norra Värmland och norrut. Beståndet tätar i norra Sverige. Den är inte känd som årlig häckfågel i Örebro län.

Storspov - Ojämn förekomst i Sverige och finns i Mellansverige som sparsam häckfågel på mossar, ängar och åkermark. Under de senaste decennierna har storspoven minskat starkt i antal i Götaland och Svealands jordbruksbygder. Den har därmed blivit mer beroende av de öppna myrmarkerna.

Småspov - Allmän till sällsynt häckfågel på torra myrmarker och fuktiga fjällhedar från nordvästra Dalarna och norrut. Örebro län ligger utanför dessa kända utbredningsområden.

Slaguggla - Sparsam vid myrar och andra öppna marker i norrländska barrskogsområdet ner till norra Värmland. Endast sporadisk förekomst i Örebro län. I inventeringen anges inte var den finns p g a sekretesskäl.

Efter inventeringen bedömdes följande fyra myrar tillhöra **klass 1**:

<u>Namn</u>	<u>Kommun</u>	<u>Klassificeringsmotiv</u>
Römyren - Rostamossen	Hällefors	Fågelfaunan i sin helhet. Den klart bästa myren för vadare i länet. Dessutom det största redovisade orrspelet i länet.
Knuthöjdsmossen	Hällefors	Fågelfaunan i sin helhet. Den andfågelrikaste myren i länet och hyser 25 % av de inventerade myrarnas par av smålom.
Skagershultsmossen	Örebro	Nyckelarterna. Länets största antal tranpar.
Stora Gåssjömossen	Degerfors	Nyckelarterna. Orrspelet är ett av de största i länet.

Följande tio myrar bedömdes tillhöra **klass 2**:

<u>Namn</u>	<u>Kommun</u>	<u>Klassificeringsmotiv</u>
Komoramossen	Ljusnarsberg	Nyckelarterna och orrspelet.

Sifilmossen	Hällefors	Ett ovanligt fint fågelliv med åtskilliga nyckelarter.
Björnhöjdsmossen-Tommossen	Hällefors	Fint fågelliv med flera nyckelarter.
Boviksmossen	Karlskoga	Förekomsten av flera nyckelarter.
Trangärdet	Karlskoga	Nyckelarterna.
Snöbergsmossen	Nora	Nyckelarterna.
Himmermossen	Örebro	Orrspelet och fiskgjusarna.
Mosstorpsmossen	Degerfors	Nyckelarterna.
Julösmossen	Degerfors	Nyckelarterna och orrspelet.
Södra Åsmossen-Högsjös stormosse	Degerfors	Nyckelarterna och orrspelet.

7.2 Madmarker i Örebro län

1978-1979 utförde Mats Rosenberg en inventering av Örebro läns madmarker. Syftet med inventeringen har bl a varit att bedöma och klassificera madmarkernas nuvarande eller potentiella ornitologiska värden. Nedan följer ett kort sammandrag av rapporten med de madmarker som bedömdes höra till klass 1 eller klass 2.

De kriterier som ligger till grund för värderingarna är följande:

- Om maden är, eller har varit, art- eller individrik.
- Om området ligger i en öppen, näringsrik jordbruksbygd.
- Tillgång på eller möjlighet till öppet, grunt vatten i anslutning till betesmarken.
- Om maden delvis någon gång under året utsätts för översvämning.
- Arealen. Stor areal krävs om området till väsentlig del gränsar till strandskogar. Mindre areal krävs om området gränsar till åkrar och i övrigt gynnsamma biotoper.
- Markens och vegetationens struktur och sammansättning. Ju mer varierad desto högre värde.
- Om maden befinner sig i ett område med många kompletterande våtmarksbiotoper, t ex bladvassar, flytbladsvegetation, öppet vatten med undervattensängar.
- Om området befinner sig utmed eller i närheten av någon flyttningsväg - ledlinje i landskapet.

Madmarkerna klassificerades i en tregradig skala enligt följande:

Klass 1 Områden av stor areal som i huvudsak uppfyller alla ovan givna kriterier för en positiv bedömning. Områdena har få motsvarigheter i landsdelen.

Klass 2 Områden som saknar några av ovan angivna kriterier för en positiv bedömning. Områdena har få motsvarigheter i länet.

Klass 3 Områden som saknar flera av ovan angivna kriterier för positiv bedömning. Områdena har lokal betydelse för fågellivet.

I rapporten redovisas 66 områden med en sammanlagt yta av c a 1 000 hektar. Tre av dessa bedömdes höra till klass 1 och sjutton till klass 2.

Klass 1

<u>Namn</u>	<u>Kommun</u>	<u>Bedömning</u>
Tysslingen	Örebro	Tysslingen är en av mellansveriges värdefullaste fågellokaler. Madarealerna är förhållandevis mycket stora och kompletteras av den typiska slättsjöns alla andra biotoper. Häckfågelbeståndet är art- och individrikt. Dessutom har sjön ett gynnsamt läge vid randen av norrlandsterrängen. Stora mängder våtmarksfåglar lockas att rasta under vår- och höstflyttningen.
Oset	Örebro	De relativt stora arealerna betad fuktäng ingår som ett mycket viktigt biotopelement i de klassiska, rika fågelmarkerna i västra Hemfjärden. Området har sitt största värde som rastplats för en mängd andfåglar och vadare. Betesängarna utgör det enda som finns kvar i Örebro län av en för Hjälmarstränderna karaktäristisk naturtyp innan den stora sänkningen.
Kvismaren	Örebro	Kvismaresjöarna är en av Mellansveriges värdefullaste fågellokaler. De finns med i våtmarkskonventionens svenska lista. Madarealerna är stora och kompletteras numera av hela det biotopregister som är en förutsättning för en rik och varierad fågelsjö.

Klass 2

<u>Namn</u>	<u>Kommun</u>	<u>Bedömning, utdrag ur</u>
Morskogasjön	Lindesberg	Området är en omtyckt rast- och häckningslokal för ett flertal våtmarksarter.
Sörängarna (Råsvalen)	Lindesberg	Våtängsarealen är stor och omgivande landskap öppet. Området har lokal betydelse för fågellivet.

Näset (Stora Lindesjön)	Lindesberg	Näset är en för Bergslagsnaturen rik fågellokal.
Finnåkersjön och Österhammarsjön	Lindesberg	Området är under våren en av länets finaste rastlokaler för sjöfåglar, främst sångsvan. Madarealerna är förhållandevis mycket stora.
Sällingesjön	Lindesberg	Den sammanlagda arealen på sjöns västra sida är betydande. Det är dock endast de norra delarna som har ett riktigt gynnsamt utseende. Sjön är en välfrekventerad rastplats för andfåglar, och i viss mån vidare.
Känäsjön	Lindesberg	Sjön är liten och de öppna strandängarna krymper på grund av igenväxning. Under vår och höst rastar mycket sångsvanar och änder.
Sörbysjön	Lindesberg	Sjön utgörs av en vidsträckt enhetlig starrmad. Under vårens högvatten är sjön en omtyckt rastplats för andfåglar.
Sjömosjön	Lindesberg	Sjön är en av länets finaste fågelsjöar, främst under våren.
Ervalla	Örebro	Ängarna är en mycket omtyckt rastplats för andfåglar och vidare under våröversvämningen. De är kulturellt, botaniskt och ornitologiskt intressanta som jämförelseområden eftersom de utgör länets enda slåtterängar.
Sundet	Askersund	Våtängsarealen är relativt liten men det öppna landskapet och närheten till vegetationsrika stränder gör området attraktivt för rastande simänder och vidare.
Lången	Örebro	Området hyser ett rikt fågelliv genom goda näringsbetingelser och tillgång till många kompletterande biotoper.
Fisksjön	Karlskoga	Sjön är en av västra länets två egentliga fågelsjöar. Strandängsarealen är liten men kompletteras av övriga biotoper.
Östersjön	Degerfors	Sjön är en artrik, liten fågelsjö belägen utmed flyttfågelstråken i Letälvsdalen. Strandängsarealen är liten men ändå av stort värde på grund av

		god näringstillgång och kompletterande biotoper i omgivningen.
Skarbysjön	Hallsberg	Sjön är under våren en god rastlokal för andfåglar och i viss mån vidare.
Lillsjön (Svennevad)	Hallsberg	Ängarna har ett gynnsamt läge i anslutning till den relativt fågelrika Lillsjön.
Sundet	Askersund	Våtängsarealen är relativt liten men det öppna landskapet och närheten till vegetationsrika stränder gör området attraktivt för rastande simänder och vidare.
Fyrnäset-Almudden	Askersund	Ängarna har ett gynnsamt läge utmed Vätterstranden. Mindre mängder vidare och andfåglar rastar främst under våren.

8 Plan- och skyddsstatus

I samband med inventeringens flygbildstolkning, i steg I, registrerades objektets aktuella plan- och skyddsstatus. Om ett objekt har en eller flera former av dessa framgår i rapportens katalogdel över respektive objekt. Där framkommer även om planen eller skyddet täcker hela eller delar av objektet i fråga. Nedan följer en kort beskrivning över olika former av planer respektive skydd.

8.1 Planstatus

Domänreservat: Reservaten har inrättats av Domänverket. Eftersom de saknar lagstadgat skydd kan de användas som en markering av ett område av olika skäl är intressant.

Naturvårdsplan: Den motsvaras i Örebro län av Naturvårdsöversikten (1984). I översikten redovisas områden som är av intresse för naturvården och om de är i behov av skötsel och skydd m m. Områdena är rangordnade i en tre-gradig skala: högsta naturvärde, mycket högt naturvärde samt högt naturvärde. Ett flertal av våtmarksobjekten ingår i naturvårdsöversikten.

Våtmarkskonventionen: Convention on Wetlands. Sverige undertecknade konventionen, som är av stor internationell betydelse för främst fågellivet, 1974. 1988 omfattade konventionen 30 områden i Sverige. Ett av dem, Kvismaren, ligger i Örebro län. "Konventionens syfte är att generellt öka förståelsen för att den pågående förstörelsen av våtmarker måste bromsas samt att särskilt slå vakt om de värden som är knutna till områdena på CW-listan, de s k CW-områdena" (SNV 1989).

Ängs- och hagmarksinventering: Inventeringen är rikstäckande och omfattar naturliga fodermarker. I Örebro län pågick inventeringen av ängar och hagar under åren 1987 till 1990. Några av områdena sammanfaller med våtmarksobjekten.

8.2 Skyddsstatus

Nationalpark: Nationalparker avsätts med stöd av 4:e paragrafen i naturvårdslagen. En rad villkor måste tillgodoses innan ett område fastställs som nationalpark, bl a krav på en minsta storlek, för landområden 1 000 hektar, samt att parkerna ska utgöras av framträdande representativa landskap som bevaras i sitt naturliga tillstånd. Vidare ska marken som upplåts till nationalpark ägas av staten. Beslut om nationalparker fattas av riksdagen. I Örebro län finns en nationalpark, Tiveden, i vilken några våtmarksobjekt ingår. Tivedens nationalpark berör även Skaraborgs län.

Naturreservat: Naturreservat avsätts med stöd av 7:e paragrafen i naturvårdslagen. Skyddsformen ska i första hand användas för områden som behöver ha omfattande föreskrifter för säkerställandet. Det finns inget krav på att marken ska ägas av samhället. Beslut om naturreservat fattas av Länsstyrelsen eller av kommunen om denna fått delegation. Ett av de mer kända naturreservaten i Örebro län som omfattar våtmarker är Skagerhultsmossen.

Naturvårdsområde: Med stöd av 19:e paragrafen i naturvårdslagen kan ett område avsättas som naturvårdsområde. De gällande föreskrifterna i ett sådant område får inte avsevärt försvåra den pågående markanvändningen. Beslut om ett naturvårdsområde fattas av länsstyrelsen eller av kommunen, under förutsättning att den senare har delegation.

9 Nyttjandet av våtmarker

Myrar har ofta haft ett skimmer av mystik över sig och stundtals har de haft en skrämmande effekt. De har ibland också setts över axeln och stämplats som vattensjuka och värdelösa. Men de har tjänat människan under lång tid och på många olika sätt. Inte minst för bärplockare har myrarna varit en källa till glädje. Hjortron och tranbär har drygat ut matkassan förr som nu. Av porsen kan brännvinet få en spännande smak. Den så vanliga vitmossan har kvinnorna använt som blöjstoppning och i dåtidens krig har den funnits i förband på mången soldats sår. Listan kan säkert göras lång.

Våtmarkerna har även varit livsnödvändiga under den period då djurhållningen var en viktig del i samhällsstrukturen och konstgödningens tid låg långt in i framtiden. Våtmarkernas starr eller vassbevuxna ytor slåtterhävdades och gav vinterfoder åt djuren. För att öka produktiviteten i de magra starrmaderna kunde man låta vatten långsamt översila dem, s k sil-ängar, eller helt dränka dem i vatten för ett tag s k dammängar.

Våtmarkernas positiva effekt på andra biotoper har kanske först aktualiserats på senare år. De har bl a en förmåga att fungera som kvävefällor och biologiska filter. Flera försök pågår i landet där man undersöker hur dessa funktioner bäst kan utnyttjas.

Kunskap om landskapets utveckling från den senaste istiden och framåt hämtas från torvmarkerna. I torvens syrefria miljö bevaras effektivt växtdelar från en svunnen tid. Genom bl a pollenanalyser kan klimatförändringar genom årtusenden rekonstrueras.

Det finns olika slags störningar som våtmarkerna kan utsättas för. Vissa störningar kan vara positiva, t ex hävd i form av bete eller slåtter. Maderna, kärren, fuktängarna m fl blir därvid mer varierade, vilket innebär fler nischer för växter och djur att kolonisera. Andra störningar, t ex dikningar och torvtäkter, har en negativ inverkan på våtmarkerna. Deras miljö blir torftig och ensartad om hydrologin förändras, och det bara finns spillror kvar av de livsrum som krävs för ett mångfaldigt biologiskt liv. Flertalet av Sveriges sumpskogar är förstörda p g a just dikningen, en dikning som tjänar till att öka virkesproduktionen och arealen produktiv skogsmark.

De förmultnande delarna av myren, torven, har utnyttjats av människan under en lång period. Torven har en god uppsugande förmåga och den användes förr som hjälpmedel att hålla rent. På landsbygden ströddes torven ut på ladugårdsgolvet och i städerna byggdes torvmullklosetter. Idag används torvmull och torvströ mindre för renhållning men är desto vanligare som jordförbättringsmedel. I Sverige finns 150 växttorvtäkter med en sammanlagd areal av 5 000 hektar, brytningen kan väntas öka eftersom tillgången på kontinenten minskar (Löfroth 1991).

Ett annat stort användningsområde för torven är som energiråvara. Bränttorv hade länge endast utnyttjats till husbehov men under slutet av 1800-talet uppstod flera torvindustrier i Sverige. De hade dock problem vid tillverkningen och svårt med avsättningen av torven. Torvindustrierna förlorade mark till den konkurrensstarka oljan i mitten av 1900-talet. På senare år har torven fått renässans men har fortfarande svårt att mäta sig med andra energikällor.

Bränttorv kan framställas på flera olika sätt. Förr, då torven användes till husbehov, var stick- eller skärtorvmetoden vanligast. Torven styckades upp i lämpliga, ganska små, bitar och forslades bort för torkning. För att få en jämnare kvalitet på torven kunde älttorvmetoden användas. Där bearbetades torven med vatten till en jämn konsistens innan den torkades. Vid flygbildstolkningen upptäcktes mängder av dessa husbehovstorvtäkter. De är små och utgör vanligen inget hot mot våtmarken. I dag, med modern teknik och krav på storskalighet, är frästorvmetoden och djupbrytning vanligast. Frästorvmetoden är mycket ytkrävande, jämfört med djupbrytning kräver den en dubbelt så stor areal. I Sverige finns 6 miljoner hektar torvbildande våtmarker, den brytningsintressanta arealen begränsas till 350 000 hektar. På 52 270 hektar har tillstånd till torvtäkt givits, aktiv torvtäktssyftighet förekommer på 7 000 - 8 000 hektar (Löfroth 1991). I Örebro stad står torven för 10,5 % av total tillförd energi i kraftvärmeverket. I framtiden kommer användningen att minska i takt med avvecklingen av fossila bränslen (Comet, B., 1994).

10 Statistik

I följande kapitel kommer några jämförelser att göras, bl a mellan de naturgeografiska regionerna. Observera att två minsta storleksgränser använts, tjugo hektar i regionerna 28B och 30A, tio hektar i de övriga, se även under kapitel Metodik. Den redovisade arealen är objektets areal, d v s ingående vatten och fastmark är medräknade.

10.1 Fördelning av våtmarksytan


Våtmarksinventeringen i Örebro län omfattar totalt 979 objekt. Tillsammans täcker de en yta av 41 151 hektar. Det är 4,2% av länets totala yta, 4,8% av länets landareal. Siffran skulle naturligtvis vara avsevärt högre om inte någon minsta hektarsgräns använts.

Mellan kommunerna fördelade sig våtmarksytan enligt nedanstående tabell. Hektarsangivelserna anger hur stor del av kommunernas yta som utgörs av inventerad våtmark i länet. Procentangivelserna visar hur stor del av kommunernas totala landareal som utgörs av inventerad våtmark.

Kommun	Areal våtmark		Kommun	Areal våtmark	
	hektar	%		hektar	%
Askersund	1 498	1,8	Laxå	4 754	8,4
Degerfors	3 677	9,5	Lindesberg	5 384	3,9
Hallsberg	2 611	4,0	Ljusnarsberg	2 314	4,0
Hällefors	5 312	5,3	Nora	2 818	4,5
Karlskoga	3 010	6,4	Örebro	8 972	4,9
Kumla	801	3,9			

Nedanstående diagram gör bilden mer överskådlig. Det visar kommunernas andel av den totala våtmarksytan.

Kommunernas andel av inventerad våtmarksyta




I nedanstående tabell fördelas länets våtmarksyta mellan de naturgeografiska regionerna. Slående är den höga andelen våtmark i regionerna 23, 27 och 28B. Dessa är dock de ytmässigt största regionerna i Örebro län. Jämförelsen mellan dem är ändå inte helt korrekt eftersom, vilket redan nämnts, minsta storleksgräns skiljer.

Naturgeografisk region	Våtmarksyta i hektar
23	11 074
24	2 928
26	3 934
27	10 870
28B	9 682
30A	2 663

10.2 Objektens storleksfördelning

Om den totala våtmarksarealen skulle fördelas lika mellan antalet objekt ger det ett medelvärde på 42 hektar per objekt. Om alla objekt istället grupperas i olika storleksintervall blir bilden helt annorlunda, se diagrammet nedan. De allra flesta objekt har en yta som håller sig inom intervallet 10-20 hektar. Många av objekten ligger inom intervallerna 20-30 respektive 30-40 hektar, därefter börjar "kurvan" plana ut. Det är endast ett fåtal objekt som har en areal överstigande 700 hektar.

10.3 Fördelning mellan naturvärdesklasserna



Naturvärdesbedömningen av objekten resulterade i följande fördelning mellan de olika klasserna:

Klass	Våtmarksareal i hektar	Antal objekt
1	14 204	113
2	9 454	212
3	14 117	571
4	3 376	83


I tabellen framgår att trots att klass 1 objekten svarar för ett mindre antal är deras sammanlagda yta förhållandevis stor.

Antalet objekt per naturvärdesklass och kommun redovisas nedan, siffrorna inom parentes anger andelen av totala antalet objekt i kommunen. Observera att naturvärdesbedömningarna inte har något med kommungränserna att göra. Det är således inte relevant att göra snäva jämförelser mellan kommunerna.


<u>Kommun</u>	<u>Klass 1</u>	<u>Klass 2</u>	<u>Klass 3</u>	<u>Klass 4</u>
Askersund	3 (5,5%)	7 (12,7%)	37 (67,3%)	8 (14,5%)
Degerfors	8 (15,1%)	9 (17,0%)	32 (60,4%)	4 (7,5%)
Hallsberg	9 (14,3%)	12 (19%)	39 (61,9%)	3 (4,8%)
Hällefors	17 (15,0%)	27 (23,9%)	69 (61,1%)	0
Karlskoga	3 (4,0%)	14 (18,9%)	50 (67,5%)	7 (9,6%)
Kumla	0	1 (33,3%)	0	2 (66,7%)
Laxå	14 (12,0%)	24 (20,5%)	66 (56,4%)	13 (11,1%)
Lindesberg	11 (6,1%)	36 (20,1%)	113 (63,1%)	19 (10,7%)
Ljusnarsberg	6 (10,3%)	22 (37,9%)	29 (50%)	1 (1,7%)
Nora	17 (19,6%)	21 (24,1%)	39 (44,8%)	10 (11,5%)
Örebro	25 (14,2%)	39 (22,2%)	96 (54,5%)	16 (9,1%)

Följande två diagram visar areell fördelning respektive andel objekt per klass och naturgeografisk region. Vid en jämförelse mellan klass 1 objekten i regionerna 26 och 27 framkommer att de sinsemellan visar olikheter. Andelen av objekten är i region 27 mindre än i region 26. Ytan som de täcker är däremot större. Det kan t ex tyda på några få stora objekt i region 27 och många små i region 26.

Areell fördelning mellan naturvärdesklass och naturgeografisk region




Andel objekt per klass och naturgeografisk region



10.4 Areell fördelning av olika våtmarkstyper

Nedanstående diagram visar den areella fördelningen av länets våtmarkstyper inom respektive naturgeografisk region. Arealen har beräknats från delobjekten och är den faktiska våtmarksytan (till skillnad från övriga arealuppgifter vilka inkluderade ingående öppet vatten och fastmark). Mossar utgör det dominerande inslaget i alla naturgeografiska regioner utom möjligen i region 24. Där förekommer flera av länets igenvuxna slättsjöar, bl a Kvismaren, vilket förklarar den höga andelen Bevuxen sjö m. m.

Areell fördelning av våtmarkstyper inom
naturgeografisk region



11 Förklaringar

11.1 Ordförklaringar

Bergkullslätt: Landskapstyp. Bergkullslätten kännetecknas i typiska fall av att bergkullarna ligger glest och oregelbundet utspridda och att de mellanliggande slättytorna är relativt vidsträckta. Kullarna har lämnats kvar p g a större motståndskraft i berggrundsmaterialet.

Biomassa: En mängd organiskt material.

Biotop: Synonymt med naturtyp.

Bäck: Ett vattendrag med en bredd av ett par decimeter till två meter.

Drumlin: Ett spolfformat spår efter inlandsisen. Drumlinerna förekommer svärmvis och är orienterade i isrörelseriktningen. De består vanligen av en bergskärna i fronten med moränansamlingar runt om.

Dråg: Ett område med ytlig avrinning av myrvatten. Vattenföringen är kraftigare än i resten av myren men inte så kraftig att en bäckfåra utbildats. Dråg förekommer både i mossar och kärr. Om dråget övergår till en bäck kallas det för bäckdråg.

Flark: Förekommer i minerotrofa områden. Ett område med lösbotten eller en mycket blöt mjukmatta som avgränsas av strängar. De torkar vanligen ut under senare delen av sommaren eller under torrår. Flarken kan senare övergå till en flarkgöl.

Gyttja: Består till stor del av mer eller mindre finfördelat organiskt material.

Göl: Permanent mindre vattensamling i en myr. Bildningen är sekundär d v s den fanns inte, till skillnad från en tjärn, då myren bildades.

Högsta kustlinjen: Anger den högsta nivån dit havet nådde under inlandsisens avsmältning.

Hölja: Lägre liggande parti mellan tuvor och strängar på en mosse. Miljön är alltid ombrotrof. Höljan består av fastmatta, mjukmatta eller lösbotten. Höljan kan övergå till en höljegöl.

Kambrosilur: Kambrium, ordovicium och silur. Del av den geologiska tidsskalan. Perioden sträcker sig från 570 miljoner år sedan till 395 miljoner år sedan.

Källa: Ett område i terrängen där grundvatten koncentrerat strömmar ut.

Källkupol: Kupolformad bildning runt, eller i anslutning till, en källa. Den är till största delen utbildad i torv.

Lagg: Smalt kärrparti runt en mosse. Den är ett resultat av den vattenansamling som bildas runt mossen, av vatten från mossen och från fastmarken. Ett naturligt "dike".

Limes norrlandicus: Norrlandsgränsen. Skiljelinje mellan olika vegetationszoner. Söder om gränsen är klimatet mildare än norr om.

Minerotrof: Här, våtmark som inte bara mottar sitt vatten från nederbörden utan även från omgivande mark.

Morän: Dominerande jordart i Sverige. Det är ett osorterat, kantigt material som transporterats och avsatts av inlandsisen.

Mosseplan: Öppen central yta på en välvd mosse eller hela ytan på en plan, sluttande eller skogsklädd mosse.

Nyckelord: En övergripande företeelse inom, eller i anslutning till, ett objekt, delobjekt eller element.

Ombrotrof: Här, våtmark som endast mottar sitt vatten från nederbörden.

Randskog: Skog som växer på mosseranden. Växer mellan planet och laggen på en välvd mosse.

Relativ höjd: Höjdskillnaden mellan enskilda ojämnheters basnivå och högsta punkt.

Slukhål: Hål i myren där myrvattnet förs bort genom underjordiska dräneringssystem.

Slätt: Landskapstyp. Avgörande för slättbegreppet är den relativa höjden som på slätten understiger 20 meter. Slätterna kan indelas i flera typer.

Sprickdal: Landskapstyp. Sprickdalar skapas genom att material i bergets sprickzoner eroderas bort. Övriga delar av berget framträder som ryggar, platåer eller höjdsträckningar. Sprickdalslandskapen ansluter geografiskt nära till slätter och de betraktas som genetiskt närstående.

Sträng: Långsmalt, upphöjt parti. Den kan vara ombrotrof, mossesträng, och minerotrof, kärrsträng. Strängarna är vanligen orienterade tvärs myrens lutningsriktning. De kan förekomma i flera våtmarkstyper, bl a kärr, mossar och blandmyrar.

Subkambriskt peneplan: En plan yta som är resultatet av samverkan mellan flera olika vittringsprocesser. Förekommer bl a i Västergötland, Östergötland och Närke.

Tjärn: Sjö i myr. Den är primär d v s den fanns då myren bildades.

Trädsockel: Trädbas som ofta är mer eller mindre täckt av organiskt material.

Tuva: Den kan påträffas i alla myrtyper. Det är en upp till några kvadratmeter stor upphöjning som utgörs av torv. Den kan, liksom strängen, vara ombrotrof eller minerotrof.

Vågig bergkullterräng: Landskapstyp. Vågig bergkullterräng kan med hänsyn till de relativa höjderna delas in i olika reliefklasser. Topografin är utpräglad och bergig men trots det har höjderna vanligen mjuka linjer.

Öformade ytformer: Ligger högre än omgivande delar av myren. Både kärr- och mossevegetation kan bygga upp ön.

11.2 Mossornas svenska namn

Nedan ges svenska namn över de mossor som förekommer i beskrivningarna till klass 1- objekten.

<i>Bryum neodamense</i>	sumpbryum
<i>Bryum pseudotriquetrum</i>	kärrbryum
<i>Calliergon cordifolium</i>	kärrskedmossa
<i>Calliergon giganteum</i>	stor skedmossa
<i>Calliergon megalophyllum</i>	jätteskedmossa
<i>Calliergon stramineum</i>	blek skedmossa
<i>Calliergon trifarium</i>	maskmossa
<i>Calliergonella cuspidata</i>	spjutmossa
<i>Campylium stellatum</i>	guldspärrmossa
<i>Cinclidium stygium</i>	myruddmossa
<i>Dicranum leioneuron</i>	skottkvastmossa
<i>Loeskhypnum badium</i>	mässingsmossa
<i>Mnium hornum</i>	skuggstjärnmossa
<i>Moerckia hibernica</i>	kärrmörkia
<i>Odontoschisma elongatum</i>	mörk knutmossa
<i>Plagiomnium ellipticum</i>	kärrpraktmossa
<i>Polytrichum commune</i>	stor björnmossa
<i>Pseudobryum cinclidioides</i>	källpraktmossa
<i>Scapania irrigua</i>	strandskapania
<i>Scorpidium cossoni</i>	mellankrokmossa
<i>Scorpidium revolvens</i>	praktkrokmossa
<i>Scorpidium scorpioides</i>	korvmossa
<i>Sphagnum angermanicum</i>	spatelvitmossa
<i>Sphagnum angustifolium</i>	klubbvitmossa
<i>Sphagnum balticum</i>	flaggvitmossa
<i>Sphagnum centrale</i>	krattvitmossa
<i>Sphagnum compactum</i>	tät vitmossa
<i>Sphagnum contortum</i>	lockvitmossa
<i>Sphagnum cuspidatum</i>	flytvitmossa
<i>Sphagnum fallax</i>	uddvitmossa
<i>Sphagnum fimbriatum</i>	fransvitmossa
<i>Sphagnum fuscum</i>	rostvitmossa
<i>Sphagnum girgensohnii</i>	granvitmossa
<i>Sphagnum imbricatum</i>	snärjvitmossa
<i>Sphagnum inundatum</i>	grodvmossa
<i>Sphagnum jensenii</i>	piskvitmossa
<i>Sphagnum lindbergii</i>	björnvitmossa
<i>Sphagnum magellanicum</i>	praktvitmossa
<i>Sphagnum majus</i>	rufsvitmossa
<i>Sphagnum molle</i>	hedvitmossa
<i>Sphagnum obtusum</i>	trubbvitmossa
<i>Sphagnum palustre</i>	sumpvitmossa
<i>Sphagnum platyphyllum</i>	skedvitmossa

<i>Sphagnum pulchrum</i>	drågvitmossa
<i>Sphagnum riparium</i>	klyvbladsvitmossa
<i>Sphagnum rubellum</i>	rubinvitmossa
<i>Sphagnum russowii</i>	brokvitmossa
<i>Sphagnum squarrosum</i>	spärrvitmossa
<i>Sphagnum subfulvum</i>	brun glansvitmossa
<i>Sphagnum subnitens</i>	röd glansvitmossa
<i>Sphagnum subsecundum</i>	krokvitmossa
<i>Sphagnum tenellum</i>	ullvitmossa
<i>Sphagnum teres</i>	knoppvitmossa
<i>Sphagnum warnstorffii</i>	purpurvitmossa
<i>Sphagnum wulfianum</i>	bollvitmossa
<i>Tomentypnum nitens</i>	gyllenmossa
<i>Warnstorffia exannulatus</i>	kärrkrokmossa
<i>Warnstorffia fluitans</i>	vattenkrokmossa

12 Lista över litteratur och uppgiftslämnare

Andersson, M., 1993. Muntligen, Lindesberg.

Asklund, L., 1992. Stencil. Nora.

Backeus, I., et. al., 1978. Skyddsvärda myrar i Örebro län. - Länsstyrelsen i Örebro län Naturvårdsenheten.

Bengtsson, A., 1975. Översiktlig naturinventering av Laxå kommun (utom Tiveden). - Stencil. Länsstyrelsen i Örebro län.

Comet, B., 1994. Förslag till energiplan för Örebro kommun. - Manuskript.

Databanken för hotade arter och Naturvårdsverket., 1990. Hotade växter i Sverige 1990. Kärlväxter, mossor, lavar och svampar - förteckning och länsvis förekomst. - btj tryck Lund.

Ekholm, E., 1979. Naturvårdsinventering av Älhytteområdet. - Offset. Länsstyrelsen Örebro län.

Ekholm, E. och Hallin, G., 1980. Översiktlig naturinventering av Askersunds kommun (utom Tiveden). - Offset. Länsstyrelsen i Örebro län.

Ekholm, E. och Hallin, G., 1980. Översiktlig naturinventering av Hallsbergs kommun. - Offset. Länsstyrelsen i Örebro län.

Ekholm, E., 1978. Översiktlig naturinventering av Lindesbergs kommun. - Offset. Länsstyrelsen Örebro län.

Ekholm, E., 1975. Översiktlig naturinventering av Nora kommun. Stencil. Länsstyrelsen Örebro län.

Ekvall, A., 1977. Översiktlig naturinventering av Degerfors kommun. - Offset. Länsstyrelsen i Örebro län.

Eliasson, C., 1992. Riksintressanta fjärilar. Lindesbergs kommun. - Stencil.

Fredriksson, D., Tammela, P-K. och Larsson, L-E., 1993. Miljökonsekvenser. Torvmarker och jämförande arealer.- Torvfakta 1 1993.

- Fredriksson, Ö., 1981. Något om mossfloran i Kindlahöjdsområdet i nordvästra västmanlands bergslag. - Stencil. Göteborgs universitet.
- Furuholm, L., 1972. Översiktlig naturvårdsinventering av Kumla kommun. - Stencil. Länsstyrelsen i Örebro län.
- Furuholm, L., Karlsson, B. och Nettelbladt, M., 1974. Översiktlig naturinventering av Örebro kommun. - Offset. Länsstyrelsen i Örebro län.
- SNV PM 1680., 1983. Inventering av Sveriges våtmarker. Metodik. - Graphic Systems Angered.
- SNV PM 1681., 1983. Våtmarksinventering i sydvästra Sverige. Katalog över särskilt värdefulla objekt.
- Hallingbäck, T. och Holmåsen, Å., 1985. Mossor. En fälthandbok. - Interpublishing AB Stockholm.
- Hedberg, S., 1993. Muntligen. Åtorp.
- Hedenäs, L., 1993. Field and microscope keys to the Fennoscandian species of the *Calliergon-Scorpidium-Drepanocladus* complex, including some related or similar species. - Premotryck AB Sundbyberg.
- Hedenäs, L. och Löfroth, M., 1992. Mossor som indikerar skyddsvärda våtmarksbiotoper. - Svensk botanisk tidskrift 86: 375-389.
- Inventering av ängs- och hagmarker i Örebro län., 1992. - Preliminär upplaga. Länsstyrelsen i Örebro län.
- Krok, Th. och Almqvist, S., 1984. Svensk flora. Fanerogamer och ormbunksväxter. - Esselte Herzogs Uppsala.
- Lantmäteriverket., Topografiska kartbladen 09E, 09F, 10E, 10F, 11E, 11F, 12E (SV och SO) samt 12F (SV)
- Lindesbergs biologiska förening. Diverse information till Länsstyrelsen - stencil
- Lindström, Å., 1993. Muntligen. - Länsstyrelsen Örebro län.
- Ljung, E., 1975. Översiktlig naturinventering av Karlskoga kommun. Stencil. - Länsstyrelsen Örebro län.
- Länsstyrelsens miljöenhet., 1993. Muntligen. - Örebro.
- Löfroth, M., 1991. Våtmarkerna och deras betydelse. - Naturvårdsverket rapport 3824.
- Löfroth, M., 1993. Muntligen. - Naturvårdsverket.
- Länsstyrelsen., 1984. Naturvårdsöversikt. Örebro län.
- Magnusson, N., Lundqvist, G. och Regnell, G., 1963. Sveriges geologi. - Kungl. Boktr. Stockholm.
- Mossberg, B. och Stenberg, L., 1992. Den Nordiska floran. Wahlström & Widstrand.
- Mossornas vänner., 1993. Vitmossor i Nörden. - Vasastadens bokbinderi AB Göteborg, 125 sid.
- Naturvårdsverket., 1989. Svenska våtmarker av internationell betydelse. Våtmarkskonventionen och CW-listan. - Nordstedts Tryckeri AB Stockholm.
- Nilsson, KG., 1982. - Stencil.

- Nitare, J. och Noren, M., 1992. Nyckelbiotoper kartläggs i nytt projekt vid Skogsstyrelsen. - Svensk Botanisk Tidskrift. Särtryck ur volym 86, sid 219-216.
- Norabiologerna. Stenciler från ett flertal år, Länsstyrelsen Örebro län.
- Nordiska ministerrådet., 1984. Naturgeografisk regionindelning av Norden.
- Nordiska ministerrådet., 1984. Terrängformer i Norden.
- Nordiska ministerrådet., 1984. Vegetationstyper i Norden.
- Nämnden för skoglig flygbildsteknik., 1980. Flygbildsteknik och fjärranalys, - Tryckindustri AB Solna.
- Riksförbundet för hembygdsvård., 1976. Myrmarker. En bok om bruket av våtmarkerna förr och nu, - Axel Abrahams Tryckeri AB Karlskrona.
- Rosen, S., 1988. Kodlista M2. Version 88163-SR. Bryophyta, - Nordstedts tryckeri AB.
- Rosenberg, M., 1980. Madmarker i Örebro län. Inventering och landskapsvårdsplanering. - Publikation 1980:2 Länsstyrelsen i Örebro län.
- Rönn, T., 1993. Muntligen, Karlskoga.
- Sandgren, L., 1982. Fågelmyrar i Örebro län. - Publikation 1982:1 Länsstyrelsen i Örebro län Naturvårdsenheten.
- Sjökvist, A., 1994. Muntligen. Örebro.
- Sjörs, H., 1971. Biologi. Ekologisk botanik. - Almqvist och Wiksell Förlag AB Stockholm, 296 sid.
- Sjörs, H., 1950. Myren och dess växtvärld, - Albert Bonniers boktryckeri Stockholm.
- Sjörs, H., 1976. Myren som naturtyp, - Finlands natur nr 2 1976.
- Skogsstyrelsen., 1993. Signalarter i projekt nyckelbiotoper.
- Sveriges geologiska undersökning., Berggrundskartorna 09F, 10E (SO och NV), 10F, 11E (SV, SO och NV), 11F (SV, NV och NO) och 12FSV.
- Sveriges geologiska undersökning., Mineralyra 1984, Geologisk karta skala 1:250 000.
- Ursberg, K., 1976. Översiktlig naturinventering av Hällefors kommun. - Offset. Länsstyrelsen Örebro län.
- Ursberg, K., 1978. Översiktlig naturinventering av Ljusnarsbergs kommun. - Offset. Länsstyrelsen i Örebro län.
- Zetterberg, G., 1986. Kodlista T1. Version 85375-GUZ. Vegetationstyper, landskapstyper och terrängformer i Sverige, - Naturhistoriska riksmuseet.
- Öberg, T., 1972. Översiktlig naturvårdsinventering av Askersunds kommun. - Stencil. Länsstyrelsen i Örebro län.
- Öberg, T., 1972. Översiktlig naturvårdsinventering av Hallsbergs kommun. - Stencil. Länsstyrelsen i Örebro län.
- Österdahl, E., 1985. Kodlista B4. Version 85055-EÖ. Kärlväxter, - Modin tryck AB Stockholm.

ASKERSUND



**09E 3G 06 (4349) KLASS 3
ORRMOSSEN 8 KM NO TIVED**

18 ha (18 ha våtm), 190 m ö h. Flygb. -83.
Askersunds kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
4 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Platåformigt våldv moss
14 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 40 % av delobjektytan. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 3 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 4: Randskog, 32 % av delobjektytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 5: Lagg, 3 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 6: Lagg, 2 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

**09E 4G 04 (1839) KLASS 3
MYR 200 M S LOMTÄRN, 7,5 KM NO TIVED**

8 ha (8 ha våtm), 180 m ö h. Flygb. -83.
Askersunds kn.
Åkermark ansluter.

Delobj. 1: Platåformigt våldv moss
8 ha, öppet. Svag lokal påverkan från torvtäkt, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 65 % av delobjektytan. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Randskog, 30 % av delobjektytan, skogsbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Lagg, 4 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Lagg, 1 % av delobjektytan. Mjukmatta.

**09E 4G 05 (1543) KLASS 3
TIVEDSSKOGAMOSSEN 7 KM NO TIVED**

20 ha (19 ha våtm), 180 m ö h. Flygb. -83.
Askersunds kn.

Delobj. 1: Platåformigt våldv moss
13 ha, öppet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 82 % av delobjektytan. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Sträng, 10 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 3 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Lagg, 4 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 5: Lagg, 1 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
1 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande dikning.

Element 1: Golv. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Svagt våldv moss
5 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 97 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 3 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

**09E 4G 06 (0444) KLASS 2
DANSMOSEN 7,5 KM NO TIVED**

51 ha (43 ha våtm), 180 m ö h. Flygb. -83.
Askersunds kn.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Tjörn
5 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Topogent kärr
4 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Sluttande moss
8 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Sträng, 45 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 13 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 35 % av delobjektytan. Fastmatta med ristuvor.

Element 4: Dråg, 4 % av delobjektytan.

Element 5: Göl, 1 % av delobjektytan.

Element 6: Lösbotten, 2 % av delobjektytan.

Delobj. 4: Svagt våldv moss
31 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, anslutande dikning.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Lagg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 5 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta med ristuvor.

**09E 4G 07 (2546) KLASS 3
STORMOSSEN 200 M S LILLA KAMPETORP, 8,5 KM NO
TIVED**

27 ha (24 ha våtm), 175 m ö h. Flygb. -83.
Askersunds kn.
Åkermark ansluter.

Delobj. 1: Topogent kärr
2 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande väg.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
22 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande
hyggen, svag generell påverkan från dikning, svag lokal
påverkan från anslutande dikning, kraftledning, stark lokal
påverkan från torvtäkt, svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, barrskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, lövskog.
Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 13 % av delobjektytan, öppet.
Fastmatta med ristuvor.

Element 4: Lagg, 2 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**09E 4H 01 (1108) KLASS 3
SKIRBRÅTSMOSSEN 7,5 KM NNV OLSHAMMAR**

27 ha (27 ha våtm), 165 m ö h. Flygb. -83.
Askersunds kn.

Delobj. 1: Obestämbär mosse
7 ha, glest träd täckt. Stark generell påverkan från
torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
19 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande
hyggen, anslutande dikning.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, barrskog.
Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 13 % av delobjektytan, öppet.
Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 2 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
1 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan. Lösbotten.

**09E 4H 02 (1701) KLASS 3
MYR 500 M SO NYTORP, 8 KM NV OLSHAMMAR**

18 ha (16 ha våtm), 170 m ö h. Flygb. -83.
Askersunds kn.

Delobj. 1: Tjörn
2 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Topogent kärr
1 ha, öppet.

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 40 % av delobjektytan, skogsbevuxet,
lövskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse
15 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 12 % av delobjektytan, öppet.
Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Mosseplan, 3 % av delobjektytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, barrskog.
Fastmatta.

Element 4: Lagg, 5 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**09E 4J 01 (2529) KLASS 3
DALÄNGSMOSSEN 9 KM NNO OLSHAMMAR**

40 ha (40 ha våtm), 95 m ö h. Flygb. -83.
Askersunds kn.
Åkermark ansluter.

Delobj. 1: Obestämbär mosse
28 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning,
kraftledning, stark generell påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, barrskog.
Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, öppet.
Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
12 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning,
anslutande dikning, körspår från traktor/skogsmaskin,
anslutande kraftledning.

Element 1: Mosseplan, barrskog. Fastmatta.

09E5H01

Nycklamossen, 10 km V Askersund

Myren har inte inventerats i fält. Naturvärdesbedömning och beskrivning grundas på flygbildstolkning. Det av-
långa objektet sträcker sig mellan sjöarna Östra Laxsjön och Örkaggen. Omgivningarna är skogsdominerade och
i berggrunden finns företrädesvis granit. En smal skogsbilväg leder tvärs genom myren. Ombrotrof torvmark
dominerar, i söder finns små kärr. Objektet innehåller även ett par, större tjärnar. Mossarna är av två typer, dels
skogsklädda svagt välvda mossar och dels en öppen platåmosse. Platåmossen har en hel del strängstrukturer.
Mellan strängarna finns höljor av både fast- respektive mjukmattetyper. I mossen löper några väl upptrampade

stigar. Kärren är företrädesvis av fastmattetyper men det finns blötare inslag, särskilt i de kärrarmar som leder mot Örskagen.

Myren har höga naturvärden bl a genom storleken, månformigheten, kontakten med öppet vatten samt de ringa ingreppen.

**09E 5H 01 (3125) KLASS 1
NYCKLAMOSSEN 10 KM V ASKERSUND**

83 ha (75 ha våtm), 135 m ö h. Flygb. -88.
Askersunds kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Tjärn
8 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Svagt våldv moss
41 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning, torvtäkt, väg.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, öppet, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 3: Sumpskog
4 ha. Svag lokal påverkan från kraftledning, anslutande väg.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 4: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning, väg, anslutande väg.

Element 1: Dråg, 15 % av delobjekttytan.

Element 2: Golv, 10 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 3: Golv, 5 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 4: Golv, 50 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 5: Golv, 20 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Plattformigt våldv moss
18 ha, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning, torvtäkt.

Element 1: Sträng, 45 % av delobjekttytan, glest trädäck, lövskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 20 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Mosseplan, 20 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

**09E 5H 02 (2642) KLASS 3
RÖKÄRRET 8,5 KM V ASKERSUND**

16 ha (15 ha våtm), 135 m ö h. Flygb. -88.

Askersunds kn.

Delobj. 1: Sumpskog, 4 ha.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Svagt våldv moss
6 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, öppet. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 3: Topogent kärr
5 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Golv, 40 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 55 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, lövskog. Fastmatta.

Delobj. 4: Tjärn
1 ha.

Element 1: Golv.

**09E 5I 01 (0145) KLASS 3
MYR 500 M O LERDALEN, 4,5 KM SV ASKERSUND**

37 ha (37 ha våtm), 95 m ö h. Flygb. -88.
Askersunds kn.
Åkermark ansluter.

Delobj. 1: Fuktäng
4 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Golv. Örtdominerad vegetation.

Delobj. 2: Topogent kärr
29 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, anslutande dikning, väg.

Element 1: Golv, 20 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 5 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 4: Golv, 55 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 5: Golv, 5 % av delobjekttytan. Örtdominerad vegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
4 ha.

Element 1: Golv, blandskog. Fastmatta.

**09E 5J 01 (1811) KLASS 3
MYR 200 M O KNÅTTORP, 2,5 KM SV ASKERSUND**

14 ha (14 ha våtm), 90 m ö h. Flygb. -88.
Askersunds kn.
Åkermark ansluter.

Delobj. 1: Sumpskog
14 ha. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande dikning.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan, lövskog.

Element 2: Små fuktängsytor, 5 % av delobjektytan, öppet.
Örtdominerad vegetation.

**09E 5J 02 (3424) KLASS 3
LINDBOMOSSEN 300 M SV ASKERSUND**

18 ha (18 ha våtm), 90 m ö h. Flygb. -88.
Askersunds kn.
Åkermark ansluter.

Delobj. 1: Topogent kärr
4 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, stark lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 5 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Små fuktängsytor, 10 % av delobjektytan.
Örtdominerad vegetation.

Delobj. 2: Fuktäng
14 ha, glest trädäck. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande dikning, stark lokal påverkan från igenfyllnad, anslutande väg.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, lövskog.
Örtdominerad vegetation.

Element 2: Bäck, 10 % av delobjektytan.

**09E 6H 06 (0947) KLASS 3
MYR 500 M V KOLFALLET, 9 KM SO RÖFORS**

23 ha (22 ha våtm), 170 m ö h. Flygb. -88.
Askersunds kn.

Delobj. 1: Tjörn 1 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
3 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning. Spänger.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 24 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 1 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 4: Golv, 30 % av delobjektytan, glest trädäck, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, lövskog.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, barrskog.

**09E 6I 01 (4619) KLASS 2
ORREMOSSEN 2 KM NV NORRA HUNNA, 6,5 KM SV SNAVVLUNDA**

24 ha (23 ha våtm), 170 m ö h. Flygb. -88.
Askersunds kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
7 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 5 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
16 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 3: Golv, 4 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 4: Bäck, 1 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Tjörn 1 ha.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan. Vattenvegetation.

**09E 6I 02 (0211) KLASS 3
MYR 700 M V GOMOSSEN, 8,5 KM OSO RÖFORS**

15 ha (14 ha våtm), 180 m ö h. Flygb. -88.
Askersunds kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
2 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Tjörn
1 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 3: Topogent kärr
4 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, blandskog. Gräs/starrvegetation.
Fastmatta.

Delobj. 4: Svagt välvd mosse
8 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädäck. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, barrskog.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 3: Mosseplan, 25 % av delobjekttytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

**09E 6J 01 (2549) KLASS 3
MYR 100 M O KARLSLUND, 1,5 KM NO ASKERSUND**

13 ha (11 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -88.
Askersunds kn.

Delobj. 1: Tjärn
2 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Golv, 85 % av delobjekttytan.

Element 2: Golv, 15 % av delobjekttytan. Gungfly.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
8 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande dikning, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
3 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

**09E 7I 02 (1518) KLASS 2
MYR VID STUBBAKOLKEN 5,5 KM SV SNAVLUNDA**

33 ha (27 ha våtm), 180 m ö h. Flygb. -88.
Askersunds kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
4 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Tjärn
3 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv, 85 % av delobjekttytan.

Element 2: Golv, 15 % av delobjekttytan. Vattenvegetation.

Delobj. 3: Topogent kärr
18 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.

Element 1: Golv, 78 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Golv, 20 % av delobjekttytan, glest träddäckt, lövskog.

Element 3: Gungfly, 2 % av delobjekttytan.

Delobj. 4: Topogent kärr
5 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**09F 2B 01 (3813) KLASS 2
KÄRR VID ÖVRE FORSA 10 KM SO HAMMAR KA**

3 ha (3 ha våtm), 130 m ö h. Flygb. -83.
Askersunds kn.
Ingår i naturvårdsplan, ingår i SNV:s övers. inv. 1979.
Botaniska värden, rikkärr, rullstensås, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
2 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Golv, 50 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Golv, 50 % av delobjekttytan, lövskog.

**09F 3A 01 (3833) KLASS 3
VÄTMARK VID HULTSJÖN 500 M SO SÄNNA**
25 ha (25 ha våtm), 90 m ö h. Flygb. -83.
Askersunds kn.
Åkermark ansluter, sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Limnogen strandsumpskog
11 ha, fördelat på 3 ytor. Svag lokal påverkan från dikning, väg, anslutande väg.

Element 1: Golv, 95 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Små fuktängsytor, 5 % av delobjekttytan, öppet.

Delobj. 2: Fuktäng
8 ha, glest träddäckt. Svag lokal påverkan från dikning, väg.

Element 1: Golv, 65 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Golv, 35 % av delobjekttytan, öppet, lövskog.

Delobj. 3: Mad vid sjö
6 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 30 % av delobjekttytan. Vattenvegetation.

Element 2: Golv, 60 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 3: Golv, 10 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, lövskog.

Delobj. 4: Svagt välvd mosse
ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

**09F 4A 01 (0532) KLASS 3
HJORTRONMOSEN 1 KM N SÄNNA**

14 ha (14 ha våtm), 90 m ö h. Flygb. -83.
Askersunds kn.
Åkermark ansluter.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
14 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning, torvtäkt, väg.

Element 1: Mosseplan, 25 % av delobjekttytan, glest träddäckt, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjekttytan, öppet. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Mosseplan, 50 % av delobjekttytan, barrskog.

**09F 4A 02 (1847) KLASS 1
MYR O VERKASJÖLUND, 3 KM O HAMMAR**

28 ha (27 ha våtm), 90 m ö h. Flygb. -83.
Askersunds kn.
Åkermark ansluter, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Sumpskog
6 ha, fördelat på 2 ytor. Svag lokal påverkan från kraftledning, anslutande väg.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Flytbladsvegetation
5 ha, öppet.

Element 1: Bäck, 25 % av delobjekttytan.

Element 2: Golv, 75 % av delobjekttytan.

Flytbladsvegetation.

Delobj. 3: Topogent kärr
14 ha, glest trädäckt.

Element 1: Bäck, 3 % av delobjekttytan, öppet.

Element 2: Golv, 52 % av delobjekttytan, glest trädäckt, lövskog.

Element 3: Golv, 45 % av delobjekttytan, öppet.
Örtdominerad vegetation.

Delobj. 4: Topogent kärr
2 ha, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 20 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Element 2: Golv, 75 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Bäck, 5 % av delobjekttytan.

Delobj. 5: Tjärn
1 ha.

Element 1: Golv.

09F 4B 01 (4528) KLASS 4
BREDMOSEN 2,5 KM N ZINKGRUVAN

15 ha (12 ha våtm), 155 m ö h. Flygb. -83.
Askersunds kn.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning, torvtäkt.

09F 4B 02 (4146) KLASS 3
KVARNÄNGSMOSEN 2 KM N ZINKGRUVAN

15 ha (13 ha våtm), 180 m ö h. Flygb. -83.
Askersunds kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
13 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

09F 4C 05 (3001) KLASS 2
KÄRR 500 M SV ISÅSEN, 1 KM N ZINKGRUVAN

1 ha (1 ha våtm), 185 m ö h. Flygb. -83.
Askersunds kn.
Ingår i naturvårdsplan. Botaniska värden, rikkärr, sjö
ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Topogent kärr
1 ha, öppet.

Element 1: Golv. Mjukmatta.

09F 5A 01 (2008) KLASS 3
KÄRR 50 M O HOLMSTORP, 2 KM V ÅMMEBERG

29 ha (29 ha våtm), 95 m ö h. Flygb. -83.
Askersunds kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
21 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning,
kanalisering.

Element 1: Golv, 50 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 45 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Delobj. 2: Bevuxen sjö
8 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, kanalisering.

Element 1: Golv.

09F 5B 01 (2945) KLASS 3
ULVSMOSEN 5,5 KM O ÅMMEBERG

16 ha (15 ha våtm), 170 m ö h. Flygb. -83.
Askersunds kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
8 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan
från dikning, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 65 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjekttytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 30 % av delobjekttytan, glest
trädäckt, barrskog. Vegetationen domineras av mossor.
Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
7 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 25 % av delobjekttytan, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 72 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 3 % av delobjekttytan. Lösbotten.

09F 5C 01 (1905) KLASS 3
MYR 1 KM V HÅKANTORP, 2 KM V MARIEDAMM

14 ha (13 ha våtm), 180 m ö h. Flygb. -83.
Askersunds kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
10 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning,
torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
3 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädäckt.

Element 1: Golv, 75 % av delobjekttytan, blandskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 24 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Gungfly, 1 % av delobjekttytan, öppet.

Delobj. 3: Tjärn
1 ha.

Element 1: Golv.

09F 5C 02 (4730) KLASS 3
FLÅSKAKÄRRET 3 KM N MARIEDAMM

27 ha (24 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -83.
Askersunds kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
19 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 97 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 3 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr

5 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjekttytan, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, lövskog.

**09F 5D 01 (1102) KLASS 4
BJÖRNFALLSMOSSEN I KM O MARIEDAMM**

98 ha (98 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -83.
Askersunds kn.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning, torvtäkt.

**09F 5D 02 (0926) KLASS 3
TILFÄRDS-SKVACKRA 4 KM O MARIEDAMM**

46 ha (45 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -83.
Askersunds kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
40 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande dikning, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 5 % av delobjekttytan, glest trädäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr

6 ha, skogsbevuxet. Svag generell påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
3 ha, öppet.

Element 1: Golv, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**09F 5D 03 (0230) KLASS 3
SKALLEMOSEN 4,5 KM OSO MARIEDAMM**

38 ha (36 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -88.
Askersunds kn.

Delobj. 1: Mad vid vattendrag
29 ha, öppet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Golv, 97 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Bäck, 3 % av delobjekttytan.

Delobj. 2: Limnogen strandsumpskog
7 ha. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

09F5E01

Kyrkmossen och Bredmossen med omgivande myrar, 7 km O Mariedamm

Myren har inte inventerats i fält. Naturvärdesbedömning och beskrivning grundas på flygbildstolkning samt uppgifter från litteratur. Objektet är långsmalt och består av flera myrar vilka är sammanbundna av kärrar. Det ger ett spretigt intryck med inflikande fastmark och uppstickande fastmarksholmar. Det ligger i ett småkuperat skogslandskap öster om Storsjön. I berggrunden är framförallt metasediment och kvartsporfyr dominerande. Gränsen till Östergötlands län ligger strax söder om objektet, gränsen följer här Blåvåmmen. Den södra delen, Bredmossen och halva Långa kärret, ingår i ett militärt skyddsområde. Bredmossen och Långa kärret domineras av tallmossar med inslag av kärrfläckar och platåmossar. Det är egentligen endast norr om den övertvänder smala skogsbilvägen som Långa kärret är ett kärr. Enligt Backeus (1978) domineras kärrgolvet av pors. Bland porsen växer bl a ängsull, blåtåtel och snip. *Sphagnum palustre* växer ymnigt i bottenskiktet. Långa kärret övergår så småningom till Åfjärdskärret, också den dominerad av ombrotrof torvmark. Mossen är välvd och i det närmaste helt öppen. I väster finns ristuvor och fastmattor av *Sphagnum balticum* typ (Backeus 1978). I öster försvinner risen och mosseplanet byggs upp av fastmattor och mjukmattehöljor. En mjukmattedominerad kärrarm leder till Kyrkmossen. Mossen är tallbevuxen och har centralt en tjärn, Kyrktjärnen. Den begränsas i norr av en stor trädbevuxen fastmarksholme. Även Skarprättarkärret är till största delen en tallmosse. En kärrarm leder till Mosjön. Kärrgolvet är ställvis mycket blött med ett utvecklat bottenskikt.

Myrens höga naturvärden består bl a i att den är relativt oskadad och är komplext uppbyggd med ett flertal olika myrtyper.

**09F 5E 01 (3408) KLASS 1
KYRKMOSSEN OCH BREDMOSSEN MED OMGIVANDE
MYRAR 7 KM O
MARIEDAMM**

184 ha (157 ha våtm), 115 m ö h. Flygb. -83. Fält -77.
Askersunds kn.
Litteratur om objektet finns, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt vålvd mosse
72 ha, fördelat på 5 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning,
körspår från traktor/skogsmaskin, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 2 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 4 % av delobjekttytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 9 % av delobjekttytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Delobj. 2: Plåtformigt vålvd mosse
22 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan, barrskog.
Fastmatta.

Element 2: Randskog, (otyd.), 3 % av delobjekttytan,
skogbevuxet, barrskog.

Element 3: Lagg, 5 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Tuva, 5 % av delobjekttytan. Ristuvmosse av S.
fuscumtyp.

Element 5: Mosseplan, 47 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5, underelem. 1: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan.
Fastmattemosse av tuvull-S. balticumtyp.

Element 6: Hölja, 25 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent klärr
60 ha, fördelat på 7 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen, dikning,
körspår från traktor/skogsmaskin, kraftledning, väg.

Element 1: Golv, 45 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Golv, 10 % av delobjekttytan,
1-3 % krontäckning, lövskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blååtel-
vit-brunmosstyp.

Element 2: Golv, 20 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 2, underelem. 1: Golv, 5 % av delobjekttytan.
Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 2, underelem. 2: Golv, 5 % av delobjekttytan.
Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 3: Golv, 10 % av delobjekttytan, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Golv, 2 % av delobjekttytan, skogsbevuxet,
lövskog. Fastmatta.

Element 5: Golv, 22 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 5, underelem. 1: Golv, 5 % av delobjekttytan. Öppet
lösbottenkärr.

Element 6: Golv, 1 % av delobjekttytan. Örtdominerad
vegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Topogent klärr
3 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan
från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 5: Tjärn
2 ha.

Element 1: Golv.

**09F 6B 01 (1512) KLASS 3
MULTNAMOSSEN 1,5 KM SSV RÖNNESHYTTA**

19 ha (19 ha våtm), 120 m ö h. Flygb. -82.
Askersunds kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt vålvd mosse
14 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning,
stark lokal påverkan från torvtäkt, svag lokal påverkan från
väg.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Mad vid sjö
5 ha, öppet. Svag generell påverkan från dikning,
svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, 75 % av delobjekttytan, lövskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

**09F 6B 02 (2149) KLASS 3
KULLMOSSEN 2 KM SO RÖNNESHYTTA**

68 ha (64 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -82.
Askersunds kn.

Delobj. 1: Svagt vålvd mosse
52 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande
hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan, glest
träddäckt, barrskog. Vegetationen domineras av mossor.
Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 6 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 4: Lagg, 4 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Plåtformigt vålvd mosse
12 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen,
dikning.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 8 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan, glest
träddäckt, barrskog. Vegetationen domineras av mossor.
Fastmatta.

Element 4: Lagg, 2 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

09F 6B 03 (1730) KLASS 3
VÄTMARK 50 M S KILSLUND, 1 KM S RÖNNESHYTTA

42 ha (41 ha våtm), 120 m ö h. Flygb. -82.
Askersunds kn.

Delobj. 1: Mad vid sjö
21 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning,
kraftledning, väg.

Element 1: Bäck, 5 % av delobjekttytan.

Element 2: Golv, 95 % av delobjekttytan, lövskog.

Delobj. 2: Fuktäng
3 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från
dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
9 ha, skogsbevuxet. Stark generell påverkan från dikning,
svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 4: Topogent kärr
8 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.

Element 1: Golv, 65 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Golv, 20 % av delobjekttytan, blandskog.

Element 3: Golv, 15 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

09F 6B 04 (3233) KLASS 4
DAMPEMOSEN 1 KM O RÖNNESHYTTA

9 ha (9 ha våtm), 130 m ö h. Flygb. -82.
Askersunds kn.
Mycket starkt generellt påverkat av torvtäkt.

09F 6B 05 (4929) KLASS 3
GÖLAMOSSEN 1,5 KM NO RÖNNESHYTTA

14 ha (14 ha våtm), 145 m ö h. Flygb. -82.
Askersunds kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
11 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 26 % av delobjekttytan, öppet,
barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 2 % av delobjekttytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Lagg, 2 % av delobjekttytan, öppet, barrskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
3 ha, öppet.

Element 1: Golv, barrskog. Fastmatta.

09F 6C 01 (3515) KLASS 3
MUGGHULTAMOSSARNA 3,5 KM O RÖNNESHYTTA

23 ha (22 ha våtm), 130 m ö h. Flygb. -82.
Askersunds kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
22 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, väg.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 4 % av delobjekttytan,
glost trädäckat, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 6 % av delobjekttytan, blandskog.

09F 6C 02 (3334) KLASS 3
FÄGLAMOSSEN 6 KM O RÖNNESHYTTA

12 ha (11 ha våtm), 145 m ö h. Flygb. -82.
Askersunds kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
11 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 97 % av delobjekttytan, barrskog.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Lagg, 3 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

09F 6D 01 (4118) KLASS 3
STORA MOSEN 200 M V TÖSNAHULT,
7,5 KM NNO MARIEDAMM

73 ha (72 ha våtm), 135 m ö h. Flygb. -82.
Askersunds kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
23 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, stark
lokal påverkan från torvtäkt, svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, 98 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 2 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Plåtformigt välvd mosse
36 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
dikning, torvtäkt.

Element 1: Göl, 1 % av delobjekttytan.

Element 2: Mosseplan, 47 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 40 % av delobjekttytan, glost
träddäckat, barrskog. Vegetationen domineras av mossor.
Fastmatta.

Element 4: Hölja, 5 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 5: Lagg, 2 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 6: Randskog, (otyd.), 5 % av delobjekttytan,
skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 4 ytor, glost trädäckat. Svag lokal
påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjekttytan, blandskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjekttytan, öppet, blandskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**09F 6E 01 (4247) KLASS 4
SUTTERMOSEN 4 KM N GRYTS BRUK**

34 ha (34 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -82.
Askersunds kn.
Mycket starkt generellt påverkat av anslutande hyggen, dikning, torvtäkt.

**09F 7A 01 (1313) KLASS 2
BRUNNSNÄSMOSEN 1 KM S KÄRBERG**

22 ha (22 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -82.
Askersunds kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
4 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtykt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjekttytan, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Bevuxen sjö
6 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv. Lösbotten.

Delobj. 3: Svagt våldv moss
12 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Hölja, 3 % av delobjekttytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 16 % av delobjekttytan, glest trädtykt, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Lagg, 1 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**09F 7A 02 (4204) KLASS 3
SÖDRA MELÄNGEN 1 KM N KÄRBERG**

21 ha (21 ha våtm), 115 m ö h. Flygb. -82.
Askersunds kn.
Åkermark ansluter, ornitologiska värden.

Delobj. 1: Bevuxen sjö
21 ha, öppet. Svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv.

**09F 7B 01 (3304) KLASS 3
MYR 200 M V STENKUMLA, 2 KM SV ÅSBRO**

13 ha (13 ha våtm), 115 m ö h. Flygb. -82.
Askersunds kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt våldv moss
13 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande dikning, torvtäkt, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

**09F 7B 02 (1742) KLASS 4
AXSJÖMOSSARNA 2,5 KM O LERBÄCK**

34 ha (34 ha våtm), 155 m ö h. Flygb. -82.
Askersunds kn.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning, torvtäkt, väg.

**09F 7B 03 (1719) KLASS 4
LERBÄCKSMOSEN 50 M O LERBÄCK**

38 ha (39 ha våtm), 130 m ö h. Flygb. -82.
Askersunds kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
4 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Svagt våldv moss
2 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 3: Obestämbare myr
32 ha, skogsbevuxet. Stark generell påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning, väg.

Element 1: Golv, 85 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Golv, 15 % av delobjekttytan, öppet.
Vattenvegetation.

**09F 7B 04 (2645) KLASS 4
FÄGLAMOSEN 3 KM ONO LERBÄCK**

30 ha (29 ha våtm), 155 m ö h. Flygb. -82.
Askersunds kn.

Delobj. 1: Svagt våldv moss
8 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, anslutande torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 10 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Obestämbare moss
21 ha, öppet. Stark generell påverkan från torvtäkt, svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, blandskog.

**09F 7C 01 (3949) KLASS 3
STORMOSEN 200 M SO RUDETORPET, 3,5 KM S TISARSTRAND**

10 ha (10 ha våtm), 160 m ö h. Flygb. -82.
Askersunds kn.

Delobj. 1: Svagt våldv moss
10 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 7 % av delobjekttytan, öppet, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Lagg, 3 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**09F 7C 02 (4105) KLASS 3
MAJORMOSEN 4,5 KM NO LERBÄCK**

11 ha (11 ha våtm), 170 m ö h. Flygb. -82.
Askersunds kn.

Delobj. 1: Svagt vålvd mosse

3 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr

8 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 30 % av delobjekttytan, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 65 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjekttytan. Lösbotten.

**09F 7D 02 (4811) KLASS 3
MYR RUNT HOVDESJÖN, 7,5 KM O ÅSBRO**

17 ha (14 ha våtm), 160 m ö h. Flygb. -82.
Askersunds kn.

Delobj. 1: Tjörn
2 ha.

Element 1: Golv, 0 % av delobjekttytan.

Delobj. 2: Obestämbar mosse

5 ha, öppet. Stark generell påverkan från torvtäkt, svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjekttytan, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 18 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 3: Lagg, 2 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Delobj. 3: Svagt vålvd mosse

5 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjekttytan, öppet, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr

4 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

**09F 7E 07 (0402) KLASS 3
VÄTMARK 50 M S VÄSTRA HJÄRTA, 3,5 KM NO NÄRKES-
BERG**

10 ha (10 ha våtm), 115 m ö h. Flygb. -82.
Askersunds kn.

Ingår i ängs- och hagmarksinventering. Området är beteshävdad, sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Strandäng

3 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Limnogen strandsumpskog

7 ha, fördelat på 3 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

**09F 8A 01 (2602) KLASS 2
TYCKEKÄRREN 4,5 KM SSV ÖSTANSJÖ**

15 ha (14 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -88.
Askersunds kn.

Delobj. 1: Topogent kärr

6 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Golv, 20 % av delobjekttytan, glest träd täckt, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjekttytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Svagt vålvd mosse

8 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, 93 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 1 % av delobjekttytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Lagg, 1 % av delobjekttytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**09F 8B 01 (2729) KLASS 4
VÄTMARK 500 M SO VISSBODA, 300 M NO ÅSBRO**

20 ha (20 ha våtm), 105 m ö h. Flygb. -81.
Askersunds kn.

Delobj. 1: Limnogen strandsumpskog

20 ha. Svag generell påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande järnväg, anslutande väg.

Element 1: Golv, 95 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Små fuktängsytor, 5 % av delobjekttytan, öppet.

**09F 8B 02 (3334) KLASS 3
VÄTMARK 100 M SV TISARBADEN, 1 KM NO ÅSBRO**

12 ha (12 ha våtm), 105 m ö h. Flygb. -81.
Askersunds kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Strandäng

5 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 95 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Golv, 5 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, lövskog.

Delobj. 2: Limnogen strandsumpskog

7 ha. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande järnväg, anslutande väg.

Element 1: Golv, 95 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Små fuktängsytor, 5 % av delobjekttytan, öppet, lövskog.

DEGERFORS



Myren ligger öster om sjön Skagern i ett barrskogspräglat landskap. Berggrunden domineras i huvudsak av granit och grå gnejs. Den sydvästra delen av objektet, Högskogs stormosse, är avsatt som ett domänreservat. Två stora mossar, varav den ena excentrisk, utgör det dominerande intrycket av objektet. De skiljs åt av ett nord-sydligt kärrstråk. Här och var bryter trädbevuxna fastmarksholmar fram. Objektet inventerades i fält den 16 augusti 1993. De vackra vidsträckta mossarna har strängar och tuvor av risvegetation, hela mossen är glest bevuxen med martallar. Mossefastmattor med tuvull, tuvsäv och *Sphagnum tenellum* finns där risen vikit undan. I mjukmattehöljorna växer *Sphagnum cuspidatum*. Den östra av de båda mossarna har centralt ett väl utbildat komplex med lösbottenhöljor. Det nord-sydliga kärrstråket är relativt smalt, längst i norr sväller det ut och viker av mot nordost. Genom den smala passagen flyter en liten bäck, stundtals med en bård av starr. Kärrret är huvudsakligen ett flaskstarrdominerat mjukmattekärr med inslag av lösbottnar. Här och var är kärrret ytterst svårbedrätt. Insprängt i kärrret, bl a i anslutning till slukhålet, växer bl a blåtåtel, klockklung, ängsnycklar samt ett bestånd med myrdilja (Backeus 1977).

Myren är stor och flera av de ingående delobjekten är helt oskadade. Myren är dessutom botaniskt intressant och har ett rikt fågelliv med bl a enkelbeckasin, ljungpipare och orrspel, den bedömdes höra till skyddsklass 2 i Fågelmyrar i Örebro län (1982:1). Objektet ingår i Myrskyddsplan för Sverige.

09E 8E 01 (4230) KLASS 1
SÖDRA ÅSMOSSEN/HÖGSKOGS STORMOSSE 9 KM NNV
FINNERÖDJA KA

251 ha (275 ha våtm), 135 m ö h. Flygb. -86. Fält -93.

Degerfors kn.

Domänreservat, ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården, ingår i SNV:s övers. inv. 1979.

Tillfredsställ. dokumentation finns.

Delobj. 1: Excentrisk mosse

75 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Randskog, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Lagg, 5 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 10 % av delobjektytan. Ristuvmosse av *S. fuscum*typ.

Element 4: Sträng, 20 % av delobjektytan. Ristuvmosse av *S. fuscum*typ.

Element 5: Hölja, 20 % av delobjektytan. Fastmattemosse av tuvull-*S. balticum*typ.

Element 6: Hölja, 9 % av delobjektytan. Mjukm.mosse, vitag-kallgräs-*S.cuspidatum*typ.

Element 6, underelem. 1: Hölja, 2 % av delobjektytan. Höljegöl av vattentyp.

Element 7: Mosseplan, 15 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 8: Dråg, 5 % av delobjektytan. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 9: Göl, 1 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Plåtformigt våldv mosse

80 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Dråg, 3 % av delobjektytan. Fastmatta. Parallellt strukturmönster.

Element 2: Dråg, 2 % av delobjektytan. Mjukmatta-lösbotten. Parallellt strukturmönster.

Element 3: Mosseplan, 10 % av delobjektytan.

Ljungdominerad vegetation. Fastmatta med ristuvor.

Element 4: Sträng, 20 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta med ristuvor. Oregelbundet strukturmönster.

Element 4, underelem. 1: Tuva, 5 % av delobjektytan. Ristuvmosse av *S. fuscum*typ.

Element 5: Hölja, 30 % av delobjektytan. Fastmattemosse av tuvull-*S. balticum*typ.

Element 6: Hölja, 10 % av delobjektytan. Mjukm.mosse, vitag-kallgräs-*S.cuspidatum*typ.

Element 6, underelem. 1: Hölja, 2 % av delobjektytan. Höljegöl.

Element 7: Mosseplan, 10 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 8: Randskog, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta med ristuvor.

Element 9: Lagg, 5 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 9, underelem. 1: Lagg, 1 % av delobjektytan. Öppet fastmattekärr.

Delobj. 3: Topogent kärr

60 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 20 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Golv, 5 % av delobjektytan. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vitmosstyp.

Element 2: Golv, 55 % av delobjektytan. Mjukmattekärr, starr-*S. papillosum* var.

Element 2, underelem. 1: Golv, 5 % av delobjektytan. Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vitmosstyp.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 3, underelem. 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 5 % av delobjektytan. Öppet sumpkärr.

Element 4: Bäck, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 4: Topogent kärr

40 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.
Element 1: Golv, 80 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjekttytan. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 5: Sumpskog

10 ha. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog. Fastmatta.

Delobj. 6: Plåtformigt välvd mosse

10 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Lagg, 10 % av delobjekttytan, öppet.

Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

09E9D01 Julösmossen, 5 km NNV Finnerödja

Det drygt åtta kilometer långa objektet sträcker sig i en nord-sydlig riktning öster om sjön Skagern. Omgivningarna består främst av skogsmark men i anslutning till myren finns fläckar av åkermark. Gnejs bygger upp berggrunden. Mossar och smärre kärr är de huvudsakliga våtmarkstyperna. Objektet inventerades i fält den 17 augusti 1993. Det är framförallt risvegetationen som är dominerande på de excentriska mossarna. Risen täcker ibland hela ytor, men förekommer även som strängar och tuvor. Mossen är glest bevuxen med martallar. Risen avbryts i sin dominans av mjukmattehöljor med *Sphagnum cuspidatum* och lösbottenhöljor. Objektets största kärr ligger strax norr om Lämås. Det domineras av ett mycket blött mjukmattegolvet med inslag av mossetuvar och lösbottnar. Glasbjörk täcker delar av kärret. I det öppna kärret är flaskstarr och trådstarr samdominerande i fältskiktet och *Sphagnum magellanicum*, *S. papillosum* och *S. pulchrum* i bottenskiktet. Bland övriga arter kan klocklång nämnas. I sydöst tillkommer bl a svärdsliilja och brunrör (Backeus 1977).

Myren är stor och skadorna härrör främst från diken i ytterkanterna och små husbehovstorvtäcker. Den har fått ett högt naturvärde trots skadorna, bl a beroende på komplexiteten med flera mossetyper representerade. Den har dessutom ett rikt fågelliv med bl a orrspele och hör till skyddsklass 2 i Fågelmyrar i Örebro län (1982:1).

**09E 9D 01 (0642) KLASS I
JULÖSMOSSEN 5 KM NNV FINNERÖDJA**

387 ha (382 ha våtm), 115 m ö h. Flygb. -86. Fält -93.
Degerfors kn.
Ingår i naturvårdsplan. Botaniska värden, litteratur om objektet finns, ornitologiska värden.

Delobj. 1: Tjörn

2 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Plåtformigt välvd mosse

31 ha, fördelat på 2 ytor, glest träd täckt. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande dikning, körspår från traktor/skogsmaskin, kraftledning, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjekttytan, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Randskog, (otyd.), 2 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 3: Lagg, 3 % av delobjekttytan, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr

15 ha, fördelat på 6 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, väg.

Element 1: Golv, 80 % av delobjekttytan, lövskog. Granbjörkkärr.

Element 1, underelem. 1: Golv, 20 % av delobjekttytan, 1-3 % kron täckning, blandskog. Mjukmattekärr, starr-S. papillosum var.

Element 2: Golv, 20 % av delobjekttytan, blandskog.

Delobj. 4: Svagt välvd mosse

10 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, anslutande dikning, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 5: Svagt välvd mosse

4 ha, fördelat på 2 ytor, glest träd täckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, anslutande dikning.

Element 1: Mosseplan, lövskog. Fastmatta.

Delobj. 6: Excentrisk mosse

284 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, torvtäkt, väg. Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Göl, 1 % av delobjekttytan.

Element 2: Hölja, 2 % av delobjekttytan. Höljegöl.

Element 3: Hölja, 20 % av delobjekttytan. Mjukm.mosse, vitag-kallgräs-S.cuspidatumtyp.

Element 4: Hölja, 5 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Mosseplan, 30 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 6: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog. Tallmosse av ristyp.

Element 7: Lagg, 3 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 8: Mosseplan, 32 % av delobjekttytan, glest träd täckt, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 9: Sträng, 1 % av delobjektytan, barrskog.
Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Delobj. 7: Topogent kärr
24 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 15 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 70 % av delobjektytan. Mjukmattekärr,
starr-S. papillosum var.

Element 2, underelem. 1: Tuva, 5 % av delobjektytan.
Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 3: Golv, 3 % av delobjektytan. Öppet lösbottenkärr.

Element 4: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet,
barrskog. Gran-björkkärr av fattig vitmossotyp.

Element 5: Gungfly, 2 % av delobjektytan.

Delobj. 8: Sluttande mosse
14 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, torvtäkt.

Element 1: Sträng, 10 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 60 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest
träddäckt, barrskog. Fastmatta.

09E 9E 02 (0203) KLASS 3
MYR 400 M O NORRA JULÖN 3,5 KM NO RÅBÄCK

25 ha (20 ha våtm), 120 m ö h. Flygb. -86.
Degerfors kn.

Delobj. 1: Svagt vålvd mosse
6 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan
från dikning, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
5 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
dikning, anslutande väg.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 28 % av delobjektytan, skogbevuxet,
lövskog. Fastmatta.

Element 3: Gungfly, 2 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Tjärn
2 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 4: Svagt vålvd mosse
9 ha, glest träddäckt. Svag lokal påverkan från dikning,
körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, 73 % av delobjektytan, barrskog.
Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 2 % av delobjektytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

09E 9E 03 (0409) KLASS 3
MYR 700 M S JULÖFALLET, 2 KM O LÄMÅS

12 ha (12 ha våtm), 120 m ö h. Flygb. -86.
Degerfors kn.

Delobj. 1: Svagt vålvd mosse
6 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan
från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, glest
träddäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 2: Topogent kärr
6 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen, dikning, anslutande väg.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet,
lövskog.

09E 9E 04 (0713) KLASS 3
MYR 700 M O JULÖFALLET, 2,5 KM O LÄMÅS

15 ha (15 ha våtm), 120 m ö h. Flygb. -86.
Degerfors kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Sumpskog
4 ha.

Element 1: Golv, barrskog.

Delobj. 2: Bevuxen sjö
5 ha, öppet.

Element 1: Golv. Vattenvegetation.

Delobj. 3: Topogent kärr
6 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen,
dikning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet,
lövskog.

Element 3: Golv, 3 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 4: Bäck, 2 % av delobjektytan.

09E 9E 05 (0118) KLASS 3
MYR 700 M SV ANDERSTORP, 3 KM O LÄMÅS

28 ha (28 ha våtm), 115 m ö h. Flygb. -86.
Degerfors kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, lövskog.
Örtdominerad vegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr

4 ha, skogsbevuxet. Svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse

14 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 98 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 2 % av delobjekttytan, öppet. Fastmatta.

**09E 9E 06 (1716) KLASS 3
MYR 300 M V KVARNBÄCKEN, 3 KM NO LÄMÅS**

10 ha (10 ha våtm), 115 m ö h. Flygb. -86.
Degerfors kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr

2 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse

5 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 3: Topogent kärr

3 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 98 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Golv, 2 % av delobjekttytan, öppet.
Vattenvegetation.

**09E 9E 07 (4613) KLASS 2
TRUNHATTEN 3,5 KM O SÄLLARETORP**

201 ha (200 ha våtm), 120 m ö h. Flygb. -86. Fält -77.
Degerfors kn.
Ingår i naturvårdsplan. Botaniska värden, litteratur om objektet finns, området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

6 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr

15 ha, fördelat på 6 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 22 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 45 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 2, underelem. 1: Golv, 20 % av delobjekttytan.
Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 2, underelem. 2: Tuva, 2 % av delobjekttytan, 1-3 %
kröntäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. magellanicumtyp.

Element 3: Golv, 30 % av delobjekttytan. Lösbottom.

Element 4: Golv, 3 % av delobjekttytan, skogsbevuxet,
lövskog.

Delobj. 3: Excentrisk mosse

19 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen,
anslutande dikning.

Element 1: Sträng, (otyd.), 10 % av delobjekttytan,
barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjekttytan, glest
träddäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 20 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Randskog, 40 % av delobjekttytan, skogsbevuxet,
barrskog.

Delobj. 4: Platåformigt välvd mosse

160 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande
dikning.

Element 1: Sträng, (otyd.), 5 % av delobjekttytan.

Element 2: Dråg, 1 % av delobjekttytan. Mjukmattekärr av
starr-vitmosstyp.

Element 3: Randskog, 5 % av delobjekttytan, skogsbevuxet,
barrskog. Tallmosse av skvatramtyp.

Element 4: Mosseplan, 40 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4, underelem. 1: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan.
Fastmattemosse av tuvull-S. fuscumtyp.

Element 4, underelem. 2: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan.
Fastm.mosse av tuvull-S. magellanicumtyp.

Element 5: Hölja, 25 % av delobjekttytan.
Mjukm.mosse, vitag-kallgräs-S.cuspidatumtyp.

Element 6: Hölja, 15 % av delobjekttytan. Lösbottom.

Element 7: Göl, 4 % av delobjekttytan.

Element 8: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan, barrskog.
Fastmatta med ristuvor.

**09E 9E 08 (3725) KLASS 2
EDSBÄCKAMOSSEN OCH GRYTEFORSMYREN 4,5 KM SO
SÄLLARETORP**

70 ha (64 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -86. Fält -93.
Degerfors kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr

17 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen, dikning, kraftledning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjekttytan, lövskog.
Fastm.kärr,tuvsäv-S.papillosum-compactumtyp.

Element 1, underelem. 1: Tuva, 15 % av delobjekttytan.
Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Golv, 15 % av delobjekttytan. Mjukmattekärr,
starr-S. papillosum var.

Delobj. 2: Platåformigt välvd mosse

7 ha, öppet. Svag lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 65 % av delobjekttytan, barrskog.
Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 1, underelem. 1: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan,
11-25 % kröntäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan. Vegetationen

domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan. Mjukmattemosse av vitag-S.tenellumtyp.

Element 4: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, skogsbevuxet, barrskog. Tallmosse av skvattramtyp.

Element 5: Lagg, 10 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse
28 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, barrskog. Tallmosse av skvattramtyp.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, glest träd täckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Mosseplan, 5 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
7 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 5: Mad vid vattendrag
5 ha, glest träd täckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, lövskog. Sumpkärr av högstarr-örttyp.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, glest träd täckt,

barrskog.

10E 0D 01 (1049) KLASS 2 MOSSTORPSMOSEN 4,5 KM SO NYSUND

95 ha (94 ha våtm), 120 m ö.h. Flygb. -78.
Degerfors kn.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns, ornitologiska värden.

Delobj. 1: Excentrisk mosse
94 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, torvtäkt.

Element 1: Ett flertal gölar, 5 % av delobjektytan.

Element 2: Sträng, 25 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Hölja, 15 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Mosseplan, 33 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 6: Randskog, 3 % av delobjektytan, skogsbevuxet.

Element 7: Lagg, 1 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 8: Lagg, 1 % av delobjektytan. Mjukmatta.

10E0E01

Stora och Lilla Klingen, 4 km OSO Nysund

Objektet har inte inventerats i fält. Beskrivningen och naturvärdesbedömningen bygger enbart på flygbildstolkning. Myren ligger i skuggan av Stora Gåssjömossen i ett skogspräglad landskap. I berggrunden finns företrädesvis granit. Smala skogsbilvägar leder nästan ända fram till myren från flera håll. Mossar utgör den klart dominerande våtmarkstypen. I norr heter myren Lilla Klingen. Den består av en platåmosse och en skogsbevuxen svagt välvd mosse. Platåmossen har ett fastmattegolvet i vilket det växer enstaka träd samt en fastmattedominerad lagg. Den södra delen, Stora Klingen, täcks i stort sett av en excentrisk mosse. Mellan de av ris uppbyggda strängarna finns höljor av fast- respektive mjukmatte. Utanför mossen ligger kärr med ungefär lika delar fastmatte- och mjukmattegolvet.

Det höga naturvärdet motiveras bl a av att flera mossetyper ingår samt en begränsad hydrologisk påverkan.

10E 0E 01 (3113) KLASS 1 STORA OCH LILLA KLINGEN 4 KM OSO NYSUND

90 ha (89 ha våtm), 110 m ö.h. Flygb. -78.
Degerfors kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
14 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan. Lösbottn.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
18 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Bäck, 1 % av delobjektytan, öppet.

Element 3: Mosseplan, 14 % av delobjektytan, glest träd täckt, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 3: Excentrisk mosse
46 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 14 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 1 % av delobjektytan. Lösbottn.

Element 4: Hölja, 20 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Mosseplan, 20 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 6: Randskog, 15 % av delobjekttytan.

Delobj. 4: Platåformigt välvd mosse
11 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.
Element 1: Mosseplan, (otydl.), 97 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Element 2: Lagg, (otydl.), 3 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**10E 0E 05 (1028) KLASS 3
JÄRNMYREN 7 KM SO NYSUND**

16 ha (14 ha våtm), 115 m ö h. Flygb. -86.
Degerfors kn.

Delobj. 1: Soligent kärr
5 ha, fördelat på 2 ytor, glest träd täckt. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjekttytan, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjekttytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 3: Golv, 5 % av delobjekttytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
9 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjekttytan, blandskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjekttytan, barrskog.

**10E 0E 06 (2921) KLASS 3
MYR 500 M N FALLTORP, 5,5 KM SO NYSUND**

12 ha (12 ha våtm), 105 m ö h. Flygb. -86.

Degerfors kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
4 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Platåformigt välvd mosse
8 ha, glest träd täckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjekttytan, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Lagg, 5 % av delobjekttytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**10E 0E 07 (4019) KLASS 3
MYR 2,5 KM O KÄLLSBODALARNA, 5 KM OSO NYSUND**

20 ha (19 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -86.
Degerfors kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
7 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 90 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 9 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 1 % av delobjekttytan. Lösbottn.

Delobj. 2: Platåformigt välvd mosse
12 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 65 % av delobjekttytan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 35 % av delobjekttytan, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Randskog, 15 % av delobjekttytan, skogbevuxet, barrskog.

10E1C05 Stormossen vid Mickelsrud, 3,5 km NV Nysund

Det ca 400 hektar stora objektet är helt omgivet av skog med undantag av i nordväst där det har kontakt med sjön Däveln. Berggrunden domineras av gnejs och granit. Myren fortsätter in i Värmlands län och kallas där Billingsmossarna. Objektet är hästskoformat och består huvudsakligen av vackert utbildade mossar. Ett sträng- flarkkärr ingår i objektet. Myren inventerades i fält den 20 september 1993. Den koncentrisk mossen i öster har glest tallbevuxna rissträngar och ristuvor, flertalet av strängarna är distinkt utbildade. Randskogen i väster är av skvatt-ramtyp och den sluttar ibland mycket brant. Mellan risen dominerar fastmatta med bl a tuvull och *Sphagnum balticum*. I nordväst ligger objektets största samling gölar. I mjukmattebården runt gölarna dominerar *Sphagnum majus*. Den är för övrigt vanlig även i mjukmattehöljorna. Objektets övriga mossar har ett liknande utseende som den ovan beskrivna. Mellan den koncentrisk mossen i öster och den excentrisk i norr ligger ett sträng- flarkkärr. Kärret är stundtals mycket blött. Det är bredast i öster och smalnar av mot sydväst. Flarkarna är inte helt vegetationsfria, i dem växer bl a dystarr, flaskstarr, ängsull och, enligt Backeus (1978), småsileshår. Bladvassen är ställsvis beståndsbildande. I mjukmattesträngarna är vitag, *Sphagnum papillosum* och *Sphagnum fallax* dominanta. Ett litet björkkärr ligger utmed den nordöstra kanten av objektet. Golvets hydrologiska typ varierar från fastmatta till blöt mjukmatta. I fältskiktet är inte någon art klart dominant, här växer bl a tuvull, skogsfräken, topplösa, hundstarr och grenrör. *Sphagnum fallax* är allmän bland mossorna. Längst i norr övertvåras en järnväg en smal passage av myren, det finns också några diken. Men, med hänsyn till objektets storlek samt att diken är belägna i periferin är den hydrologiska påverkan svag.

De höga naturvärdena motiveras bl a av storleken, få ingrepp samt att sträng- flarkärr är en ovanlig myrtyp i regionen. Stormossen ingår i Myrskyddsplan för Sverige.

**10E 1C 05 (4845) KLASS 1
STORMOSSEN VID MICKELSRUD, 3,5 KM NV NYSUND**

409 ha (404 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -78. Fält -93.
Degerfors kn.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns, sjö
ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Koncentrisk mosse

231 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen,
dikning, järnväg, torvtäkt. Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Sträng, 5 % av delobjekttytan. Ristuvmosse av S.
fuscumtyp.

Element 1, underelem. 1: Tuva, 1 % av delobjekttytan.
Mjukmattemosse av vitag-kallgräs-S.majustyp.

Element 2: Sträng, 35 % av delobjekttytan, barrskog.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 18 % av delobjekttytan. Mjukmattemosse av
vitag-kallgräs-S.majustyp.

Element 4: Mosseplan, 25 % av delobjekttytan.
Fastmattemosse av tuvull-S. balticumtyp.

Element 4, underelem. 1: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan.
Fastmattemosse av tuvull-S. rubellumtyp.

Element 5: Hölja, 3 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 6: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, skogbevuxet,
barrskog. Tallmosse av skvatramtyp.

Element 6, underelem. 1: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan,
11-25 % krontäckning, barrskog. Tallmosse av ristyp.

Element 7: Lagg, 2 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Element 7, underelem. 1: Lagg. Mjukmattekärr, starr-S.
fallax variant.

Element 8: Dråg, 1 % av delobjekttytan.
Mjukmattekärr, starr-S. fallax variant.

Element 9: Slukhål, 1 % av delobjekttytan.

Delobj. 2: Excentrisk mosse

19 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, torvtäkt.

Element 1: Sträng, (otyd.), 10 % av delobjekttytan.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 5 % av delobjekttytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Mosseplan, 65 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Randskog, 5 % av delobjekttytan, skogbevuxet,
barrskog.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse

26 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning, järnväg, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 4: Plåtformigt välvd mosse

14 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen,
dikning, anslutande järnväg.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Lagg, 10 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Sträng-flarkkärr

11 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Flark, 25 % av delobjekttytan. Lösbottenkärr av
oligotrof typ.

Element 2: Sträng, 25 % av delobjekttytan. Mjukmattekärr,
starr-S. fallax variant.

Element 3: Golv, 50 % av delobjekttytan. Mjukmattekärr av
starr-vitmosstyp.

Delobj. 6: Topogent kärr

21 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande
hyggen,
dikning.

Element 1: Golv, 53 % av delobjekttytan. Mjukmattekärr,
starr-S. papillosum var.

Element 2: Golv, 35 % av delobjekttytan, lövskog.
Fastmattekärr av tuvull-vitmosstyp.

Element 3: Golv, 10 % av delobjekttytan, glest träd täckt,
lövskog.

Element 4: Bäck, 2 % av delobjekttytan.

Element 4, underelem. 1: Vegetation utmed mindre vattendrag,
1 % av delobjekttytan. Mjukmattekärr, starr-S. fallax
variant.

**10E 1D 01 (2045) KLASS 3
MYR 200 M O BÄCKELID, 1,5 KM ONO NYSUND**

23 ha (23 ha våtm), 90 m ö h. Flygb. -78.
Degerfors kn.
Åkermark ansluter.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

6 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning,
torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, blandskog.

Delobj. 2: Plåtformigt välvd mosse

17 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning,
kraftledning, stark lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjekttytan, barrskog.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 35 % av delobjekttytan, glest
träddäckt, barrskog. Vegetationen domineras av mossor.
Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan, skogbevuxet,
barrskog.

**10E 1D 02 (3444) KLASS 3
DOMAREMOSEN 2 KM NO NYSUND**

38 ha (38 ha våtm), 90 m ö h. Flygb. -78.
Degerfors kn.

Delobj. 1: Plåtformigt välvd mosse

29 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
dikning, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjekttytan, barrskog.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Randskog, 15 % av delobjekttytan, skogbevuxet,

barrskog.

Element 3: Lagg, 10 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
4 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
6 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv. Fastmatta.

10E 1D 03 (3038) KLASS 2
PRÄSTGÅRDSMOSEN I KM NNO NYSUND

71 ha (63 ha våtm), 90 m ö h. Flygb. -78.
Degerfors kn.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns,
området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
14 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Tjårn
2 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 3: Topogent kärr
5 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 83 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet,
lövskog. Fastmatta.

Element 3: Gungfly, 2 % av delobjektytan.

Delobj. 4: Plåtformigt välvd mosse
44 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen,
dikning.

Element 1: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest
träddäckt, barrskog. Vegetationen domineras av mossor.
Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 43 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 7 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Dråg, 14 % av delobjektytan.

Element 5: Lagg, (otydl.), 1 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 6: Mosseplan, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet,
barrskog.

10E 1D 04 (4441) KLASS 3
MYR 200 M O HULTET, 3 KM NNO NYSUND
15 ha (15 ha våtm), 95 m ö h. Flygb. -78.
Degerfors kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
5 ha, glest träddäckt. Svag lokal påverkan från anslutande
hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet,
lövskog.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, öppet, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
10 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 18 % av delobjektytan, öppet,
barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Lagg, 2 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

10E 1D 05 (2709) KLASS 4
MYR 100 M SO SVARTKÄRR, 2 KM NV NYSUND

11 ha (11 ha våtm), 115 m ö h. Flygb. -78.
Degerfors kn.

Delobj. 1: Excentrisk mosse
11 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, stark lokal
påverkan från torvtäkt. Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Sträng, (otydl.), 10 % av delobjektytan.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 65 % av delobjektytan, barrskog.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Randskog, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet,
barrskog.

10E 1D 06 (0632) KLASS 4
MYR 50 M O KUNGSHAG, 0,5 KM O NYSUND

16 ha (16 ha våtm), 85 m ö h. Flygb. -78.
Degerfors kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
16 ha, skogsbevuxet. Stark lokal påverkan från dikning,
svag lokal påverkan från kraftledning, stark lokal påverkan
från torvtäkt, svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, glest
träddäckt, barrskog. Vegetationen domineras av mossor.
Fastmatta.

Med sina 700 hektar är Stora Gåssjömossen den näst största myren i länet. Den ligger helt omgiven av skog strax sydväst om sjön Storbjörken. Berggrunden domineras av gnejs. Med undantag av några små kärrstråk är myren uppbyggd av mossar. En bäck rinner genom de centrala delarna. I mitten är ett stort område av mossen skadad på grund av diken. Objektet inventerades i fält den 20 augusti 1993. Hela den norra delen är en oregelbundet formad excentrisk mosse. Ris dominerar, antingen som tuvor, vilket är vanligast, eller som vaga strängar. Mossen är glest tallbevuxen. I övre halvan finns ett större blötstråk med några gölar. Här förlorar risen sin dominans, likaså försvinner tallarna. Istället är mjukmattehöljor med *Sphagnum cuspidatum* dominerande. Ett gömsle har byggts intill vattensamlingarna. Från Björnbråstjärnen utgår ett par kärrstråk med bladvass och *Sphagnum papillosum* som starka dominanter. De omkringliggande mossarna sträcker ut trädlösa risarmer i kärret. Mot sydost och nordost smalnar kärret av och övergår till ett laggkärr. I detta trädstarrdominerade kärr finns små kuddar av pors och ljung bland vilka tall och glasbjörk slagit rot. Det utdikade området strax söder om ovan nämnda kärr är en skvattramdominerad tallmosse. Enligt flygbilden tycks även resten av det dikade området vara kraftigt risbevuxet. Ytterligare en bit söderut finns ett större kärr där det i mitten har bildats en liten tallmosse. Med undantag av en fläck är kärret fullkomligt täckt av bladvass. Där bladvassen vikit undan växer bl a blåtåtel, ängsull, jungfrulin och ängsvädd. *Sphagnum papillosum* bygger upp mossemattan i hela kärret. Den sydvästra koncentrisk mossen har inte fältinventerats. Mellan strängarna finns, förutom fastmattor, även mjukmattor. I mitten, med dragning åt sydväst, ligger en liten göl. Norr om mossen finns, enligt Backeus (1978), ett artfattigt mjukmattekärr dominerat av flaskstarr och *Sphagnum papillosum*.

Trots att en betydande del av myren är störd av diken har den kvar höga naturvärden. Stora, sammanhängande områden återstår, bl a excentriska mossar, som endast är lokalt påverkade. Myren har ett rikt och intressant fågelliv med ett orrspele som är det största i länet. I Fågelmyrar i Örebro län (1982:1) har den bedömts höra till skyddsklass 1.

10E 1E 01 (0422) KLASS I
STORA GÅSSJÖMOSSEN 3,5 KM O NYSUND

705 ha (690 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -86. Fält -93.
Degerfors kn.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns,
ornitologiska värden.

Delobj. 1: Svagt våldv moss
15 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning. Spänger.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan, barrskog.
Tallmosse av skvattramtyp.

Element 2: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan, blandskog.

Element 3: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan,
glest träd täckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 2: Topogent kärr
65 ha, fördelat på 10 ytor, öppet. Svag lokal
påverkan från anslutande hyggen, dikning, kraftledning.
Spänger.

Element 1: Golv, 40 % av delobjekttytan. Fastm.kärr av
tuvsäv-blåtåtel-vitmosstyp.

Element 1, underelem. 1: Golv, 10 % av delobjekttytan.
Öppet fastmattekärr.

Element 2: Golv, 5 % av delobjekttytan, skogbevuxet,
blandskog.

Element 3: Golv, 39 % av delobjekttytan. Mjukmattekärr,
starr-S. papillosum var.

Element 3, underelem. 1: Tuva, 5 % av delobjekttytan, 1-3 %

krontäckning, blandskog. Öppet fastmattekärr.

Element 3, underelem. 2: Golv, 10 % av delobjekttytan.
Öppet mjukmattekärr.

Element 3, underelem. 3: Golv, 5 % av delobjekttytan.
Mjukmattekärr, starr-S. papillosum var.

Element 4: Golv, 10 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 5: Bäck, 1 % av delobjekttytan.

Element 6: Gungfly, 1 % av delobjekttytan.

Element 7: Golv, 4 % av delobjekttytan, skogbevuxet,
lövskog.

Delobj. 3: Sträng-flarkkärr
5 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 40 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 2: Flark, 45 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 3: Golv, 15 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Koncentrisk mosse
54 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning,
körspår från traktor/skogsmaskin, torvåkt.

Element 1: Sträng, 35 % av delobjekttytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 2: Hölja, 14 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 1 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 4: Göl, 1 % av delobjektytan.

Element 5: Hölja, 20 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 6: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, glest trädäck, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 7: Mosseplan, 15 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 8: Lagg, 1 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 9: Randskog, 3 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 5: Excentrisk mosse
215 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning. Oregelbundet strukturmönster, spänger.

Element 1: Sträng, 1 % av delobjektytan, barrskog. Ristuvmosse av *S. fuscum*typ.

Element 1, underelem. 1: Tuva, 10 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av *S. fuscum*typ.

Element 2: Hölja, 18 % av delobjektytan. Mjukm.mosse, vitag-kallgräs-*S.cuspidatum*typ.

Element 3: Hölja, 4 % av delobjektytan. Höljegöl.

Element 4: Göl, 1 % av delobjektytan.

Element 4, underelem. 1: Vegetation vid gölkant, 1 % av delobjektytan. Mjukmattemosse av vitag-kallgräs-*S.majus*typ.

Element 5: Slukhål, 1 % av delobjektytan.

Element 6: Bäck, 1 % av delobjektytan.

Element 7: Mosseplan, 13 % av delobjektytan, barrskog. Öppen fastmattemosse.

Element 8: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 8, underelem. 1: Randskog, 5 % av delobjektytan, > 25 % krontäckning, barrskog. Tallmosse av skvatramtyp.

Element 9: Dråg, 2 % av delobjektytan. Fastmatta.

Delobj. 6: Tjärn
1 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 7: Svagt välvd mosse
47 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, barrskog. Tallmosse av skvatramtyp.

Element 2: Mosseplan, 24 % av delobjektytan, glest trädäck, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 1 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 8: Excentrisk mosse
291 ha, öppet. Stark generell påverkan från dikning. Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädäck, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, lövskog.

Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Randskog, 6 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 4: Bäck, 1 % av delobjektytan.

Element 5: Göl, 1 % av delobjektytan.

Element 6: Hölja, 15 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 7: Hölja, 10 % av delobjektytan. Lösbottn.

Element 8: Dråg, 2 % av delobjektytan.

Element 9: Sträng, 15 % av delobjektytan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

10E 1F 01 (3224) KLASS 4
NORDÄNDSMOSEN 1,5 KM NO SVARTA

10 ha (10 ha våtm), 135 m ö h. Flygb. -86.
Degerfors kn.
Mycket starkt generellt påverkat av torvtäkt.

10E 1F 02 (3826) KLASS 3
ÄLGSJÖUNGEMOSEN 1,5 KM N SVARTA

25 ha (25 ha våtm), 135 m ö h. Flygb. -86.
Degerfors kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
4 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 5 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 4: Dråg, 15 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
17 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 12 % av delobjektytan, glest trädäck, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Sträng, (otydl.), 1 % av delobjektytan, öppet. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Hölja, 1 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 5: Lagg, 1 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Excentrisk mosse
4 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning. Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Sträng, (otydl.), 3 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 12 % av delobjektytan.

Element 3: Hölja, 20 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Mosseplan, 50 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Randskog, 15 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

**10E 1F 03 (3833) KLASS 3
FINNBROMOSSEN 2 KM NNO SVARTÅ**

23 ha (23 ha våtm), 135 m ö h. Flygb. -86.
Degerfors kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
7 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, glest trädäck, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 2: Topogent kärr
3 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Sluttande mosse
13 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.
Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Sträng, (otyd.), 15 % av delobjekttytan.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 30 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 45 % av delobjekttytan. Vegetationen

domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, glest trädäck, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

**10E 1F 04 (3446) KLASS 3
MYR O NOLSJÖN 3 KM NO SVARTÅ**

19 ha (19 ha våtm), 115 m ö h. Flygb. -86.
Degerfors kn.

Delobj. 1: Mad vid vattendrag 3 ha, öppet.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, kraflledning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjekttytan, barrskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 5 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Tuva, 10 % av delobjekttytan, barrskog.
Fastmatta.

Delobj. 3: Plåtformigt välvd mosse
9 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 20 % av delobjekttytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, öppet, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Randskog, 70 % av delobjekttytan.

10E2C05 Östra Sälsljömossen, 4 km SSO Björneborg

Myren, som snuddar gränsen till Kristinehamns kommun i Värmland, är avsatt som domänreservat. Två smala vägar leder till objektet genom ett barrskogsdominerat område. Berggrunden består i huvudsak av granit. Myren är utdragen i en nord-sydlig riktning och våtmarkstypen är övervägande mossar avgränsade genom öst-västliga kärrdråg. Objektet inventerades i fält den 15 september 1993. Vegetationstyperna i den koncentriska och i de excentriska mossarna är likartade. Ristuvor och vaga rissträngar är glest tallbevuxna. Mellan risen finns fastmattor av *Sphagnum magellanicum* och *Sphagnum balticum* typ. Även mjukmattehöljor är representerade. I höljorna är *Sphagnum majus* den vanligaste mossan. Några få och små lösbottenhöljor utan vegetation är utspridda i objektet. Den mellersta mossen har i mitten en samling gölar. De är distinkt avgränsade av ristuvor. Randskogen är av östlig vegetationstyp d v s skvatramdominerad. Kärr i söder, strax nedan den stora fastmarksholmen, har ett blött mjukmattegolv. Flaskstarr och *Sphagnum papillosum* dominerar. Kärr saknar ställvis bottenvegetation. Det norra kärrdråget är smalt i mitten men vidgar sig åt både öster och väster. Flaskstarr, dvärgbjörk, ängsull och blåttåtel är allmänna men det är bladvassen som är beståndsbildare. Bottenskiktet är så gott som fullständigt täckt av *Sphagnum imbricatum*. Myren har i Fågelmyrar i Örebro län (1982:1) fått skyddsklass 3 för sitt orrspel.

Den höga naturvärdesbedömningen motiveras bl a av att myren är helt opåverkad, flera myrtyper ingår och den är relativt stor.

**10E 2C 05 (4942) KLASS 1
ÖSTRA SÄLSJÖMOSEN 4 KM SSO BJÖRNEBORG**

101 ha (97 ha våtm), 140 m ö h. Flygb. -78. Fält -93.
Degerfors kn.

Domänreservat, ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns, området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Excentrisk mosse
45 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Spänger.

Element 1: Sträng, 25 % av delobjekttytan, barrskog.
Ristuvosmosse av *S. fuscum*typ.

Element 1, underelem. 1: Tuva, 10 % av delobjekttytan,
1-3 % krontäckning, barrskog. Ristuvosmosse av *S. fuscum*typ.

Element 2: Hölja, 14 % av delobjektytan. Mjukmattemosse av vitag-kallgräs-S.majustyp.

Element 3: Hölja, 1 % av delobjektytan. Höljegöl.

Element 4: Hölja, 10 % av delobjektytan. Fastmattemosse av tuvull-S. balticumtyp.

Element 4, underelem. 1: Hölja, 3 % av delobjektytan. Fastm.mosse av tuvull-S. magellanicumtyp.

Element 5: Mosseplan, 20 % av delobjektytan. Fastmattemosse av tuvull-S. balticumtyp.

Element 5, underelem. 1: Mosseplan, 5 % av delobjektytan. Fastm.mosse av tuvull-S. magellanicumtyp.

Element 6: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädäck, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 7: Randskog, 9 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Tallmosse av skvatramtyp.

Element 8: Golv, 1 % av delobjektytan. Mjukmattekärr, starr-S. fallax variant.

Delobj. 2: Koncentrisk mosse
21 ha, öppet. Spänger.

Element 1: Göl, 2 % av delobjektytan.

Element 2: Sträng, 25 % av delobjektytan, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2, underelem. 1: Tuva, 10 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan. Mjukmattemosse av vitag-kallgräs-S.majustyp.

Element 4: Hölja, 5 % av delobjektytan. Fastm.mosse av tuvull-S. magellanicumtyp.

Element 5: Mosseplan, 30 % av delobjektytan. Fastmattemosse av tuvull-S. balticumtyp.

Element 5, underelem. 1: Mosseplan, 5 % av delobjektytan. Fastm.mosse av tuvull-S. magellanicumtyp.

Element 6: Mosseplan, 28 % av delobjektytan, glest trädäck, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse
8 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, barrskog. Tallmosse av skvatramtyp.

Delobj. 4: Topogent kärr
16 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Golv, 10 % av delobjektytan. Öppet fastmattekärr.

Element 2: Golv, 65 % av delobjektytan. Mjukmattekärr, starr-S. papillosum var.

Element 2, underelem. 1: Golv, 20 % av delobjektytan. Mjukmattekärr, starr-S. papillosum var.

Element 2, underelem. 2: Golv, 5 % av delobjektytan. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 3: Golv, 4 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 4: Bäck, 1 % av delobjektytan.

Delobj. 5: Topogent kärr
7 ha, glest trädäck. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

10E 2C 06 (2545) KLASS 3
ULVMYREN 6,5 KM NNV NYSUND

28 ha (28 ha våtm), 130 m ö h. Flygb. -78.
Degerfors kn.

Delobj. 1: Excentrisk mosse
16 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 10 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 49 % av delobjektytan, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Randskog, 30 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 5: Lagg, 1 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
12 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, lövskog. Fastmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

10E 2D 01 (0448) KLASS 3
LÖVBOFALLSMOSSEN 4 KM NO NYSUND

73 ha (62 ha våtm), 90 m ö h. Flygb. -78.
Degerfors kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
5 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 97 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 2 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 3: Lagg, 1 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr
10 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande väg.

Element 1: Golv, blandskog.

Delobj. 3: Tjärn
6 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv.

Delobj. 4: Plåtformigt välvd mosse
39 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan. Vegetationen

domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 4 % av delobjektytan, glest trädäck, barrskog.

Element 3: Lagg, 1 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 4: Randskog, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 5: Topogent kärr

8 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan. Mjukmatta.

**10E 2D 02 (1541) KLASS 2
MYR 200 M V TOMASBRÄTEN, 4 KM N NYSUND**

53 ha (51 ha våtm), 90 m ö h. Flygb. -78.
Degerfors kn.
Ornitologiska värden, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr

8 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, lövskog.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 2: Fuktäng

4 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, lövskog. Örtdominerad vegetation.

Delobj. 3: Tjörn

1 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 4: Topogent kärr

16 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, väg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 5: Svagt våldv moss

23 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, väg.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 14 % av delobjektytan, glest trädäck, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Lagg, (otydl.), 1 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**10E 2D 03 (3910) KLASS 3
MYR 150 M S RÖT, 7,5 KM NN NYSUND**

21 ha (21 ha våtm), 120 m ö h. Flygb. -78.

Degerfors kn.
Åkermark ansluter.

Delobj. 1: Svagt våldv moss

21 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

**10E 2E 01 (3511) KLASS 3
GRÄSMOSSEN 7 KM NNO NYSUND**

22 ha (20 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -78.
Degerfors kn.

Delobj. 1: Platåformigt våldv moss

15 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, glest trädäck, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Randskog, (otydl.), 8 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 4: Lagg, 2 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr

5 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**10E 2E 02 (0108) KLASS 3
NYCKELMOSSEN 4,5 KM NO NYSUND**

22 ha (21 ha våtm), 105 m ö h. Flygb. -78.
Degerfors kn.

Delobj. 1: Platåformigt våldv moss

21 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 45 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Randskog, 50 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Lagg, 5 % av delobjektytan, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**10E 2F 01 (0329) KLASS 3
MYR VID KOPPARTJÄRNE 3 KM NO SVARTÅ**

16 ha (14 ha våtm), 140 m ö h. Flygb. -86.
Degerfors kn.

Delobj. 1: Tjörn
1 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Topogent kärr

3 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från

dikning.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan, barrskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Gungfly, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse

7 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 4: Platåformigt välvd mosse

4 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning. Öregelbundet strukturmönster.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 7 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 3 % av delobjektytan. Lösbottnen.

10E2F02 Stormossen, Rödmossen och Spångkärret, 4 km N Svartå

Myren sträcker sig i en ungefärlig nord-sydlig riktning öster om sjön Ölen. Omgivningarna är skogsdominerade, berggrunden består i huvudsak av metavulkanit. Några smala skogsbilvägar leder fram till myren. Större delen av objektet utgörs av mossar. I nordost är våtmarken mer uppsplittrad och flikig med omväxlande små kärr, mossar och fastmarksholmar. Två stora tjärnar, Laktjärnen i nordost och Stormossetjärnen i väst, rymmer inom objektets gränser. Objektet inventerades i fält den 27 juli 1993. Den excentriska mossen har vagt utbildade rissträngar och, vanligare, ristuvor. Enstaka tallar och en och en annan glasbjörk växer på det vidsträckta mosseplanet. Höljor finns men är inte särskilt frekventa. I mjukmattehöljorna är *Sphagnum cuspidatum* dominerande. I myrens sydöstra del finns ett vassdominerat dråg som slutar i en vattensamling (Backeus 1977). Gölen är omgiven av ett fattigkärr med bl a vitag och *Sphagnum compactum*. Kärren är små och är belägna i myrens periferi. Ett exempel är ett fastmattekärr vid bäcken i norr. Tuvull och blåttåtel samdominerar men även pors och kärrsilja är vanliga. I det sporadiskt utbildade bottenskiktet växer *Sphagnum papillosum*. Laktjärnen håller så smått på att växa igen, mosseöar flyter i vattnet. I tjärnen växer både gul och vit näckros.

Den höga naturvärdesbedömningen motiveras bl a av stora, opåverkade mosseenheter och inslag av flera kärr. Hela myren är för övrigt i det närmaste opåverkad. Myren har dessutom ett rikt fågelliv med bl a orrspel. Den har i Fågelmyrar i Örebro län bedömts höra till skyddsklass 3.

10E 2F 02 (3018) KLASS I STORMOSSEN, RÖDMOSSEN OCH SPÅNGKÄRRET 4 KM N SVARTÅ

135 ha (123 ha våtm), 145 m ö h. Flygb. -86. Fält -77.
Degerfors kn.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns,
området ornitologiskt inventerat, sjö ansluter till högst
24%.

Delobj. 1: Tjärn
6 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Topogent kärr

22 ha, fördelat på 8 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, väg.

Element 1: Gungfly, 2 % av delobjektytan. Mjukmattekärr, starr-S. fallax variant.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan. Mjukmattekärr, starr-S. fallax variant.

Element 2, underelem. 1: Golv, 5 % av delobjektytan. Mjukmattekärr, starr-S. papillosum var.

Element 3: Golv, 50 % av delobjektytan, blandskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåttåtel-vitmosstyp.

Element 3, underelem. 1: Golv, 10 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, blandskog. Öppet fastmattekärr.

Element 4: Bäck, 2 % av delobjektytan.

Element 4, underelem. 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 1 % av delobjektytan. Öppet sumpkärr.

Element 5: Dråg, 5 % av delobjektytan.

Element 6: Golv, 6 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse

10 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 9 % av delobjektytan, gles trädäck, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 1 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Excentrisk mosse

85 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning. Öregelbundet strukturmönster.

Element 1: Göl, 1 % av delobjektytan.

Element 2: Hölja, 20 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjektytan. Lösbottnen.

Element 4: Dråg, 5 % av delobjektytan. Fastmattekärr av tuvull-vitmosstyp.

Element 5: Randskog, (otyd.), 3 % av delobjektytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 6: Sträng, (otydl.), 15 % av delobjektytan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 7: Mosseplan, 20 % av delobjektytan. Fastmatta med ristuvor.

Element 8: Mosseplan, 28 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 9: Lagg, 3 % av delobjektytan. Fastmattekärr av tuvull-vitmosstyp.

Element 9, underelem. 1: Golv, 1 % av delobjektytan. Mjukmattekärr, starr-S. papillosum var.

Delobj. 5: Plåtformigt välvd mosse
6 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Mosseplan, 48 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 2 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Randskog, (otydl.), 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

10E 2F 03 (3411) KLASS 3
MYR N MÖRKESTJÄRNEN 5 KM N SVARTÅ

16 ha (15 ha våtm), 135 m ö h. Flygb. -86.
Degerfors kn. Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
2 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 5 % av delobjektytan. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 2: Plåtformigt välvd mosse
5 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 55 % av delobjektytan. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Hölja, 35 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Randskog, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
8 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Gungfly, 1 % av delobjektytan.

10E 2F 04 (4617) KLASS 2
MYR VID LOMTJÄRNARNA 6,5 KM N SVARTÅ

20 ha (18 ha våtm), 135 m ö h. Flygb. -86.
Degerfors kn.
Domänreservat, ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Tjörn
1 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
10 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, glest trädäck, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaikt
2 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädäck.

Element 1: Golv, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
6 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Gungfly, 25 % av delobjektytan.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 4: Dråg, 5 % av delobjektytan.

10E 2F 05 (1821) KLASS 3
SNÄRMOSSEN 4 KM N SVARTÅ

15 ha (13 ha våtm), 150 m ö h. Flygb. -86.
Degerfors kn.

Delobj. 1: Tjörn
1 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
6 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 5 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
4 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Gungfly, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 4: Sluttande mosse
3 ha, öppet. Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Sträng, 5 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 40 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädäck. Fastmatta med ristuvor.

Element 5: Lagg, 10 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**10E 2F 06 (1827) KLASS 3
MYR VID KORVMOSSETJÄRNE 4 KM NNO SVARTÅ**

10 ha (10 ha våtm), 150 m ö h. Flygb. -86.
Degerfors kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
8 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan, glest trädäck, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
2 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 95 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Gungfly, 5 % av delobjekttytan.

**10E 3C 02 (4047) KLASS 3
HÖKÅSMYREN 2,5 KM O BJÖRNEBORG**

36 ha (33 ha våtm), 155 m ö h. Flygb. -78.
Degerfors kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
24 ha, fördelat på 5 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan, barrskog.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
9 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Bäck, 1 % av delobjekttytan.

Element 2: Golv, 49 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 40 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 4: Golv, 10 % av delobjekttytan, glest trädäck, blandskog. Fastmatta.

**10E 3D 01 (2313) KLASS 2
KYRKMOSSEN, GRYSJÖMOSSEN
OCH RÖPMOSSEN 3 KM V HÖGBERG**

135 ha (129 ha våtm), 150 m ö h. Flygb. -78.
Degerfors kn.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
64 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, anslutande vlg.

Element 1: Mosseplan, 73 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 1 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Lagg, 1 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 4: Mosseplan, 25 % av delobjekttytan, glest trädäck, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 2: Platåformigt välvd mosse
19 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, vlg.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 35 % av delobjekttytan, glest trädäck, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Randskog, (otyd.), 9 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 4: Lagg, 1 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 5: Hölja, 5 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 3: Excentrisk mosse
11 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.
Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 40 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Lagg, 5 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, lövskog.

Element 6: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, glest trädäck, barrskog.

Delobj. 4: Topogent kärr
35 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från vlg.

Element 1: Golv, 35 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 43 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, lövskog.

Element 4: Golv, 5 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, blandskog.

Element 5: Golv, 2 % av delobjekttytan. Lösbotten.

**10E 3D 02 (4117) KLASS 3
RÖRMOSSEN 4,5 KM O BJÖRNEBORG**

25 ha (25 ha våtm), 160 m ö h. Flygb. -78.
Degerfors kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 45 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Excentrisk mosse

18 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Sträng, 10 % av delobjektytan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 3 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 7 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, glest trädäck, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 6: Randskog, 19 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 7: Lagg, 1 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

**10E 3D 03 (2435) KLASS 3
LÅNGSMOSSEN 5,5 KM O BJÖRNEBORG**

32 ha (32 ha våtm), 155 m ö h. Flygb. -78.
Degerfors kn.

Delobj. 1: Topogent kärr

8 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet.
Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, lövskog.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, glest trädäck, lövskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Excentrisk mosse

24 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande soptipp, dikning.

Element 1: Sträng, 25 % av delobjektytan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 14 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Hölja, 1 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 5: Mosseplan, 25 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 6: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, glest trädäck, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 7: Randskog, 9 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 8: Lagg, (otydl.), 1 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**10E 3D 04 (1901) KLASS 4
KOLPMOSSEN 4 KM SO BJÖRNEBORG**

20 ha (19 ha våtm), 160 m ö h. Flygb. -78.
Degerfors kn.

Delobj. 1: Tjörn

1 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse

19 ha, glest trädäck.

Element 1: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 28 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Lagg, 1 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 5: Lagg, 1 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

**10E 3F 01 (2037) KLASS 3
RÅMOSEN 9 KM NNO SVARTÅ**

11 ha (11 ha våtm), 145 m ö h. Flygb. -86.
Degerfors kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

11 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaikt
5 ha, glest trädäck.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

**10E 4D 01 (3411) KLASS 2
STORA VISMOSSEN 4 KM NV STRÖMTORP**

53 ha (50 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -78.
Degerfors kn.

Delobj. 1: Plåtformigt välvd mosse

30 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 67 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 13 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Tuva, 2 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, glest trädäck, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Dråg, 3 % av delobjektytan.

Element 6: Randskog, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse

4 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
16 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande järnväg, anslutande väg.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 4: Golv, 35 % av delobjektytan, glest träd täckt, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**10E 4D 02 (3722) KLASS 3
TJURVALLEN 3 KM NV STRÖMTORP**

36 ha (33 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -78.
Degerfors kn.

Delobj. 1: Platåformigt välvd mosse
22 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 10 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 4 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Randskog, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 5: Lagg, 1 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
11 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, kraftledning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 44 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Bäck, 1 % av delobjektytan.

Element 4: Golv, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

**10E 4D 03 (2434) KLASS 3
MYR 100 M V GRÄSMOSSEN, 6 KM NO BJÖRNEBORG**

26 ha (26 ha våtm), 115 m ö h. Flygb. -78.
Degerfors kn.

Delobj. 1: Platåformigt välvd mosse
26 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, stark lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest träd täckt, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Randskog, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

10E 4D 04 (2029) KLASS 3

STORA MOSSEN 500 M V GRÄSHOLMEN, 5,5 KM NO BJÖRNEBORG

22 ha (22 ha våtm), 115 m ö h. Flygb. -78.
Degerfors kn.

Delobj. 1: Excentrisk mosse
12 ha, öppet. Stark lokal påverkan från dikning. Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Sträng, (otydl.), 5 % av delobjektytan.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 64 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 5: Randskog, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 6: Lagg, (otydl.), 1 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande järnväg.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, lövskog. Fastmatta.

**10E 4D 05 (1920) KLASS 3
STUTMYREN 5 KM NO BJÖRNEBORG**

38 ha (38 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -78.
Degerfors kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
18 ha, fördelat på 5 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, glest träd täckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande järnväg, väg.

Element 1: Bäck, 1 % av delobjektytan.

Element 2: Tuva, 4 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 3: Golv, 55 % av delobjektytan, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Golv, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 5: Golv, 35 % av delobjektytan, lövskog. Fastmatta.

**10E 4E 01 (3707) KLASS 2
MYR 100 M O LILLA STRÖMTORP, 2 KM N DEGERFORS**

90 ha (90 ha våtm), 105 m ö h. Flygb. -78.
Degerfors kn.

Ingår i ängs- och hagmarksinventering, ingår i

naturvårdsplan. Åkermark ansluter, sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

34 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från krafledning, anslutande annan täkt, stark lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 65 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjekttytan, glest trädtyckt, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan, öppet, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 2: Strandäng

18 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning. Området är beteshävdad.

Element 1: Golv, 67 % av delobjekttytan, lövskog. Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 25 % av delobjekttytan, lövskog. Örtdominerad vegetation.

Element 3: Golv, 5 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, lövskog.

Element 4: Bäck, 3 % av delobjekttytan.

Delobj. 3: Bevuxen sjö

38 ha, öppet.

Element 1: Golv. Vattenvegetation.

10E 4F 03 (1041) KLAS 3
LÅNGMYREN 600 M V KOJA, 4 KM SO KNUTSBOL

35 ha (31 ha våtm), 130 m ö h. Flygb. -88.
Degerfors kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

3 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Topogent källr

11 ha, fördelat på 7 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 19 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Bäck, 1 % av delobjekttytan.

Element 4: Golv, 10 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, lövskog.

Delobj. 3: Sluttande mosse

17 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning. Öregelbundet strukturmönster.

Element 1: Sträng, 5 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 55 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Dråg, 10 % av delobjekttytan.

Element 5: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan. Fastmatta med ristuvor.

10E4G01 Örgivsmossen

Objektet ligger strax öster om sjön Örgiven i ett barrskogsdominerat område. Berggrunden utgörs huvudsakligen av granit. En smal skogsbilväg stryker längs myrens östra kant. Myren består av två olikstora delar, sammanbundna av en smal kärrarm. Den västra delen är trattformig och domineras av en mosse med ett kärrparti centralt. Den östra består i huvudsak av en tallmose med en liten tjärn. En liten flik av myren når in i Karlskoga kommun. Över hela den excentriska mossen finns rissträngar och ristuvor men strängarna är vagt utbildade. Tuvorna flyter ibland samman till en vid matta. Blötare partier är insprängda bland risen. I mjukmattehöljorna växer främst *Sphagnum majus* och *Sphagnum cuspidatum*, vitag och dystarr är dominerande bland kärlväxterna. I de fastmattor som inte riset har koloniserat är tuvull den vanligaste i fältskiktet och *Sphagnum balticum* och *Sphagnum tenellum* i bottenskiktet. Lösbottnarna bildar här och var ett nättliknande mönster. I väster finns en stor, trädbevuxen fastmarksholme. Strax sydväst om denna ligger ett litet, relativt rikt, kärr där låga glasbjörkar dominerar det mer eller mindre slutna trädskiktet. Bland kärlväxterna är trädstarren vanligast men här växer även storsileshår, snip och några exemplar av den lilla orkiden myggblomster. Bottenskiktet har inte en enskild art som dominant. Bland mossorna kan *Sphagnum palustre*, *Sphagnum fallax* och, enligt Backeus 1977, den mindre allmänna *Plagiomnium ellipticum* nämnas. Vid fastmarksholmens östra kant ligger Örgivskällan men vattnet här har stagnerat, troligen sedan en lång tid tillbaka. Det stora kärrstråket i den centrala delen sträcker ut två armar över myren, den ena åt väster den andra åt sydväst. Tuvor, fastmattor, mjukmattor och lösbottnar ger det fattiga kärret ett varierat intryck.

Örgivsmossen är helt opåverkad av hydrologiska ingrepp och är komplext uppbyggd med flera myrtyper och innehåller även en rikare miljö. Myren har ett intressant fågelliv. Den har i Fågelmyrar i Örebro län (1982:1) bedömts höra till skyddsklass 3.

10E 4G 01 (0208) KLASS 1
ÖRGIIVSMOSSEN 6 KM SV VILLINGSBERG

76 ha (74 ha våtm), 135 m ö h. Flygb. -86. Fält -93.
Degerfors kn.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns,
området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Topogent kärr
11 ha, fördelat på 5 ytor, öppet.

Element 1: Gungfly, 15 % av delobjekttytan.

Element 2: Golv, 45 % av delobjekttytan, lövskog. Mjukmatte.

Element 2, underelem. 1: Golv, 10 % av delobjekttytan.
Mjukmattekärr, starr-S. fallax variant.

Element 3: Golv, 30 % av delobjekttytan. Mjukmattekärr,
starr-S. papillosum var.

Element 3, underelem. 1: Golv, 10 % av delobjekttytan.
Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 4: Golv, 10 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Delobj. 2: Svagt våld mosse
12 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjekttytan, barrskog.
Tallmosse av ristyp.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan, glest
träddäckt, barrskog. Fastmatte med ristuvor.

Delobj. 3: Topogent kärr
12 ha, öppet.

Element 1: Golv, 20 % av delobjekttytan. Fastm.kärr,tuvsäv-
S.papillosum-compactumtyp.

Element 1, underelem. 1: Tuva, 5 % av delobjekttytan, 1-3 %
krontäckning, blandskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Golv, 30 % av delobjekttytan. Öppet
mjukmattekärr.

Element 3: Golv, 50 % av delobjekttytan. Öppet
lösbottenkärr.

Delobj. 4: Tjörn
1 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 5: Topogent kärr
4 ha, fördelat på 3 ytor, glest träddäckt.

Element 1: Golv, lövskog. Gran-björkkärr av fattig
vitmosstyp.

Delobj. 6: Excentrisk mosse
35 ha, öppet. Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Sträng, (otydl.), 1 % av delobjekttytan,
barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Hölja, 20 % av delobjekttytan. Mjukmattemosse av
vitag-kallgräs-S.majustyp.

Element 3: Hölja, 7 % av delobjekttytan. Höljegöl.

Element 4: Göl, 3 % av delobjekttytan.

Element 5: Mosseplan, 25 % av delobjekttytan, barrskog.
Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 6: Mosseplan, 20 % av delobjekttytan.
Fastmattemosse av tuvull-S. balticumtyp.

HALLSBERG



**09E 8H 01 (0535) KLASS 2
FINNAFALLSMOSSEN 5 KM O LAXÅ**

76 ha (74 ha våtm), 130 m ö h. Flygb. -88.
Hallsbergs kn.
Ingår i naturvårdsplan. Botaniska värden, litteratur om objektet finns, området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Platåformigt vålvd mosse
45 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning, torvtäkt.

Element 1: Göl, 1 % av delobjekttytan.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 40 % av delobjekttytan. Fastmatta med ristuvor.

Element 4: Sträng, 10 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 5: Mosseplan, 25 % av delobjekttytan, gles trädäck, barrskog. Fastmatta.

Element 6: Randskog, 5 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 7: Lagg, 5 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 8: Lagg, 4 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent klirr
7 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från

dikning, svag lokal påverkan från anslutande dikning.
Element 1: Golv, 60 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
15 ha, fördelat på 2 ytor. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 4: Tjärn
1 ha. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjekttytan.

Element 2: Gungfly, 20 % av delobjekttytan.

Delobj. 5: Svagt vålvd mosse
7 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

**09E 8H 02 (4017) KLASS 4
MYR 100 M N STAVÅNA, 4,5 KM NO LAXÅ**

20 ha (20 ha våtm), 85 m ö h. Flygb. -88.
Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Sumpskog
20 ha. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, blandskog.

09E9J01

Våtmarker vid Vibysjön, 100 m N Vretstorp

Objektet har inte inventerats i fält. Naturvärdesbedömningen och beskrivningen bygger på flygbildstolkning samt uppgifter från litteratur. Vibysjön ligger i ett öppet odlingslandskap på en berggrund som domineras av sandsten. Med få undantag är det åkermark som ansluter till sjön. En väg leder förbi sjön, från Vretstorp och norrut, längs dess västra sida. Slättsjön har sänkts och är nu grund och näringsrik. Vassvegetationen förekommer som en bred bård utmed hela sjön. Mellan den utanföriggande åkermarken och vassen finns en zon med strandskog och små öppna gläntor. I dag beteshävdas endast delar i norr, i framtiden är det tänkt att hela området ska betas. Enligt Naturvårdsöversikten (1984) är sjön med sin rika vegetation och sitt rika fågelliv en av länets värdefullaste slättsjöar. I Madmarker i Örebro län (1980:2) nämns bl a att ett tiotal arter häckar i området samt att det är en rast-lokal för andfåglar, den hör där till klass 3.

Den höga naturvärdesbedömningen motiveras bl a av storleken, hävden och fågellivet.

**09E 9J 01 (2412) KLASS 1
VÅTMARKER VID VIBYSJÖN 100 M N VRETSTORP**

99 ha (99 ha våtm), 60 m ö h. Flygb. -88.
Hallsbergs kn.
Ingår i ängs- och hagmarksinventering, ingår i naturvårdsplan. Åkermark ansluter, ornitologiska värden, sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Strandäng
15 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande väg. Området är beteshävdad.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Limnogen strandsumpskog
19 ha, fördelat på 6 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjekttytan, lövskog.

Området är beteshävdad.

Element 2: Golv, 3 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 3: Golv, 37 % av delobjekttytan, lövskog.

Delobj. 3: Vassar
65 ha, öppet. Öppna vattenytor i vassar.

Element 1: Golv. Vassvegetation.

**09F 4F 01 (4325) KLASS 3
HJÄRTSJÖMOSSAN OCH ORRLÄTTEN 6 KM NV LJUS-
FALLSHAMMAR**

122 ha (106 ha våtm), 95 m ö h. Flygb. -83.
Hallsbergs kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

12 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan, blandskog.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, öppet, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 2: Excentrisk mosse

64 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande järnväg. Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Sträng, 10 % av delobjekttytan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 5 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 2 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 4: Hölja, 13 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 5: Mosseplan, 29 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 6: Randskog, 10 % av delobjekttytan, skogsbevuxet.

Element 7: Mosseplan, 25 % av delobjekttytan, glest träd täckt, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 8: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan, glest träd täckt, lövskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 9: Lagg, (otydl.), 1 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Platåformigt välvd mosse

8 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, torvtäkt.

Element 1: Dråg, 2 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 2: Mosseplan, 58 % av delobjekttytan, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 35 % av delobjekttytan, glest träd täckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 4: Lagg, (otydl.), 1 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 5: Lagg, 4 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, lövskog.

Delobj. 4: Topogent kärr

23 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 62 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 3: Golv, 25 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 4: Golv, 3 % av delobjekttytan, glest träd täckt, barrskog. Fastmatta.

09F 4F 02 (3132) KLASS 3

MYR 400 M NV BRÅTEN, 5 KM NV LJUSFALLSHAMMAR

12 ha (12 ha våtm), 90 m ö h. Flygb. -83. Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Topogent kärr

12 ha, glest träd täckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 98 % av delobjekttytan, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Bäck, 2 % av delobjekttytan, öppet.

09F 4F 03 KLASS 1
TROLLEFLODS MOSSE

Se Östergötlands län nr 09F 4F 01 Biberghärrn 19 km NV Hällestad

09F 5E 02 (3833) KLASS 3
KÄRR 500 M SV GRYS BRUK, 10 KM NO MARIEDAMM

2322 ha (18 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -83. Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Tjärn
3 ha. Restsjö.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Topogent kärr

18 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 15 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 2: Golv, 25 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 55 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Tuva, 5 % av delobjekttytan. Fastmatta.

09F 5F 01 (3014) KLASS 3
LORTÄNGARNA 2,5 KM SV HJORTKVARN

41 ha (41 ha våtm), 95 m ö h. Flygb. -83. Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Platåformigt välvd mosse
25 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 82 % av delobjekttytan. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Randskog, (otydl.), 4 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 4: Lagg, (otydl.), 4 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse

16 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande järnväg, väg.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

09F 5F 02 (1706) KLASS 3
MYR VID BJÖRNHAMMAREN, 4 KM SV HJORTKVARN

16 ha (16 ha våtm), 95 m ö h. Flygb. -83. Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Fuktäng
6 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Golv, 75 % av delobjekttytan. Örtdominerad vegetation.

Element 2: Bäck, 10 % av delobjekttytan.

Element 3: Golv, 15 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, lövskog.

Delobj. 2: Obestämbär våtmark
10 ha, öppet. Stark generell påverkan från dikning, torvtäkt, svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv.

09F 5F 03 (2030) KLASS 3
VÅTMARK 100 M O LILLA EMMA, 2 KM O BJÖRNHAM-
MAREN

18 ha (18 ha våtm), 95 m ö h. Flygb. -83.
Hallsbergs kn.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
2 ha, skogsbevuxet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Strandäng
6 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
10 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 90 % av delobjekttytan, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, lövskog.

09F5G01 Tärnsmossen, Rönnbärsmossen och Svinkärret, 3 km SO Hjortkvarn k:a

Myren ligger sydväst om sjön Avern, strax norr om länsgränsen. Skogsmark omger myren, berggrunden utgörs i huvudsak av kvartsporfyr, metasediment och granit. Objektet inventerades i fält den 9 augusti 1993. Myren är flikig och uppsplittrad av skogsklädda fastmarkstungor och fastmarksholmar. Större delen byggs upp av mossmark. Den norra delen kallas Svinkärret, men är trots sitt namn ombrotrof. Mossarna är, med undantag av några fläckar, tallbevuxna. I fältskiktet dominerar skvatram. Små, fattiga kärr avbryter mossedominansen. Rönnbärsmossen ligger strax söder om Svinkärret. Det är en platåmosse med randskog och lagg. Mosseplanet är tuvig av risvegetation. Mjukmattehöljor med *Sphagnum cuspidatum* och *Sphagnum tenellum* ligger insprängda här och var på mosseplanet. Tärnsmossen upptar den största arealen, även den är en platåmosse. I kärret vid gården Österängen rinner en bäck och vegetationen är inte lika fattig som i de övriga kärren. Golvet är ställvis mycket blött och mjukmattor upptar större delen av ytan. Trådstarren är den dominerande kärlväxten, andra vanliga arter är bl a kärrsilja, kråklöver, kärrviol och blodrot.

Den höga naturvärdesbedömningen motiveras bl a av att de ingående delobjekten alla är representativa för regionen, platåmossarna har en betydande storlek och att myren är relativt opåverkad, dikena är vanligen igenväxta.

09F 5G 01 (3815) KLASS 1
TÄRNSMOSEN, RÖNNBÄRSMOSEN OCH SVINKÄRRET
3 KM SO HJORTKVARN KA

315 ha (275 ha våtm), 90 m ö h. Flygb. -83. Fält -93.
Hallsbergs kn.
Ingår i naturvårdsplan, ingår i SNV:s övers. inv. 1979.
Mosaik med fastmark.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
100 ha, fördelat på 10 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från avverkning, anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning. Mosaikartad fördelning av våtmarkstyper.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjekttytan. Tallmosse av skvatramtyp.

Element 2: Golv, 20 % av delobjekttytan.

Element 3: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, öppet. Fastmatta.

Delobj. 2: Platåformigt välvd mosse
99 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Randskog, 10 % av delobjekttytan. Tallmosse av skvatramtyp.

Element 2: Lagg, 10 % av delobjekttytan. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 3: Mosseplan, 30 % av delobjekttytan. Ristuvmosse av *S. fuscum*typ.

Element 4: Mosseplan, 30 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog. Tallmosse av ristyp.

Element 5: Sträng, 10 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta med ristuvor.

Element 6: Hölja, 10 % av delobjekttytan. Fastmattemosse av tuvull-*S. balticum*typ.

Element 6, underelem. 1: Hölja, 5 % av delobjekttytan. Mjukm.mosse, vitag-kallgräs-*S.cuspidatum*typ.

Delobj. 3: Topogent kärr
45 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från avverkning, svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning. Mosaikartad fördelning av våtmarkstyper.

Element 1: Golv, 80 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjekttytan. Lösbottn.

Delobj. 4: Topogent kärr

15 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 0: Bäck, 5 % av delobjekttytan.

Element 1: Golv, 35 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 1, underelem. 1: Vegetation utmed mindre vattendrag, 5 % av delobjekttytan. Öppet sumpkärr.

Element 2: Golv, 30 % av delobjekttytan. Sumpkärr av högstarr-örttyp.

Element 2, underelem. 1: Tuva, 5 % av delobjekttytan, 4-10 % krontäckning, lövskog. Sumpkärr av högstarr-örttyp.

Element 3: Golv, 30 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Delobj. 5: Svagt välvd mosse

15 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning, torvtäkt. Mosaikartad fördelning av våtmarkstyper.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, glest träddäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 6: Tjärn

1 ha.

Element 1: Restsjö, 95 % av delobjekttytan. Permanent öppet vatten.

Element 2: Gungfly, 5 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

09F5G02**Spångmossen och Mårtena, 2,5 km S Hjortkvarn**

Objektet, som omges av skog, ligger på en granodiorit och kvartsitdominerad berggrund. Flera smala skogbilvägar leder fram till myren. Gränsen till Östergötland löper genom större delen av objektet. Den västra delen kallas för Spångmossen, den domineras av minerotrof torvmark. Den östra delen, Mårtena, domineras av ombrotrof torvmark. Objektet inventerades i fält den 16 augusti 1993. Mårtenas svagt välvda mosse är tallbevuxen och risdominerad. Längst i öster övergår den till ett kärr, som inte har inventerats. Det tycks dock vara ett fastmattekärr med blöta inslag. Över Spångmossens östra del sträcker sig en kraftledning, under den ligger spänger. Fastmattegolvet är buskigt av martallar. I fältskiktet är trädstarren allmän men bladvassen är ställvis dominant. I bottenskiktet växer ymnigt av *Sphagnum papillosum*. Små blöta fläckar utan bottenvegetation ligger insprängda i fastmattan. Vid Spångtorpet rinner Emmaån och vid dess sida ligger en mad som tyvärr är dikespåverkad. Golvet är glest trädbbevuxet och vegetationen i fältskiktet i armbågshöjd och starkt tuvad. I fältskiktet växer bl a pors, blåttåtel, älgört och kärrsilja. Längre norrut minskar inslaget av träd och buskar. Bottenskiktet är mycket sporadiskt utbildat.

Att flera våtmarkstyper finns representerade, kärrrens och mossens storlek samt att myren, med undantag av maden och sumpskogen, är relativt opåverkad är några faktorer som utgör grunden till den höga naturvärdesbedömningen.

**09F 5G 02 (2002) KLASS 1
SPÅNGMOSSEN OCH MÅRTERNA,
2,5 KM S HJORTKVARN**

180 ha (166 ha våtm), 90 m ö h. Flygb. -83. Fält -93. Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Sumpskog

7 ha, fördelat på 2 ytor. Svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Mad vid vattendrag

43 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande väg.

Element 1: Golv, 70 % av delobjekttytan, lövskog. Sumpkärr av högstarr-örttyp.

Element 2: Bäck, 20 % av delobjekttytan.

Element 3: Golv, 10 % av delobjekttytan, glest träddäckt, lövskog.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse

52 ha, fördelat på 5 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, väg.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjekttytan, barrskog. Tallmosse av ristyp.

Element 2: Lagg, 10 % av delobjekttytan.

Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 20 % av delobjekttytan, öppet. Fastmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr

64 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, väg, anslutande väg.

Element 1: Golv, 55 % av delobjekttytan, lövskog. Öppet fastmattekärr.

Element 2: Golv, 15 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Bäckdråg. Öppet sumpkärr.

**09F 5G 03 (2844) KLASS 2
KASTMOSSEN 5,5 KM SO HJORTKVARN**

20 ha (20 ha våtm), 90 m ö h. Flygb. -83. Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

12 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr

5 ha, öppet.

Element 1: Bäck, 5 % av delobjekttytan.

Element 2: Golv, 45 % av delobjektytan, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 50 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
3 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Golv, lövskog.

09F6F01 Glottrakärret och Venerna, 500 m V Hjortkvarn

Väster om Hjortkvarn ligger ett vackert översvåmningskärr. Omgivningarna är dominerande av barrskog och berggrunden utgörs i huvudsak av granit. Objektet inventerades i fält den 16 augusti 1993. Genom kärret slingrar sig Haddeboån som strax innan sågverket dämms upp till en liten sjö. Den nordvästra delen kallas för Glottrakärret, längre nedströms byter maden namn till Venerna. Det vidsträckta översvåmningskärret täcker en stor yta. Kantzonerna är trädbevuxna men i övrigt är kärret så gott som fritt från träd. Kärrgolvet är huvudsakligen en blöt mjukmatta. Det är svårframkomligt och på sina håll olämpligt att beträda. Venerna är något torrare än Glottrakärret men vegetationssammansättningarna är i stort sett likartade. Trådstarr och *Sphagnum papillosum* är de härskande arterna. De mer krävande arterna representeras bl a av hästsvans och *Pseudobryum cinclidioides*. Väster om Transundet har en mindre tallrismosse bildats men så gott som alla tallar har dött. Enligt Fågelmyrar i Örebro län (1982:1) är översvåmningskärret en av de mest intressanta fågellokalerna i sydöstra Närke med bl a en mängd tranor, klass 3. Med undantag av en liten utdikad fuktäng i anslutning till kärret, tippmassor i sydöst från sågverket och dämmen i Haddebobäcken är objektet opåverkat.

Den höga naturvärdesbedömningen motiveras främst av den stora areal som översvåmningskärret utgörs av. Glottrakärret och Venerna ingår i Myrskyddsplan för Sverige.

9F 6F 01 (1617) KLASS 1 GLOTTAKÄRRET OCH VENERNA, 500 M V HJORTKVARN

140 ha (135 ha våtm), 90 m ö h. Flygb. -82. Fält -93.
Hallsbergs kn.
Ingår i naturvårdsplan, ingår i SNV:s övers. inv. 1979.

Delobj. 1: Mad vid vattendrag
107 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande soptipp, anslutande hyggen, stark generell påverkan från dämning, svag lokal påverkan från dikning. Leveer utmed vattendraget, meandring.

Element 1: Golv, 20 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 2: Golv, 52 % av delobjektytan. Mjukm.kärr av örtstarr-vitmoss-brunmossstyp.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan. Lösbottom.

Element 4: Bäck, 3 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Svagt våldv moss
7 ha, glest träd täckt.

Element 1: Mosseplan. Tallmoss av ristyp.

Delobj. 3: Topogent kärr
3 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, lövskog. Granbjörkkärr.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, barrskog.

Delobj. 4: Fuktäng
6 ha, öppet. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv. Fastmatta.

09F 6F 02 (0106) KLASS 3 GRYTSTORPSSMOSEN MED FLERA MYRAR, 3 KM V HJORTKVARN

48 ha (46 ha våtm), 115 m ö h. Flygb. -82.
Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Svagt våldv moss
25 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Element 2: Lagg, 1 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
18 ha, fördelat på 6 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, kraftledning.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, lövskog. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
3 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, lövskog.

09F 6F 03 (1203) KLASS 3 SMÄRISMOSSEN 3 KM ONO HJORTKVARN

17 ha (15 ha våtm), 120 m ö h. Flygb. -82.
Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Svagt våldv moss
8 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, glest träd täckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr

7 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 96 % av delobjektytan, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 4 % av delobjektytan. Fastmatta.

**09F 6H 01 (3018) KLASS 3
KOBÄCKSMOSSEN 3 KM OSO BO**

11 ha (10 ha våtm), 85 m ö h. Flygb. -82.
Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Svagt våldv moss

10 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 94 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 5 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Element 3: Gungfly, 1 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 2: Tjärn

1 ha. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv.

**09F 7D 01 (3941) KLASS 3
KORTORPA MOSSE 6,5 KM SO TISARSTRAND**

13 ha (13 ha våtm), 145 m ö h. Flygb. -82.
Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Svagt våldv moss

13 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, anslutande dikning.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 29 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 1 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**09F 7E 01 (2905) KLASS 3
STORA MOSSEN 500 M N LILLA HJÄRTA, 6,5 KM NO
NÄRKESBERG**

26 ha (25 ha våtm), 135 m ö h. Flygb. -82.
Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Svagt våldv moss

12 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 19 % av delobjektytan, glest trädäck, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, (otyd.), 1 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr

9 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 10 % av delobjektytan, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 75 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 3: Obestämbbar myr

4 ha, glest trädäck. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark generell påverkan från dikning, svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, lövskog.

**09F 7E 02 (3320) KLASS 2
FÅGLAMOSSEN 9,5 KM S PÅLSBODA**

34 ha (30 ha våtm), 145 m ö h. Flygb. -82.
Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Topogent kärr

3 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 2: Tjärn

1 ha.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan.

Element 2: Gungfly, 50 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Svagt våldv moss

27 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, anslutande kraftledning, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 12 % av delobjektytan, glest trädäck, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Mosseplan, 3 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Lagg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**09F 7E 03 (2549) KLASS 2
ORRMOSSEN OCH SANKA KÄRRET 7 KM N GRYTS
BRUK**

60 ha (59 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -82. Fält -77.
Hallsbergs kn.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Topogent kärr

23 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 1 % av delobjektytan. Tallmoss av skvatramtyp.

Element 2: Golv, 65 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 2 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 4: Golv, 2 % av delobjektytan, skogsbevuxet, lövskog. Fastmatta.

Element 5: Golv, 30 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Excentrisk moss

36 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, torvtäkt.

Element 1: Sträng, (tydliga), 2 % av delobjekttytan, barrskog. Ristuvmosse av *S. fuscum*typ.

Element 2: Hölja, 20 % av delobjekttytan. Fastmattemosse av *tuvull-S. balticum*typ.

Element 3: Hölja, 14 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan, glest träd täckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 5: Lagg, 1 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 6: Randskog, 25 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 2: Golv. Öppet sumpkärr.

Element 2, underelem. 1: Golv, 20 % av delobjekttytan. Sumpkärr av högstarr-örttyp.

Element 2, underelem. 2: Golv, 5 % av delobjekttytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 5: Golv. Öppet kärr.

**09F 7E 04 (0145) KLASS 3
TÄRNMOSSEN 4,5 KM N GRYTS BRUK**

86 ha (73 ha våtm), 115 m ö h. Flygb. -82.
Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Tjärn
3 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Obestämbbar mosse
44 ha, skogsbevuxet. Stark generell påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
11 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 27 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Gungfly, 3 % av delobjekttytan.

Delobj. 4: Svagt våld mosse
18 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 23 % av delobjekttytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 2 % av delobjekttytan, glest träd täckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

**09F 7E 05 (3441) KLASS 3
LINDSNÄREMOSSEN 9,5 KM S PÅLSBODA**

25 ha (24 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -82.
Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Topogent kärr

13 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, väg.

Element 1: Golv, 80 % av delobjekttytan, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, lövskog.

Element 3: Golv, 5 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Svagt våld mosse

11 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, glest träd täckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 3: Tjärn
1 ha.

Element 1: Golv.

**09F 7E 06 (2938) KLASS 3
SPÅNGMOSSEN 7,5 KM N GRYTS BRUK**

12 ha (12 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -82.
Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Svagt våld mosse
5 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, 98 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 2 % av delobjekttytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 82 % av delobjekttytan, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

**09F 7E 08 (1907) KLASS 3
MYR 100 M V LILLA HJÄRTA, 7,5 KM NV GRYTS BRUK**

14 ha (13 ha våtm), 120 m ö h. Flygb. -82.
Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Topogent kärr

7 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Bäck, 2 % av delobjekttytan, öppet.

Element 2: Golv, 70 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 3: Golv, 8 % av delobjekttytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Golv, 20 % av delobjekttytan, glest träd täckt, lövskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr

6 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 40 % av delobjekttytan, lövskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 60 % av delobjekttytan, lövskog. Mjukmatta.

Kamperhultkärret har inte inventerats i fält. Naturvärdesbedömningen och beskrivningen grundas på flygbildstolkning samt uppgifter från litteratur. Objektet har med sin östra sida kontakt med Bjurhultsjön. I omgivningarna växer barrskog på en berggrund dominerad av metasediment med diabas. Sjömad och lövsumpskog är de våtmarkstyper som täcker den största arealen i objektet. Ombrotrof torvmark finns men i liten omfattning. Ett par stora fastmarksholmar avbryter våtmarksdominansen. Maden hör till rikkärren. Golvet är närmast sjön ett oframkomligt gungfly. Längre bort från den öppna vattenytan blir golvet torrare. Det består fortfarande av mjukmattor men också av fastmattor. I bottenkiktet växer rikligt med mossor som karaktäriserar en rik miljö, bl a *Scorpidium scorpioides*, *Warnstorfia procerus* och *Calliergon megalophyllum* (Backeus 1978). I fältskiktet dominerar bladvass med inslag av bl a såsom tråd- och flaskstarr, kärrsilja, gräsull och snip (Eriksson 1985). De svagt välvda mossarna är tallbevuxna med ett fältskikt dominerat av skvattram.

Naturvärdesbedömningen motiveras främst av madens storlek, att objektet är relativt opåverkat samt den rika miljön.

**09F 7F 01 (3145) KLASS 1
KAMPERHULTKÄRRET 7,5 KM SSO SVENNEVAD KA**

80 ha (70 ha våtm), 105 m ö h. Flygb. -81. Fält -85.
Hallsbergs kn.
Ingår i naturvårdsplan, ingår i SNV:s övers. inv. 1979.
Botaniska värden, rikkärr.

Delobj. 1: Mad vid sjö
20 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, sjö ansluter till högst 24%.

Element 1: Golv, 30 % av delobjekttytan, lövskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjekttytan. Sumpkärr av högstarr-örttyp.

Element 3: Golv, 30 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Delobj. 2: Plåtformigt välvd mosse
20 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Element 2: Lagg, (otyd.), 5 % av delobjekttytan.

Element 3: Randskog, (otyd.), 5 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 4: Randskog, 5 % av delobjekttytan, lövskog.

Delobj. 3: Sumpskog
30 ha. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 90 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Golv, 10 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 1: Mosseplan. Tallmosse av skvatramtyp.

**09F 7F 02 (3211) KLASS 2
MYR VID GLOTTASJÖN 5 KM S SVENNEVAD**

19 ha (19 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -82.
Hallsbergs kn.
Sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

14 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 10 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Mad vid sjö
5 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv.

**09F 7F 03 (1349) KLASS 3
HARGA LÅNGMOSSE 3,5 KM NV BO**

12 ha (12 ha våtm), 105 m ö h. Flygb. -81.
Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
12 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan, öppet.
Fastmatta.

Element 3: Lagg, 10 % av delobjekttytan, öppet. Fastmatta.

**09F 7F 04 (3801) KLASS 3
OMMEKÄRRSMOSSEN 4,5 KM SSV SVENNEVAD**

29 ha (29 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -82.
Hallsbergs kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
16 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 3: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, lövskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjekttytan, glest trädträtt, blandskog. Fastmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

**09F 7G 01 (0302) KLASS 3
HARGA MOSSE OCH HARGAKÄRRET 2,5 KM NV BO**

15 ha (14 ha våtm), 90 m ö h. Flygb. -81.
Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Sumpskog
2 ha. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Svagt vålvd mosse
12 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning, stark lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjektytan. Fastmatta.

**09F 7G 02 (2419) KLASS 3
ORRMOSSEN 4 KM NV BO**

9 ha (9 ha våtm), 90 m ö h. Flygb. -81.
Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Svagt vålvd mosse
9 ha, glest träddäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 92 % av delobjektytan, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Lagg, 5 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Lagg, 3 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

**09F 7G 03 (2219) KLASS 3
VATTENBRÅTARNA 3 KM N BO**

15 ha (14 ha våtm), 100 m ö h. Flygb. -81.
Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
14 ha, glest träddäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan, lövskog. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 30 % av delobjektytan, öppet.

**09F 7G 04 (1833) KLASS 3
HÄSTRUMPAN 2,5 KM N BO**

8 ha (8 ha våtm), 95 m ö h. Flygb. -81.
Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
3 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, glest träddäckt, lövskog.

Delobj. 2: Svagt vålvd mosse
5 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan. Risvegetation.

Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Lagg, 5 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**09F 7G 05 (1242) KLASS 3
MYR VID STORA KRINGSJÖN 2 KM NNO BO**

23 ha (22 ha våtm), 95 m ö h. Flygb. -81.
Hallsbergs kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan, glest träddäckt, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, lövskog. Fastmatta.

**09F 7G 06 (0444) KLASS 3
STORA MOSSEN S STORA KRINGSJÖN, 1,5 KM NO BO**

12 ha (12 ha våtm), 90 m ö h. Flygb. -81.
Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Svagt vålvd mosse
12 ha, glest träddäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Lagg, (otydl.), 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**09F 7G 07 (3635) KLASS 3
RÖKÄRRET 4,5 KM N BO**

13 ha (12 ha våtm), 105 m ö h. Flygb. -81.
Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
4 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande dikning.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Svagt vålvd mosse
8 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande dikning, väg.

Element 1: Mosseplan, 55 % av delobjektytan. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

**09F 7G 08 (4340) KLASS 3
GÖLMOSEN 4,5 KM SV BREVENS BRUK**

22 ha (22 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -81.
Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Topogent kärr

4 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädäckat. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjekttytan, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjekttytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse

18 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjekttytan, blandskog.

Element 2: Mosseplan, 37 % av delobjekttytan, glest trädäckat, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Hölja, 3 % av delobjekttytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor.

**09F 8A 02 (3408) KLASS 3
BLÄNKKÄRRET 3,5 KM SSV ÖSTANSJÖ**

4 ha (4 ha våtm), 120 m ö h. Flygb. -88.
Hallsbergs kn.
Botaniska värden, litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Topogent kärr

4 ha, öppet.

Element 1: Golv, 30 % av delobjekttytan, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 60 % av delobjekttytan, lövskog. Fastmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

**09F 8C 01 (4902) KLASS 3
TÄNGAMOSSEN OCH SKYMOSEN 6 KM OSO ÖSTANSJÖ**

171 ha (153 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -81.
Hallsbergs kn.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Excentrisk mosse

26 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande dikning.
Åkermark ansluter.

Element 1: Sträng, 35 % av delobjekttytan, barrskog.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 9 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 1 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 4: Hölja, 25 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Tuva, 5 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 6: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan, barrskog.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 7: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, glest trädäckat, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Platåformigt välvd mosse

86 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, stark lokal påverkan från torvtäkt, svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, 40 % av delobjekttytan.

Element 2: Mosseplan, 23 % av delobjekttytan, barrskog.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, glest trädäckat, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Hölja, 10 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 5: Sträng, (otyd.), 5 % av delobjekttytan.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 6: Randskog, 7 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 7: Dråg, 4 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Element 8: Göl, 1 % av delobjekttytan.

Delobj. 3: Topogent kärr

11 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 55 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 3: Golv, 35 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Delobj. 4: Svagt välvd mosse

10 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande dikning, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjekttytan, glest trädäckat, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 5: Obestämbart mosse

15 ha, öppet. Stark generell påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 6: Topogent kärr

5 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

**09F 8C 02 (4628) KLASS 2
BREDMOSEN OCH GRUVMOSEN 5 KM NO ÅSBRO**

49 ha (48 ha våtm), 105 m ö h. Flygb. -81.
Hallsbergs kn.
Litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Topogent kärr

29 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 75 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 3 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 3: Golv, 18 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 4: Sträng, (otyd.), 2 % av delobjekttytan.

Fastmatta.

Element 5: Flark, (otyd.), 2 % av delobjekttytan.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
12 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 3: Plåtformigt välvd mosse
4 ha, glest träd täckt.

Element 1: Sträng, (otyd.), 40 % av delobjekttytan.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 40 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 20 % av delobjekttytan, barrskog.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
3 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan
från dikning.

Element 1: Golv, skogsbevuxet, lövskog.

09F 8C 03 (3423) KLASS 2
00BODAMOSSEN 4,5 KM NO ÅSBRO

39 ha (39 ha våtm), 105 m ö h. Flygb. -81.
Hallsbergs kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
31 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 1 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 9 % av delobjekttytan, öppet,
barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
8 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjekttytan, lövskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 5 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 30 % av delobjekttytan, lövskog.
Örtdominerad vegetation. Fastmatta.

09F 8C 04 (4935) KLASS 2
HULTSJÖMOSEN 6,5 KM NO ÅSBRO

65 ha (62 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -81.
Hallsbergs kn.
Litteratur om objektet finns, området ornitologiskt
inventerat, sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
26 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Excentrisk mosse
35 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, torvtäkt.
Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjekttytan, barrskog.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan, glest
träd täckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 17 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Randskog, (otyd.), 3 % av delobjekttytan,
skogsbevuxet, barrskog.

Element 5: Sträng, (otyd.), 5 % av delobjekttytan.
Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 65 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 5 % av delobjekttytan, skogsbevuxet,
barrskog.

Element 3: Golv, 20 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 4: Golv, 10 % av delobjekttytan. Lösbotten.

09F8C05

Tornmossen och Tränemossen, 1,5 km NO Tisarstrand

Objektet ligger mellan Hultsjön och Långviken, den senare är en långsmal vik av Tisaren. Det är omgivet av skogsmark på en berggrund som domineras av gnejsig granodiorit. En smal väg leder genom ett kärrparti mitt i myren. Myren är uppsplittrad med flikiga gränser och uppstickande små fastmarksholmar. Den västra delen, Tornmossen, domineras av en svagt välvd mosse, den östra, Tränemossen, av ett kärr. Objektet inventerades i fält den 21 september 1993. Längst i väster finns en svagt rinnande bäck, vid fältbesöket var den så gott som helt uttorkad. På ömse sidor om den har ett kärrgolv bildats. Mitt i det relativt rika kärret dominerar trädstarr med inslag av bl a ängsull och kärrsilja. I bottenskiktet är inte en mossor dominant över någon annan. Här påträffas t ex *Bryum pseudotriquetrum*, *Calliergon cordifolium*, *Warnstorfia exanulatus* och den lilla levermossan *Scapania irrigua*. I zonerna närmast fastmarken förändras vegetationssammansättningen. Små dungar av träd, glasbjörk, klibbal, tall och gran, uppträder och porsen täcker större delen av fältskiktet. Mossorna, bl a *Sphagnum papillosum*, uppträder fläckvis. Den svagt välvda mossen är tallbevuxen och är av östlig skvattramtypen. I kärret som täcker större delen av Tränemossen finns utspridda ristuvor och i dessa växer glasbjörk och tall. Golvet är av både fastmatte- och mjukmattetyper. Mjukmattorna är ställvis mycket blöta och svåra att beträda. Vegetationen är fattig med starr och vitmossor.

Att flera olika våtmarkstyper ingår, en rik miljö som bryter av mot den fattiga samt att myren är så gott som opåverkad motiverar naturvärdesbedömningen.

09F8C05 (4148) KLASS 1
TORNMOSSEN OCH TRÄNEMOSSEN 1,5 KM NO TISAR-
STRAND

42 ha (38 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -81. Fält -93.
Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Mad vid vattendrag
3 ha, glest trädäck.

Element 1: Bäck, 5 % av delobjekttytan, öppet.

Element 2: Golv, 80 % av delobjekttytan, lövskog.
Fastm.kärr av tuvsäv-blåttäl-vit-brunmosstyp.

Element 2, underelem. 1: Golv, 20 % av delobjekttytan.
Fastm.kärr av tuvsäv-blåttäl-vit-brunmosstyp.

Element 3: Golv, 15 % av delobjekttytan, skogbevuxet,
lövskog.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
16 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjekttytan, barrskog.

Tallmosse av skvattramtyp.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, öppet,
barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Lagg, 5 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
19 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen,
väg.

Element 1: Golv, 45 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 44 % av delobjekttytan, lövskog.
Mjukmattekärr, starr-S. fallax variant.

Element 2, underelem. 1: Tuva, 5 % av delobjekttytan, 1-3 %
kröntäckning, blandskog. Ristuvmosse av *S. magellanicum*typ.

Element 2, underelem. 2: Golv, 15 % av delobjekttytan.
Mjukmattekärr, starr-S. papillosum var.

Element 3: Golv, 1 % av delobjekttytan, Lösbotten.

Element 4: Golv, 10 % av delobjekttytan, skogbevuxet,
blandskog.

09F8D01 Hamra tärn och Lövsjökärret, 10,5 km SV Pålshoda station

Objektet ligger sydost om sjön Tisaren. Det omges av skogsmark och berggrunden domineras av gnejsig granodiorit. De två små våtmarkerna ligger i var sin sprickdal åtskilda av en höjdrygg. Fuktstråken sträcker sig parallellt med varandra i en nordväst-sydöstlig riktning. Objektet inventerades i fält den 12 augusti 1993. Både Hamra tärn och Lövsjökärret ger ett varierat intryck med omväxlande öppna och trädbevuxna kärr, svagt rinnande bäckar och små vattenspeglar i form av små tjärnar. I Lövsjökärret finns dessutom en liten tallmosse. I de skogsklädda kärren dominerar björk med inslag av tall. Fältskiktet är relativt artrikt. Där växer framförallt trädstarr, men även grönstarr och ärtstarr. *Sphagnum riparium* är den dominerande mossan, bland brunmossorna kan *Warnstorfia exannulata* nämnas. Här och var ger träden vika för små öppna gläntor. De öppna kärren är inte helt fria från träd, i dem växer enstaka löv- och barrträd. Vegetationsområdet ligger på gränsen mellan intermediär och rik. Mellan porsen växer en mängd arter bl a brakved, ängsvädd, myggblomster, snip och ärtstarr. Bottenskiktet täcks av ett flertal vitmossor och några brunmossor t ex *Warnstorfia exannulata* och *Calliergonella cuspidata*. Fastmattan avbryts av små fläckar mjukmatta där det täta fältskiktet hastigt glesas ut. I bottenskiktet påträffas bl a *Scorpidium revolvens* och *Sphagnum contortum*. Den lilla tallmossen i Lövsjökärret når nästan ner till tjärnen. Mossen är av ristyp med ljung och tuvull som dominerar. Bäckens vid Hamra tärn är något uppdämd i de centrala delarna. I övrigt är objektet hydrologiskt opåverkat. Strandlinjen i området är av ett visst geologiskt värde (Naturvårdsöversikt 1984).

Den höga naturvärdesbedömningen grundas framförallt på de botaniska värdena.

09F8D01 (2115) KLASS 1
HAMRA TÄRN/LÖVSJÖKÄRRET 10,5 KM SV PÅLSBODA
STN

18 ha (17 ha våtm), 150 m ö h. Flygb. -81. Fält -93.
Hallsbergs kn.
Ingår i naturvårdsplan, ingår i SNV:s övers. inv. 1979.
Botaniska värden, våtmarken ligger i en sprickdal.

Delobj. 1: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 20 % av delobjekttytan, barrskog.
Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjekttytan, glest trädäck,
barrskog. Fastmatta.

Element 3: Golv, 60 % av delobjekttytan, blandskog.
Skogskärr.

Delobj. 2: Topogent kärr
6 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, lövskog.
Fastm.kärr av tuvsäv-blåttäl-vit-brunmosstyp.

Element 1, underelem. 1: Golv, 5 % av delobjektytan.
Mjukm.kärr av start-vitmos- brunmosstyp.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 9 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 3, underelem. 1: Golv, 2 % av delobjektytan. Öppet
lösbottenkärr.

Element 4: Bäck, 1 % av delobjektytan.

Element 5: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, > 25 %
krontäckning, barrskog. Tallmosse av ristyp.

Delobj. 3: Tjärn
1 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Restsjö, 90 % av delobjektytan. Permanent öppet
vatten.

Element 2: Gungfly, 10 % av delobjektytan. Mjukmatta.

09F 8D 02 (2502) KLASS 2
SKÅLSTU ÄNG 1,5 KM O TISARSTRAND

18 ha (17 ha våtm), 105 m ö h. Flygb. -81.
Hallsbergs kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
14 ha, glest trädäkt.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, lövskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, blandskog.
Fastmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet, lövskog.
Gräs/startvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
3 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

09F 8D 03 (3524) KLASS 3
HAMPETUSSAMOSSEN 3,5 KM O TISARSTRAND

32 ha (30 ha våtm), 105 m ö h. Flygb. -81.
Hallsbergs kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Plåtformigt välvd mosse
5 ha, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning, stark
lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 55 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, barrskog.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
25 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande
hyggen, dikning, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 98 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 2 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/startvegetation. Fastmatta.

09F 8E 01 (3544) KLASS 3
VÅTMARK 100 M S SVENNEVADS BY, 4 KM S PÅLSBODA

32 ha (32 ha våtm), 75 m ö h. Flygb. -81.
Hallsbergs kn.
Ingår i ängs- och hagmarksinventering. Åkermark ansluter,
sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Mad vid vattendrag
32 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Bäck, 5 % av delobjektytan. Meandring.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan, lövskog.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, glest trädäkt,
lövskog.

Element 4: Golv, 20 % av delobjektytan, skogsbevuxet,
lövskog.

09F 8F 01 (0333) KLASS 2
SANDBERGS MOSSE 3,5 KM SO SVENNEVAD

61 ha (61 ha våtm), 120 m ö h. Flygb. -82.
Hallsbergs kn.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
17 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande dikning, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, öppet.
Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 2: Topogent kärr
6 ha, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Små fuktängsytor, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Plåtformigt välvd mosse
38 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, torvtäkt.

Element 1: Göl, 4 % av delobjektytan.

Element 2: Gungfly, 6 % av delobjektytan.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Mosseplan, 60 % av delobjektytan. Fastmatta med
ristuvor.

Element 5: Randskog, 15 % av delobjektytan, skogsbevuxet,
barrskog.

Element 6: Lagg, 5 % av delobjektytan.
Gräs/startvegetation. Fastmatta.

09F 8F 02 (3406) KLASS 3
VÅTMARK 200 M V SVENNEVAD

16 ha (16 ha våtm), 75 m ö h. Flygb. -81.
Hallsbergs kn.
Ingår i ängs- och hagmarksinventering. Åkermark ansluter,
sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Strandäng
16 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, nedlagd
järnväg.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan, lövskog.

Element 2: Golv, 70 % av delobjektytan, lövskog.
Området är beteshävdad.

09F 9A 01 (0137) KLASS 3
TRIPPHULTSMOSSEN 1,5 KM SO ÖSTANSJÖ

39 ha (39 ha våtm), 130 m ö h. Flygb. -81.
Hallsbergs kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
7 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Svagt våld mosse
32 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning,
stark lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Element 2: Lagg, 1 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

09F 9B 01 (0328) KLASS 3
RÖMOSSEN 300 M O BLÅBERGA, 4,5 KM SO ÖSTANSJÖ

41 ha (42 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -81.
Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Plåtformigt våld mosse
38 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, stark lokal
påverkan från torvtäkt, svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, barrskog.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.
Element 3: Dräg, 5 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 4: Randskog, 10 % av delobjektytan, skogsbevuxet,
barrskog.

Element 5: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, glest
träddäckt, blandskog. Vegetationen domineras av mossor.
Fastmatta.

Delobj. 2: Svagt våld mosse
3 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

09F 9C 01 (0821) KLASS 3
MYR 100 M O ORMHULT, 3 KM NO TISARBADEN

14 ha (14 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -81.
Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
2 ha, öppet.

Element 1: Golv. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Svagt våld mosse
12 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning,
stark lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, glest
träddäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, öppet,
barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

09F9D01 Kärr, Matstorpsskärret, 1,5 km N Sarsebo, 5 km SV Pålshoda

Det lilla objektet ligger i en sänka, helt omgivet av skogsmark. Bergrunden i området domineras av gnejs och granit, men moränen innehåller en del kalk. Genom fuktstråket, som sträcker sig i en nord-sydlig riktning, flyter Matstorpabäcken. Den för dock en tynande tillvaro och sommartid är den vanligen helt uttorkad. Objektet inventerades i fält den 6 augusti 1993. Krontäckningen i kärret är varierande. I norr är det relativt öppet, men längre söderut ökar trädinslaget och förbuskningen. I fältskiktet, som trots en begynnande igenväxning fortfarande hyser en artrik flora, varvas gräs och halvgräs med örter. Trädstarren är dominerande men här växer också mängder av ängsnycklar. Andra vanliga arter är blååtel, kärrsilja, strandklo och grönstarr. Bottenskiktet är inte särskilt väl utvecklat. Bland mossorna kan *Sphagnum warnstorfi* och *Calliergon giganteum* nämnas. I norr finns en liten fläck som är fullkomligt täckt med skogssäv.

De botaniska värdena är det som framförallt motiverar den höga naturvärdesbedömningen.

**09F 9D 01 (1532) KLASS 1
KÄRR 1,5 KM N SARSEBO, 5 KM SV PÅLSBODA**

4 ha (4 ha våtm), 90 m ö h. Flygb. -81. Fält -93.
Hallsbergs kn.
Litteratur om objektet finns, rikkärr.

Delobj. 1: Topogent kärr
4 ha, öppet.

Element 1: Golv, 75 % av delobjekttytan, lövskog. Sumpkärr
av högstarr-örttyp. Järnockrafällning, rikkärr.

Element 1, underelem. 1: Golv, 4-10 % krontäckning,
lövskog. Öppet fastmattekärr.

Element 2: Golv, 25 % av delobjekttytan, skogsbevuxet,

lövskog. Fastmatta.

**09F 9D 02 (4734) KLASS 3
KÄRR 400 M O KOLAFALLET, 4 KM V PÅLSBODA**

1 ha (1 ha våtm), 95 m ö h. Flygb. -81.
Hallsbergs kn.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns,
rikkärr.

Delobj. 1: Topogent kärr
1 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning,
anslutande annan täkt.

Element 1: Golv, 25 % av delobjekttytan, glest träd täckt,
lövskog. Örtdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 75 % av delobjekttytan, lövskog.

**09F 9E 01 (0641) KLASS 3
SVENNEVADSMOSSEN 2 KM S PÅLSBODA**

51 ha (50 ha våtm), 80 m ö h. Flygb. -81.
Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Svagt våldv moss
15 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 1 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 4 % av delobjekttytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 2: Platåformigt våldv moss
36 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande
dikning.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjekttytan, barrskog.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjekttytan, glest
träddäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

**09F 9E 02 (1216) KLASS 2
IGELN 2 KM SV PÅLSBODA**

10 ha (10 ha våtm), 85 m ö h. Flygb. -81.
Hallsbergs kn.
Ingår i naturvårdsplan. Botaniska värden, ornitologiska
värden.

Delobj. 1: Mad vid sjö
10 ha, öppet.

Element 1: Golv.

**09F 9F 01 (0924) KLASS 4
MYR 300 M O KNACKERUD, 1,5 KM NO SVENNEVAD**

45 ha (44 ha våtm), 75 m ö h. Flygb. -81.
Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
44 ha, skogsbevuxet. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 95 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Små fuktängsytor, 5 % av delobjekttytan, öppet.
Örtdominerad vegetation.

09F9F02 Bockmossen, 5 km NO Svennevad

Objektet är beläget utmed Ekenesviken i nordöstra Sottern. Det är inte som namnet antyder en moss utan en sumpskog. I öster omges våtmarken av vatten och i väster av skogsmark. Berggrunden är huvudsakligen uppbyggd av granodiorit. En delvis utträdad bäck, Annebäck, rinner österut, genom sumpskogens övre del för att förena sig med sjön. Objektet inventerades i fält den 11 augusti 1993. Sumpskogen täcker inte en särskilt stor yta, men den är tilltalande. Förmultnande vedrester ligger utspridda här och var i skogen och trädsocklarna är ställvis väl utbildade. På sina håll tränger bladvassen in i skogen från sjösidan. Krontäckningen domineras av lövträd, glasbjörk och klibbal med inslag av gran. Fältskiktet är väl utbildat. Här växer bl a grenrör, älgört, videört, strandklo och grönstarr. Bottenskiktet är däremot sporadiskt. Bland mossorna kan *Sphagnum girgensohnii*, *Sphagnum squarrosum*, *Mnium hornum* och *Campylium stellatum* nämnas. Maden, som sträcker sig mellan skogen och den öppna vattenytan, domineras av högvassar med bladvass och smalkavelvass. På en fläck har vassen vikit undan. Här växer spridda lövträd, pors, trädstarr, blåttäl och kärrsilja m m. Bottenskiktet är mycket svagt utbildat.

Den höga naturvärdesklassen motiveras främst av de ingående våtmarkstyperna och att området är relativt opåverkat.

09F 9F 02 (2846) KLASS 1
BOCKMOSEN 5 KM NO SVENNEVAD

14 ha (14 ha våtm), 75 m ö h. Flygb. -81. Fält -93.
Hallsbergs kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Sumpskog
10 ha. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, lövskog. Sumpskog av örttyp.

Element 2: Bäck, 1 % av delobjekttytan.

Delobj. 2: Mad vid sjö
4 ha, öppet.

Element 1: Golv, 75 % av delobjekttytan. Högklass av tät
bladvegetation.

Element 1, underelem. 1: 15 % av delobjekttytan, 1-3 %
kröntäckning, lövskog. Sumpskog av högstarr-örttyp.

Element 2: Golv, 24 % av delobjekttytan.
Flytbladsvegetation.

Element 3: Bäck, 1 % av delobjekttytan.

09F 9F 03 (0836) KLASS 3
VÄTMARK 300 M O GILBERGA, 3 KM NO SVENNEVAD

6 ha (5 ha våtm), 75 m ö h. Flygb. -81.
Hallsbergs kn.
Ingår i ängs- och hagmarksinventering. Åkermark ansluter,
området är beteshävdad, sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Strandäng
2 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Vassar
3 ha, öppet.

Element 1: Golv. Vassvegetation.

09F 9F 04 (3637) KLASS 3
LÅNGÅNGSKÄRREN 5 KM NO SVENNEVAD

9 ha (9 ha våtm), 80 m ö h. Flygb. -81.

Hallsbergs kn.

Delobj. 1: Strandäng
9 ha, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Bäck, 5 % av delobjekttytan.

Element 2: Golv, 75 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 3: Golv, 20 % av delobjekttytan, glest trädäck,
lövskog.

10E 01 05 (0245) KLASS 4
MYR 200 M V VAKTEN, 4 KM S TÄNGERÅSA

64 ha (64 ha våtm), 70 m ö h. Flygb. -86.
Hallsbergs kn.
Åkermark ansluter.

Delobj. 1: Svagt våldv moss
64 ha, glest trädäck. Svag lokal påverkan från dikning.

stark lokal påverkan från torvtäkt, svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjekttytan, barrskog.
Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan, skogsbevuxet,
barrskog.

Element 3: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

10E 01 02 (1406) KLASS 2
SKARBYSJÖN 9 KM SSO FJUGESTA

192 ha (191 ha våtm), 55 m ö h. Flygb. -86.
Hallsbergs kn.
Ingår i ängs- och hagmarksinventering, ingår i
naturvårdsplan, riksintresse för naturvärden. Åkermark
ansluter, området är beteshävdad, våtmarken är en sänkt sjö.

Delobj. 1: Topogent kärr
47 ha, glest trädäck. Svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjekttytan, lövskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjekttytan, lövskog.
Örtdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Fuktäng
65 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
dikning.

Element 1: Golv, lövskog. Örtdominerad vegetation.

Delobj. 3: Topogent kärr
79 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet. Svag generell
påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 95 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Golv, 5 % av delobjekttytan, öppet. Fastmatta.

10F 0F 02 (2130) KLASS 3
ÖSTANSJÖSJÖN 6,5 KM SSV ASKER

32 ha (32 ha våtm), 85 m ö h. Flygb. -86.
Hallsbergs kn.
Ingår i naturvårdsplan. Ornitologiska värden.

Delobj. 1: Bevuxen sjö
6 ha, öppet. Våtmarken är en sänkt sjö.

Element 1: Golv. Vattenvegetation.

Delobj. 2: Topogent kärr
16 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.
Våtmarken är en sänkt sjö.

Element 1: Golv, 55 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 2: Golv, 25 % av delobjekttytan, lövskog. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjekttytan, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Golv, 10 % av delobjekttytan, glest trädäck,
lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Svagt våldv moss
10 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning, stark lokal påverkan från
torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

10F 0F 03 (1029) KLASS 3
LILLSJÖN 7,5 KM SSV ASKER

12 ha (12 ha våtm), 85 m ö h. Flygb. -88.
Hallsbergs kn.
Våtmarken är en sänkt sjö.

Delobj. 1: Bevuxen sjö
9 ha, öppet.

Element 1: Golv, lövskog. Mjukmatta.

Delobj. 2: Sjöstrand
3 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning,
kraftledning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, lövskog.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, blandskog.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, glest träddäckt,
lövskog.

KARLSKOGA



**09F 4C 01 (2841) KLASS 4
HEMMOSSEN 3 KM V TJÄLLTORP**

26 ha (26 ha våtm), 140 m ö h. Flygb. -83.
Karlskoga kn.
Mycket starkt generellt påverkat av torvtäkt.

**09F 4C 02 (2436) KLASS 3
MYR 300 M S LILLA BLACKFÄRD, 3,5 KM V TJÄLLTORP**

9 ha (9 ha våtm), 130 m ö h. Flygb. -83.
Karlskoga kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
9 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande
hyggen, dikning, anslutande dikning, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 35 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 45 % av delobjekttytan, glest
träddäckt, barrskog.

Element 3: Mosseplan, 20 % av delobjekttytan, öppet.
Fastmatta.

**09F 4C 03 (2349) KLASS 4
FJÄLLMOSEN OCH BLACKFÄRDSMOSEN 1 KM V
TJÄLLTORP**

359 ha (344 ha våtm), 130 m ö h. Flygb. -83.
Karlskoga kn.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning, torvtäkt, väg.
Området ornitologiskt inventerat.

**09F 4C 04 (0939) KLASS 3
SV DELEN AV BLACKFÄRDSMOSEN 3,5 KM OSO ZINK-
GRUVAN**

22 ha (22 ha våtm), 135 m ö h. Flygb. -83.
Karlskoga kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
22 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning,
körspår från traktor/skogsmaskin, anslutande torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan, öppet.
Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 5 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**09F 4D 01 (4103) KLASS 4
LÅNGMOSEN 2 KM NV TJÄLLTORP**

20 ha (20 ha våtm), 130 m ö h. Flygb. -83.
Karlskoga kn.
Mycket starkt generellt påverkat av torvtäkt.

**10E 3E 01 (0725) KLASS 2
SOLBERGAMOSSEN 2,5 KM OSO HÖGBERG**

75 ha (58 ha våtm), 105 m ö h. Flygb. -78.
Karlskoga kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
23 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Golv, 75 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjekttytan, barrskog.
Fastmatta.

Delobj. 2: Excentrisk mosse
19 ha, öppet.

Element 1: Tuva, 5 % av delobjekttytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 70 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Randskog, 10 % av delobjekttytan, skogsbevuxet,
barrskog.

Element 4: Lagg, 3 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 5: Mosseplan, 12 % av delobjekttytan, barrskog.
Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Platåformigt välvd mosse
19 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, 68 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Randskog, 15 % av delobjekttytan, skogsbevuxet,
barrskog.

Element 3: Lagg, 2 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan, barrskog.
Risvegetation. Fastmatta.

**10E 3H 04 (4021) KLASS 3
RÄVMOSSEN 4,5 KM S VILLINGSBERG**

12 ha (11 ha våtm), 190 m ö h. Flygb. -86.
Karlskoga kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
5 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 60 % av delobjekttytan, blandskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjekttytan, blandskog.
Fastmatta.

Element 3: Tuva, 5 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
6 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning,
anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 40 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjekttytan, glest
träddäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Mosseplan, 33 % av delobjekttytan, barrskog.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Hölja, 2 % av delobjekttytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

**10E 4F 01 (4245) KLASS 3
TRINDMYREN 2,5 KM O KNUTSBOL**

23 ha (23 ha våtm), 140 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

2 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr

3 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 30 % av delobjekttytan, lövskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 35 % av delobjekttytan.

Delobj. 3: Excentrisk mosse

16 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning. Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Sträng, 10 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 5 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Hölja, 10 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Mosseplan, 40 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 6: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan. Fastmatta med ristuvor.

Element 7: Randskog, 13 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 8: Lagg, (otyd.), 2 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Plåtformigt välvd mosse

2 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan. Fastmatta med ristuvor.

**10E 4F 02 (4847) KLASS 3
LÅNGMYREN 100 M O NYTORP, 3 KM O KNUTSBOL**

34 ha (34 ha våtm), 130 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

15 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Mad vid sjö
4 ha, öppet.

Element 1: Golv.

Delobj. 3: Topogent kärr

15 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

**10E 4G 02 (3107) KLASS 3
LYSINGSMOSSEN 5 KM SV VILLINGSBERG**

23 ha (20 ha våtm), 130 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

9 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjekttytan, glest trädäck, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 2: Topogent kärr

3 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mad vid sjö

8 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv.

**10E 4G 03 (1507) KLASS 3
MYR 200 M O KOJA, 5 KM SO KNUTSBOL**

20 ha (19 ha våtm), 130 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Plåtformigt välvd mosse

8 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Randskog, 20 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 4: Lagg, 5 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Tjörn

1 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse

11 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 39 % av delobjekttytan, glest trädäck, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 1 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Lagg, 1 % av delobjekttytan, öppet. Risvegetation. Fastmatta.

**10E 4G 04 (3121) KLASS 4
ÖSTRA HJORTRONKÄRRET OCH SLÄTTERÄNGEN 5 KM
SO KNUTSBOL**

40 ha (40 ha våtm), 130 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.
Mycket starkt generellt påverkat av anslutande hyggen,
dikning.

**10E 4G 05 (2543) KLASS 2
LOMTJÄRNSMOSSEN 2,5 KM SV VILLINGSBERG**

21 ha (20 ha våtm), 160 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.
Ingår i naturvårdsplan, ingår i urskogsinventering 1982.

Delobj. 1: Platåformigt välvd mosse
7 ha, öppet.

Element 1: Sträng, (otyd.), 5 % av delobjektytan.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, barrskog.
Fastmatta med ristuvor.

Element 4: Mosseplan, 55 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
13 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, öppet.
Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 3: Tjärn
1 ha.

Element 1: Golv.

**10E 4G 06 (1843) KLASS 3
ÖSTRA NORRÄMTSMOSSEN OCH GUBBMOSSEN 2,5 KM
SV VILLINGSBERG**

19 ha (18 ha våtm), 155 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Tjärn
1 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
7 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtyckt. Svag lokal
påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 3: Topogent kärr
3 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Gungfly, 10 % av delobjektytan.

Element 4: Golv, 10 % av delobjektytan. Örtdominerad
vegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Platåformigt välvd mosse
8 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen,

dikning.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, barrskog.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Randskog, (otyd.), 10 % av delobjektytan,
skogbevuxet, barrskog.

Element 3: Lagg, (otyd.), 5 % av delobjektytan. Fastmatta.

**10E 4H 01 (0117) KLASS 3
ANNERSAS MOSSE OCH RÅBOCKEN 3,5 KM S VILLINGS-
BERG**

13 ha (13 ha våtm), 200 m ö h. Flygb. -86.
Karlskoga kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
5 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, barrskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Platåformigt välvd mosse
6 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan. Fastmatta med
ristuvor.

Element 2: Mosseplan, 35 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Lagg, 5 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Randskog, 10 % av delobjektytan, skogsbevuxet,
barrskog.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse
2 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

**10E 4H 02 (0523) KLASS 3
RÖDSTJÄRTEN OCH ORRMOSSEN 2,5 KM SSO
VILLINGSBERG**

24 ha (23 ha våtm), 200 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 15 % av delobjektytan, glest trädtyckt,
lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 5 % av delobjektytan, skogsbevuxet,
barrskog. Fastmatta.

Element 3: Golv, 60 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Golv, 20 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Excentrisk mosse
16 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen. Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Sträng, (otyd.), 8 % av delobjektytan.

Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 6 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 1 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 4: Dråg, 5 % av delobjektytan.

Element 5: Mosseplan, 25 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 6: Mosseplan, 45 % av delobjektytan. Fastmatta med ristuvor.

Element 7: Randskog, (otydl.), 9 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 8: Lagg, (otydl.), 1 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**10E 4H 04 (2319) KLASS 2
FLATLANDSMOSSEN 1 KM S VILLINGSBERG**

28 ha (28 ha våtm), 175 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
2 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
3 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, glest trädäck, lövskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
18 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.
Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 4: Platåformigt välvd mosse
5 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädäck, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan. Fastmatta.

**10E 4H 05 (1009) KLASS 3
MYR 100 M V FALLTORP, 2,5 KM SSV VILLINGSBERG**

10 ha (10 ha våtm), 185 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
7 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 4 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog. Fastmatta.

Element 4: Bäck, 1 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
3 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädäck. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

**10E 4I 01 (4003) KLASS 3
KÄRMSÖMOSSEN 3,5 KM O VILLINGSBERG**

16 ha (16 ha våtm), 165 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Platåformigt välvd mosse
10 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 58 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 1 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädäck, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 4: Randskog, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 5: Lagg, (otydl.), 1 % av delobjektytan. Fastmatta.

Delobj. 2: Mad vid sjö
6 ha, öppet.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan. Vattenvegetation.

**10E 5D 01 (2439) KLASS 3
MYR 100 M O NÖTBUSKEN, 4,5 KM V KARLSKOGA**

45 ha (44 ha våtm), 130 m ö h. Flygb. -78.
Karlskoga kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Tjärn
1 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Platåformigt välvd mosse
37 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 65 % av delobjektytan, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 14 % av delobjektytan, glest trädäck, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Randskog, 3 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 5: Lagg, (otydl.), 2 % av delobjektytan, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 6: Hölja, 1 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 3: Topogent kärr

7 ha, öppet. Kärrret är en igenvuxen sjö.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan. Lösbotten.

**10E 5D 02 (3540) KLASS 3
DAMMOSEN 5 KM V KARLSKOGA**

23 ha (23 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -78.

Karlskoga kn.

Ornitologiska värden, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Platåformigt våldv moss

23 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 18 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Randskog, 2 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

**10E 5E 01 (3701) KLASS 4
BJÖRTORPSMOSEN 4 KM V KARLSKOGA**

21 ha (21 ha våtm), 120 m ö h. Flygb. -78.

Karlskoga kn.

Delobj. 1: Svagt våldv moss

21 ha, glest träd täckt. Stark lokal påverkan från dikning, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 4: Lagg, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

**10E 5E 02 (3316) KLASS 2
BOFORSMOSEN 2,5 KM V KARLSKOGA**

103 ha (97 ha våtm), 115 m ö h. Flygb. -78.

Karlskoga kn.

Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns, ornitologiska värden.

Delobj. 1: Excentrisk mosse

97 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande soptipp, dikning.

Element 1: Göl, 7 % av delobjektytan.

Element 2: Hölja, 4 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 4: Hölja, 1 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 5: Sträng, (otyd.), 10 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 6: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 7: Randskog, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet,

barrskog.

Element 8: Lagg, 2 % av delobjektytan, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 9: Lagg, 1 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

**10E 5E 03 (2825) KLASS 3
BOTORPSMOSEN 1 KM V KARLSKOGA**

83 ha (83 ha våtm), 130 m ö h. Flygb. -88.

Karlskoga kn.

Delobj. 1: Excentrisk mosse

26 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning, anslutande torvtäkt.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Randskog, 12 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 6: Lagg, 2 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 7: Hölja, 1 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 2: Obestämbbar mosse

57 ha, glest träd täckt. Svag lokal påverkan från kraftledning, stark generell påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

**10E 5E 04 (2836) KLASS 4
MYR 200 M NO BOTORP, 200 M V KARLSKOGA**

14 ha (14 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -88.

Karlskoga kn.

Mycket starkt generellt påverkat av dikning, torvtäkt.

**10E 5E 05 (2033) KLASS 3
FISKSJÖN 250 M V KARLSKOGA**

25 ha (25 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -88.

Karlskoga kn.

Ingår i naturvårdsplan. Naturreservat. Ornitologiska värden.

Delobj. 1: Svagt våldv moss

4 ha, skogsbevuxet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr

5 ha, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, lövskog. Fastmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet,

lövskog.

Delobj. 3: Bevuxen sjö
16 ha, öppet.

Element 1: Golv. Vassvegetation.

10E 5G 01 (0118) KLASS 3
TUVMOSSEN 2,5 KM SO KARLSKOGA

14 ha (14 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.
Ornitologiska värden, sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Platåformigt våldv moss
9 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, 55 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 30 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Lagg, 15 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mad vid sjö
5 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv.

10E 5G 02 (0411) KLASS 2
MYR 600 M O FRÖKENBORG, 1 KM S KARLSKOGA

33 ha (32 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.
Åkermark ansluter, sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Platåformigt våldv moss
7 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Lagg, 15 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
2 ha, öppet.

Element 1: Golv. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mad vid sjö
23 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, anslutande dikning, körspår från traktor/skogsmaskin, anslutande väg.

Element 1: Golv, 80 % av delobjekttytan.

Element 2: Gungfly, 20 % av delobjekttytan.

10E 5G 03 (3821) KLASS 3
ORRMOSSEN 700 M O KARLSKOGA

36 ha (35 ha våtm), 145 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
5 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, stark lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, blandskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från

anslutande hyggen, svag generell påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande dikning, kraftledning, väg.

Element 1: Golv, 45 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 39 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 14 % av delobjekttytan. Risvegetation.

Element 4: Dråg, 1 % av delobjekttytan.

Element 5: Bäck, 1 % av delobjekttytan.

Delobj. 3: Svagt våldv moss
2 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 4: Platåformigt våldv moss
2 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, väg.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 8 % av delobjekttytan, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, (otyd.), 2 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Obestämbar myr
11 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, kraftledning, anslutande annan läkt, stark lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv. Fastmatta.

Delobj. 6: Blandmyr av mosaikt
2 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv. Fastmatta.

10E 5G 04 (2627) KLASS 3
TOLMOSEN 1,5 KM O KARLSKOGA

53 ha (47 ha våtm), 150 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.

Delobj. 1: Svagt våldv moss
25 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, kraftledning, väg, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 40 % av delobjekttytan, glest träd täckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, kraftledning, väg. Spänger.

Element 1: Golv, 75 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjekttytan, lövskog. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjekttytan.

Delobj. 3: Excentrisk moss

7 ha, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning. Spänger.

Element 1: Sträng, 40 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 40 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 17 % av delobjektytan, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Randskog, (otydl.), 3 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 4: Platåformigt vålvd mosse
2 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 9 % av delobjektytan, glest trädäckat, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Hölja, 1 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

**10E 5G 05 (3949) KLASS 3
SYDVÄSTRA DELEN AV LILLSJÖMOSSEN,
3,5 KM O KARLSKOGA**

33 ha (31 ha våtm), 170 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt vålvd mosse
5 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 5 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 2: Platåformigt vålvd mosse
19 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 73 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Randskog, (otydl.), 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 4: Lagg, 2 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, anslutande dikning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 23 % av delobjektytan. Örtdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 3: Drägg, 2 % av delobjektytan.

**10E 5H 01 (4435) KLASS 3
HÖGMOSSEN 1 KM NNV LÖVBRÅTEN,
7 KM O KARLSKOGA**

31 ha (30 ha våtm), 185 m ö h. Flygb. -88.

Karlskoga kn.

Delobj. 1: Svagt vålvd mosse
10 ha, skogsbevuxet. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Lagg, 1 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Blandmyr av mosaikttyp
2 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
6 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 4: Platåformigt vålvd mosse
12 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 27 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 3 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Sträng, (otydl.), 5 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 5: Lagg, 5 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**10E 5H 02 (0346) KLASS 3
LÅNGA MOSSEN 600 M O HÅKAS, 9 KM SO KARLSKOGA**

27 ha (26 ha våtm), 180 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.

Delobj. 1: Svagt vålvd mosse
6 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 13 % av delobjektytan, glest trädäckat, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Lagg, 2 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Platåformigt vålvd mosse
13 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 15 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Randskog, 14 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 4: Lagg, 1 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
4 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från

anslutande hyggen, kraftledning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, lövskog.

Element 3: Golv, 10 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Delobj. 4: Obestämbbar myr
3 ha, öppet. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv. Fastmatta.

**10E 5H 03 (0625) KLASS 3
MEDSKOGSMOSSEN 7 KM SO KARLSKOGA**

20 ha (20 ha våtm), 155 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
5 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 90 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Golv, 10 % av delobjekttytan, öppet, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Svagt välvad mosse
6 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 3: Vegetationsrikt vatten
2 ha, öppet.

Element 1: Golv. Vattenvegetation.

Delobj. 4: Platåformigt välvad mosse
4 ha, öppet. Svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan, lövskog.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Randskog, 10 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

Delobj. 5: Excentrisk mosse
3 ha, öppet. Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Sträng, (otyd.), 10 % av delobjekttytan.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 75 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan, barrskog.
Fastmatta med ristuvor.

**10E 5H 04 (4907) KLASS 2
MYR 100 M S FÅGELSJÖN, 3,5 KM O HYTTFALLET**

43 ha (41 ha våtm), 175 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.

Delobj. 1: Svagt välvad mosse
20 ha, fördelat på 7 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, kraftledning, militärt skjutfält, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr

20 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, kraftledning, militärt skjutfält.

Element 1: Golv, 70 % av delobjekttytan, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 5 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 4: Golv, 10 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Delobj. 3: Obestämbbar myr
9 ha, öppet. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, blandskog. Fastmatta.

**10E 5I 05 (4403) KLASS 3
ORRKOJMOSEN 8,5 KM O KARLSKOGA**

98 ha (83 ha våtm), 175 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.

Delobj. 1: Mad vid vattendrag
5 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, svag generell påverkan från militärt skjutfält, svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Bäck, 10 % av delobjekttytan.

Element 2: Golv, 90 % av delobjekttytan.

Delobj. 2: Topogent kärr
32 ha, fördelat på 7 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, svag generell påverkan från militärt skjutfält, svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Bäck, 1 % av delobjekttytan.

Element 2: Golv, 60 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 39 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Delobj. 3: Svagt välvad mosse
6 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet. Svag generell påverkan från militärt skjutfält, svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, glest trädtyckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Platåformigt välvad mosse
40 ha, fördelat på 6 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från avverkning, anslutande hyggen, dikning, svag generell påverkan från militärt skjutfält.

Element 1: Mosseplan, 35 % av delobjekttytan, glest trädtyckt, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 35 % av delobjekttytan, barrskog. Fastmatta.

Element 4: Hölja, 15 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 5: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

**10E 51 07 (3531) KLASS 3
BERGAÄNGEN 12 KM SSV DALKARLSBERG**

38 ha (36 ha våtm), 185 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.
Ornitologiska värden, sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
5 ha, glest trädäck.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, barrskog.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Lagg, 5 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Plåtformigt välvd mosse
11 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädäck. Svag lokal
påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, barrskog.
Fastmatta.

Element 2: Randskog, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet,
barrskog.

Element 3: Lagg, 10 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mad vid sjö
20 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen,
dikning.

Element 1: Golv, 89 % av delobjektytan.

Element 2: Bäck, 1 % av delobjektytan.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet,
lövskog.

**10E 6E 01 (2535) KLASS 3
STENBÄCKSMOSSEN 2,5 KM NNV KARLSKOGA**

46 ha (46 ha våtm), 115 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.
Spänger.

Delobj. 1: Koncentrisk mosse
39 ha, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning,
torvtäkt.

Element 1: Sträng, 50 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjektytan. Fastmatta med
ristuvor.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Hölja, 1 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 5: Göl, 1 % av delobjektytan.

Element 6: Randskog, (otyd.), 8 % av delobjektytan,
skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
2 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande dikning, anslutande torvtäkt.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 3: Sumpskog

5 ha, fördelat på 2 ytor. Stark lokal påverkan från dikning,
svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, blandskog.

**10E 6E 02 (0533) KLASS 3
GROTTMOSSEN 1,5 KM NNO KARLSKOGA**

36 ha (34 ha våtm), 115 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
23 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädäck. Svag lokal
påverkan från dikning, anslutande dikning, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 83 % av delobjektytan, barrskog.
Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Mosseplan, 5 % av delobjektytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Randskog, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet,
barrskog.

Element 4: Lagg, 2 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Sumpskog
10 ha. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande
kraftledning.

Element 1: Golv, barrskog.

Delobj. 3: Tjärn
2 ha.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan.

Element 2: Gungfly, 30 % av delobjektytan.

Delobj. 4: Flytbladsvegetation
1 ha, öppet.

Element 1: Golv.

**10E 6F 01 (3510) KLASS 4
MYR VID MOSSTORPET 2,5 KM N KARLSKOGA**

11 ha (11 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.

Delobj. 1: Plåtformigt välvd mosse
10 ha, glest trädäck. Svag lokal påverkan från dikning,
kraftledning, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 87 % av delobjektytan, barrskog.
Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Mosseplan, 1 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Randskog, 12 % av delobjektytan, skogbevuxet,
barrskog.

**10E 6F 02 (3314) KLASS 3
MYR 50 M O KARLSTORP 2,5 KM N KARLSKOGA**

10 ha (10 ha våtm), 115 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.

Svagt lokalt påverkat av dikning, kraftledning, anslutande
väg.

**10E 6G 01 (3520) KLASS 3
BRICKEGÅRDSMOSSEN 2 KM NNO KARLSKOGA**

15 ha (15 ha våtm), 150 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.

Delobj. 1: Platåformigt våldv moss
10 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, 47 % av delobjekttytan. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Mosseplan, 2 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Randskog, 46 % av delobjekttytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 4: Lagg, 5 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
5 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 65 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 5 % av delobjekttytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 4: Golv, 10 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

10E 6G 02 (4744) KLASS 3
RÅDEHULTSMOSSEN 4,5 KM NNO KARLSKOGA

19 ha (19 ha våtm), 185 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.

Delobj. 1: Platåformigt våldv moss
19 ha, öppet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande dikning, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 55 % av delobjekttytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 2 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 4: Lagg, 3 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Sumpskog
2 ha. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, barrskog.

10E6G03

Fågelsjömossen med flera myrar, 2 km O Karlskoga

Myren har inte inventerats i fält. Naturvärdesbedömningen och beskrivningen bygger på flygbildstolkning samt uppgifter hämtade från litteratur. Objektet, som omfattar flera sammanhängande myrar, ligger strax öster om Karlskoga i ett militärt skyddsområde. Det omges av skogsmark på en gnejsdominerad berggrund, i öster har det kontakt med Fågelsjön. Flertalet av de fastmarksholmar som höjer sig över våtmarken har avverkats, vilket gör området aningen svårtolkat. En smal väg leder genom de norra delarna av myren på sin väg till Dalkarlsberg. Objektet är komplext uppbyggt med olika mossetyper och topogena kärr. Större delen av objektet som gränsar till Fågelsjön, Fågelsjömossen, är uppbyggd av excentriska mossar. Randskogen är mer eller mindre väl utvecklad. Mellan strängarna, och på mosseplanet, finns vanligen fastmattor men även nedsänkta mjukmattehöljor. I norr omger mossen Lomtjärn. Väster om tjärnen breder en platåmoss ut sig. Även den här mossen är torr och har, enligt flygbilden, inga mjukmattehöljor. Norr om vägen domineras mossen av ristuvor. Båda mossetyperna, liksom små tallmossar, återkommer på flera platser i objektet. Kärran förekommer över hela myren. De är i allmänhet små och belägna i periferin. Kärrgolven domineras av fastmattor med inslag av blötare partier. Det största kärret ligger i sydost och kallas för Dymossen. Även det är huvudsakligen uppbyggd av fastmattor. Golvet har inslag av risvegetation. Några små tallmossar och fastmarksholmar avbryter det i övrigt öppna kärr.

Den höga naturvärdesbedömningen motiveras bl a av att de för regionen representativa myrtyperna är stora och att betydande delar av myren endast är svagt hydrologiskt påverkad. Myren är dessutom av betydelse för fågellivet (Naturvärdsöversikten 1984).

10E 6G 03 (0741) KLASS 1
FÅGELSJÖMOSSEN M FL MYRAR 2 KM O KARLSKOGA

337 ha (304 ha våtm), 155 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns, ornitologiska värden, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt våldv moss
15 ha, fördelat på 8 eller fler ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, anslutande dikning, väg.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjekttytan, glest

träddäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Obestämbart moss
10 ha, fördelat på 2 ytor, glest träddäckt. Stark generell påverkan från torvtäkt, svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
109 ha, fördelat på 9 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från avverkning, anslutande hyggen, dikning, anslutande dikning, väg.

Element 1: Golv, 40 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 7 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Sträng, 5 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 4: Flark, 5 % av delobjektytan.

Element 5: Golv, 15 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 6: Dråg, 4 % av delobjektytan.

Element 7: Golv, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Element 8: Golv, 18 % av delobjektytan, lövskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 9: Golv, 1 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 4: Excentrisk mosse

119 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från avverkning, anslutande hyggen, dikning, anslutande torvtäkt, väg.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 25 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 15 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Randskog, (otyd.), 3 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 6: Hölja, 7 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 7: Göl, 1 % av delobjektytan.

Element 8: Mosseplan, 8 % av delobjektytan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 9: Lagg, 1 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Plattformigt välvd mosse

51 ha, fördelat på 7 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från avverkning, anslutande hyggen, dikning, anslutande torvtäkt, väg.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Randskog, (otyd.), 9 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 4: Hölja, 1 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 6: Tjärn

2 ha.

Element 1: Golv.

**10E 6H 01 (4714) KLASS 3
BJÖRNHOLMSMOSEN 6 KM NO KARLSKOGA**

52 ha (51 ha våtm), 165 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.
Litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Excentrisk mosse

35 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning, militärt skjutfält.
Element: Fastmatta.

Element 2: Hölja, 20 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 10 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Hölja, 9 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 5: Dråg, 2 % av delobjektytan.

Element 6: Göl, 1 % av delobjektytan.

Element 7: Randskog, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 8: Lagg, 3 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr

11 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, stark lokal påverkan från kraftledning, svag lokal påverkan från militärt skjutfält.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 7 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 3 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 4: Golv, 10 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse

5 ha, fördelat på 5 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande dikning, militärt skjutfält.

Element 1: Mosseplan, 97 % av delobjektytan, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 3 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

**10E 6H 02 (1424) KLASS 3
VÄSTRA ÄLGSIMSMOSEN 5,5 KM O KARLSKOGA**

50 ha (50 ha våtm), 160 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Sluttande mosse

27 ha, öppet. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin, militärt skjutfält, väg.

Element 1: Sträng, 60 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 22 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 1 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 4: Lagg, 1 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 5: Lagg, 1 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 6: Randskog, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr

23 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, anslutande dikning, militärt skjutfält, väg.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 3: Golv, 1 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 4: Golv, 4 % av delobjektytan. Lösbotten.

10E 6H 03 (1307) KLASS 3
MYR 300M S SUNDSBRON, 5 KM O KARLSKOGA

16 ha (15 ha våtm), 160 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.

Delobj. 1: Svagt vålvd mosse
8 ha, fördelat på 2 ytor, glest träd täckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, kraftledning, militärt skjutfält.

Element 1: Mosseplan, 97 % av delobjektytan, blandskog.
Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Lagg, 3 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 3: Golv, 3 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 4: Golv, 6 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 5: Bäck, 1 % av delobjektytan.

10E 6H 04 (2823) KLASS 2
ÖSTRA ÄLGSIMSMOSSEN 6,5 KM O KARLSKOGA

72 ha (67 ha våtm), 165 m ö h. Flygb. -88.

Karlskoga kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, kraftledning.

Element 1: Bäckdråg, 5 % av delobjektytan.

Element 2: Golv, 32 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 8 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 4: Golv, 55 % av delobjektytan, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Svagt vålvd mosse
3 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, lövskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Excentrisk mosse
51 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från avverkning, anslutande hyggen, dikning, kraftledning.
Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Ett flertal gölar, 5 % av delobjektytan.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 4: Sträng, (otyd.), 15 % av delobjektytan.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 5: Mosseplan, 45 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 6: Mosseplan, 11 % av delobjektytan, barrskog.
Fastmatta med ristuvor.

Element 7: Randskog, 6 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 8: Lagg, 2 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 9: Lagg, 1 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

10E6H05

Fallmossen och Råmossen, 6 km O Karlskoga

Myren har inte inventerats i fält. Naturvärdesbedömningen och beskrivningen bygger på flygbildstolkning samt uppgifter hämtade från litteratur. Det avlånga objektet ligger inom militärt skyddsområde på gränsen till det skog- och myrrika Kilsbergsområdet. Berggrunden i området domineras av granit och grå gnejs. Smala skogsbilvägar omgärdar myren. Objektet ger ett omväxlande intryck där våtmark varvas med skogsklädda fastmarksholmar samt stora och små tjärnar. Nästan hela myren är ombrotrof, det är bara i de perifera delarna som kärren finns. Den största ytan upptas av en oregelbundet excentriskt formad mosse. Mjukmattehöljor förekommer men är koncentrerade till fläckar strax söder om Spårtjärn och söder om Gäddtjärn. I övrigt är mossen relativt torr. Ett kärrdråg avbryter den ombrotrofa miljön i bl a Råmossen. I östra kanten av Råmossen finns ett kärr med företrädesvis mjukmattor.

Storleken och att den hydrologiska påverkan är ringa är två av faktorerna som påverkade den höga naturvärdesbedömningen. Myren är även betydelsefull ur ornitologisk synvinkel, den bedömdes tillhöra skyddsklass 3 i Fågelmyrar i Örebro län (1982:1) med förekommande nyckelarter, bl a smålom, som motivering.

10E 6H 05 (0526) KLASS 1
FALLMOSEN OCH RÅMOSEN 6 KM O KARLSKOGA

191 ha (160 ha våtm), 170 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.

Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns, området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
20 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 5 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
16 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Gungfly, 2 % av delobjekttytan.

Element 4: Golv, 13 % av delobjekttytan, lövskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Tjänn
21 ha, fördelat på 5 ytor.

Element 1: Golv.

Delobj. 4: Topogent kärr
5 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 25 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Golv, 75 % av delobjekttytan, lövskog.

Delobj. 5: Excentrisk mosse
119 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning. Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Göl, 3 % av delobjekttytan.

Element 2: Hölja, 18 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 2 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 4: Sträng, 25 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 5: Randskog, 8 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 6: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 7: Lagg, 5 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 8: Dråg, 2 % av delobjekttytan.

Element 9: Mosseplan, 27 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

**10E 6H 06 (4043) KLASS 3
SNÖBERGSHYTTMOSEN 8,5 KM O KARLSKOGA**

48 ha (47 ha våtm), 180 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
8 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.
Element 1: Golv, 85 % av delobjekttytan.

Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Bäck, 1 % av delobjekttytan.

Element 3: Golv, 5 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 4: Golv, 9 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Excentrisk mosse
6 ha, öppet. Svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Tuva, 25 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 70 % av delobjekttytan, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Randskog, (otyd.), 5 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

Delobj. 3: Platåformigt välvd mosse
33 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, väg.

Element 1: Göl, 5 % av delobjekttytan.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Mosseplan, 70 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Lagg, 5 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 6: Lagg, 2 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 7: Randskog, (otyd.), 3 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

**10E 6H 07 (3142) KLASS 2
MYR 1,5 KM SO LÅNGSJÖBÄCKEN,
8,5 KM O KARLSKOGA**

38 ha (37 ha våtm), 185 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.
Ornitologiska värden, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Platåformigt välvd mosse
9 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjekttytan, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 20 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 4: Göl, 2 % av delobjekttytan.

Element 5: Mosseplan, 13 % av delobjekttytan, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
11 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjekttytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr

16 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, glest träddäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Gungfly, 5 % av delobjektytan.

10E6101**Trangärdet, 12 km ONO Bofors stn**

Trangärdet har inte inventerats i fält. Naturvärdesbedömningen och beskrivningen grundas enbart på flygbildstolkning och uppgifter från litteratur. I det barrskogspräglade området finns mängder av myrmarker och Trangärdet är en av dem. Det avsattes som naturreservat 1974. I berggrunden finns framförallt bergarterna granit och grågnejs. Hela objektet ligger inom ett militärt skyddsområde och till delar av detta har inte allmänheten tillträde. En smal bilväg leder förbi myrens sydvästra hörn. Myren är flikig med flera fastmarksholmar som bryter in i våtmarken. De ombrotrofa miljöerna överväger, kärren påträffas vanligen i myrens utkanter. Flera större tjärnar och ett par bäckar ingår. Detta tillsammans ger Trangärdet ett omväxlande och tilltalande intryck. Myren kan indelas i en nordlig och en sydlig del. Mellan de båda ligger stora fastmarksholmar samt de många tjärnar som ingår i objektet. I de perifera delarna är myrmarken mosaikartad medan det centralt är mer homogent. De enhetliga komplexen utgörs av sluttande respektive platåmossar. Platåmossarna är ganska torra, större delen består av fastmattor med inslag av strängar. Smärre fläckar med mjukmattehöljor är insprängda på mosseplanet. De sluttande mossarna har en tydligare strängstruktur men är också torra med inslag av blöta höljor. Ett par kärrdråg avbryter den ombrotrofa miljön. De svagt välvda mossarna är klädda med tall. På de fläckar där endast enstaka tall växer skymtar ristuvor.

Den höga naturvärdesbedömningen motiveras främst av orördheten och storleken på de ingående myrtyperna. Trangärdet har även ett intressant fågelliv med bl a ljungpipare och storspov. Det har i Fågelmýrar i Örebro län (1982:1) bedömts höra till skyddsklass 2. Trangärdet ingår i Myrskyddsplan för Sverige.

**10E 61 01 (2005) KLASS 1
TRANGÄRDET 12 KM ONO BOFORS STN**

270 ha (230 ha våtm), 180 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.
Ingår i naturvårdsplan, ingår i SNV:s övers. inv. 1979.
Naturreservat. Naturskog i eller i anslutning.

Delobj. 1: Platåformigt välvd mosse
75 ha, fördelat på 6 ytor, öppet.

Element 1: Randskog, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Lagg, 5 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 55 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 4: Sträng, 10 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 5: Hölja, 10 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 6: Hölja, 5 % av delobjektytan. Mjukmatta-lösbotten.

Element 7: Dråg, 4 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 8: Göl, 1 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Sluttande mosse
80 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Randskog, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Dråg, 3 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 3: Lagg, 5 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 4: Dråg, 2 % av delobjektytan. Mjukmatta-lösbotten.

Element 5: Sträng, 10 % av delobjektytan. Fastmatta med ristuvor.

Element 6: Mosseplan, 50 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 7: Hölja, 10 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 8: Hölja, 10 % av delobjektytan. Mjukmatta-lösbotten.

Delobj. 3: Topogent kärr
40 ha, fördelat på 9 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande väg. sjö ansluter till högst 24%.

Element 1: Golv, 5 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 2: Golv, 5 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 59 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 4: Golv, 27 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Element 5: Bäck, 1 % av delobjektytan.

Element 6: Vattenvegetation, 3 % av delobjektytan.

Delobj. 4: Svagt välvd mosse
20 ha, fördelat på 12 ytor, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 5: Tjärn
15 ha, fördelat på 9 ytor.

Element 1: Restsjö, 90 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Element 2: Gungfly, 10 % av delobjektytan. Mjukmatta.

10E 6I 12 (0741) KLASS 2
MYR V SPJUTTJÄRNEN, 6,5 KM NV HJULÄSEN

19 ha (18 ha våtm), 200 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
6 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 4: Golv, 10 % av delobjektytan, glest trädäck, blandskog.

Delobj. 2: Svagt våldv moss
7 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, glest trädäck, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 3: Platåformigt våldv moss
5 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädäck, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 3 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Hölja, 2 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 5: Randskog, (otydl.), 5 % av delobjektytan, glest trädäck, barrskog.

10E 6J 13 (0103) KLASS 2
MYR S MÄCKATJÄRNEN, 5 KM NV HJULÄSEN

41 ha (30 ha våtm), 220 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.

Delobj. 1: Mad vid vattendrag
5 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Bäck, 10 % av delobjektytan.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 60 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Golv, 5 % av delobjektytan, skogsbevuxet,

lövskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
4 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan, glest trädäck, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Svagt våldv moss
21 ha, fördelat på 7 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning, militärt skjutfält.

Element 1: Mosseplan, 58 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Tuva, 5 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädäck, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 5: Lagg, 2 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Tjärn
7 ha, fördelat på 4 ytor.

Element 1: Golv.

10E 6J 15 (1802) KLASS 2
MYR 500 M SSO HOLMSJÖN, 6,5 KM NV HJULÄSEN

13 ha (12 ha våtm), 205 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
6 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Bäck, 5 % av delobjektytan.

Element 2: Golv, 80 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Svagt våldv moss
4 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädäck.

Element 1: Mosseplan, 48 % av delobjektytan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, skogsbevuxet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Hölja, 2 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 3: Platåformigt våldv moss
2 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 6 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 4 % av delobjektytan.

Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Randskog, 7 % av delobjektytan, glest träd täckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 5: Hölja, 1 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 6: Hölja, 2 % av delobjektytan. Lösbotten.

**10E 7G 01 (3029) KLASS 3
MYR 150 M V LIMÄNGEN, 2 KM O GRANBERGSDAL**

18 ha (18 ha våtm), 160 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.

Delobj. 1: Platåformigt välvd mosse
15 ha, öppet. Svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 55 % av delobjektytan, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 17 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Lagg, 3 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 4: Randskog, 25 % av delobjektytan, skogsbevuxet, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
3 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjektytan. Örtdominerad vegetation. Fastmatta.

**10E 7H 01 (2420) KLASS 3
KORTFORS MOSSEN 6 KM O GRANBERGSDAL**

20 ha (20 ha våtm), 200 m ö h. Flygb. -88. Fält -93.
Karlskoga kn.

Delobj. 1: Platåformigt välvd mosse
20 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 61 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Göl, 1 % av delobjektytan.

Element 4: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, glest träd täckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 5: Randskog, 10 % av delobjektytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 6: Lagg, (otydl.), 2 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 7: Tuva, 5 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 8: Hölja, 1 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 1: Sträng. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Hölja. Mjukm.mosse, vitag-kallgräs-S.cuspidatumtyp.

Element 2, underelem. 1: Hölja, 10 % av delobjektytan.

Mjukmattemosse av vitag-kallgräs-S.majustyp.

Element 6, underelem. 1: Mosseplan, 3 % av delobjektytan. Fastmattemosse av tuvull-S. fuscumtyp.

**10E 7H 04 (1523) KLASS 3
KVARNMOSSEN 4,5 KM S KARLSDAL**

21 ha (20 ha våtm), 180 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
9 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest träd täckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
3 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 3 % av delobjektytan.

Element 3: Golv, 17 % av delobjektytan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Excentrisk mosse
8 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Sträng, 20 % av delobjektytan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Hölja, 7 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Hölja, 13 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Mosseplan, 40 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 6: Hölja, 1 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 7: Randskog, 4 % av delobjektytan, skogsbevuxet, barrskog.

**10E 7H 05 (1227) KLASS 3
SVARTBÄCKSMOSSEN 5 KM S KARLSDAL**

30 ha (30 ha våtm), 180 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
8 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, barrskog.

Element 3: Mosseplan, 24 % av delobjektytan, glest träd täckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Lagg, (otydl.), 1 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
11 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från

anslutande hyggen, dikning, anslutande dikning.

Element 1: Bäck, 1 % av delobjektytan.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 70 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Dråg, 9 % av delobjektytan.

Element 5: Golv, 5 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 3: Excentrisk mosse
11 ha, öppet. Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan, barrskog.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 25 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, glest
träddäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 5: Mosseplan, 15 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

10E 8E 01 (2935) KLASS 3
ASPEN 3,5 KM ONO KYRKSTEN

17 ha (17 ha våtm), 170 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.
Åkermark ansluter.

Delobj. 1: Koncentrisk mosse
17 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande
dikning, torvtäkt.

Element 1: Sträng, 45 % av delobjektytan, barrskog.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 45 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Randskog, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet,
barrskog.

10E 8F 01 (4431) KLASS 3
ÖSTRA KÄRNEMOSSEN 1,5 KM O ÖSTRA KÄRNE

23 ha (23 ha våtm), 150 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.
Åkermark ansluter.

Delobj. 1: Excentrisk mosse
23 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen,
dikning, torvtäkt.

Element 1: Sträng, (otydl.), 47 % av delobjektytan.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 50 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Randskog, (otydl.), 3 % av delobjektytan, glest
träddäckt, blandskog.

10E 8F 02 (4209) KLASS 3
MYR 300 M NV ÖSTRA KÄRNE, 13 KM N KARLSKOGA
FLYGPLATS

4 ha (4 ha våtm), 145 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.
Sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Mad vid sjö
1 ha, öppet.

Element 1: Golv. Mjukmatta.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
2 ha, glest träddäckt. Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, barrskog.
Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, öppet,
barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
1 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande väg.
Vegetationen är influerad av källvatten.

Element 1: Golv, lövskog. Fastmatta.

10E 8G 01 (1234) KLASS 3
MYR 1,5 KM O ARVIDSUDDEN,
4 KM NO GRANBERGSDAL

26 ha (23 ha våtm), 215 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Tjärn
3 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan. Vattenvegetation.

Delobj. 2: Sluttande mosse
2 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 40 % av delobjektytan, barrskog.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 40 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 3: Randskog, 20 % av delobjektytan,
glest träddäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse
9 ha, fördelat på 7 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan
från dikning.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, barrskog.
Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, öppet,
barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 5 % av delobjektytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 6 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan, glest träddäckt,
lövskog. Fastmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 4: Golv, 9 % av delobjektytan. Lösbottom.

Element 5: Bäck, 1 % av delobjektytan.

**10E 8G 02 (0726) KLASS 2
KÄRR 700 M O LERSJÖTORP, 11,5 KM NO KARLSKOGA
FLYGPLATS**

2 ha (2 ha våtm), 185 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.
Sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Topogent kärr
2 ha, glest trädäkt. Svag lokal påverkan från anslutande
hyggen, dikning. Botaniska värden.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, blandskog.
Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, skogsbevuxet,
blandskog. Fastmatta.

**10E 8H 02 (1225) KLASS 3
VÅTMARK 200 M O VARVET, 6 KM V ÄLVHYTTAN**

5 ha (5 ha våtm), 150 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.
Ingår i ängs- och hagmarksinventering. Sjö ansluter till
minst 25%.

Delobj. 1: Strandäng
5 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, lövskog.
Området är beteshävdad.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan, glest trädäkt,
lövskog.

**10E 9E 01 (3624) KLASS 3
KOJMOSEN 3 KM NV ÖSTRA KEDJEÅSEN**

20 ha (20 ha våtm), 150 m ö h. Flygb. -78.
Karlskoga kn.
Ingår i naturvårdsplan. Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt våldv moss
12 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
3 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande väg.
Element 1: Bäck, 1 % av delobjektytan.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 9 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 4: Golv, 40 % av delobjektytan, skogsbevuxet,
lövskog.

Delobj. 3: Platåformigt våldv moss
5 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, barrskog.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 7 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Lagg, 3 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**10E 9F 01 (3844) KLASS 2
MOSSBOMOSEN 9,5 KM NV KARLSDAL**

53 ha (49 ha våtm), 225 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
16 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, öppet. Svag lokal
påverkan från anslutande hyggen, dikning, anslutande väg.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Gungfly, 2 % av delobjektytan.

Element 3: Bäck, 1 % av delobjektytan.

Element 4: Golv, 12 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 5: Golv, 10 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
2 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Golv, lövskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Svagt våldv moss
15 ha, fördelat på 7 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 22 % av delobjektytan, glest
trädäkt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Hölja, 1 % av delobjektytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Lagg, 2 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Platåformigt våldv moss
11 ha, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Göl, 1 % av delobjektytan.

Element 2: Hölja, 2 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 1 % av delobjektytan. Lösbottom.

Element 4: Mosseplan, 80 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Mosseplan, 14 % av delobjektytan, glest
trädäkt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 6: Dråg, 2 % av delobjektytan.

Delobj. 5: Obestämbbar myr
5 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen,
stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, skogsbevuxet,
barrskog.

**10E 9G 01 (3214) KLASS 2
STORA BOFALLSMOSEN 8 KM NV KARLSDAL**

21 ha (21 ha våtm), 275 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.

Delobj. 1: Koncentrisk mosse

18 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Göl, 3 % av delobjekttytan.

Element 2: Hölja, 17 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 1 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 4: Mosseplan, 50 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Sträng, 10 % av delobjekttytan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 6: Tuva, 15 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 7: Dråg, 5 % av delobjekttytan.

Element 8: Lagg, 4 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 9: Randskog, (otyd.), 1 % av delobjekttytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 2: Platåformigt vålvd mosse

3 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjekttytan, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjekttytan, glest trädäck, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Lagg, 5 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**10E 9G 02 (0635) KLASS 3
GÄLLSJÖMOSSAN 5 KM NV KARLSDAL**

19 ha (19 ha våtm), 265 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.

Delobj. 1: Sluttande mosse

15 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Sträng, 35 % av delobjekttytan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 20 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Göl, 1 % av delobjekttytan.

Element 4: Hölja, 2 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 5: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan, glest trädäck, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 6: Lagg, 5 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 7: Hölja, 22 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 2: Svagt vålvd mosse

4 ha, glest trädäck. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, barrskog. Fastmatta.

**10E 9G 04 (2017) KLASS 3
ETTERMOSSAN 8,5 KM NNO GRANBERGSDAL**

18 ha (17 ha våtm), 270 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.

Delobj. 1: Excentrisk mosse

4 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Tuva, 10 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 80 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 2 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Hölja, 2 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 5: Mosseplan, 6 % av delobjekttytan, glest trädäck, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr

5 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 25 % av delobjekttytan, glest trädäck, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Svagt vålvd mosse

2 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädäck. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Platåformigt vålvd mosse

6 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 24 % av delobjekttytan, glest trädäck, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 2 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 4: Dråg, 3 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 5: Lagg, (otyd.), 1 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**11E 0F 06 (1408) KLASS 3
FLYMOSSAN 8 KM V ROCKESHOLM**

22 ha (21 ha våtm), 215 m ö h. Flygb. -78.
Karlskoga kn.

Delobj. 1: Topogent kärr

5 ha, glest trädäck. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjekttytan, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjekttytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 3: Golv, 10 % av delobjekttytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 2: Excentrisk mosse

16 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Göl, 1 % av delobjektytan.

Element 2: Hölja, 20 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 1 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 4: Hölja, 10 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.


Element 5: Sträng, 30 % av delobjektytan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 6: Mosseplan, 13 % av delobjektytan, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 7: Mosseplan, 24 % av delobjektytan, glest träd täckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 8: Lagg, (otyd.), 1 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

KUMLA



**10F 0A 01 (4116) KLASS 2
ÖJAMOSSEN 6 KM V ÅBYTORP**

433 ha (418 ha våtm), 55 m ö h. Flygb. -86. Fält -77.
Kumla kn.
Riksintresse för naturvården. Drumlin i anslutning,
litteratur om objektet finns, området ornitologiskt
inventerat.

Delobj. 1: Obestämbär mosse

43 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Stark lokal
påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse

41 ha, skogsbevuxet. Stark generell påverkan från torvtäkt,
svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 3: Tjärn

2 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 4: Excentrisk mosse

283 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
dikning, anslutande dikning, torvtäkt, väg.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan, barrskog.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 23 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, glest
träddäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 5: Gungfly, 1 % av delobjektytan. Öppet
mjukmattekärr.

Element 6: Hölja, 1 % av delobjektytan. Lösbottom.

Element 7: Mosseplan, 8 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 8: Lagg, 2 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 8, underelem. 1: Lagg, 1 % av delobjektytan, 1-3 %
krontäckning, lövskog. Öppet fastmattekärr.

Element 8, underelem. 2: Lagg, 1 % av delobjektytan.
Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 8, underelem. 3: Lagg, 1 % av delobjektytan,
4-10 % krontäckning, lövskog. Öppet fastmattekärr.

Element 9: Randskog, 5 % av delobjektytan, skogsbevuxet,
barrskog.

Delobj. 5: Svagt välvd mosse

40 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning, anslutande dikning,
torvtäkt, väg.

Element 1: Mosseplan, 78 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, glest
träddäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 2 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 6: Topogent kärr

11 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 1, underelem. 1: Golv, 15 % av delobjektytan,
1-3 % krontäckning, lövskog. Mjukmattekärr, starr-S. fallax
variant.

Element 2: Golv, 63 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 2 % av delobjektytan, skogsbevuxet,
lövskog.

**10F 1B 02 (2625) KLASS 4
STORMOSSEN 1 KM O ÅBYTORP**

23 ha (23 ha våtm), 65 m ö h. Flygb. -86.
Kumla kn.


Mycket starkt generellt påverkat av torvtäkt.

**10F 2C 01 (0919) KLASS 4
EKEBYMOSEN 1 KM N KUMLA**

360 ha (360 ha våtm), 40 m ö h. Flygb. -86.
Kumla kn.

Mycket starkt generellt påverkat av torvtäkt. Området
ornitologiskt inventerat.

LAXÅ



**09E 1F 01 (2826) KLASS 3
BRÄNNEMOSSEN OCH STORMOSSEN,
4 KM NNV SÖRHAMN**

15 ha (15 ha våtm), 180 m ö h. Flygb. -83.
Laxå kn.

Delobj. 1: Sluttande mosse
8 ha, öppet.

Element 1: Sträng, (otyd.), 25 % av delobjekttytan.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 20 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 40 % av delobjekttytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 4: Lagg, 5 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 5: Randskog, 10 % av delobjekttytan, skogbevuxet,
barrskog.

Delobj. 2: Platåformigt välvd mosse
7 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjekttytan, glest
träddäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Lagg, 3 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Lagg, 7 % av delobjekttytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 5: Randskog, 5 % av delobjekttytan, skogbevuxet,
barrskog. Fastmatta.

**09E 1F 02 (4746) KLASS 3
MYR 500 M O BLANKSJÖN, 7,5 KM SSO TIVED**

5 ha (5 ha våtm), 175 m ö h. Flygb. -83.
Laxå kn.
Ingår i naturvårdsplan. Nationalpark.

Delobj. 1: Platåformigt välvd mosse
5 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, 55 % av delobjekttytan, barrskog.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 5 % av delobjekttytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 30 % av delobjekttytan, glest
träddäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Randskog, 9 % av delobjekttytan, skogbevuxet,
barrskog.

Element 5: Lagg, (otyd.), 1 % av delobjekttytan, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

09E2F04

Myrar kring Vringelirövarna och Röven, 5,5 km SO Tived k:a

Myren har inte inventerats i fält, beskrivningen och naturvärdesbedömningen bygger enbart på flygbildstolkning. De tre små myrarna ligger i det natursköna landskap som karaktäriserar Tivedens nationalpark. Sydväst om objektet breder sjön Stora Trehörningen ut sig. I det skogsbeklädda, kuperade området domineras granit berggrunden. Våtmarkerna ligger samtliga i anslutning till små skogstjärnar och består av sumpskog, svagt välvda mossar och kärr. Mellan tjärnarna höjer sig trädbevuxen fastmark. De olika delobjekten upptar små ytor. Kärren ligger närmast tjärnarna och har ett golv som är öppet och av fastmattetyt. Sumpskogarna har en sluten krontäckning, dominerad av barrträd. De svagt välvda mossarna är tallbevuxna med ett vanligtvis helt slutet trädsikt.

Naturvärdesbedömningen grundas bl a på orördheten, läget samt att flera myrtyper finns representerade.

**09E 2F 04 (4343) KLASS 1
MYRAR KRING VRINGELIRÖVARNA OCH RÖVEN 5,5
KM SO TIVED KA**

11 ha (8 ha våtm), 170 m ö h. Flygb. -83.
Laxå kn.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården, ingår i urskogsinventering 1982. Nationalpark.
Naturskog i eller i anslutning, sjö ansluter till högst 24 %, våtmarken ligger i en sprickdal.

Delobj. 1: Topogent kärr
3 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 75 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjekttytan. Skvatramdominerad
vegetation. Fastmatta. Övergångstyp kärr-mosse.

Element 3: Bäck, 5 % av delobjekttytan.

Delobj. 2: Sumpskog

2 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Golv, barrskog.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse
3 ha, fördelat på 4 ytor, skogbevuxet.

Element 1: Golv, 80 % av delobjekttytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjekttytan, glest träddäckt.
Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Tjärn
3 ha, fördelat på 5 ytor.

Element 1: Restsjö, 90 % av delobjekttytan. Permanent öppet
vatten.

Element 2: Gungfly, 10 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

**09E 2F 05 (4619) KLASS 3
KÄRREMOSSEN 1,5 KM S TIVED**

32 ha (26 ha våtm), 180 m ö h. Flygb. -83.
Laxå kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
2 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 90 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjekttytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
24 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, körspår från traktor/skogsmaskin, stark lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 89 % av delobjekttytan, glest trädäck, blandskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 1 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 4: Lagg, 3 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 5: Lagg, 2 % av delobjekttytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 6: Göl, 1 % av delobjekttytan.

**09E 2F 06 (0144) KLASS 3
RÅGETEMOSSEN 7 KM SSO TIVED**

4 ha (4 ha våtm), 185 m ö h. Flygb. -83.
Laxå kn.
Ingår i naturvårdsplan. Nationalpark.

Delobj. 1: Platåformigt välvd mosse
4 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, 82 % av delobjekttytan, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 10 % av delobjekttytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 3: Randskog, (otydl.), 8 % av delobjekttytan, skogbevuxet, barrskog.

09E2G01 Tolvtingsmossen med flera myrar, 6 km SO Tived k:a

Objektet är omgivet av vildmarkspräglad natur med mossövertäckta stenblock i en barrträdsdominerad skog. Berggrunden domineras av granit. Myren ligger i Tivedens nationalpark, strax nedom dess norra gräns. Våtmarken slingrar sig fram mellan de skogsklädda höjderna och ger ett flikigt intryck. De öppna vattenytorna representeras av spridda små tjärnar. Enstaka, fattiga kärr finns i periferin i det i övrigt mossedominerade objektet. Objektet inventerades i fält den 9 augusti 1993. Längs i sydväst ligger en öppen, svagt välvd mosse. Fastmattor med tuvull och bl a *Sphagnum magellanicum* dominerar mosseplanet. Inslag finns av mjukmattehöljor med vitag och *Sphagnum cuspidatum*, ristuvor och enstaka lösbottenhöljor. Ett par smärre stenblock ligger i mossen. I söder ligger ett litet kärr omgivet av branta, kala bergssidor. Tuvor uppbyggda av tuvull finns i kärret som i övrigt utgörs av en mycket blöt mjukmatta med ett svagt utbildat fältskikt. Enstaka tallar och glasbjörkar växer i kärret. Några av träden har dött och står kvar som torra rester. I objektet finns även tallklädda, svagt välvda mossar. Deras undervegetation domineras av skvattram.

Mosaiken av flera myrtyper, läget samt att myren är relativt orörd är några faktorer bakom den höga naturvärdesbedömningen. Området har dessutom betydelse för friluftslivet och är välfrekventerat.

**09E 2G 01 (2402) KLASS 1
TOLVTINGSMOSEN M.F.L. NORR DÄROM TIVEDENS NP
6 KM SO TIVED
KA**

38 ha (30 ha våtm), 170 m ö h. Flygb. -83. Fält -93.
Laxå kn.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården, ingår i urskogsinventering 1982. Nationalpark.
Naturskog i eller i anslutning, våtmarken ligger i en sprickdal.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
13 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet. Finmosaik av olika vegetationstyper.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjekttytan, barrskog. Tallmosse av skvattramtyp.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjekttytan, blandskog. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, glest trädäck, barrskog. Fastmatta. Finmosaik av olika vegetationstyper.

Delobj. 2: Topogent kärr
3 ha, fördelat på 6 ytor, öppet.

Element 1: Golv, lövskog. Fastmattekärr av tuvullvitmosstyp.

Element 1, underelem. 1: Golv, 20 % av delobjekttytan. Mjukmattekärr, starr-S. fallax variant.

Delobj. 3: Sumpskog
7 ha, fördelat på 4 ytor.

Element 1: Golv, 90 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Golv, 10 % av delobjekttytan, blandskog.

Delobj. 4: Svagt välvd mosse
7 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan.
Fastm.mosse av tuvull-S. magellanicumtyp.

Element 1, underelem. 1: Tuva, 30 % av delobjektytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 1, underelem. 2: Hölja, 5 % av delobjektytan.
Mjukm.mosse, vitag-kallgräs-S.cuspidatumtyp.

Element 1, underelem. 3: Hölja, 5 % av delobjektytan.
Höljegöl.

Element 2: Randskog, 10 % av delobjektytan, skogsbevuxet,

barrskog. Tallmosse av ristyp.

Element 3: Mosseplan, 10 % av delobjektytan.
Skvatramdominerad vegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Tjärn
2 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Restsjö, 90 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Element 2: Gungfly, 10 % av delobjektytan. Fastmatta-mjukmatta.

09E2G02 Myr vid Trollkyrkesjön, 7 km SO Tived k:a

Objektet ligger i norra delen av Tivedens natursköna nationalpark. Berggrunden utgörs av granit. Våtmarken är liten, den sträcker sig huvudsakligen mellan Andsjön i norr till Trollkyrkesjön i söder, en sträcka på ett par hundra meter. En del av Bergslagsleden är förlagd till söder om Andsjön. Området utgörs av skogstäckta mossar med undantag av ett kärr i sydväst. Objektet inventerades i fält den 9 augusti 1993. De svagt välvda tallmossarna är av östlig typ och domineras av odon och skvatram. Kärrret är fattigt och har ett fastmattegolvs där pors och *Sphagnum fallax* är vanliga. Dominansen bryts av mjukmattor med ett svagt utbildat fältskikt men med en heltäckande matta av *Sphagnum papillosum* i botten. Enstaka lösbottnar är också representerade. Längst i norr finns en liten sumpskog som tyvärr är skadad av diken.

Den höga naturvärdesbedömningen motiveras bl a av att flera typer ur myrserien finns representerade, att det är relativt opåverkat samt läget. Våtmarken har också betydelse för det rörliga friluftslivet.

09E 2G 02 (1710) KLASS 1 MYR VID TROLLKYRKESJÖN TIVEDENS NP 7 KM SO TIVED KA

10 ha (9 ha våtm), 180 m ö h. Flygb. -83. Fält -93.
Laxå kn.

Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården, ingår i urskogsinventering 1982. Nationalpark.
Naturskog i eller i anslutning, sjö ansluter till högst 24%, våtmarken ligger i en sprickdal.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
4 ha, skogsbevuxet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, barrskog.
Tallmosse av skvatramtyp.

Element 2: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, blandskog.

Element 3: Bäck, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr
2 ha, glest trädäckat.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan, barrskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan, öppet. Öppet fastmattekärr.

Element 2, underelem. 1: Golv, 10 % av delobjektytan.
Mjukmattekärr, starr-S. papillosum var.

Element 2, underelem. 2: Golv, 3 % av delobjektytan. Öppet lösbottenkärr.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, öppet.
Risvegetation. Fastmatta. Övergångstyp kärr-mosse.

Delobj. 3: Tjärn
1 ha.

Element 1: Restsjö, 80 % av delobjektytan. Permanent öppet vatten.

Element 2: Gungfly, 20 % av delobjektytan. Fastmatta-mjukmatta.

Delobj. 4: Svagt välvd mosse
3 ha, skogsbevuxet.

Element 1, underelem. 1: Mosseplan, barrskog.

09E 2G 03 (2901) KLASS 3 EKEDUNGSMOSSEN 5 KM SO TIVED

18 ha (16 ha våtm), 195 m ö h. Flygb. -83.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
14 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, barrskog.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 2: Sluttande mosse
2 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Sträng, 40 % av delobjektytan, barrskog.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 40 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 20 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

**09E 3F 01 (0729) KLASS 2
BASTLANDSMOSSEN 1,5 KM O TIVED**

32 ha (27 ha våtm), 180 m ö h. Flygb. -83.
Laxå kn.

Delobj. 1: Tjärn
2 ha. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan.

Element 2: Gungfly, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Delobj. 3: Svagt våldv moss
12 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, 10 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 89 % av delobjektytan, barrskog.

Element 3: Lagg, 1 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Platåformigt våldv moss
8 ha, öppet. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 2: Sträng, 2 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 3: Hölja, 7 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Göl, 1 % av delobjektytan.

Element 5: Randskog, 10 % av delobjektytan, skogsbevuxet,
barrskog.

**09E 3F 02 (3129) KLASS 3
SVARTEMOSSEN 1 KM NO TIVED**

18 ha (15 ha våtm), 165 m ö h. Flygb. -83.
Laxå kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
3 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande väg.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 27 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 3: Golv, 3 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 2: Platåformigt våldv moss
8 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Göl, 5 % av delobjektytan.

Element 2: Hölja, 24 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 4: Mosseplan, 30 % av delobjektytan. Fastmatta med ristuvor.

Element 5: Randskog, 5 % av delobjektytan, skogsbevuxet,
barrskog. Fastmatta.

Element 6: Lagg, 1 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 7: Mosseplan, 30 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 3: Svagt våldv moss
4 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

**09E 3G 01 (0706) KLASS 2
PORSÄNGSMOSSEN OCH EKEFALLSMOSSEN,
4 KM O TIVED**

55 ha (53 ha våtm), 180 m ö h. Flygb. -83. Fält -77.
Laxå kn.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Excentrisk moss
25 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, körspår från traktor/skogsmaskin. Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Sträng, 40 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 2: Hölja, 25 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 2, underelem. 1: Hölja, 5 % av delobjektytan.
Mjukmattemosse av vitag-S.tenellumtyp.

Element 3: Hölja, 1 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 4: Mosseplan, 23 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4, underelem. 1: Dråg, 2 % av delobjektytan.
Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 5: Randskog, 8 % av delobjektytan, skogsbevuxet,
barrskog.

Element 6: Lagg, 1 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 7: Lagg, 2 % av delobjektytan.
Mjukmattekärr, starr-S. papillosum var.

Delobj. 2: Svagt våldv moss
23 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, körspår från traktor/skogsmaskin, kraftledning, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, barrskog.
Fastmatta.

Element 2: Lagg, 3 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Lagg, 2 % av delobjektytan, öppet.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Lagg, 1 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 5: Mosseplan, 8 % av delobjektytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 6: Mosseplan, 1 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 3: Tjärn
2 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan.

Element 2: Gungfly, 25 % av delobjektytan.

Delobj. 4: Topogent kärr
5 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Golv, 10 % av delobjektytan.
Fastm.kärr,tuvslöv-S.papillosum-compactumtyp.

Element 1, underelem. 2: Golv, 5 % av delobjektytan,
> 25 % kröntäckning, blandskog. Skogskärr.

Element 2: Golv, 6 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 3: Golv, 4 % av delobjektytan. Mjukmatta.

09E 3G 02 (1708) KLASS 2
STORMOSSEN 1 KM NO TIVEDSTORP, 4 KM O TIVED

36 ha (35 ha våtm), 180 m ö h. Flygb. -83. Fält -77.
Laxå kn.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns, sjö
ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Excentrisk mosse
22 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Sträng, 1 % av delobjektytan, barrskog.
Ristuvmosse av S. rubellumtyp.

Element 2: Hölja, 23 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 39 % av delobjektytan.
Fastmattemosse av tuvull-S. balticumtyp.

Element 4: Randskog, 2 % av delobjektytan, glest träd täckt,
blandskog.

Element 5: Lagg, 1 % av delobjektytan, blandskog. Öppet
fastmattekärr.

Delobj. 2: Svagt våldv moss
11 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, anslutande
dikning, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, glest träd täckt, blandskog.

Element 2: Lagg, 1 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
2 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 5 % av delobjektytan. Mjukmatta.

09E 3G 03 (2706) KLASS 3
FLYMOSEN M FL MYRAR 3,5 KM O TIVED

54 ha (45 ha våtm), 175 m ö h. Flygb. -83. Fält -77.
Laxå kn.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns, sänkt
sjö i anslutning.

Delobj. 1: Tjärn
4 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Svagt våldv mosse
33 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen, dikning,
körspår från traktor/skogsmaskin, väg.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, skogsbevuxet,
barrskog. Tallmosse av ristyp.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 3: Hölja, 2 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Lagg, 8 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4, underelem. 1: Dråg, 2 % av delobjektytan.
Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 5: Lagg, 3 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 6: Gungfly, 2 % av delobjektytan. Mjukmattekärr av
starr-vitmosstyp.

Element 6, underelem. 1: Gungfly, 1 % av delobjektytan.
Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Delobj. 3: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från
dikning.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjektytan. Mjukmattekärr av
starr-vitmosstyp.

Element 4: Golv, 30 % av delobjektytan, skogsbevuxet,
lövskog. Fastmatta.

09E 3G 04 (2340) KLASS 3
SVARTSJÖMOSEN 7 KM O TIVED

15 ha (13 ha våtm), 190 m ö h. Flygb. -83.
Laxå kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Excentrisk mosse
6 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen,
dikning, anslutande dikning, väg.

Element 1: Sträng, 45 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 35 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Randskog, 3 % av delobjektytan, skogsbevuxet,
barrskog.

Element 5: Lagg, 1 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation.

Element 6: Lagg, 1 % av delobjektytan. Risvegetation.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
7 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, körspår från traktor/skogsmaskin, torvtäkt, väg. Åkermark ansluter.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Element 2: Gungfly, 1 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Tjärn
2 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv.

09E 3G 05 (2843) KLASS 3
MYR 500 M O SJÖFALLET, 7,5 KM O TIVED

15 ha (15 ha våtm), 190 m ö h. Flygb. -83.
Laxå kn.
Ingår i naturvårdsplan. Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Excentrisk mosse
13 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Sträng, 50 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element: Randskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
2 ha, glest trädäkt. Svag lokal påverkan från anslutande dikning.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan, barrskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 70 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

09E 4F 01 (1442) KLASS 3
MYR 500 M S SÄV SJÖFALLET, 3,5 KM NNO TIVED

17 ha (14 ha våtm), 160 m ö h. Flygb. -83.
Laxå kn.
Sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Topogent kärr
3 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 3: Gungfly, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
11 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, väg.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, barrskog.
Fastmatta.

Element 2: Lagg, 15 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Tjärn

1 ha.

Element 1: Golv.

09E 4F 02 (0845) KLASS 3
FLYÄNGSMOSSEN 3,5 KM NNO TIVED

13 ha (13 ha våtm), 160 m ö h. Flygb. -83.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
11 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, stark lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, barrskog.
Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 2: Topogent kärr
2 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, anslutande väg.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjektytan. Mjukmatta.

09E 4G 01 (1118) KLASS 3
BOSJÖMOSSAR 5 KM NO TIVED

58 ha (55 ha våtm), 165 m ö h. Flygb. -83.
Laxå kn.
Litteratur om objektet finns, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
10 ha, fördelat på 5 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande dikning, stark lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Sluttande mosse
39 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, körspår från traktor/skogsmaskin, anslutande kraftledning, anslutande väg. Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Sträng, 11 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 3 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 4: Göl, 1 % av delobjektytan.

Element 5: Mosseplan, 65 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 6: Randskog, 10 % av delobjektytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 7: Lagg, 4 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 8: Lagg, 1 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
6 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från

dikning, väg.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, glest trädäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan, glest trädäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan. Mjukmatta.

**09E 4G 02 (3303) KLASS 3
MYR 500 M NNV BJURTÄRNEN, 5,5 KM NNO TIVED**

13 ha (12 ha våtm), 165 m ö h. Flygb. -83.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
9 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, kraflledning.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 5 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
4 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, kraflledning, anslutande väg.

Element 1: Golv, 84 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 3: Gungfly, 1 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Tjärn
1 ha.

Element 1: Golv.

**09E 4G 03 (2322) KLASS 2
MYR 500 M V SÖRBYTORP, 7,5 KM NNO TIVED**

32 ha (25 ha våtm), 165 m ö h. Flygb. -83.
Laxå kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Tjärn
4 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Topogent kärr
3 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, väg, anslutande väg.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 39 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 4: Gungfly, 1 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Platåformigt välvd mosse
4 ha, öppet. Svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Mosseplan, 1 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 4: Svagt välvd mosse
18 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, öppet.
Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 1 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 4: Lagg, 7 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 5: Lagg, 2 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

**09E 5D 06 (4111) KLASS 3
LÅNGEMOSSEN 600 M O SÖDERÅS, 4 KM SO GÅRDSJÖ**

14 ha (13 ha våtm), 210 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.

Delobj. 1: Tjärn
1 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
4 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 98 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 2 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
5 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Gungfly, 1 % av delobjektytan.

Element 2: Golv, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Platåformigt välvd mosse
4 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, barrskog.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 2 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Lagg, 3 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**09E 5D 07 (2043) KLASS 2
MYR 500 M O SLOTTSBOL, 3,5 KM SO GÅRDSJÖ**

33 ha (28 ha våtm), 210 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.
Ingår i naturvårdsplan. Ornitologiska värden.

Delobj. 1: Tjärn
2 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
10 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan, glest trädäckat, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 3: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Golv, 90 % av delobjekttytan, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Gungfly, 10 % av delobjekttytan.

Delobj. 4: Sluttande mosse
6 ha, öppet.

Element 1: Sträng, 10 % av delobjekttytan, Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 55 % av delobjekttytan, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 18 % av delobjekttytan, glest trädäckat, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 5: Lagg, 2 % av delobjekttytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 5: Platåformigt välvd mosse
5 ha, glest trädäckat. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 89 % av delobjekttytan, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 8 % av delobjekttytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Randskog, (otydl.), 2 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 4: Lagg, (otydl.), 1 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

09E 5E 01 (3213) KLASS 3
BARRSJÖMOSSEN 5,5 KM O GÅRDSJÖ

13 ha (12 ha våtm), 170 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
2 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Gungfly, 50 % av delobjekttytan.

Element 2: Golv, 50 % av delobjekttytan, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
10 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan, öppet. Fastmatta.

09E 5E 02 (4102) KLASS 3
MYR 700 M O LIDEN, 4,5 KM O GÅRDSJÖ

18 ha (15 ha våtm), 190 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.

Delobj. 1: Tjörn
1 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
13 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 98 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 2 % av delobjekttytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
2 ha, öppet.

Element 1: Golv, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

09E 5E 03 (4604) KLASS 3
MYR 200 M S SKOGSBOLET, 4 KM S FINNERÖDJA

9 ha (9 ha våtm), 195 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
9 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, torvtäkt, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Element 2: Lagg, (otydl.), 1 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

09E 5E 04 (4701) KLASS 3
MYR 300 M V SKOGSBOLET, 4 KM S FINNERÖDJA

18 ha (18 ha våtm), 180 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Mad vid sjö
6 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
6 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 3: Platåformigt välvd mosse
5 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjekttytan, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 18 % av delobjekttytan, glest trädäckat, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Randskog, 2 % av delobjekttytan, glest trädäckat, blandskog.

Delobj. 4: Topogent kärr
1 ha, öppet.

Element 1: Golv, lövskog. Risvegetation. Fastmatta.

09E 5E 05 (4409) KLASS 3
MYR 200 M NNO KÄLLEMON, 4 KM S FINNERÖDJA

17 ha (17 ha våtm), 140 m ö h. Flygb. -86.

Laxå kn.

Delobj. 1: Topogent kärr

5 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Platåformigt våldv moss

12 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjekttytan, lövskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

**09E 5E 06 (4844) KLASS 3
LÖVÖNSMOSEN 5 KM SO FINNERÖDJA**

14 ha (12 ha våtm), 200 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.

Delobj. 1: Tjärn
1 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Topogent kärr

5 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 48 % av delobjekttytan, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Gungfly, 2 % av delobjekttytan.

Delobj. 3: Svagt våldv moss

7 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 13 % av delobjekttytan, glest träd täckt, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Lagg, (otyd.), 2 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

09E5F01

Abborrtärnsmossen, 7 km SV Röfors

I området mellan Kråksjön och norra Unden har flera stora myrar utbildats. De har skonats från både dikningsföretag och torvtäktverksamhet. Abborrtärnsmossen är en av dem. Objektet har inte inventerats i fält. Beskrivningen bygger på flygbildstolkning samt uppgifter från litteratur. Abborrtärnsmossen ligger i ett barrskogsdominerat område. Berggrund är i huvudsak uppbyggd av granit. I öster tangeras myren av en rullstensås, Geta ryggen, som här är avsatt som domänreservat. Större delen av objektet utgörs av ombrotrof torvmark. De centrala delarna upptas av en platåmoss med strängstruktur i den norra hälften. I söder tycks mosseplanet däremot domineras av ristuvor. Mellan strängarna finns både fast- och mjukmattor. Mjukmattehöljorna är främst koncentrerade till ett stråk i mitten av mossen. Mer eller mindre väl utvecklad randskog finns längs den nordvästra kanten av mossen. I söder ligger ett stort öppet kärr. Det är uppbyggt av fastmattor och mjukmattor med inslag av risvegetation. Kärrret omger en liten tallmoss i nordväst. En kärrarm sticker iväg mot sydost och förenar på så sätt ytterligare en tallmoss till objektet. Mossen är centralt nästan helt öppen.

Orördheten, det finns endast ett par mycket små husbehovstorvtäkter, och storleken är två faktorer som den höga naturvärdesbedömningen grundas på.

**09E 5F 01 (3738) KLASS 1
ABBORRTÄRNMOSEN 7 KM SV RÖFORS**

76 ha (74 ha våtm), 140 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.
Ingår i naturvårdsplan. Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt våldv moss

13 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 87 % av delobjekttytan, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 3 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr

22 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 45 % av delobjekttytan.

Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjekttytan.

Element 4: Golv, 5 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 5: Golv, 20 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Delobj. 3: Platåformigt våldv moss

39 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, körspår från traktor/skogsmaskin, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 26 % av delobjekttytan. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Sträng, 20 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Element 4: Hölja, 15 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 5: Hölja, 2 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 6: Lagg, 1 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 7: Lagg, 1 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 8: Randskog, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet,
barrskog.

09E5F02

Kojemossen, Rotamossen och Källängsmossen, 7,5 km SSV Röfors

Myren har inte inventerats i fält. Beskrivningen och naturvärdesbedömningen grundas på flygbildstolkning samt uppgifter hämtade från litteratur. Kojemossen m fl, är den största myren i området mellan Kråksjön och norra Unden som befriats från hydrologiska ingrepp. Större delen av objektet kallas för Kojemossen, den övergår längst i söder till Rotamossen och i väster till Källängsmossen. Myren är omgiven av barrskog som också växer på fastmarksholmarna. Berggrunden domineras av granit. I öster har myren kontakt med Grässjön. I väster passerar myren av en väg. Så gott som hela Kojemossen består av sluttande mossar med svag lutning. Den avdelas av ett vattendrag i en övre och en nedre halva. Bäckens övergång senare till ett dråg. Mossens strängstruktur är svag, den utgörs ofta av tätt liggande ristuvor. Bäckdråget är artfattigt med fast- och mjukmattor samt lösbottenar. I väster finns ett ytterligare dråg med tuvull och vitmossor (Backeus 1978). Även de i periferin liggande kärren är fattiga. Golven är uppbyggda av både fast- och mjukmattor. De svagt välvda mossarna är till största delen tallbevuxna. I de trädfattiga partierna skyntas den riskladda undervegetationen.

Den höga naturvärdesbedömningen motiveras framförallt av storleken och orördheten.

09E 5F 02 (2240) KLASS I KOJEMOSSEN, ROTAMOSSEN OCH KÄLLÄNGSMOSSEN 7,5 KM SSV RÖFORS

265 ha (242 ha våtm), 145 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns,
området ornitologiskt inventerat, sjö ansluter till högst
24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
46 ha, fördelat på 7 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning, körspår från
traktor/skogsmaskin, torvläkt, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 81 % av delobjektytan, barrskog.
Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, Fastmatta.

Element 3: Lagg, 2 % av delobjektytan.

Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Lagg, 2 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
30 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, öppet. Svag lokal
påverkan från anslutande hygien, dikning, anslutande
dikning.

Element 1: Golv, 45 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 1, underelem. 1: Golv, 10 % av delobjektytan.
Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 2: Gungfly, 2 % av delobjektytan.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan.

Element 4: Golv, 2 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 5: Golv, 30 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

09E 5F 03 (4116) KLASS 3 MÄRREMOSSEN 7,5 KM SV RÖFORS

Element 5, underelem. 1: Golv, 10 % av delobjektytan.
Fastmattekärr av tuvull-vitmosstyp.

Element 6: Golv, 15 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 7: Restsjö, 1 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 3: Sluttande mosse
166 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, körspår
från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Sträng, 25 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan. Fastmatta med
ristuvor.

Element 3: Hölja, 24 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Hölja, 15 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 5: Bäckdråg, 5 % av delobjektytan.

Element 5, underelem. 1: Golv, 1 % av delobjektytan. Öppet
lösbottenkärr.

Element 5, underelem. 2: Golv, 2 % av delobjektytan. Öppet
kärr.

Element 5, underelem. 3: Golv, 1 % av delobjektytan. Öppet
lösbottenkärr.

Element 5, underelem. 4: Dråg, 1 % av delobjektytan.
Fastmattekärr av tuvull-vitmosstyp.

Element 6: Mosseplan, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet,
barrskog. Fastmatta.

Element 7: Lagg, 1 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 8: Randskog, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet,
barrskog.
21 ha (19 ha våtm), 140 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Tjärn
1 ha.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan.

Element 2: Gungfly, 10 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr

1 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse

18 ha, glest träd täckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, anslutande dikning.

körspår från traktor/skogsmaskin, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, barrskog.
Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Sträng, (otydl.), 10 % av delobjektytan.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Mosseplan, 55 % av delobjektytan, skogsbevuxet,
barrskog. Fastmatta.

Element 5: Lagg, 3 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 6: Lagg, 2 % av delobjektytan. Lösbotten.

09E5G01

Myr 100 m SO Skomakaretorp och Store mosse, 9,5 km S Röfors

Objektet har inte inventerats i fält. Naturvärdesbedömningen och beskrivningen grundas på flygbildstolkning samt uppgifter hämtade från litteratur.

Myren ligger mellan norra Unden och Grytsjön. I omgivningarna finns skogsmark med inslag av jordbruksmark. Berggrunden domineras av gnejs och granit. Mossar täcker större delen av objektets areal medan kärren finns i periferin. Ingående öppet vatten representeras av en stor och en liten tjärn. Myren består av två olikstora delar förenade av en kärrarm. Över kärrarmen leder en smal väg till Grässjön. Den västra delen av objektet är svagt hjärtformad med en kraftig randskog som ramar in mossen. I nordost ligger den största tjärnen, Bottnalösen. Den östra delen av myren upptar störst areal. Den består huvudsakligen av en vagt utbildad sluttande mosse. Några skogsbevuxna fastmarksholmar sticker upp ur mossen. Fastmattor är den mest frekventa av de hydrologiska typerna, men det finns inslag av mjukmattehöljor och små gölar. Den fattiga miljön avbryts av ett drag och en tjärn, Småsjön. Kärren finns företrädesvis i utkanterna av myren.

Att myren är relativt opåverkad, det finns endast några smala diken och en husbehovstorvtäkt och att flera myrtyper ingår, bl a sluttande mosse är två av bedömningsgrunderna till det höga naturvärdet. Myren är dessutom, enligt Naturvårdsöversikten (1984), en utmärkt biotop för flera fågelarter.

09E 5G 01 (0308) KLASS 1
MYR 100 M SO SKOMAKARETORP OCH STORE MOSSE,
9,5 KM S RÖFORS

128 ha (121 ha våtm), 160 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Åkermark ansluter, litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Sluttande mosse

94 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande dikning, torvtäkt.

Element 1: Sträng, (otydl.), 15 % av delobjektytan.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 27 % av delobjektytan. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 4: Hölja, 5 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 5: Hölja, 25 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 6: Göl, 2 % av delobjektytan.

Element 7: Drag, 3 % av delobjektytan.

Element 8: Lagg, 3 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 9: Randskog, 10 % av delobjektytan,

glest träd täckt, blandskog.

Delobj. 2: Topogent kärr

24 ha, fördelat på 6 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 3: Drag, 7 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 4: Golv, 3 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse

3 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 4: Tjärn

4 ha, fördelat på 2 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv.

09E 5G 02 (4303) KLASS 2
ORRMOSEN S KRÅKSJÖN, 6 KM S RÖFORS

84 ha (74 ha våtm), 145 m ö h. Flygb. -88.

Laxå kn.

Delobj. 1: Topogent kärr

16 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 40 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjekttytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 3: Bäck, 5 % av delobjekttytan.

Element 4: Golv, 25 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Sluttande mosse

39 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen. Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Sträng, (otyd.), 20 % av delobjekttytan.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 20 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 4: Mosseplan, 49 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Element 5: Lagg, 1 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 6: Randskog, 5 % av delobjekttytan, skogsbevuxet,
barrskog.

Delobj. 3: Tjärn

3 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 4: Svagt välvd mosse

19 ha, fördelat på 5 ytor, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjekttytan, barrskog.
Fastmatta.

Element 2: Lagg, 5 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

**09E 6D 01 (2012) KLASS 4
TORPMOSSEN 5 KM SV FINNERÖDJA**

20 ha (20 ha våtm), 150 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

20 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från avverkning,
stark generell påverkan från dikning, svag lokal påverkan
från anslutande dikning.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

**09E 6D 02 (3815) KLASS 4
MYR 100 M V BORGAN, 4,5 KM V FINNERÖDJA**

23 ha (22 ha våtm), 165 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

22 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning,
stark lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 12 % av delobjekttytan, glest

träddäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, (otyd.), 1 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Hölja, 1 % av delobjekttytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 5: Mosseplan, 1 % av delobjekttytan, lövskog.

**09E 6E 01 (4135) KLASS 3
LINDEHULTSMOSSEN 1,5 KM O FINNERÖDJA**

36 ha (35 ha våtm), 175 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.

Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

4 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan
från anslutande hyggen, dikning, anslutande dikning.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan, glest
träddäckt, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr

12 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen, anslutande dikning, kraftledning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Delobj. 3: Sluttande mosse

19 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, 8 % av delobjekttytan, barrskog.
Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Lagg, 2 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Sträng, 30 % av delobjekttytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 4: Hölja, 25 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 5: Hölja, 15 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 6: Tuva, 10 % av delobjekttytan, skogsbevuxet,
barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

**09E 6E 02 (2946) KLASS 3
GRÖNLIDS MOSSAR OCH VARGEKÄRRET 3 KM OSO
FINNERÖDJA**

88 ha (84 ha våtm), 185 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

39 ha, fördelat på 5 ytor; skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning,
kraftledning, stark lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan, glest
träddäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 2 % av delobjekttytan, öppet.

Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Hölja, 3 % av delobjektytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
17 ha, fördelat på 6 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 5 % av delobjektytan, glest trädtyckt, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Golv, 30 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 3: Excentrisk mosse
28 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, glest trädtyckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Sträng, 25 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 25 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Hölja, 5 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 5: Hölja, 24 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 6: Lagg, (otyd.), 1 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 7: Randskog, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 4: Tjärn
1 ha.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan. Vattenvegetation.

09E 6E 03 (4747) KLASS 3
FINNKÄRRSMOSSEN 3 KM V FINNERÖDJA

8 ha (8 ha våtm), 195 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
6 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, torvtäkt, väg.

Element 1: Mosseplan, 2 % av delobjektytan, barrskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 13 % av delobjektytan, glest trädtyckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 2: Topogent kärr

5 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, väg.

Element 1: Mosseplan, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

09E 6F 01 (0519) KLASS 3
LÅNGKÄRRET 6,5 KM SV RÖFORS

16 ha (16 ha våtm), 120 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
16 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning, väg.

Element 1: Golv, 25 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 22 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Gungfly, 5 % av delobjektytan.

Element 4: Bäck, 3 % av delobjektytan.

Element 5: Golv, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 6: Golv, 20 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

09E 6F 02 (1244) KLASS 3
KRÅKMOSSEN 5 KM SV RÖFORS

20 ha (18 ha våtm), 135 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
4 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, anslutande väg.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
14 ha, glest trädtyckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, öppet.
Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädtyckt, barrskog.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Lagg, 5 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

09E6F03 Långsmossen

Myren är vackert beläget mittemellan Lången och Borasjön. Omgivande mark är skogsdominerad utom vid gården Långsmon där det finns ett smärre parti jordbruksmark. Berggrunden utgörs i huvudsak av gnejs. Objektet sträcker sig i en nord-sydlig riktning och är ihopsnörd på mitten. Ett vattendrag, Långsmoån, flyter utmed östra kanten. I norr består objektet uteslutande av en svagt välvd mosse, i söder är kärr den dominerande våtmarkstypen. Objektet inventerades fält den 20 juli 1993. Den norra mossen är torr och fullkomligt täckt av ristuvor. Trädfrekvensen varierar från spridda tallar till skog. I öster, intill Långsmoviken, finns en zon vid

vattnet som är starkt betad av gäss. Här löper även en väl upptrampad stig. I maden utmed vattendraget vid Långsmon är trådstarr beståndsbildare men bladvassen tar ställvis överhanden. Bottenskiktet domineras av *Sphagnum papillosum*. Längre söderut är vattnet rörigare och vegetationssammansättningen i maden förändras något. Spridda glasbjörkar och klibbalar växer i kärret. Dystarr, vattenklöver, dybläddra och ängsull är vanliga kärlväxter. Bottenskiktet är vanligen mindre väl utbildat med bl a *Sphagnum contortum*. I sydväst finns ett dikespåverkat skogskärr.

Naturvärdesbedömningen grundas bl a på att flera olika våtmarkstyper ingår, från mosse till mad.

**09E 6F 03 (4935) KLASS 1
LÅNGSMOMOSSEN 3 KM V RÖFORS**

86 ha (83 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -88. Fält -93.
Laxå kn.
Litteratur om objektet finns, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr

17 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädäckt. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, lövskog.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mad vid vattendrag

23 ha, öppet. Svag lokal påverkan från bro, dikning, kraftledning.

Element 1: Golv, 10 % av delobjektytan. Öppet sumpkärr.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan. Vattenvegetation.

Element 3: Bäck, 10 % av delobjektytan.

Element 4: Golv, 55 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, lövskog. Sumpkärr av högstarr-örttyp.

Delobj. 3: Svagt välvad mosse

43 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 62 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av *S. fuscum*typ.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan.

Element 4: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, > 25 % krontäckning, barrskog. Tallmosse av ristyp.

Element 5: Lagg, 8 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 1: Golv, 11-25 % krontäckning, blandskog. Skogskärr.

**09E 6G 01 (2503) KLASS 2
GUMMETORPSMOSEN OCH STENSMOSEN 3 KM SSV
RÖFORS**

103 ha (90 ha våtm), 140 m ö h. Flygb. -88.

Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvad mosse

34 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 87 % av delobjektytan, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 5 % av delobjektytan. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 5 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Dråg, 3 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr

11 ha, fördelat på 7 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 28 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 4: Gungfly, 2 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Excentrisk mosse

45 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, torvtäkt. Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Lagg, 2 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Randskog, 10 % av delobjektytan.

Element 3: Sträng, 20 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Hölja, 20 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 5: Hölja, 10 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 6: Mosseplan, 25 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 7: Dråg, 1 % av delobjektytan.

Element 8: Mosseplan, 12 % av delobjektytan, glest trädäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 4: Tjärn

1 ha.

Element 1: Golv.

09E6G02 Karamossen, 3,5 km S Laxå

Det ca 400 hektar stora objektet ligger strax väster om Röfors, mellan de båda sjöarna Borasjön och Västra Laxsjön. En liten del av myren har kontakt med den senare. Omgivande mark är skogsdominerad, berggrunden består i huvudsak av gnejs. Två våtmarkstyper, framförallt excentrisk mosse men även kärr, upptar större delen av arealen. Ett fåtal skogsklädda fastmarksholmar ligger insprängda i myren. Objektet inventerades i fält den 29 september 1993. Den excentriska mossen är oregelbundet formad och avdelas i mitten av ett tvärgående kärr. Hela mossen är svagt tallbevuxen. Mellan de risbevuxna tuvorna och strängarna förekommer fastmattor med tuvull och vitmossor, bl a *Sphagnum balticum* och *Sphagnum rubellum* samt mjukmattehöljor. Utåt mossekanterna ökar inslaget av tall och ris. Randskogen är ställvis av skvattramtyp. Kärrret som avdelar mossen på mitten är vidsträckt och öppet. Till största delen är kärrret fattigt. Längst i söder är golvet av fastmattetyper där tuvull dominerar fältskiktet och *Sphagnum papillosum* bottenskiktet. Norrut övergår kärrret till en blöt mjukmatta där flaskstarr och vitag är allmänna i det utvecklade fältskiktet. I bottenskiktet samdominerar *Sphagnum papillosum* och *Sphagnum pulchrum*. Enligt Backeus (1978) växer här mer krävande arter t ex *Sphagnum obtusum*. Längst i sydost har objektet sjökontakt via en tallbevuxen svagt välvd mosse. Ingreppen är få och utgör inget större hot mot myrens hydrologi. Intill vägen i sydöst finns små, äldre torvtäcker. Några större kraftledningar korsar området, under den södra finns ett par smala diken.

Storleken och att myren är förhållandevis opåverkad är två av motiven till den höga naturvärdesbedömningen. Myren är också en av södra länets finaste vadarmyror med sex häckande arter. Bedömdes höra till klass 3 i Fågelmyrar i Örebro län (1982:1).

09E 6G 02 (4705) KLASS I KARAMOSSEN 3,5 KM S LAXÅ

408 ha (400 ha våtm), 135 m ö h. Flygb. -88. Fält -93. Laxå kn.

Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns, området ornitologiskt inventerat, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr

61 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande dikning, kraftledning.

Element 1: Golv, 20 % av delobjekttytan. Fastm.kärr,tuvsilv-S.papillosum-compactumtyp.

Element 2: Golv, 75 % av delobjekttytan. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 2, underelem. 1: Golv, 5 % av delobjekttytan, 1-3 % krontäckning, blandskog. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 2, underelem. 2: Golv, 5 % av delobjekttytan. Mjukmattekärr, starr-S. papillosum var.

Element 3: Golv, 5 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse

54 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning, torvtäkt, väg.

Element 1: Mosseplan, 83 % av delobjekttytan, barrskog. Tallmosse av skvatramtyp.

Element 2: Mosseplan, 12 % av delobjekttytan, glest trädtyckt, barrskog. Tallmosse av ristyp.

Element 3: Lagg, 3 % av delobjekttytan. Mjukmattekärr, starr-S. fallax variant.

Element 4: Lagg, 2 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Delobj. 3: Excentrisk mosse

275 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från

dikning, kraftledning. Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Sträng, 1 % av delobjekttytan. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 1, underelem. 1: Sträng, 5 % av delobjekttytan, 4-10 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 1, underelem. 2: Tuva, 10 % av delobjekttytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjekttytan. Mjukm.mosse, vitag-kallgräs-S.cuspidatumtyp.

Element 3: Mosseplan, 30 % av delobjekttytan. Fastmattemosse av tuvull-S. balticumtyp.

Element 3, underelem. 1: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan. Fastmattemosse av tuvull-S. rubellumtyp.

Element 4: Hölja, 3 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 5: Lagg, 2 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 6: Lagg, 1 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 7: Randskog, 10 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog. Tallmosse av ristyp.

Element 7, underelem. 1: Randskog, 5 % av delobjekttytan, > 25 % krontäckning, barrskog. Tallmosse av skvatramtyp.

Element 8: Mosseplan, 24 % av delobjekttytan, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Delobj. 4: Topogent kärr

10 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjekttytan, glest trädtyckt, blandskog. Fastmattekärr av tuvull-vitmosstyp.

Element 2: Golv, 5 % av delobjekttytan, öppet. Mjukmattekärr, starr-S. papillosum var.

Element 3: Golv, 30 % av delobjekttytan, lövskog. Granbjörkkärr av fattig vitmosstyp.

09E6H01 Flera mindre myrar i Gropsjöområdet, Rockebrokarret, 6 km OSO Røfors skola

Våtmarken har inte inventerats i fält. Naturvärdesbedömningen och beskrivningen bygger på flygbildstolkning samt uppgifter hämtade från litteratur. Rockebrokarret ligger strax norr om Östra Laxsjön, i berggrunden dominerar gnejs. Kärret, som egentligen utgörs av ett antal småmyrar, avsattes som naturreservat 1974. De små rikkärren är utspridda i ett skogsdominerat område. En väg passerar området mellan kärret och Östra Laxsjön. Kärrgolven är uppbyggda av fastmattor med ett stort inslag av lösbotten. Fältskiktet är artrikt och hyser en mängd krävande, eller på annat sätt intressanta, växter. Här påträffas bla kärrull, snip, brunag och myrlilja. I mossemattan växer både vit- och brunmossor, t ex *Sphagnum contortum*, *Sphagnum subfulvum*, *Loeskhypnum badium* och *Scorpidium scorpioides*. Tjörnarna omgärdas av en bård med injukmattor. Objektets tallbevuxna platåmosse ligger öster om Gropsjön.

Myrens höga naturvärdesklass beror framförallt på dess botaniska värden. Rockebrokarret ingår i Myrskyddsplan för Sverige.

09E 6H 01 (3017) KLASS 1 FLERA MINDRE MYRAR I GROPSJÖOMRÅDET 6 KM OSO RØFORS SKOLA

12 ha (9 ha våtm), 140 m ö h. Flygb. -88. Fält -73.
Laxå kn.

Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvärden, ingår i SNV:s övers. inv. 1979. Naturreservat. Botaniska värden, dödislandskap, geovetenskapliga värden, stora hydrologiska värden, isälvsbildning i anslutning.

Delobj. 1: Topogent kärr

6 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, öppet.
Området ligger i en åsgrav, rullstensås.

Element 1: Golv, 25 % av delobjekttytan. Öppet kärr.
Rikkärr.

Element 1, underelem. 1: Golv, 25 % av delobjekttytan.
Öppet kärr.

Element 2: Golv, 30 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 3: Golv, 20 % av delobjekttytan, skogbevuxet,
barrskog. Fastmatta.

Element 4: Källa, 1 % av delobjekttytan.

Delobj. 2: Platåformigt våldv moss

3 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan, barrskog.
Risvegetation. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Lagg, 10 % av delobjekttytan, lövskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Tjörn

3 ha, fördelat på 4 ytor.

Element 1: Restsjö, 80 % av delobjekttytan. Permanent öppet
vatten.

Element 2: Gungfly, 20 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

09E 6H 02 (0801) KLASS 2 BRUNNSNÄSMOSSEN 5 KM SO RØFORS

28 ha (28 ha våtm), 135 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.
Sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Svagt våldv moss

25 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet.

Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning,
anslutande dikning.

Element 1: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, öppet,
barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Mosseplan, 80 % av delobjekttytan, skogbevuxet,
barrskog. Fastmatta.

Element 3: Lagg, 9 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Lagg, 1 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Mad vid sjö

3 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 50 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation.

Element 2: Golv, 50 % av delobjekttytan. Vattenvegetation.

09E 6H 03 (3815) KLASS 3 SPJUTHULTSMOSSEN 4,5 KM SO RØFORS

17 ha (17 ha våtm), 145 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.
Åkermark ansluter.

Delobj. 1: Topogent kärr

2 ha, öppet.

Element 1: Golv, 20 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 45 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 35 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Delobj. 2: Svagt våldv moss

15 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande
dikning, körspår från traktor/skogsmaskin, kraftledning,
anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjekttytan, glest
trädäckat, blandskog. Fastmatta med ristuvor.

09E 6H 04 (3528) KLASS 2 DJÅKNAMOSSEN 6 KM SO RØFORS

26 ha (26 ha våtm), 145 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
22 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, anslutande dikning, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Element 3: Göl, 2 % av delobjektytan, öppet.

Element 4: Lagg, 3 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Sumpskog
4 ha.

Element 1: Golv, blandskog.

09E6H05 Gädssjömossen och Långmossen, 8,5 km O Röfors

Objektet ligger i Tivedens barrskogsområde, nordost om Östra Laxsjön. Berggrunden består av granit. En smal bilväg leder förbi myren längs den östra kanten. De ingående våtmarkstyperna är svagt välvda mossar samt öppna och trädbevuxna kärr. Objektet inventerades i fält den 9 augusti 1993. Mossarna är flera och ligger utspridda över hela myren. De tallbevuxna domineras i fältskiktet av lika delar skvattram, ljung och odon. Vid tjärnen Gädssjön finns ett skogsklätt kärr där klibbal och glasbjörk är samdomineranter, men barrträd förekommer också. I det tuvade golvet växer bl a tuvull, hundstarr, videört och pors. Bottenskiktet är sporadiskt utbildat med t ex *Polytricum commune* och *Sphagnum angustifolium*. De trädäckta fastmatteöarna omges av en svårbeträdd, blöt mjukmatta. I fältskiktet är flaskstarr vanlig, mossemattan domineras av *Sphagnum fallax* och *Sphagnum riparium*. Vegetationstypen återkommer i de öppna kärren där också mossetuvor med ljung och rosling bryter in då och då.

Naturvärdesbedömningen grundas bl a på att myren är opåverkad samt att det är en mosaik av mossar och kärr.

09E 6H 05 (4843) KLASS 1 GÄDSSJÖMOSSEN OCH LÅNGMOSSEN, 6,5 KM O RÖFORS

59 ha (50 ha våtm), 170 m ö h. Flygb. -88. Fält -93.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
20 ha, fördelat på 5 ytor, glest trädäckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, barrskog. Tallmosse av skvatramtyp.

Element 2: Hölja, 3 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 2 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Element 4: Lagg, 10 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 5: Lagg, 5 % av delobjektytan, öppet. Lösbotten.

Delobj. 2: Topogent kärr
30 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, anslutande väg.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 16 % av delobjektytan, skogsbevuxet, lövskog. Alkärr.

Element 3, underelem. 1: Golv, 6 % av delobjektytan. Mjukm.kärr av ört-starr-vitmoss-brunmossstyp.

Element 4: Gungfly, 2 % av delobjektytan.

Element 5: Golv, 20 % av delobjektytan. Mjukm.kärr av ört-starr-vitmoss-brunmossstyp.

Element 5, underelem. 1: Tuva, 10 % av delobjektytan,

1-3 % krontäckning, lövskog. Ristuvmosse av S. magellanicumtyp.

Element 6: Golv, 10 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 7: Göl, 1 % av delobjektytan.

Element 8: Bäck, 1 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Tjörn
7 ha.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan.

Element 2: Vattenvegetation, 10 % av delobjektytan.

09E 7E 01 (2832) KLASS 3 HERREFALLS MOSSE 2,5 KM NO FINNERÖDJA

31 ha (31 ha våtm), 150 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.

Delobj. 1: Excentrisk mosse
31 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande dikning, anslutande järnväg, torvtäkt, anslutande väg.

Element 1: Sträng, 23 % av delobjektytan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 20 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, glest trädäckt, barrskog. Fastmatta.

Element 5: Lagg, 2 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 6: Mosseplan, 15 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 7: Randskog, 20 % av delobjektytan, skogsbevuxet, barrskog.

**09E 7E 02 (4537) KLASS 2
SJÖKÄRRET 4,5 KM NNO FINNERÖDJA**

49 ha (46 ha våtm), 135 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.
Sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Topogent kärr

7 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 80 % av delobjekttytan, öppet, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjekttytan, blandskog.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse

7 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mad vid sjö

32 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande järnväg, väg.

Element 1: Bäck, 5 % av delobjekttytan.

Element 2: Golv, 80 % av delobjekttytan.

Element 3: Golv, 15 % av delobjekttytan. Vattenvegetation.

**09E 7E 03 (4904) KLASS 3
MYR 600 M O LINDÅS, 4 KM N FINNERÖDJA**

21 ha (19 ha våtm), 105 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.

Delobj. 1: Tjärn

2 ha. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 40 % av delobjekttytan.

Element 2: Golv, 60 % av delobjekttytan. Vattenvegetation.

Delobj. 2: Topogent kärr

10 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 3: Topogent kärr

9 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 55 % av delobjekttytan, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjekttytan. Örtdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

**09E 7F 01 (4313) KLASS 3
MYR 50 M O ÅBACKA, 4 KM V LAXÅ**

Halle mossen

23 ha (23 ha våtm), 120 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

23 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande dikning, stark lokal påverkan från järnväg, svag lokal påverkan från kraftledning, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan, öppet. Fastmatta med ristuvor.

**09E 7F 02 (4036) KLASS 2
ÖNAMOSSEN 2 KM SV LAXÅ**

25 ha (25 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.
Ingår i naturvårdsplan. Området omotologiskt inventerat, sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

20 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, 62 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjekttytan. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 5 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Gungfly, 3 % av delobjekttytan.

Delobj. 2: Vegetationsrikt vatten

5 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, Vattenvegetation.

09E7F03 Björnbäcksmossen och Kolösmossen, 1 km V Laxå

Objektet sträcker sig utmed Borasjöns östra sida. I övrigt är den helt omgiven av skogsmark. Berggrunden utgörs i huvudsak av gnejs. I norr stryker Europaväg 3 förbi, men det är endast en liten skogsbilväg som leder till myren. Objektet är utsträckt i en nord-sydlig riktning, bredast är den i norr. Mossar och kärr är de våtmarkstyper som bygger upp myren. Objektet inventerades i fält den 20 augusti 1993. Mossen i norr, Kolösmossen, har en randskog bestående av skvatram, odon och ljung. På det relativt öppna mosseplanet finns ristuvor och en svag strängstruktur. Tuvorna och strängarna är tallbevuxna, utåt mossekanterna förtätas trädsiktet. Risdominansen avbryts av en mossefastmatta bestående av bl a tuvull, vitag och *Sphagnum balticum*. Det större kärret längre söderut, Björnbäcksmossen, är enligt Backeus (1978) ett fattigt översvämningskärr. I fältsiktet påträffas, förutom den dominerande tuvullen, även trådstarr, videört och vattenklöver m fl. Bottensiktet består av *Sphagnum fallax* och *Sphagnum majus*. Mossen längst i söder är flygbildstolkad som en svagt välvd mosse, till största delen tallbevuxen. Objektet är i stort sett oskadat. Några små diken finns i de perifera delarna, ett något mer markerat i översvämningskärret. Indirekt påverkan p g a reglerad sjö.

Närheten till vatten, representativa våtmarkstyper och att myren är relativt opåverkad är några av de faktorer som ligger bakom den höga naturvärdesbedömningen. Myren har dessutom ett intressant fågelliv med bl a häckande tranor och flera rovfågelarter. Bedömdes vara ett klass 3 objekt i Fågelmyrar i Örebro län (1982:1).

**09E 7F 03 (3241) KLASS 1
BJÖRNBÄCKSMOSSEN OCH KOLÖMOSSEN 1 KM V
LAXÅ**

144 ha (143 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -88. Fält -93.
Laxå kn.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns,
området ornitologiskt inventerat, sjö ansluter till högst
24%.

Delobj. 1: Svagt våldad mosse
22 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande
hyggen, dikning, anslutande dikning.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjekttytan, barrskog.
Tallmosse av skvattramtyp.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, glest
träddäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 10 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Excentrisk mosse
91 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande
dikning. Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Mosseplan, 20 % av delobjekttytan. Fastmatta med
ristuvor.

Element 2: Sträng, 1 % av delobjekttytan, barrskog.
Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2, underelem. 1: Tuva, 5 % av delobjekttytan,
4-10 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Hölja, 5 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 5: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan.
Fastmattemosse av tuvull-S. balticumtyp.

Element 6: Lagg, 4 % av delobjekttytan. Fastmattekärr,
taggstarr-S. angustifolium var.

Element 6, underelem. 1: Lagg, 1 % av delobjekttytan. Öppet
kärr.

Element 6, underelem. 2: Lagg, 1 % av delobjekttytan. Öppet
kärr.

Element 7: Randskog, 40 % av delobjekttytan, skogsbevuxet,
barrskog. Tallmosse av skvattramtyp.

Delobj. 3: Vegetationsrikt vatten
9 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen.

Element 1: Golv. Vattenvegetation.

Delobj. 4: Topogent kärr
31 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen, dikning, anslutande dikning.

Element 1: Golv, 30 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Golv, 10 % av delobjekttytan.

Öppet sumpkärr.

Element 2: Golv, 15 % av delobjekttytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 3: Golv, 25 % av delobjekttytan, skogsbevuxet,
lövskog.

Element 4: Golv, 10 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 5: Golv, 15 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 6: Golv, 5 % av delobjekttytan. Vattenvegetation.

**09E 7G 01 (3049) KLASS 4
SLÄTTSMOSSEN 2 KM SO LAXÅ**

72 ha (71 ha våtm), 130 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn. Ingår i naturvårdsplan. Botaniska värden.

Delobj. 1: Obestämbart mosse
71 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande
hyggen, stark generell påverkan från dikning, svag lokal
påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan, blandskog.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, glest
träddäckt, barrskog.

**09E 7G 02 (0846) KLASS 3
STOCKABROMOSSEN 2,5 KM V RÖFORS**

29 ha (23 ha våtm), 140 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt våldad mosse
23 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande
hyggen, dikning, anslutande dikning, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 92 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 4 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Lagg, 3 % av delobjekttytan, öppet. Mjukmatta.

Element 4: Gungfly, 1 % av delobjekttytan, öppet.

Delobj. 2: Tjärn
1 ha.

Element 1: Golv.

**09E 7G 03 (1541) KLASS 3
KRINGSJÖMOSSEN 2 KM O RÖFORS**

15 ha (15 ha våtm), 135 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt våldad mosse
15 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande
hyggen, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan, öppet.
Fastmatta.

Element 3: Lagg, 5 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**09E 7G 04 (2838) KLASS 4
DRUGGEMOSSEN 1 KM SO LAXÅ**

15 ha (15 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
16 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande
hyggen, stark generell påverkan från dikning, svag lokal
påverkan från anslutande dikning.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

**09E 7G 05 (3940) KLASS 3
TOBAKSMOSSEN 800 M O LAXÅ**

24 ha (24 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
20 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning, anslutande dikning,
kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 39 % av delobjekttytan, öppet.
Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 1 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
4 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjekttytan, skogsbevuxet,
lövskog.

**09E 7G 06 (1847) KLASS 3
TOSJÖMOSSEN 2 KM O RÖFORS**

12 ha (12 ha våtm), 140 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
10 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, anslutande
dikning, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 26 % av delobjekttytan, öppet,
barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 4 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Sumpskog
2 ha.

Element 1: Golv, lövskog.

**09E 7H 01 (2610) KLASS 3
MYR 400 M NNV FALLET, 2,5 KM SO LAXÅ**

16 ha (15 ha våtm), 135 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
11 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning,
torvtäkt, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, öppet.
Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 5 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
4 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande
kraftledning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjekttytan, skogsbevuxet,
lövskog.

**09E 7H 02 (4406) KLASS 2
TRUGAMOSSEN 2 KM O LAXÅ**

75 ha (73 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Platåformigt välvd mosse
51 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande dikning, anslutande väg.

Element 1: Sträng, 25 % av delobjekttytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 28 % av delobjekttytan, glest
träddäckt. Fastmatta med ristuvor.

Element 5: Randskog, 15 % av delobjekttytan, skogsbevuxet,
barrskog.

Element 6: Lagg, 3 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 7: Lagg, 4 % av delobjekttytan. Mjukmatta.
Botaniska värden.

Delobj. 2: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
dikning, anslutande dikning.

Element 1: Golv, 30 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 60 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjekttytan. Lösbottom.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse
10 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 97 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 3 % av delobjekttytan, öppet.
Fastmatta med ristuvor.

**09E 7H 03 (3914) KLASS 2
STAVKÄRRSMOSSEN 3 KM O LAXÅ**

147 ha (133 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
79 ha, fördelat på 6 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande dikning, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, öppet.
Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 8 % av delobjekttytan, öppet.
Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Hölja, 2 % av delobjekttytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Mosseplan, 80 % av delobjekttytan, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
54 ha, fördelat på 6 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen, dikning. Åkermark ansluter.
Element 1: Bäck, 5 % av delobjekttytan.

Element 2: Små fuktängsytor, 5 % av delobjekttytan.
Örtdominerad vegetation.

Element 3: Golv, 48 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Golv, 30 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 5: Golv, 2 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 6: Golv, 10 % av delobjekttytan, glest träd täckt,
blandskog.

**09E 7H 04 (1833) KLASS 3
SPÅNGAMOSSEN 6 KM O RÖFORS**

35 ha (35 ha våtm), 160 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
3 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande
väg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Sumpskog
5 ha. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande väg.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse
27 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Stark lokal
påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande
dikning, väg, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 15 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**09E 7H 05 (0329) KLASS 3
SJÖMOSSEN 5,5 KM O RÖFORS**

27 ha (27 ha våtm), 165 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

11 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.
Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan, öppet.
Fastmatta.

Element 3: Hölja, 1 % av delobjekttytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Lagg, (otydl.), 9 % av delobjekttytan, öppet,
lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr

9 ha, fördelat på 2 ytor, glest träd täckt. Svag lokal
påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Sumpskog

6 ha, fördelat på 2 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

**09E 7I 01 (1101) KLASS 2
BREDMOSSEN OCH BENTEBODAMOSSAR,
6,5 KM SO LAXÅ**

141 ha (118 ha våtm), 175 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Topogent kärr

39 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, öppet. Svag lokal
påverkan från dikning, väg.

Element 1: Golv, 35 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 25 % av delobjekttytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 4: Golv, 10 % av delobjekttytan, glest träd täckt,
lövskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse

57 ha, fördelat på 7 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjekttytan, öppet.
Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Hölja, 2 % av delobjekttytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Lagg, 5 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 5: Lagg, 3 % av delobjekttytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Excentrisk mosse

22 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen,
körspår från traktor/skogsmaskin, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 48 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 2 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 4: Dråg, 3 % av delobjekttytan.

Element 5: Sträng, (otydl.), 25 % av delobjektytan.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 6: Randskog, 5 % av delobjektytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 7: Lagg, 2 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Tjörn
2 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv.

09E 7E 01 (2832) KLASS 3
HERREFALLS MOSSE 2,5 KM NO FINNERÖDJA

31 ha (31 ha våtm), 150 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.

Delobj. 1: Excentrisk mosse
31 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande dikning, anslutande järnväg, torvtäkt, anslutande väg.

Element 1: Sträng, 23 % av delobjektytan, barrskog.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 20 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, glest träd täckt, barrskog. Fastmatta.

Element 5: Lagg, 2 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 6: Mosseplan, 15 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 7: Randskog, 20 % av delobjektytan, skogsbevuxet, barrskog.

09E 7E 02 (4537) KLASS 2
SJÖKÄRRET 4,5 KM NNO FINNERÖDJA

49 ha (46 ha våtm), 135 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.
Sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan, öppet, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, blandskog.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
7 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mad vid sjö
32 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande järnväg, väg.

Element 1: Bäck, 5 % av delobjektytan.

Element 2: Golv, 80 % av delobjektytan.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan. Vattenvegetation.

09E 7E 03 (4904) KLASS 3
MYR 600 M O LINDÅS, 4 KM N FINNERÖDJA

21 ha (19 ha våtm), 105 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.

Delobj. 1: Tjörn
2 ha. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan. Vattenvegetation.

Delobj. 2: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
9 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan. Örtdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjektytan. Mjukmatta.

09E 7F 01 (4313) KLASS 3
MYR 50 M O ÅBACKA, 4 KM V LAXÅ

23 ha (23 ha våtm), 120 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
23 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande dikning, stark lokal påverkan från järnväg, svag lokal påverkan från kraftledning, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 5 % av delobjektytan, öppet.
Fastmatta med ristuvor.

09E 7F 02 (4036) KLASS 2
ÖNAMOSSEN 2 KM SV LAXÅ

25 ha (25 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.
Ingår i naturvårdsplan. Området ornitologiskt inventerat, sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
20 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, 62 % av delobjektytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjektytan. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 5 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Gungfly, 3 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Vegetationsrikt vatten
5 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, Vattenvegetation.

**09E 7F 03 (3241) KLASS 1
BJÖRNBÄCKSMOSSEN OCH KOLÖMOSSEN,
1 KM V LAXÅ**

144 ha (143 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -88. Fält -93.
Laxå kn.

Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns,
området ornitologiskt inventerat, sjö ansluter till högst
24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

22 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande
hyggen, dikning, anslutande dikning.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjekttytan, barrskog.
Tallmosse av skvattramtyp.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, glest
trädäck, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 10 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Excentrisk mosse

91 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande
dikning. Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Mosseplan, 20 % av delobjekttytan. Fastmatta med
ristuvor.

Element 2: Sträng, 1 % av delobjekttytan, barrskog.
Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2, underelem. 1: Tuva, 5 % av delobjekttytan,
4-10 % kröntäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Hölja, 5 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 5: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan.
Fastmattemosse av tuvull-S. balticumtyp.

Element 6: Lagg, 4 % av delobjekttytan. Fastmattekärr,
taggstarr-S. angustifolium var.

Element 6, underelem. 1: Lagg, 1 % av delobjekttytan. Öppet
kärr.

Element 6, underelem. 2: Lagg, 1 % av delobjekttytan. Öppet
kärr.

Element 7: Randskog, 40 % av delobjekttytan, skogbevuxet,
barrskog. Tallmosse av skvattramtyp.

Delobj. 3: Vegetationsrikt vatten

9 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen.

Element 1: Golv. Vattenvegetation.

Delobj. 4: Topogent kärr

31 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen, dikning, anslutande dikning.

Element 1: Golv, 30 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Golv, 10 % av delobjekttytan.
Öppet sumpkärr.

Element 2: Golv, 15 % av delobjekttytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 3: Golv, 25 % av delobjekttytan, skogbevuxet,
lövskog.

Element 4: Golv, 10 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 5: Golv, 15 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 6: Golv, 5 % av delobjekttytan. Vattenvegetation.

**09E 7G 01 (3049) KLASS 4
SLÄTTSMOSSEN 2 KM SO LAXÅ**

72 ha (71 ha våtm), 130 m ö h. Flygb. -88.

Laxå kn. Ingår i naturvårdsplan. Botaniska värden.

Delobj. 1: Obestämbär mosse

71 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande
hyggen, stark generell påverkan från dikning, svag lokal
påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan, blandskog.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, glest
trädäck, barrskog.

**09E 7G 02 (0846) KLASS 3
STOCKABROMOSSEN 2,5 KM V RÖFORS**

29 ha (23 ha våtm), 140 m ö h. Flygb. -88.

Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

23 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande
hyggen, dikning, anslutande dikning, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 92 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 4 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Lagg, 3 % av delobjekttytan, öppet. Mjukmatta.

Element 4: Gungfly, 1 % av delobjekttytan, öppet.

Delobj. 2: Tjärn

1 ha.

Element 1: Golv.

**09E 7G 03 (1541) KLASS 3
KRINGSJÖMOSSEN 2 KM O RÖFORS**

15 ha (15 ha våtm), 135 m ö h. Flygb. -88.

Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

15 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande
hyggen, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan, öppet.
Fastmatta.

Element 3: Lagg, 5 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**09E 7G 04 (2838) KLASS 4
DRUGGEMOSSEN 1 KM SO LAXÅ**

15 ha (15 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -88.

Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

16 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande

hyggen, stark generell påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande dikning.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

**09E 7G 05 (3940) KLASS 3
TOBAKSMOSSEN 800 M O LAXÅ**

24 ha (24 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
20 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning, anslutande dikning, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 39 % av delobjektytan, öppet.
Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 1 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
4 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, skogsbevuxet, lövskog.

**09E 7G 06 (1847) KLASS 3
TOSJÖMOSSEN 2 KM O RÖFORS**

12 ha (12 ha våtm), 140 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
10 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, anslutande dikning, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 26 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 4 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Sumpskog
2 ha.

Element 1: Golv, lövskog.

**09E 7H 01 (2610) KLASS 3
MYR 400 M NNV FALLET, 2,5 KM SO LAXÅ**

16 ha (15 ha våtm), 135 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
11 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, torvtäkt, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, öppet.
Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 5 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
4 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande kraftledning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, skogsbevuxet, lövskog.

**09E 7H 02 (4406) KLASS 2
TRUGAMOSSEN 2 KM O LAXÅ**

75 ha (73 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Platåformigt välvd mosse
51 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande dikning, anslutande väg.

Element 1: Sträng, 25 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 28 % av delobjektytan, glest träd täckt. Fastmatta med ristuvor.

Element 5: Randskog, 15 % av delobjektytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 6: Lagg, 3 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 7: Lagg, 4 % av delobjektytan. Mjukmatta.
Botaniska värden.

Delobj. 2: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande dikning.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse
10 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 97 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 3 % av delobjektytan, öppet.
Fastmatta med ristuvor.

**09E 7H 03 (3914) KLASS 2
STAVKÄRRSMOSSEN 3 KM O LAXÅ**

147 ha (133 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
79 ha, fördelat på 6 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande dikning, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, öppet.
Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 8 % av delobjektytan, öppet.
Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Hölja, 2 % av delobjektytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
54 ha, fördelat på 6 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen, dikning. Åkermark ansluter.
Element 1: Bäck, 5 % av delobjektytan.

Element 2: Små fuktängsytor, 5 % av delobjektytan.
Örtdominerad vegetation.

Element 3: Golv, 48 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Golv, 30 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 5: Golv, 2 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 6: Golv, 10 % av delobjektytan, glest träd täckt,
blandskog.

09E 7H 04 (1833) KLASS 3
SPÅNGAMOSSEN 6 KM O RÖFORS

35 ha (35 ha våtm), 160 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
3 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande
väg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Sumpskog
5 ha. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande väg.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse
27 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Stark lokal
påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande
dikning, väg, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 15 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

09E 7H 05 (0329) KLASS 3
SJÖMOSEN 5,5 KM O RÖFORS

27 ha (27 ha våtm), 165 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
11 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 5 % av delobjektytan, öppet.
Fastmatta.

Element 3: Hölja, 1 % av delobjektytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Lagg, (otydl.), 9 % av delobjektytan, öppet,

lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
9 ha, fördelat på 2 ytor, glest träd täckt. Svag lokal
påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
6 ha, fördelat på 2 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

09E 7I 01 (1101) KLASS 2
BREDMOSEN OCH BENTEBODAMOSSAR,
6,5 KM SO LAXÅ

141 ha (118 ha våtm), 175 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
39 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, öppet. Svag lokal
påverkan från dikning, väg.

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 4: Golv, 10 % av delobjektytan, glest träd täckt,
lövskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
57 ha, fördelat på 7 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, öppet.
Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Hölja, 2 % av delobjektytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Lagg, 5 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 5: Lagg, 3 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Excentrisk mosse
22 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen,
körspår från traktor/skogsmaskin, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 48 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 2 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 4: Dråg, 3 % av delobjektytan.

Element 5: Sträng, (otydl.), 25 % av delobjektytan.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 6: Randskog, 5 % av delobjektytan, skogsbevuxet,
barrskog.

Element 7: Lagg, 2 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Tjärn
2 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv.

**09E 8E 02 (1422) KLAS 3
TORPSTÄLLSMOSSEN 5,5 KM N FINNERÖDJA**

29 ha (28 ha våtm), 145 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
12 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning,
kraftledning, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 98 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 2 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
6 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 95 % av delobjekttytan, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 5 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Delobj. 3: Koncentrisk mosse
10 ha, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning,
torvtäkt.

Element 1: Sträng. (otyd.), 30 % av delobjekttytan,
barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 20 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 22 % av delobjekttytan, gles
träddäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 5: Lagg, 3 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 6: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

**09E 8E 03 (2410) KLAS 3
FRÅKENKÄRREN 6,5 KM N FINNERÖDJA**

19 ha (19 ha våtm), 135 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
6 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan
från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
5 ha, öppet. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjekttytan, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse
8 ha, skogsbevuxet. Svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

**09E 8E 04 (2327) KLAS 3
KAMPMOSSEN 6,5 KM N FINNERÖDJA**

24 ha (21 ha våtm), 145 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
4 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
13 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen, anslutande dikning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjekttytan, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 13 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Element 3: Golv, 2 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Delobj. 3: Platåformigt välvd mosse
4 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 85 % av delobjekttytan. Fastmatta med
ristuvor.

Element 3: Randskog, 10 % av delobjekttytan, skogsbevuxet,
barrskog.

**09E 8E 05 (0525) KLAS 3
SIRISMÖSSMOSEN 4,5 KM N N FINNERÖDJA**

33 ha (31 ha våtm), 140 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
10 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 97 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 3 % av delobjekttytan, öppet.
Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 2: Platåformigt välvd mosse
7 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen,
dikning.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Randskog, 10 % av delobjekttytan, skogsbevuxet,
barrskog.

Element 3: Lagg, 5 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
3 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 4: Topogent kärr
11 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 90 % av delobjekttytan, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjekttytan. Risvegetation.
Fastmatta.

09E 8E 06 (0431) KLASS 3
MASTMOSEN 5 KM NNO FINNERÖDJA

15 ha (14 ha våtm), 140 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.

Delobj. 1: Topogent kärr

4 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, anslutande väg.

Element 1: Golv, 98 % av delobjektytan, lövskog.

Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 2 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse

10 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

09E8E07

Boramossen, 5 km O Lämås

Objektet har inte inventerats i fält. Beskrivningen och naturvärdesbedömningen bygger enbart på flygbildstolkning. Boramossen ligger helt omgivet av skog på en berggrund som domineras av leptitgnejs, leptit och hälleflinta. Ett par smala skogsbilvägar tangerar myrens norra delar. Objektet är uppbyggt av kärr, mossar och sumpskogar. Från sjön Gryten utgår Grytebäcken, som på sin väg norrut rinner tvärs genom myren. Den norra halvan av Boramossen domineras av ombrotrof torvmark. En stor del utgörs av tallmossar, en mindre av en platåmosse. Den senare har ett torrt mosseplan och en välutbildad lagg samt randskog i väster. Små öppna kärrfläckar, huvudsakligen av fastmattatyp, finns i periferin. Den södra delen av myren omges på två sidor av Grytebäcken. Det tycks vara en sumpskog som till övervägande del består av barrträd.

Bakom den höga naturvärdesbedömningen ligger bl a den komplexa bilden av flera olika typer av våtmarker samt att ingreppen är ringa.

09E 8E 07 (4744) KLASS 1
BORAMOSSEN 5 KM O LÄMÅS

56 ha (52 ha våtm), 135 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

17 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Element 2: Lagg, (otydl.), 1 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr

7 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 3: Platåformigt välvd mosse

14 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Hölja, 1 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 2: Lagg, 5 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Randskog, (otydl.), 4 % av delobjektytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 4: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, glest träd täckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 5: Mosseplan, 45 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 4: Sumpskog

11 ha, fördelat på 2 ytor. Svag lokal påverkan från

anslutande hyggen.

Element 1: Bäck, 1 % av delobjektytan, öppet.

Element 2: Golv, 70 % av delobjektytan, barrskog.

Element 3: Golv, 29 % av delobjektytan, lövskog.

Delobj. 5: Mad vid vattendrag

3 ha, öppet.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, lövskog. Örtdominerad vegetation.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation.

Element 3: Bäck, 5 % av delobjektytan.

09E 8E 08 (1949) KLASS 3
MYR 800 M NO BJÖRNFALLET, 7,5 KM NO FINNERÖDJA

17 ha (17 ha våtm), 150 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

8 ha, fördelat på 5 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr

2 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 3: Topogent kärr

7 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 5 % av delobjektytan. Mjukmatta.

**09E 8F 01 (3514) KLASS 3
BORAMOSSEN 4,5 KM VNV LAXÅ**

20 ha (20 ha våtm), 135 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
20 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 8 % av delobjektytan, öppet.
Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Hölja, 3 % av delobjektytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Lagg, 7 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 5: Bäckdråg, 2 % av delobjektytan.

**09E 8F 02 (3620) KLASS 3
GILLERSMOSEN 4 KM VNV LAXÅ**

20 ha (19 ha våtm), 135 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
17 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, öppet.
Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Hölja, 3 % av delobjektytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Lagg, 5 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 5: Lagg, 2 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Sumpskog
2 ha. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, lövskog.

**09E 8F 03 (4523) KLASS 2
MYR 700 M V KRYDDHULT, 4 KM NV LAXÅ**

15 ha (13 ha våtm), 135 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
10 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 5 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Tjörn
2 ha.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan.

Element 2: Gungfly, 10 % av delobjektytan.

Delobj. 3: Topogent kärr
3 ha, öppet.

Element 1: Golv, 10 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 50 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Bäckdråg, 40 % av delobjektytan.

**09E 8F 04 (4031) KLASS 2
NYBROMOSSEN 3 KM NO LAXÅ**

31 ha (30 ha våtm), 115 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
17 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning,
anslutande annan täkt, väg.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 5 % av delobjektytan, öppet.
Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 3 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Lagg, 2 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
11 ha, öppet.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 5 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 3: Bäck, 5 % av delobjektytan.

Element 4: Golv, 15 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Sumpskog
2 ha.

Element 1: Golv, blandskog.

**09E 8F 05 (1625) KLASS 3
TROLLÄSMOSSEN 3 KM V LAXÅ**

10 ha (10 ha våtm), 150 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
10 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande
hyggen, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 3 % av delobjektytan, öppet.
Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 2 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**09E 8F 06 (1238) KLASS 3
BÄCKÄNGEN 1,5 KM V LAXÅ**

15 ha (15 ha våtm), 105 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Ingår i naturvårdsplan. Botaniska värden, litteratur om
objektet finns.

Delobj. 1: Topogent kärr
15 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 45 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 5 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 40 % av delobjekttytan, glest träd täckt, blandskog. Fastmatta.

Element 4: Bäckdråg, 10 % av delobjekttytan.

09E 8F 07 (0542) KLASS 3
SKANSMOSSEN 1 KM V LAXÅ

38 ha (38 ha våtm), 105 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.
Ingår i naturvårdsplan. Botaniska värden, litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Platåformigt våldv moss
19 ha, öppet. Svag lokal påverkan från järnväg, kraftledning, stark lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
11 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från avverkning, svag lokal påverkan från anslutande dikning, järnväg, kraftledning, anslutande väg.

Element 1: Golv, 40 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 25 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 4: Golv, 10 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, blandskog.

Delobj. 3: Svagt våldv moss
8 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från järnväg.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

09E 8F 08 (0448) KLASS 4
MYR 250 M NV KLOCKARTORP, 500 M O LAXÅ

11 ha (11 ha våtm), 105 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt våldv moss
11 ha, skogsbevuxet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande järnväg, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan. Fastmatta med ristuvor.

09E 8F 09 (0430) KLASS 3
MOSJÖMOSSEN 2,5 KM V LAXÅ

25 ha (25 ha våtm), 115 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.
Ingår i naturvårdsplan. Botaniska värden.

Delobj. 1: Platåformigt våldv moss

25 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande dikning, järnväg, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjekttytan, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Randskog, 15 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

09E 8G 01 (3728) KLASS 4
ALGUTEN 1 KM N LAXÅ

36 ha (35 ha våtm), 90 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Platåformigt våldv moss
9 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, anslutande järnväg, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 30 % av delobjekttytan, glest träd täckt, lövskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Mosseplan, 70 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
12 ha, fördelat på 2 ytor, glest träd täckt. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 15 % av delobjekttytan, lövskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjekttytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 65 % av delobjekttytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 3: Svagt våldv moss
14 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande järnväg.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 18 % av delobjekttytan, öppet. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 2 % av delobjekttytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

09E 8G 02 (3434) KLASS 4
MYR O ALGUTEN 1,5 KM N LAXÅ

32 ha (27 ha våtm), 90 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt våldv moss
24 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark generell påverkan från dikning, svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
3 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, anslutande dikning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

09E 8G 03 (1549) KLASS 2
SUMPEN 2 KM O LAXÅ

24 ha (23 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt våtvd mosse
18 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 65 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjekttytan, glest trädäckat, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 3 % av delobjekttytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Lagg, 4 % av delobjekttytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 5: Lagg, 3 % av delobjekttytan, öppet. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
5 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Golv, blandskog.

09E 8G 04 (1243) KLASS 4
TYSKHULTMOSEN 1,5 KM O LAXÅ

27 ha (24 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Obestämbbar myr
24 ha, skogsbevuxet. Stark generell påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning, anslutande väg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Golv, 25 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 3: Golv, 25 % av delobjekttytan, öppet. Fastmatta.

09E 9E 01 (3538) KLASS 3
GRYTEBÄCKSMOSEN 8,5 KM NO RÅBÄCK

16 ha (15 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
12 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 45 % av delobjekttytan, blandskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjekttytan, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjekttytan, öppet. Mjukmatta.

Element 4: Golv, 25 % av delobjekttytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Svagt våtvd mosse
3 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Mosseplan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

09E 9E 09 (1531) KLASS 3
ÅSMOSEN 4 KM O LÄMÅS

58 ha (51 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt våtvd mosse
10 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjekttytan, öppet, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 2: Topogent kärr
41 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Bäck, 1 % av delobjekttytan.

Element 2: Golv, 4 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, lövskog.

Element 3: Golv, 70 % av delobjekttytan, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Golv, 20 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 5: Golv, 5 % av delobjekttytan. Lösbotten.

09E 9E 10 (2137) KLASS 3
MYR 1 KM SO VISJÖBÄCKEN, 5 KM NO LÄMÅS

18 ha (15 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.

Delobj. 1: Blandmyr av mosaiktyp
4 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädäckat. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, glest trädäckat, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
11 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 40 % av delobjekttytan, glest trädäckat, lövskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 55 % av delobjekttytan, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

09E 9E 11 (3949) KLASS 3
GRÖNSJÖMOSEN 7 KM O SÄLLARETORP

11 ha (11 ha våtm), 120 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.

Delobj. 1: Obestämbbar mosse
6 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, stark lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan.

Delobj. 2: Svagt våtvd mosse
2 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 5 % av delobjekttytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
3 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 60 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Objektet ligger helt omgivet av skogsmark väster om sjön Toften. Bergrunden domineras bl a av sedimentgnejs. Stora Rankemossen i norr avgränsas från Lilla Rankemossen i söder av stora trädbevuxna fastmarksholmar. Våtmarken är företrädesvis uppbyggd av mossar. Öppna vattenytor finns i form av en samling gölar i norr och en tjärn i söder. Objektet inventerades i fält den 28 september 1993. Mossen i norr är svagt sluttande med strängar och tuvor av risvegetation. Hela mossen är glest tallbevuxen. På mosseplanet dominerar fastmattor med bl a tuvull, *Sphagnum balticum* och *Sphagnum rubellum*. Längst i norr finns en samling distinkt avgränsade gölar vars kantzoner är uppbyggda av ristuvor. Mossen i gränsen mellan Stora och Lilla Rankemossen är något plåtformig. Här dominerar så gott som uteslutande ristuvor och hela mossen är mer eller mindre tallklädd. I mitten finns ett smalt dråg som sträcker sig i en sydväst-nordostlig riktning. Drågets golv är en fastmatta med dominans av tuvull och *Sphagnum papillosum*. Lilla Rankemossen är en svagt välvd mosse där så gott som hela mosseytan täcks av ristuvor och tall. I öster gränsar mossen till en liten tjärn, Gädssjön. Från sjön och västerut över mossen löper ett dråg uppbyggt av mjukmattor. Flaskstarr och *Sphagnum majus* dominerar, bland övriga arter kan den nordliga vitstarrén nämnas (Backeus 1977). Nordväst om den största fastmarksholmen ligger ett fattigt kärr med fastmattegolv. Flaskstarrén uppträder sporadiskt bland tuvull och *Sphagnum papillosum*. Något längre söderut finns ett bestånd klockljung (Backeus 1977).

Motiveringen till den höga naturvärdesbedömningen är framförallt storleken och frånvaron av hydrologiska ingrepp. Myren har dessutom ett rikt fågelliv med bl a orrspel och bedömdes utgöra klass 3 i Fågelmyrar i Örebro län (1982:1).

**09E 9F 01 (2608) KLASS 1
STORA OCH LILLA RANKEMOSSEN 7 KM NV LAXÅ**

232 ha (199 ha våtm), 130 m ö h. Flygb. -88. Fält -77.

Laxå kn.

Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns, minst 600 m diameter öppen yta, området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

80 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet.

Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, barrskog.

Element 1, underelem. 1: 10 % av delobjektytan. Tallmosse av skvattramtyp.

Element 2: Mosseplan, 5 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Element 4: Hölja, 4 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 5: Lagg, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmattekärr, starr-S. papillosum var.

Element 6: Dråg, 6 % av delobjektytan, öppet. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Delobj. 2: Plåtformigt välvd mosse
8 ha, glest trädäckt.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Dråg, 5 % av delobjektytan, öppet. Fastmattekärr av tuvull-vitmosstyp.

Delobj. 3: Topogent kärr

32 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan. Fastmattekärr av tuvull-vitmosstyp.

Element 2: Golv, 23 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 4: Bäck, 2 % av delobjektytan.

Delobj. 4: Tjärn
7 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 5: Sluttande mosse

79 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Lagg, 5 % av delobjektytan. Höljegöl av vattentyp.

Element 2: Hölja, 12 % av delobjektytan. Mjukmattemosse av vitag-kallgräs-S.majustyp.

Element 3: Sträng, 1 % av delobjektytan, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 4: Tuva, 30 % av delobjektytan, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 5: Mosseplan, 40 % av delobjektytan. Fastmattemosse av tuvull-S. balticumtyp.

Element 5, underelem. 1: Mosseplan, 5 % av delobjektytan. Fastmattemosse av tuvull-S. rubellumtyp.

Element 5, underelem. 2: Mosseplan, 5 % av delobjektytan. Fastm.mosse av tuvull-S. magellanicumtyp.

Element 6: Randskog, (otydl.), 2 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 7: Lagg, 1 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**09E 9G 01 (3741) KLASS 4
FALLTORPAMOSSEN 2,5 KM N PORLA BRUNN**

17 ha (17 ha våtm), 80 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.
Mycket starkt generellt påverkat av torvtäkt.

**09E 9G 02 (3835) KLASS 3
MYR VID SANDVIK, 2,5 KM N PORLA BRUNN**

33 ha (32 ha våtm), 75 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.
Sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
13 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, öppet.
Fastmatta.

Element 3: Lagg, 5 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
19 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, stark lokal påverkan från järnväg, svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 45 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 3: Golv, 12 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 4: Bäck, 3 % av delobjektytan.

Element 5: Golv, 5 % av delobjektytan. Vattenvegetation.

**09E 9G 03 (2514) KLASS 3
MYR VID LÅNGNÅS, 3 KM NV PORLA BRUNN**

15 ha (15 ha våtm), 75 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
12 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, glest trädäckat, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 5 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
3 ha, öppet.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**09E 9G 04 (2319) KLASS 4
TESTABÄCKSMOSSEN 2,5 KM NV PORLA BRUNN**

38 ha (37 ha våtm), 80 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning, torvtäkt. Sjö ansluter till högst 24%.

**09E 9G 05 (2124) KLASS 2
MYR 100 MN KOLÅSEN, 2 KM NV PORLA BRUNN**

36 ha (36 ha våtm), 80 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
18 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 7 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Lagg, 3 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
18 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 25 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 4: Golv, 15 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 5: Golv, 20 % av delobjektytan. Vattenvegetation.

**09E 9G 06 (0908) KLASS 2
HÖGLUNDAMOSSEN 2,5 KM V PORLA BRUNN**

143 ha (137 ha våtm), 80 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.
Ingår i naturvårdsplan. Åkermark ansluter, ornitologiska värden, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
19 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från torvtäkt, anslutande torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 65 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, öppet.
Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 5 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
52 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin, stark lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, öppet.
Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
26 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Golv, 35 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, glest trädäckat, lövskog. Fastmatta.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 4: Golv, 25 % av delobjektytan. Risvegetation.

Fastmatta.

Delobj. 4: Fuktäng
21 ha, öppet. Meandring.

Element 1: Golv, 65 % av delobjekttytan. Örtdominerad vegetation.

Element 2: Golv, 25 % av delobjekttytan, glest trädäckat, lövskog.

Element 3: Vegetation utmed mindre vattendrag, 10 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, lövskog.

Delobj. 5: Sumpskog
8 ha, fördelat på 2 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 6: Blandmyr av mosnåtyp
11 ha, glest trädäckat. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog. Fastmatta.

09E 9G 07 (1034) KLASS 4
DEL AV PORLAMOSSEN VID PORLA BRUNN

93 ha (93 ha våtm), 85 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.
Mycket starkt generellt påverkat av torvtäkt.

09E 9G 08 (0136) KLASS 3
DEL AV PORLAMOSSEN 500 M SV PORLA BRUNN

72 ha (66 ha våtm), 85 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt vålvd mosse
5 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
61 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning, anslutande torvtäkt, väg.

Element 1: Golv, 70 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

09E 9G 09 (2245) KLASS 4
BJÖRNSMOSEN 500 M N PORLA BRUNN

86 ha (86 ha våtm), 85 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.
Mycket starkt generellt påverkat av torvtäkt.

09E 9G 10 (0349) KLASS 4
GRINDSTUGEMOSEN OCH LÄSARMOSEN 50 M O PORLA BRUNN

113 ha (113 ha våtm), 85 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning, torvtäkt, väg.

09E 9G 11 (4809) KLASS 3
MYR 400 M O ÄRNÄS, 7,5 KM N LAXÅ

12 ha (11 ha våtm), 80 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Mad vid sjö
2 ha, öppet. Svag lokal påverkan från väg.
Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
9 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 45 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 34 % av delobjekttytan, lövskog. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjekttytan, glest trädäckat, blandskog. Fastmatta.

Element 4: Bäck, 1 % av delobjekttytan.

09E 9G 12 (4921) KLASS 3
MYR 1 KM V SJÖFALLET, 7 KM N LAXÅ

12 ha (12 ha våtm), 80 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
5 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 90 % av delobjekttytan, blandskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjekttytan, glest trädäckat, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Svagt vålvd mosse
7 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan, glest trädäckat, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

09E 9G 13 (4633) KLASS 3
BROHULTSMOSEN 7 KM N LAXÅ

11 ha (11 ha våtm), 80 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
3 ha, öppet.

Element 1: Golv, 95 % av delobjekttytan, blandskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 5 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Delobj. 2: Svagt vålvd mosse
6 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 23 % av delobjekttytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Lagg, 2 % av delobjekttytan.

Element 4: Tuva, 5 % av delobjekttytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
2 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Golv, lövskog.

09E 9G 14 (4936) KLASS 3
MYR 300 M O SJÖFALLET, 7,5 KM NNO LAXÅ

9 ha (9 ha våtm), 80 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
5 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
4 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, skogsbevuxet,
lövskog.

09E 9G 15 (4941) KLASS 3
GILLERSMOSEN 7,5 KM NNO LAXÅ

19 ha (18 ha våtm), 80 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
5 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande
järnväg, kraftledning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, skogsbevuxet,
lövskog.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
8 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan
från dikning.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 3: Plåtformigt välvd mosse
5 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen,
dikning, torvtäkt.

Element 1: Tuva, (otyd.), 5 % av delobjektytan.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, barrskog.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, barrskog.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 5 % av delobjektytan, skogsbevuxet,
barrskog.

09E 9H 01 (0116) KLASS 3
VÄTMARK 50 M O DJUPBÄCKEN, 5 KM NO LAXÅ

4 ha (3 ha våtm), 80 m ö h. Flygb. -88.
Laxå kn.

Ingår i ängs- och hagmarksinventering. Åkermark ansluter,
området är beteshävdad, litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Strandäng
3 ha, glest trädäckt.

Element 1: Bäck, 30 % av delobjektytan. Meandering.

Element 2: Golv, 70 % av delobjektytan, lövskog.

10E 0E 02 (0138) KLASS 2
TRYSSLINGSMOSEN 8,5 KM SO NYSUND

54 ha (53 ha våtm), 105 m ö h. Flygb. -86. Fält -93.
Laxå kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
4 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 98 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 2 % av delobjektytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
9 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
dikning, anslutande dikning.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan. Lösbottom.

Element 4: Golv, 15 % av delobjektytan, glest trädäckt,
lövskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
5 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan
från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 4: Koncentrisk mosse
35 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, torvtäkt.

Element 1: Tuva, 15 % av delobjektytan, barrskog.
Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan.
Mjukm.mosse, vitag-kallgräs-S.cuspidatumtyp.

Element 3: Mosseplan, 20 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 43 % av delobjektytan, glest
trädäckt, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 5: Randskog, 5 % av delobjektytan, skogsbevuxet,
barrskog. Tallmosse av ristyp.

Element 6: Lagg, 2 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 7: Sträng, 5 % av delobjektytan, barrskog.
Risvegetation. Fastmatta.

10E 0E 03 (0737) KLASS 2
MYR 900 M V TRYSSLINGE, 8 KM SO NYSUND

25 ha (25 ha våtm), 105 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.
Sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Topogent kärr
3 ha, öppet.

Element 1: Golv, 40 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 60 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Svagt välvad mosse

7 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 3 % av delobjektytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 2 % av delobjektytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr

15 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, lövskog.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, barrskog.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, glest träd täckt,
barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

10E 0E 04 (2348) KLASS 3

MYR 1,5 KM S VÄSTRA SIRSJÖTORP, 7,5 KM SO NYSUND

24 ha (24 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -86.

Laxå kn.

Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr

4 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
dikning.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 5 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Svagt välvad mosse

5 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 3: Koncentrisk mosse

16 ha, öppet. Svag lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Sträng, (otydl.), 5 % av delobjektytan,
barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 8 % av delobjektytan,
glest träd täckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 65 % av delobjektytan, barrskog.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Lagg, 2 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 6: Randskog, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet,
barrskog.

10E 0F 01 (3019) KLASS 3

GRUVEMOSEN 3 KM S SVARTÅ

19 ha (19 ha våtm), 100 m ö h. Flygb. -86.

Laxå kn.

Delobj. 1: Svagt välvad mosse

16 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning,
torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 74 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 5 % av delobjektytan, öppet,
barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Lagg, 1 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr

3 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, barrskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan. Mjukmatta.

10E 0F 02 (1636) KLASS 2

FAGERSANDSMOSEN 4,5 KM V SKAGERSHULT

55 ha (54 ha våtm), 80 m ö h. Flygb. -86.

Laxå kn.

Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr

14 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan, barrskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Golv, 15 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 2: Svagt välvad mosse

14 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning, anslutande dikning,
torvtäkt, väg.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 3: Platåformigt välvad mosse

26 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, torvtäkt,
väg.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjektytan, barrskog.
Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Mosseplan, 35 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Hölja, 1 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 5: Randskog, (otydl.), 2 % av delobjektytan,
skogbevuxet, barrskog.

Element 6: Lagg, (otydl.), 2 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

10E 0F 03 (1033) KLASS 3

STRAFFÄNGSMOSEN 5 KM V SKAGERSHULT

8 ha (8 ha våtm), 80 m ö h. Flygb. -86.

Laxå kn.

Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt välvad mosse

6 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, 83 % av delobjekttytan, barrskog.

Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan, glest trädäckat, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 2: Topogent kärr
2 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 3: Lagg, 2 % av delobjekttytan, öppet.

Element 1: Golv, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

10E0G01

Stensmossen, 1,5 km V Skagershult

Mellan Svartån i väster och Teen i öster ligger Stensmossen. Den har inte inventerats i fält, naturvärdesbedömningen och beskrivningen bygger på flygbildstolkning samt uppgifter hämtad från litteratur. Myren ligger omgiven av skog, berggrunden är uppbyggd av framförallt metavulkanit. En smal skogsbilväg tvärsar myren längst i nordost. Hela objektet tillhör inte Laxå kommun, en ganska stor del ingår i Degerfors kommun. Mossar och ett stort vidöppet kärr täcker våtmarksytan. Det storslagna kärret är svagt fjärilsformat och vidöppet. En bäck flyter stilla genom kärrets södra delar. Fastmattor och mjukmattor dominerar golvet. I öster visar flygbilden tendens till strängar och flarkar. Enligt Backeus (1978) dominerar blååteln i norr tillsammans med bl a tuvull, ängsull, ängsnycklar och pors. I bottenkiktet påträffas framförallt *Sphagnum papillosum*. I nordost finns av ängsull och starr dominerade mjukmattor. Vid ett tidigare besök, 1971, fann Backeus även klockklung och *Sphagnum warnstorffii*. I objektets östra del finns en vagt utbildad sluttande mosse. Mossen är relativt torr med ett smärre inlag av mjukmattehöljor. Norr därom ligger en av diken påverkad tallmosse. Mer eller mindre tallbeklädda svagt välvda mossar återkommer på flera håll i objektet.

Den höga naturvärdesbedömningen grundas framförallt på att kärret är stort och opåverkat samt att olika mossetyper ingår i myren. Den hydrologiska påverkan är ringa med bl a en smärre husbehovstorvtäkt.

10E 0G 01 (1111) KLASS 1 STENSMOSSEN 1,5 KM V SKAGERSHULT

146 ha (145 ha våtm), 105 m ö h. Flygb. -86. Fält -77.
Laxå kn.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns, området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
65 ha, fördelat på 8 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning, torvtäkt, väg.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 18 % av delobjekttytan, öppet, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 2 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Plåtformigt välvd mosse
9 ha, öppet. Svag lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 20 % av delobjekttytan, barrskog.
Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Mosseplan, 75 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 3: Sluttande mosse
26 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.
Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Sträng, (otydl.), 20 % av delobjekttytan.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 5 % av delobjekttytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Hölja, 10 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Mosseplan, 30 % av delobjekttytan, barrskog.
Ristuvmosse av *S. fuscum*typ.

Element 6: Randskog, 5 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 7: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
55 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Bäck, 3 % av delobjekttytan.

Element 2: Flark, 10 % av delobjekttytan.

Element 3: Sträng, 10 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Element 4: Golv, 47 % av delobjekttytan. Fastm.kärr av tuvsäv-blååtel-vitmosstyp.

Element 5: Golv, 27 % av delobjekttytan. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 5, underelem. 1: Golv, 5 % av delobjekttytan, 1-3 % krontäckning, blandskog. Öppet kärr.

Element 6: Dråg, 3 % av delobjekttytan.

10E 0G 02 (1425) KLASS 2 HERVIKSMOSSEN 1 KM SV SKAGERSHULT

21 ha (21 ha våtm), 80 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.
Sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Mad vid sjö
3 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
19 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 72 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Lagg, 2 % av delobjektytan, skogsbevuxet, lövskog.

Element 4: Lagg, 1 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

0E 0H 02 (2403) KLASS 3
VÄTMARK 50 M N BACKEN, 1 KM O SKAGERSHULT

45 ha (42 ha våtm), 70 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.

Ingår i naturvårdsplan. Höjd vattennivå genom dämning, tidigare hävd genom slåtter och/eller bete, ornitologiska värden, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Strandäng
1 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Bevuxen sjö
41 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, kanalisering, väg.

Element 1: Bäck, 15 % av delobjektytan.

Element 2: Golv, 70 % av delobjektytan, lövskog.
Vassvegetation.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, skogsbevuxet, lövskog.

Element 1: Mosseplan. Tallmosse av skvattramtyp.

Element 1, underelem. 1: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, barrskog. Tallmosse av ristyp.

Element 1, underelem. 2: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, 11-25 % krontäckning, barrskog. Tallmosse av ristyp.

Element 1: Sträng, 1 % av delobjektytan.
Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 1, underelem. 1: Tuva, 10 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 3: Hölja. Fastm.mosse av tuvull-S. magellanicumtyp.

Element 3, underelem. 1: Tuva, 5 % av delobjektytan.
Fastmattemosse av tuvull-S. fuscumtyp.

Element 4: Mosseplan. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 5: Hölja. Höljegöl.

10E 1H 07 (0109) KLASS 2
VÄTMARK 200 M V ALMBY, 1,5 KM NO SKAGERSHULT

61 ha (61 ha våtm), 70 m ö h. Flygb. -86.
Laxå kn.

Ingår i naturvårdsplan. Åkermark ansluter, sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Limnogen strandsumpskog
25 ha, fördelat på 3 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 55 % av delobjektytan, lövskog.

Element 2: Små fuktängsytor, 5 % av delobjektytan, öppet, lövskog.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, öppet.
Vassvegetation.

Element 4: Golv, 30 % av delobjektytan, lövskog.
Området är beteshävdad.

Delobj. 2: Mad vid sjö
34 ha, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, lövskog.


Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, glest träd täckt, lövskog.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan, lövskog.
Området är beteshävdad.

Delobj. 3: Strandäng
2 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande dikning.
Området är beteshävdad.

Element 1: Golv, lövskog.

ÖREBRO



09E 91 01 (4414) KLASS 3
SÖRBERGSMOSSEN 5,5 KM NV VRETSTORP

29 ha (29 ha våtm), 85 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.

Delobj. 1: Svagt våldv moss

29 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, anslutande dikning.

Element 1: Mosseplan, 65 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 35 % av delobjekttytan, glest trädäck, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

09F7G09

Ålsjömossen, 3,5 km SO Brevens bruk

Objektet har inte inventerats i fält. Beskrivningen och naturvärdesbedömningen grundas enbart på flygbildstolkning. Ålsjömossen ligger i det småbrutna barrskogsdominerade området söder om sjön Sottern. Berggrunden är huvudsakligen uppbyggd av metasediment. En skogsbilväg når nästan ända fram till myrens norra del. I söder har objektet kontakt med Ålsjön. Hela myren tillhör inte Örebro kommun, den sydligaste delen ingår i Hallsbergs kommun. Ålsjömossen är splittrad av flera myrtyper, ett par mindre tjärnar ingår också i objektet. Större delen av Ålsjömossen är mosaikartad. Enligt flygbilden tycks kärrfläckar varvas med blandmyr av mosaiktyp. Den sistnämnda verkar ha ett kärrgolv översållat av mossetuvor. Gränserna mellan de båda är diffus. Längst i norr ligger en tjärn omgiven av tallmosse.

Den höga naturvärdesbedömningen motiveras bl a av mosaiken mellan olika myrtyper samt orördheten.

09F 7G 09 (4448) KLASS 1
ÅLSJÖMOSSEN 3,5 KM SO BREVENS BRUK

53 ha (49 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -81.
Örebro kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt våldv moss
8 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, 98 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Bäck, 2 % av delobjekttytan.

Delobj. 2: Topogent kärr
23 ha, fördelat på 8 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjekttytan, glest trädäck, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp
18 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädäck.

Element 1: Golv, barrskog.

Delobj. 4: Tjärn
2 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv.

09F 7H 01 (3806) KLASS 3
ÅNGKÄRRET OCH KVARNKÄRRET 4,5 KM SO BREVENS BRUK

14 ha (14 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -81.
Örebro kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
21 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Golv, 50 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Golv, 20 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 30 % av delobjekttytan, öppet. Mjukmatta.

09F 7H 02 (3424) KLASS 3
MYRAR O BRUNA BERGEN, 4 KM S BREVENS BRUK

17 ha (17 ha våtm), 130 m ö h. Flygb. -81.
Örebro kn.

Delobj. 1: Svagt våldv moss
15 ha, fördelat på 2 ytor, glest trädäck. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjekttytan, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Lagg, 5 % av delobjekttytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
2 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 60 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

09F 7H 03 (4830) KLASS 2
STORMOSSEN V MOSSJÖN, 2,5 KM S BREVENS BRUK

107 ha (100 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -81.
Örebro kn.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns, området ornitologiskt inventerat, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
17 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 35 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 25 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 4: Golv, 15 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Delobj. 2: Excentrisk mosse

80 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Ett flertal gölar, 5 % av delobjekttytan.

Element 2: Sträng, 25 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 30 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Element 5: Randskog, 15 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 6: Lagg, 10 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse

3 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

09F8G01**Stormossen, 500 m O Bisbotärn, 4 km SV Brevens bruk**

Objektet har inte inventerats i fält. Beskrivningen och naturvärdesbedömningen bygger endast på flygbildstolkning. Stormossen ligger strax söder om Sottern i ett småbrutet, skogsdominerat landskap. I berggrunden finns framförallt granodiorit och granit. I mitten av myren ligger ett par skogsbeklädda fastmarksholmar. Söder om dessa dominerar minerotrof torvmark och norr om ombrotrof. Platåmossen i norr har ibland en tydlig randskog. På mosseplanet finns också dungar med tall, i övrigt är den glest tallbevuxen. Planet tycks enligt flygbilden vara torrt med inslag av mjukmattehöljor. En större mjukmattehölja finns i nordost. I söder dominerar kärr. Golvet är uppbyggt av både fast- och mjukmattor, i ett stråk är mjukmattan mycket blöt. Risvegetation är spridd i kärret. Kärret övergår mot kanterna till små tallmossar. Objektet är opåverkat av hydrologiska ingrepp.

Det höga naturvärdet motiveras bl a av komplexiteten av olika myrtyper samt att objektet är hydrologiskt opåverkat.

**09F 8G 01 (2123) KLAS 1
STORMOSSEN 500 M O BISBOTÄRN, 4 KM SV BREVENS
BRUK**

34 ha (32 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -81.
Örebro kn.

Delobj. 1: Topogent kärr

16 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 30 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjekttytan, glest träd täckt, lövskog.

Element 4: Dråg, 15 % av delobjekttytan.

Element 5: Golv, 20 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse

4 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 5 % av delobjekttytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Platåformigt välvd mosse

12 ha, öppet.

Element 1: Hölja, 15 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 2: Mosseplan, 60 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Element 3: Randskog, 22 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 4: Lagg, 3 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**09F 8H 01 (0323) KLAS 3
SJÖMOSSEN 2,5 KM S BREVENS BRUK**

16 ha (15 ha våtm), 125 m ö h. Flygb. -81.
Örebro kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
16 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 5 % av delobjekttytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**09F 8H 02 (0408) KLAS 3
GETMOSSEN 3 KM S BREVENS BRUK**

12 ha (11 ha våtm), 120 m ö h. Flygb. -81.
Örebro kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
11 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjekttytan, öppet. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 5 % av delobjekttytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**09F 8H 03 (4307) KLAS 3
HEMMINGS MOSSE 500 M NV BREVENS BRUK**

12 ha (10 ha våtm), 75 m ö h. Flygb. -81.
Örebro kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
10 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjekttytan, öppet, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Lagg, 3 % av delobjekttytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Lagg, 2 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, lövskog.

09F 8H 04 (2405) KLASS 3
VÄTMARK 500 M V LILLA BERGA, 1,5 KM SV BREVENS BRUK

10 ha (9 ha våtm), 75 m ö h. Flygb. -81.
Örebro kn.

Delobj. 1: Strand vid vattendrag
9 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, väg.

Element 1: Bäck, 7 % av delobjekttytan.

Element 2: Golv, 80 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 3: Golv, 13 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, lövskog.

09F 8H 05 (4947) KLASS 3
KÄRR 2 KM NO BREVENS BRUK

16 ha (14 ha våtm), 70 m ö h. Flygb. -81.
Örebro kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
14 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Bäck, 1 % av delobjekttytan, öppet.

Element 2: Golv, 30 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 3: Golv, 54 % av delobjekttytan, blandskog.

Element 4: Golv, 10 % av delobjekttytan, öppet, lövskog. Fastmatta.

Element 5: Golv, 5 % av delobjekttytan, öppet. Vattenvegetation.

09F 8I 04 (0007) KLASS 3
MYR VID JAKOBSTÄRN 4,5 KM SSV HÖGSJÖ

10 ha (9 ha våtm), 120 m ö h. Flygb. -81.
Örebro kn.

Delobj. 1: Tjärn
1 ha.

Element 1: Golv, 97 % av delobjekttytan.

Element 2: Gungfly, 3 % av delobjekttytan.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
9 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Hölja, 6 % av delobjekttytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Lagg, 4 % av delobjekttytan, öppet. Fastmatta.

09F 8I 05 (0803) KLASS 2
MYR VID RUDTÄRNEN 4 KM SV HÖGSJÖ

15 ha (13 ha våtm), 120 m ö h. Flygb. -81.
Örebro kn.

Delobj. 1: Tjärn
2 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
8 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 55 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 35 % av delobjekttytan, öppet. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 10 % av delobjekttytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
5 ha, glest träd täckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 97 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Gungfly, 3 % av delobjekttytan.

09F 9G 01 (3327) KLASS 3
BROÄNGSKÄRRET 2 KM SV KILSMO

62 ha (57 ha våtm), 75 m ö h. Flygb. -81.
Örebro kn.
Ingår i naturvårdsplan. Åkermark ansluter, litteratur om objektet finns, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
57 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark generell påverkan från dikning, svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, 70 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Golv, 10 % av delobjekttytan, öppet. Örtdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjekttytan, öppet. Mjukmatta.

Element 4: Golv, 5 % av delobjekttytan. Flytbladsvegetation.

Delobj. 2: Tjärn
3 ha.

Element 1: Golv.

09F 9H 01 (3711) KLASS 4
VÄLLBYTORPAKÄRREN 1 KM SO KILSMO

22 ha (21 ha våtm), 75 m ö h. Flygb. -81.
Örebro kn.
Starkt generellt påverkat av dikning.

09F 9H 02 (4632) KLASS 3
BJÖRNÖMOSSEN OCH KORSMOÅNGEN 3 KM O KILSMO

60 ha (59 ha våtm), 80 m ö h. Flygb. -81.
Örebro kn.
Sjö ansluter till högst 24%, torvkoncessionsansökan finns.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
20 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning, järnväg, stark lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
29 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, järnväg.

Element 1: Golv, 65 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjekttytan, lövskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Golv, 15 % av delobjekttytan, barrskog.

09F 91 02 (3506) KLASS 3
ÖVRE BAGGMOSSEN, NEDRE BAGGMOSSEN OCH KAR-
LAKÄRR 3 KM NV
HÖGSJÖ

35 ha (34 ha våtm), 100 m ö h. Flygb. -81.
Örebro kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
23 ha, fördelat på 2 ytor, glest träd täckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, järnväg.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjekttytan, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, öppet. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
11 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 40 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 35 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 25 % av delobjekttytan, glest träd täckt, barrskog. Fastmatta.

09F 91 03 (4622) KLASS 3
STORMOSSEN 500 M SO SÖRBERG, 3 KM N HÖGSJÖ

69 ha (66 ha våtm), 90 m ö h. Flygb. -81.
Örebro kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
51 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning, väg.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjekttytan, blandskog.

Element 2: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan, öppet, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr

2 ha, skogsbevuxet. Svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 3: Platåformigt välvd mosse
6 ha, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjekttytan, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 17 % av delobjekttytan, glest träd täckt, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 3 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
7 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande järnväg.

Element 1: Bäck, 1 % av delobjekttytan.

Element 2: Golv, 60 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 39 % av delobjekttytan, glest träd täckt, blandskog. Fastmatta.

10E 0H 01 (3643) KLASS 4
MYR 100 M V BJÖRKEN, 3 KM SV TÄNGERÅSA

34 ha (34 ha våtm), 65 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.

Delobj. 1: Platåformigt välvd mosse
22 ha, fördelat på 2 ytor, glest träd täckt. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, (otyd.), barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
12 ha, skogsbevuxet. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

10E 0I 01 (2603) KLASS 3
MYR 200 M O VÄSTKÄRRSTORP,
5,5 KM O SKAGERSHULT

56 ha (56 ha våtm), 70 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.
Åkermark ansluter.

Delobj. 1: Koncentrisk mosse
56 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, torvtäkt.

Element 1: Sträng, (otyd.), 25 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 25 % av delobjekttytan, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Randskog, 20 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

10E 0I 02 (3211) KLASS 3
MYR V KYRKÅSSTUGAN, 6,5 KM NO SKAGERSHULT

18 ha (18 ha våtm), 75 m ö h. Flygb. -86.

Örebro kn.
Åkermark ansluter.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
18 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning, torvtäkt, väg.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, glest träd täckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 5 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

10E 01 03 (1815) KLASS 2
KYRKOTORPSMOSEN 7 KM O SKAGERSHULT

42 ha (42 ha våtm), 75 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.
Åkermark ansluter.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
40 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 33 % av delobjektytan, glest träd täckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Hölja, 2 % av delobjektytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Lagg, 2 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 5: Dråg, 3 % av delobjektytan.

Delobj. 2: Topogent kärr
2 ha, öppet.

Element 1: Golv, 15 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 85 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

10E 01 04 (0123) KLASS 3
MYR 100 M O ÄSPLUND, 8 KM O SKAGERSHULT

33 ha (33 ha våtm), 85 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
2 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, barrskog.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
15 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande dikning.

Element 1: Mosseplan, 89 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, glest träd täckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, (otydl.), 1 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Koncentrisk mosse
16 ha, öppet. Svag lokal påverkan från torvtäkt.
Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Sträng, (otydl.), 20 % av delobjektytan.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 15 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 3: Hölja, 20 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Mosseplan, 40 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Randskog, 5 % av delobjektytan.

10E 01 06 (3548) KLASS 3
MYR 200 M O TRYSTORP, 2 KM SO TÅNGERÅSA

80 ha (80 ha våtm), 70 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.
Åkermark ansluter.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
80 ha, glest träd täckt.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, barrskog.
Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Hölja, 0 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

10E 0J 01 (3844) KLASS 3
MYR 200 M V UGGLEBO, 0,5 KM SO HACKVAD

13 ha (13 ha våtm), 60 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.
Åkermark ansluter.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
13 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning, väg.

Element 1: Mosseplan, 0 % av delobjektytan, barrskog.
Fastmatta med ristuvor.

10E 1G 01 (0405) KLASS 3
TALLKOTTMOSSEN 3 KM NV SKAGERSHULT

27 ha (26 ha våtm), 105 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
5 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, lövskog.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
7 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande dikning.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest träd täckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 3: Topogent kärr
3 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 4: Excentrisk mosse
11 ha, öppet. Svag generell påverkan från dikning.
Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Sträng, (otyd.), 4 % av delobjekttytan.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 6 % av delobjekttytan. Risvegetation.

Fastmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Mosseplan, 80 % av delobjekttytan, barrskog.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

10E1G02 Stora Stenmossen, 2 km NV Skagershult

Myren ligger väster om sjön Teen i ett barrskogsdominerat område. Berggrunden är i huvudsak uppbyggd av metavulkanit, granodiorit och granit. Strax norr om objektet sträcker sig vägen mellan Svartå och Mullhyttan. En oregelbunden excentrisk mosse täcker så gott som hela våtmarksytan. Den delas i två hälften genom ett öst-västligt drag. Objektet inventerades i fält den 30 augusti 1993. På mosseplanet överväger glest tallbevuxna ristuvor och vagt utbildade rissträngar. Enstaka lösbottomhöljor samt mjukmattehöljor med *Sphagnum majus* ligger som fördjupningar mellan risen. Fastmattor utan ris representeras i huvudsak av tuvull och *Sphagnum rubellum*. Randskogen är av östlig skvattramtyp. Dråget är brett och har formen liknande ett liggande timglas. Kärret är fattigt med ett mjukmattegolvet dominerat av flaskstarr, vitag och *Sphagnum papillosum*.

Den höga naturvärdesbedömningen motiveras bl a av att objektet i det närmaste är opåverkat samt storleken.

10E 1G 02 (0915) KLASS 1 STORA STENMOSSEN 2 KM NV SKAGERSHULT

92 ha (91 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -86. Fält -93.
Örebro kn.
Litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Excentrisk mosse
78 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen,
dikning, järnväg.

Element 1: Dråg, 5 % av delobjekttytan.
Mjukmattekärr, starr-S. papillosum var.

Element 2: Sträng, 1 % av delobjekttytan, barrskog.
Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 3: Tuva, 10 % av delobjekttytan. Ristuvmosse av S.
fuscumtyp.

Element 4: Hölja, 15 % av delobjekttytan. Mjukmattemosse av
vitag-kallgräs-S. majustyp.

Element 5: Hölja, 1 % av delobjekttytan. Höljegöl.

Element 6: Mosseplan, 20 % av delobjekttytan.
Fastmattemosse av tuvull-S. rubellumtyp.

Element 7: Mosseplan, 23 % av delobjekttytan, barrskog.
Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 8: Lagg, (otyd.), 1 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 9: Randskog. Tallmosse av skvattramtyp.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
6 ha, fördelat på 5 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan
från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 98 % av delobjekttytan, barrskog.
Tallmosse av skvattramtyp.

Element 2: Lagg, 2 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 6 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
dikning, järnväg.

Element 1: Golv, 70 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 5 % av delobjekttytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 3: Golv, 25 % av delobjekttytan, blandskog.
Mjukmattekärr, starr-S. papillosum var.

10E 1G 03 (0124) KLASS 3 LILLA STENMOSSEN 1,5 KM NV SKAGERSHULT

23 ha (23 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn. Litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
2 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande
hyggen.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 5 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Excentrisk mosse
19 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen,
anslutande dikning.

Element 1: Sträng, (otyd.), 15 % av delobjekttytan.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 30 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 35 % av delobjekttytan, barrskog.
Fastmatta med ristuvor.

Element 5: Lagg, 5 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 6: Randskog, 5 % av delobjekttytan, skogsbevuxet,
barrskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
2 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från

anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 60 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

**10E 1G 04 (2823) KLASS 3
MYR 100 M N STENFALLET, 3,5 KM SV MULLHYTTAN**

16 ha (14 ha våtm), 115 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.

Delobj. 1: Tjärn
2 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
12 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande järnväg, kraftledning,
torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
2 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
kraftledning.

Element 1: Golv, 95 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Gungfly, 5 % av delobjekttytan.

**10E 1G 05 (3739) KLASS 3
BAGGAMOSSEN 1,5 KM SV MULLHYTTAN**

10 ha (10 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
3 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
dikning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
7 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjekttytan, glest
träddäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

10E1H01

Skagershultamossen och Stenhultsmossen, 3,5 km O Skagershult

Med sin imponerande storlek av drygt 1900 hektar är objektet det största i länet. Större delen ingår i Örebro kommun, en mindre i Laxå kommun. En betydande del (ca 600 hektar) har dock varit, och är fortfarande, utsatt för industriell torvtäktverksamhet. De finaste områdena i norr avsattes som naturreservat 1982. Flera framstående personer har genom åren visat sitt intresse för myren, bl a von Post och Sernander. Objektet är också en referenslokal för torvmarksforskning. Bergrunden i landskapet domineras av metavulkanit, granodiorit och granit. I anslutning till myren finns långsträckta moränformationer, s k drumliner. Objektet inventerades i fält den 3 augusti 1993. Skagershultsmossen är bredast i norr, den avgränsas där av Svartån. Söderut smalnar myren av för att återigen svälla ut mot öster. Myren kan grovt indelas i tre områden. Den norra upptar störst yta, den centrala och den södra, den senare är flikig och uppsplittrad. Den norra delen är en stor platåmosse. Undantaget torvtäkterna är det den vackraste delen med ett stort gölkomplex i väster. Randskogen är välutvecklad och är av skvattram typ. I öster finns svagt utbildade strängar med risvegetation. Risen återkommer på mossen i form av tuvor. Mosseplanet är rikt differentierat i tuvor, fast- och mjukmattor samt lösbottnar. I de talrika mjukmattorna växer bl a *Sphagnum cuspidatum*. Lösbottenhöljorna är mer eller mindre vegetationsfria, ibland kan de ha en bård av dystarr och vitmossor. De tuvulldominerade fastmattorna är vanligen av *Sphagnum balticum* typ. En stig, Likvägen, separerar den norra delens platåmosse från den centrala delens excentriska. Söder om Likvägen finns ett björkkärr med varierad grad av krontäckning. Starr, med ett stort inslag av tuvull och vattenklöver, dominerar fältskiktet. Det lilla myggblomstret växer också i kärret. Bottensiktet täcks av vitmossor, främst *Sphagnum girgensohnii*. Backeus (1978) fann den mer krävande *Pseudobryum cinclidioides*. Den excentriska mossen centralt i myren antar svagt formen av en halvmåne. Dess strängstruktur är vanligen tydlig. Mellan strängarna finns fast- respektive mjukmattor. Vegetationstyperna är likartade dem i den välvda mossen. Den excentriska mossen har dock ett inslag, om än mycket litet, av fastmatta med tuvull och *Sphagnum fuscum* som dominanter. I sydväst är objektet skadat av torvtäkt. I sydöst ligger Stenhultsmossen. Det är till största delen en koncentrisk mosse. Norr därom är den uppsplittrad i tallmossar, av framförallt skvattramtyp, kärr och fastmarksholmar. Strängstrukturen är i stort sett tydlig, söderut avtar de dock abrupt. Förutom strängar är även fast- och mjukmattor samt lösbottnar representerade. Kärren i objektet är oftast fattiga med ett golv som huvudsakligen är av fast- eller mjukmatttyp. I Backeus inventering (1978) finns ett kärr beskrivet med en rikare vegetation. Det ligger i söder på ömse sidor om Gropakärrsbäcken, vilken övertvårar myren. Golvet är till största delen en mjukmatta. I fältskiktet växer rikligt med bl a bunkestarr. I mossemattan finns t ex vitmossan *Sphagnum papillosum* och brunmossan *Drepanocladus trichophyllus*. Myren har ett mycket intressant fågelliv med bl a länets störst antal tranpar. Den har i Fågelmymar i Örebro län (1982:1) bedömts höra till den högsta skyddsklassen, 1.

Den betydande storleken och orördheten är två av alla de faktorer som bidrar till myrens höga naturvärden. Skagershultamossen ingår i Myrskyddsplan för Sverige.

**10E 1H 01 (0333) KLASS I
SKAGERSHULTAMOSSEN OCH STENHULTSMOSSEN 3,5
KM O SKAGERSHULT**

1964 ha (1927 ha våtm), 70 m ö h. Flygb. -88. Fält -93.
Örebro kn.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvärden.
Naturreservat. Drumlin i anslutning,
kulturhistoriska värden, litteratur om objektet finns,
ornitologiska värden.

Delobj. 1: Obestämbär mosse
635 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från
dikning, stark generell påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjekttytan.

Element 2: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Hölja, 3 % av delobjekttytan. Lösbottnen.

Element 5: Mosseplan, 3 % av delobjekttytan, skogbevuxet,
barrskog.

Element 6: Kantzon utmed å, 2 % av delobjekttytan.

Element 7: Randskog, (otydl.), 1 % av delobjekttytan,
skogbevuxet, barrskog.

Element 8: Lagg, (otydl.), 1 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Plåtformigt välvd mosse
778 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen, dikning, anslutande dikning, torvtäkt,
anslutande torvtäkt, väg.

Element 1: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan. Tallmosse av
skvattramtyp.

Element 2: Hölja, 25 % av delobjekttytan.

Mjukm.mosse, vitag-kallgräs-S.cuspidatumtyp.

Element 3: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, glest
träddäckt, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 4: Sträng, (otydl.), 10 % av delobjekttytan,
barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4, underelem. 1: Tuva, 5 % av delobjekttytan, 1-3 %
krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 5: Randskog, 7 % av delobjekttytan, skogbevuxet,
barrskog. Tallmosse av skvattramtyp.

Element 6: Lagg, 5 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 6, underelem. 1: Lagg, 2 % av delobjekttytan, 1-3 %
krontäckning, barrskog. Öppet klär.

Element 7: Hölja, 10 % av delobjekttytan. Höljegöl.

Element 8: Mosseplan, 16 % av delobjekttytan.
Fastmattemosse av tuvull-S. balticumtyp.

Element 9: Mosseplan, 2 % av delobjekttytan,

glest träddäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse
50 ha, fördelat på 10 ytor, skogsbevuxet. Svag
lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, anslutande
dikning.

Element 1: Mosseplan, 94 % av delobjekttytan, barrskog.
Tallmosse av skvattramtyp.

Element 2: Mosseplan, 1 % av delobjekttytan,
glest träddäckt, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta
med ristuvor.

Delobj. 4: Topogent kärr
28 ha, fördelat på 8 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, anslutande
dikning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjekttytan, lövskog. Gran-
björkkärr av intermediär vitmosstyp.

Element 1, underelem. 1: Golv, 5 % av delobjekttytan,
4-10 % krontäckning, blandskog. Mjukmattekärr, starr-S.
fallax variant.

Element 2: Golv, 25 % av delobjekttytan, barrskog.

Delobj. 5: Topogent kärr
50 ha, fördelat på 11 ytor, öppet. Svag lokal
påverkan från anslutande hyggen, dikning, anslutande
dikning.

Element 1: Golv, 30 % av delobjekttytan, barrskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 1, underelem. 1: Golv, 10 % av delobjekttytan,
1-3 % krontäckning, lövskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blååtel-
vitmosstyp.

Element 2: Golv, 58 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 2, underelem. 1: Golv, 5 % av delobjekttytan. Öppet
mjukmattekärr.

Element 2, underelem. 2: Golv, 10 % av delobjekttytan,
1-3 % krontäckning, blandskog. Sumpkärr av högstarr-örttyp.

Element 2, underelem. 3: Golv, 5 % av delobjekttytan,
4-10 % krontäckning, blandskog. Öppet mjukmattekärr.

Element 3: Dråg, 3 % av delobjekttytan.

Element 4: Golv, 7 % av delobjekttytan, lövskog.
Örtdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 5: Golv, 2 % av delobjekttytan, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 6: Excentrisk mosse
241 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen,
dikning, anslutande dikning.

Element 1: Sträng, 35 % av delobjekttytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 2: Hölja, 40 % av delobjekttytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjekttytan. Lösbottnen.

Element 4: Mosseplan, 9 % av delobjekttytan, barrskog.
Fastmatta med ristuvor.

Element 5: Randskog, (otyd.), 1 % av delobjekttytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 6: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan. Fastmattemosse av tuvull-S. balticumtyp.

Delobj. 7: Koncentrisk mosse

130 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande dikning.

Element 1: Sträng, 37 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 40 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjekttytan. Lösbottom.

Element 4: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 5: Lagg, (otyd.), 1 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 6: Dråg, 1 % av delobjekttytan.

Element 7: Randskog, (otyd.), 1 % av delobjekttytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 8: Mad vid vattendrag

7 ha, öppet.

Element 1: Golv, 95 % av delobjekttytan, lövskog. Örtdominerad vegetation.

Element 2: Bäck, 5 % av delobjekttytan.

**10E 1H 02 (2303) KLASS 4
FRÖSTORPSMOSEN 1,5 KM S MULLHYTTAN**

52 ha (52 ha våtm), 70 m ö h. Flygb. -86.

Örebro kn.

Mycket starkt generellt påverkat av torvtäkt.

**10E 1H 03 (2111) KLASS 3
MAD 400 M S BORNÅS, 1,5 KM S MULLHYTTAN**

14 ha (13 ha våtm), 70 m ö h. Flygb. -86.

Örebro kn.

Ingår i ängs- och hagmarksinventering. Området är beteshävdad.

Delobj. 1: Mad vid vattendrag

13 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 95 % av delobjekttytan.

Element 2: Kantzon utmed å, 5 % av delobjekttytan, skogbevuxet, lövskog.

**10E 1H 04 (4234) KLASS 3
HULTAMOSSEN 1,5 KM O MULLHYTTAN**

124 ha (122 ha våtm), 70 m ö h. Flygb. -86.

Örebro kn.

Åkermark ansluter.

Delobj. 1: Excentrisk mosse

72 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, torvtäkt, anslutande torvtäkt. Minst 600 m diameter öppen yta.

Element 1: Sträng, 35 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 25 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjekttytan. Lösbottom.

Element 4: Hölja, 10 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 6: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 7: Randskog, 5 % av delobjekttytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 2: Obestämbare mosse

50 ha, öppet. Stark generell påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

**10E 1H 05 (3149) KLASS 2
MYR 500 M S FRIDHEM, 3 KM SO MULLHYTTAN**

58 ha (56 ha våtm), 65 m ö h. Flygb. -86.

Örebro kn.

Delobj. 1: Topogent kärr

41 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.

Svag lokal påverkan från dikning, krafledning.

Element 1: Golv, 40 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Golv, 60 % av delobjekttytan, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr

9 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjekttytan, lövskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaiktyp

6 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från krafledning.

Element 1: Golv, 25 % av delobjekttytan, öppet, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 75 % av delobjekttytan, barrskog. Fastmatta.

**10E 1H 06 (1719) KLASS 2
MYR 2 KM S MULLHYTTAN**

25 ha (25 ha våtm), 70 m ö h. Flygb. -86.

Örebro kn.

Tidigare hävd genom slåtter och/eller bete, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Mad vid vattendrag

9 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Topogent kärr

16 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

**10E 1H 08 (2617) KLASS 3
VÄTMARK 200 M V STOCKÅS, 1,5 KM SO MULLHYTTAN**

38 ha (38 ha våtm), 70 m ö h. Flygb. -86.

Örebro kn.

Ingår i naturvårdsplan. Tidigare hävd genom slåtter och/eller bete, litteratur om objektet finns, ornitologiska

värden.

Delobj. 1: Strandäng

38 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Golv, 20 % av delobjekttytan, skogbevuxet, lövskog.

10E 1H 09 (3025) KLASS 3

VÅTMARK 400 M N STOCKÅS, 1,5 KM SO MULLHYTTAN

11 ha (11 ha våtm), 70 m ö h. Flygb. -86.

Örebro kn.

Ingår i naturvårdsplan. Tidigare hävd genom slåtter och/eller bete, litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Strandäng

11 ha, öppet. Svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

10E 1H 10 (3324) KLASS 3

VÅTMARK 300 M S LABBÅSEN, 1,5 KM SO MULLHYTTAN

17 ha (17 ha våtm), 70 m ö h. Flygb. -86.

Örebro kn.

Åkermark ansluter, tidigare hävd genom slåtter och/eller bete, litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Strandäng

17 ha, öppet. Svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 45 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Golv, 30 % av delobjekttytan, glest trädäck, lövskog.

Element 3: Golv, 25 % av delobjekttytan, skogbevuxet, lövskog.

10E 1H 11 (3018) KLASS 3

VÅTMARK 300 M O BORNÅS, 1 KM SO MULLHYTTAN

20 ha (19 ha våtm), 70 m ö h. Flygb. -86.

Örebro kn.

Åkermark ansluter.

Delobj. 1: Strandäng

19 ha, öppet. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 60 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Golv, 40 % av delobjekttytan, skogbevuxet, lövskog.

10E 1I 01 (1942) KLASS 3

KARABYMOSEN 4,5 KM SSV FJUGESTA

13 ha (13 ha våtm), 65 m ö h. Flygb. -86.

Örebro kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

13 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande dikning.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjekttytan, glest trädäck, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjekttytan, glest trädäck, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

10E 1I 02 (2846) KLASS 2

DEL AV VELANDASJÖN 4 KM S FJUGESTA

23 ha (23 ha våtm), 65 m ö h. Flygb. -86.

Örebro kn.

Ingår i naturvårdsplan. Ornitologiska värden, sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Bevuxen sjö

18 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Golv, lövskog. Vattenvegetation.

Delobj. 2: Mad vid sjö

5 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 65 % av delobjekttytan. Örtdominerad vegetation.

Element 2: Golv, 35 % av delobjekttytan.

Gräs/starrvegetation.

10E 1I 03 (2105) KLASS 3

VÅTMARK 100 M V HINDERSTORP, 4,5 KM SO MULLHYTTAN

59 ha (50 ha våtm), 65 m ö h. Flygb. -86.

Örebro kn.

Tidigare hävd genom slåtter och/eller bete, litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Topogent kärr

2 ha, skogsbevuxet. Svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Strandäng

20 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 75 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Golv, 25 % av delobjekttytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 3: Topogent kärr

28 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog. Mjukmatta.

10E 1J 01 (1232) KLASS 3

MYR 200 M V PÅLSTORP, 4,5 KM SSO FJUGESTA

30 ha (29 ha våtm), 60 m ö h. Flygb. -86.

Örebro kn.

Åkermark ansluter.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

15 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, stark generell påverkan från torvläkt, svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse

14 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande dikning, anslutande torvläkt.

Element 1: Mosseplan, 30 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 70 % av delobjekttytan, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

**10E 2G 01 (0440) KLASS 3
SJÖMOSSEN 1,5 KM V MULLHYTTAN**

18 ha (18 ha våtm), 115 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
12 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning,
stark lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 98 % av delobjektytan, barrskog.
Element 2: Lagg, (otyd.), 2 % av delobjektytan, öppet.
Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Excentrisk mosse
6 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande
annan läkt, anslutande torvtäkt.

Element 1: Sträng, 10 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, barrskog.
Fastmatta med ristuvor.

Element 4: Mosseplan, 40 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

**10E 2G 02 (0134) KLASS 3
MYR 300 M O INTAGET, 1,5 KM V MULLHYTTAN**

15 ha (13 ha våtm), 120 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
7 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan
från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 97 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Hölja, 3 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 2: Tjärn
1 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 3: Topogent kärr
5 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Gungfly, 1 % av delobjektytan.

Element 2: Golv, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
1 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Golv, lövskog.

**10E 2G 03 (4933) KLASS 3
MYR 300 M N MÄLSJÖN, 5 KM NV MULLHYTTAN**

9 ha (9 ha våtm), 180 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
2 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr

7 ha, öppet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 15 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan, glest träd täckt,
lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**10E 2H 01 (1310) KLASS 4
ORRAMOSSEN 400 M O SALTORP,
0,5 KM N MULLHYTTAN**

38 ha (38 ha våtm), 130 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.
Mycket starkt generellt påverkat av torvtäkt.

**10E 2H 02 (1447) KLASS 4
ÖVRATORPSMOSSEN 2,5 KM NO MULLHYTTAN**

80 ha (80 ha våtm), 75 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.
Mycket starkt generellt påverkat av torvtäkt.

**10E 2I 01 (4034) KLASS 2
STORMOSSEN 800 M O FARBRORSTORP,
2,5 KM V FJUGESTA**

180 ha (175 ha våtm), 85 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns,
området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Obestämbär mosse
56 ha, öppet. Stark generell påverkan från dikning,
torvtäkt.

Element 1: Mosseplan.

Delobj. 2: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 6 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
dikning, anslutande dikning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan, barrskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, skogsbevuxet,
lövskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse
14 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, glest
träd täckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 5 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Excentrisk mosse
98 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, torvtäkt.

Element 1: Sträng, 31 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 2: Tuva, 2 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 3: Hölja, 30 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Hölja, 4 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 5: Hölja, 10 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 6: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, glest trädäck, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 7: Lagg, 3 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 8: Randskog, 5 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 9: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

**10E 3F 02 (0544) KLASS 3
MYR 800 M NO KARSBO, 8 KM NNO SVARTÅ**

10 ha (10 ha våtm), 145 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
6 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjekttytan, blandskog.

Element 2: Mosseplan, 18 % av delobjekttytan, öppet, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Lagg, 2 % av delobjekttytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
3 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
1 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, lövskog.

**10E 3G 01 (0245) KLASS 3
SPÅNGAMOSSEN 4,5 KM N MULLHYTTAN**

12 ha (11 ha våtm), 190 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
2 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Plåtformigt välvd mosse
8 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjekttytan, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Lagg, 10 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Randskog, (otydl.), 5 % av delobjekttytan, glest

träddäckt, blandskog.

Delobj. 3: Tjärn
1 ha.

Element 1: Golv.
Delobj. 4: Topogent kärr
1 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**10E 3G 02 (1108) KLASS 3
MYR 400 M V GRYTABRON, 9,5 KM NNO SVARTÅ**

13 ha (12 ha våtm), 170 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.

Delobj. 1: Tjärn
1 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
4 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, blandskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
1 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 97 % av delobjekttytan, lövskog. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 3 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Delobj. 4: Mad vid vattendrag
7 ha, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Bäck, 10 % av delobjekttytan.

Element 2: Golv, 10 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Gungfly, 5 % av delobjekttytan.

Element 4: Golv, 75 % av delobjekttytan, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**10E 3G 03 (2011) KLASS 3
MYR 400 M V INGVALDSTORP 8 KM SV VILLINGSBERG**

8 ha (8 ha våtm), 145 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
5 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjekttytan, blandskog.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan, barrskog.

Delobj. 2: Mad vid vattendrag
3 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Bäck, 10 % av delobjekttytan.

Element 2: Golv, 15 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 65 % av delobjekttytan, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Golv, 10 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, lövskog.

Objektet är litet, smalt och krokigt. Det ligger i en sänka i Kilsbergens brutna skogslandskap. Berggrunden domineras av granit. En smal skogsbilväg tvärar över en av myrarmarna och upphör vid gården Holmsjötorp. Våtmarken är i huvudsak minerotrof och omger en bäck samt Djupetjärnarna. Objektet inventerades i fält den 30 augusti 1993. Myrens lilla svagt välvda mosse ligger mellan de båda tjärnarna. Den sträcker sig ned till den södra tjärnen. Mossen är nästan fullkomligt tallbevuxen och i fältskiktet dominerar skvattram. Golvet vid och mellan tjärnarna är företrädesvis en mjukmatta med glest spridda träd. Det domineras av starr med vitmossor i botten. Spridda ristuvor och tuvulltuvor förekommer. I blötare fläckar växer bl a kallgräs och *Sphagnum inundatum*. I några fläckar råder en rikare miljö och där viker vitmossorna undan och brunmossor, främst *Warnstorfia exannulatus*, tar överhanden.

Orördheten, närheten till vatten samt den rikare miljön bidrar till det höga naturvärdet.

**10E 3G 04 (0328) KLASS 1
MYR 200 M O HOLMSJÖTORP, 5,5 KM NNV
MULLHYTTAN**

18 ha (16 ha våtm), 170 m ö h. Flygb. -86. Fält -93.
Örebro kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Tjärn
2 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
1 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, barrskog. Tallmosse av skvatramtyp.

Delobj. 3: Mad vid sjö
4 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 85 % av delobjekttytan, blandskog.
Mjukmattekärr, starr-S. fallax variant.

Element 1, underelem. 1: Tuva, 5 % av delobjekttytan,
4-10 % krontäckning, blandskog. Ristuvmosse av S.
magellanicumtyp.

Element 1, underelem. 2: Tuva, 5 % av delobjekttytan,
4-10 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 1, underelem. 3: Tuva, 5 % av delobjekttytan. Öppet
fastmattekärr.

Element 1, underelem. 4: Golv, 5 % av delobjekttytan. Öppet
mjukmattekärr.

Element 1, underelem. 5: Golv, 15 % av delobjekttytan.
Mjukm.kärr av ört-starr-vitmoss-brunmossotyp.

Element 2: Golv, 10 % av delobjekttytan, glest träd täckt,
lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 70 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Gungfly, 5 % av delobjekttytan.

Element 3: Golv, 25 % av delobjekttytan, skogbevuxet,
lövskog. Fastmatta.

Delobj. 5: Mad vid vattendrag

4 ha, öppet. Svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Bäck, 10 % av delobjekttytan.

Element 2: Golv, 25 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 3: Golv, 65 % av delobjekttytan. Öppet sumpkärr.

**10E 3G 05 (1329) KLASS 3
MYR 300 M NV HOLMSJÖTORP,
6,5 KM NNV MULLHYTTAN**

6 ha (6 ha våtm), 170 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.

Ingår i naturvårdsplan. Botaniska värden, litteratur om
objektet finns, rullstensås.

Delobj. 1: Topogent kärr
6 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, körspår från
traktor/skogsmaskin.

Element 1: Golv, 57 % av delobjekttytan, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjekttytan, glest träd täckt,
lövskog. Fastmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjekttytan, skogbevuxet,
lövskog.

Element 4: Gungfly, 5 % av delobjekttytan.

Element 5: Tuva, 3 % av delobjekttytan. Fastmatta.

**10E 3G 06 (0217) KLASS 2
MYR 300 M SO NYTORP, 6 KM NV MULLHYTTAN**

17 ha (16 ha våtm), 160 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
10 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning,
kraftledning, anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan, öppet,
barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 2: Mad vid sjö
3 ha, öppet.

Element 1: Golv. Mjukmatta.

Element 2: Bäck, 1 % av delobjekttytan.

Delobj. 3: Topogent kärr
2 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjekttytan, lövskog.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 45 % av delobjekttytan, lövskog. Fastmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, lövskog.

10E 3H 01 (2419) KLASS 3
SKRÄDDARMOSSEN 2 KM NV RIBBOHYTTAN

11 ha (10 ha våtm), 185 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.

Delobj. 1: Platåformigt våldv moss
6 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, torvtäkt, väg. Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Mosseplan, 55 % av delobjekttytan, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Lagg, 5 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
4 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 75 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

10E 3H 02 (2326) KLASS 3
MYR V GÅRDSJÖN, 1,5 KM V RIBBOHYTTAN

16 ha (15 ha våtm), 175 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt våldv moss
5 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 10 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
8 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, väg.

Element 1: Bäckdråg, 15 % av delobjekttytan.

Element 2: Golv, 80 % av delobjekttytan, barrskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Delobj. 3: Blandmyr av mosaikt
2 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, barrskog.

10E 3H 03 (1612) KLASS 3
BRICKGÅRDSMOSSEN 6,5 KM N MULLHYTTAN

10 ha (10 ha våtm), 195 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.

Delobj. 1: Svagt våldv moss
6 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, väg.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjekttytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
4 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, väg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjekttytan, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 45 % av delobjekttytan, glest träd täckt, lövskog. Fastmatta.

Element 3: Tuva, 5 % av delobjekttytan. Fastmatta.

10E 3H 05 (0127) KLASS 3
MYR 1 KM NO SIRSJÖTORP, 5 KM NO MULLHYTTAN

10 ha (8 ha våtm), 175 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
4 ha, glest träd täckt. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Tjärn
1 ha. Restsjö.

Element 1: Golv.

Delobj. 3: Mad vid sjö
4 ha, öppet.

Element 1: Bäck, 2 % av delobjekttytan.

Element 2: Golv, 85 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 13 % av delobjekttytan, barrskog.
Fastmatta.

10E 3H 06 (2630) KLASS 3
BJÖRNMOSSEN 6 KM SSO VILLINGSBERG

9 ha (9 ha våtm), 175 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
9 ha, glest träd täckt.

Element 1: Golv, 55 % av delobjekttytan, blandskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjekttytan, glest träd täckt, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Tuva, 5 % av delobjekttytan, öppet. Fastmatta.

Element 4: Golv, 10 % av delobjekttytan, öppet. Mjukmatta.

**10E 31 01 (3936) KLASS 3
BROMOSSEN 3 KM V HIDINGE**

12 ha (11 ha våtm), 120 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.

Delobj. 1: Tjärn
1 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
11 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande
hyggen, dikning, kraftledning, stark lokal påverkan från
torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 94 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 5 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Lagg, 1 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**10E 4G 07 (0446) KLASS 3
MYR 300 M V HÖGTORP, 3,5 KM SSV VILLINGSBERG**

13 ha (12 ha våtm), 160 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Tjärn
1 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Topogent kärr
4 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
dikning.

Element 1: Gungfly, 15 % av delobjektytan.

Element 2: Golv, 70 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, skogsbevuxet,
lövskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse
8 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan

från dikning.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, glest
träddäckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, glest
träddäckt, barrskog. Vegetationen domineras av mossor.
Fastmatta.

**10E 4H 03 (1031) KLASS 3
STORMOSSEN 400 M S HOLMSJÖN, 2,5 KM SO VILLINGS-
BERG**

24 ha (24 ha våtm), 190 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
9 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen,
dikning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan, glest träddäckt,
lövskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Excentrisk mosse
13 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Sträng, (otyd.), 5 % av delobjektytan.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 4: Mosseplan, 75 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Mosseplan, 5 % av delobjektytan. Fastmatta med
ristuvor.

Delobj. 3: Topogent kärr
2 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.

Element 1: Golv, barrskog.

10E4I02 Dammsjömossen, 6 km NNV Hidinge

Dammsjömossen är en av Kilsbergens många myrar, den ligger inte särskilt långt från förkastningsbranten. Den nordligaste delen av objektet når in i ett militärt skyddsområde. I söder har det kontakt med den lilla Dammsjön. I det skogsklädda landskapet dominerar metavulkanit. Med undantag av små kärr i ytterkanterna består objektet av tallmossar och öppna platåmossar. Några tjärnar ingår i objektet och intill dessa finns gömslen. En vandringsled löper genom myren och under kraftledningen finns spänger som underlättar besöket. Objektet inventerades i fält den 30 augusti 1993. Den centrala sluttande mossen lutar brant vid den större tjärnen i nordväst, i övrigt är lutningen svagare. Fastmattor är vanligast, både i form av ristuvor och, i viss mån, rissträngar men även som plan utan risvegetation. Dvärgbjörken är allmän i risvegetationen. De övriga fastmattorna domineras av två vegetationstyper, båda med tuvull som den vanligaste kärllväxten, men med olika mossadominans. I huvudtypen växer ungefär lika delar *Sphagnum rubellum* och *Sphagnum tenellum*. I den andra är *Sphagnum magellanicum* härskande. Svagt välvda mossar finns på flera olika håll i objektet. Mossen öster om den större tjärnen är en tallmosse med ett risdominerat fältskikt. Platåmossan längst i nordost har ett plan dominerat av fastmattor med inslag av ristuvor, mjukmattehöljor och lösbottenhöljor. Fastmattornas vegetationstyper är som i den sluttande mossen. Mjukmattehöljorna hyser en vegetation med bl a dystarr, *Sphagnum majus* och *Sphagnum cuspidatum*. Kärren, som inte täcker inte någon större areal av objektet, har vanligen ett mjukmattegol. Insprängt i kärren finns fastmattor, ristuvor och ibland även smärre öar av tallmossar. Vid sjön i söder dominerar flaskstarr fältskiktet, i

bottenskiktet finns gott om *Sphagnum fallax*. Här påträffas också *Sphagnum riparium*, en mossasom trivs där det finns rörligt vatten. Det långsmala kärret söder om den stora fastmarksudden har också flaskstarr som dominerande kärlväxt men här finns ett ganska stort inslag av bl a blåttåtel, tuvsäv, vattenklöver och vitag. Bland mossorna dominerar *Sphagnum papillosum*.

Mosaiken av olika myrtyper samt att myren i det närmaste är helt orörd är två av de faktorer som bidrar till det höga naturvärdet.

**10E 41 02 (4948) KLASS 1
DAMMSJÖMOSSEN 6 KM NNV HIDINGE**

59 ha (53 ha våtm), 220 m ö h. Flygb. -88. Fält -93.
Örebro kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Tjörn
2 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 7 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjekttytan. Mjukmattekärr, starr-S. papillosum var.

Element 1, underelem. 1: Golv, 15 % av delobjekttytan. Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.

Element 1, underelem. 2: Golv, 5 % av delobjekttytan. Mjukmattekärr, starr-S. fallax variant.

Element 2: Golv, 20 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 10 % av delobjekttytan.

Element 4: Golv, 15 % av delobjekttytan, glest trädäckat, barrskog. Fastmatta.

Element 5: Gungfly, 5 % av delobjekttytan.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse
19 ha, fördelat på 7 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande dikning, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan, barrskog. Tallmosse av ristyp.

Element 2: Mosseplan, 8 % av delobjekttytan, glest trädäckat, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, (otydl.), 2 % av delobjekttytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Plåtformigt välvd mosse
7 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjekttytan. Fastm.mosse av tuvull-S. magellanicumtyp.

Element 1, underelem. 1: Mosseplan, 20 % av delobjekttytan. Fastmattemosse av tuvull-S. rubellumtyp.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog. Tallmosse av ristyp.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjekttytan. Mjukmattemosse av vitag-kallgräs-S.majustyp.

Element 4: Tuva, 5 % av delobjekttytan, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Delobj. 5: Sluttande mosse
17 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning. Oregelbundet strukturmönster, spänger.

Element 1: Dråg, 2 % av delobjekttytan.

Element 2: Mosseplan, 65 % av delobjekttytan. Fastmattemosse av tuvull-S. rubellumtyp.

Element 2, underelem. 1: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan. Fastm.mosse av tuvull-S. magellanicumtyp.

Element 3: Sträng, (otydl.), 1 % av delobjekttytan, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 4: Mosseplan, 21 % av delobjekttytan, glest trädäckat, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 5: Hölja, 4 % av delobjekttytan. Mjukmattemosse av vitag-kallgräs-S.majustyp.

Element 6: Lagg, (otydl.), 3 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**10E 41 03 (3443) KLASS 2
MYR 100 M O NORRA TORPTJÄRN,
2,5 KM N LEKHYTTAN**

15 ha (13 ha våtm), 225 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
3 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Golv, blandskog.

Delobj. 2: Tjörn
2 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse
10 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning. Spänger.

Element 1: Mosseplan, 94 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Lagg, (otydl.), 1 % av delobjekttytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**10E 4J 01 (0918) KLASS 2
SKORSTENSMOSSEN OCH VINTERFLA 2 KM N HIDINGE**

21 ha (20 ha våtm), 105 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
8 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr

12 ha, fördelat på 2 ytor, glesl trädtyckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjekttytan, lövskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjekttytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**10E 51 01 (0939) KLASS 3
S STORMOSSEN 5,5 KM VSV HJULÅSEN**

13 ha (13 ha våtm), 220 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.

Delobj. 1: Topogent kärr

3 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från militärt skjutfält.

Element 1: Golv. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Excentrisk mosse

10 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, kraftledning.

Element 1: Sträng, 5 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 2 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 1 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 4: Mosseplan, 69 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Lagg, 3 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 6: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan. Fastmatta med ristuvor.

Element 7: Randskog, 5 % av delobjekttytan, skogbevuxet, barrskog.

**10E 51 02 (2613) KLASS 2
MYR V LÖVHAGET, 10 KM O KARLSKOGA**

30 ha (28 ha våtm), 165 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Tjörn

1 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Excentrisk mosse

22 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Sträng, (tydliga), 30 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 5 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hög frekvens höljor, 28 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 4: Hölja, 2 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 5: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 6: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, barrskog.

Risvegetation. Fastmatta.

Element 7: Randskog, 9 % av delobjekttytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 8: Lagg, 1 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse
3 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 8 % av delobjekttytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Lagg, 2 % av delobjekttytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr

3 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 95 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Bäck, 5 % av delobjekttytan.

**10E 51 03 (3146) KLASS 3
GILSÅSEN 13 KM O KARLSKOGA**

18 ha (18 ha våtm), 205 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.

Delobj. 1: Plåtformigt välvd mosse

18 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, torvtäkt, väg.

Element 1: Ett flertal gölar, 15 % av delobjekttytan.

Element 2: Mosseplan, 65 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Lagg, 3 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Element 5: Randskog, 7 % av delobjekttytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 6: Tuva, 5 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

**10E 51 04 (4144) KLASS 2
LÖSKERMOSSEN 12,5 KM O KARLSKOGA**

27 ha (26 ha våtm), 220 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.

Delobj. 1: Tjörn

1 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Topogent kärr

5 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 55 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjekttytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Platåformigt våldv moss
21 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Tuva, 10 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 3 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 4: Göl, 2 % av delobjekttytan.

Element 5: Hölja, 7 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 6: Dråg, 8 % av delobjekttytan.

Element 7: Mosseplan, 9 % av delobjekttytan, glest trädäckat, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 8: Lagg, (otyd.), 1 % av delobjekttytan. Fastmatta.

10E 51 06 (0123) KLASS 3
MYR 1,5 KM S RUNSTORP, 7 KM VSV HJULÅSEN

14 ha (13 ha våtm), 195 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.

Delobj. 1: Svagt våldv mosse
3 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 5 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Excentrisk mosse
7 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.
Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Sträng, (otyd.), 10 % av delobjekttytan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan, glest trädäckat, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Mosseplan, 60 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Tuva, 5 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
3 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, stark lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 95 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 5 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

10E 51 07 (3531) KLASS 3
BERGAÄNGEN 12 KM SSV DALKARLSBERG

38 ha (36 ha våtm), 185 m ö h. Flygb. -88.
Karlskoga kn.
Ornitologiska värden, sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Svagt våldv mosse
5 ha, glest trädäckat.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjekttytan, barrskog.

Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Lagg, 5 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Platåformigt våldv mosse
11 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädäckat. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjekttytan, barrskog. Fastmatta.

Element 2: Randskog, 20 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 3: Lagg, 10 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mad vid sjö
20 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 89 % av delobjekttytan.

Element 2: Bäck, 1 % av delobjekttytan.

Element 3: Golv, 10 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, lövskog.

10E 5J 01 (0416) KLASS 3
KORSMOSEN 2,5 KM SV HJULÅSEN

19 ha (18 ha våtm), 210 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.

Delobj. 1: Tjörn
1 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Topogent kärr
3 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Gungfly, 1 % av delobjekttytan.

Delobj. 3: Svagt våldv mosse
6 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan, öppet.
Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 4: Platåformigt våldv mosse
9 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjekttytan, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Mosseplan, 18 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 2 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

10E 5J 02 (4008) KLASS 3
MYR NNV LILLA AXSJÖN, 11 KM S DALKARLSBERG

22 ha (22 ha våtm), 220 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
8 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 5 % av delobjektytan. Örtdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjektytan, skogsbevuxet, lövskog. Fastmatta.

Element 4: Golv, 10 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
2 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 3: Plåtformigt välvd mosse
12 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 3 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 2 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 4: Mosseplan, 10 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 5: Randskog, 8 % av delobjektytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 6: Lagg, (otydl.), 2 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

10E 5J 03 (0528) KLASS 4
MYR 300 M V LARSBO, 1,5 KM SV HJULÅSEN

10 ha (10 ha våtm), 195 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning, torvtäkt.

10E 5J 04 (0623) KLASS 3
MYR 400 M SV KÄRRET, 2 KM SV HJULÅSEN

15 ha (14 ha våtm), 200 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.

Delobj. 1: Plåtformigt välvd mosse
2 ha, öppet.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 20 % av delobjektytan. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
12 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, stark generell påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande dikning.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 10 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

10E 5J 05 (1107) KLASS 3
MYR VID GÄDDTJÄRNEN, 3,5 KM V HJULÅSEN

12 ha (11 ha våtm), 215 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
4 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 5 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Plåtformigt välvd mosse
3 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 93 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 1 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 3: Randskog, (otydl.), 4 % av delobjektytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 4: Lagg, 2 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
4 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 23 % av delobjektytan, lövskog.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 2 % av delobjektytan. Lösbotten.

10E 6I 03 (3313) KLASS 2
RÖSIMMOSEN 8,5 KM SV DALKARLSBERG

40 ha (38 ha våtm), 185 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
11 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjektytan, glest trädäckat, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 2: Topogent kärr
6 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Bäck, 5 % av delobjektytan.

Element 3: Golv, 5 % av delobjektytan. Vattenvegetation. Lösbotten.

Delobj. 3: Plåtformigt välvd mosse
21 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, glest trädäckat, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 4: Randskog, 11 % av delobjektytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 5: Lagg, 3 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 6: Lagg, 1 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 4: Tjärn
1 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv.

10E 61 04 (2822) KLASS 2
STORÅNGEN 8 KM SV DALKARLSBERG

49 ha (44 ha våtm), 190 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
19 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 73 % av delobjektytan, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Bäck, 2 % av delobjektytan.

Element 3: Golv, 9 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 4: Golv, 4 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 5: Gungfly, 6 % av delobjektytan.

Element 6: Göl, 1 % av delobjektytan.

Element 7: Golv, 5 % av delobjektytan, skogsbevuxet, lövskog. Botaniska värden.

Delobj. 2: Tjärn
1 ha. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse
25 ha, fördelat på 5 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, väg.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädäckat, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Mosseplan, 18 % av delobjektytan, öppet.
Fastmatta med ristuvor.

Element 4: Lagg, 2 % av delobjektytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

10E 61 05 (0231) KLASS 2
LÅNGTJÄRNSMOSEN 11,5 KM O KARLSKOGA

36 ha (36 ha våtm), 190 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
3 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Bäck, 2 % av delobjektytan.

Element 2: Golv, 90 % av delobjektytan.

Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 8 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
3 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, glest trädäckat, barrskog. Vegetationen domineras av mossor.
Fastmatta.

Delobj. 3: Platåformigt välvd mosse
30 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Göl, 1 % av delobjektytan.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjektytan.

Element 3: Hölja, 14 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 4: Tuva, 13 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 5: Mosseplan, 52 % av delobjektytan, barrskog.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 6: Lagg, 2 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 7: Mosseplan, 5 % av delobjektytan, barrskog.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 8: Randskog, (otyd.), 3 % av delobjektytan,
skogsbevuxet, barrskog.

10E 61 07 (3240) KLASS 2
KINNERÅSMOSEN 7 KM SSO DALKARLSBERG

29 ha (25 ha våtm), 210 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
7 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, militärt skjutfält.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 35 % av delobjektytan, glest trädäckat, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Mosseplan, 5 % av delobjektytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 2: Platåformigt välvd mosse
14 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från militärt skjutfält.

Element 1: Mosseplan, 57 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Göl, 1 % av delobjektytan.

Element 3: Dråg, 2 % av delobjektytan.

Element 4: Hölja, 15 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 5: Hölja, 2 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 6: Mosseplan, 18 % av delobjektytan. Fastmatta med ristuvor.

Element 7: Randskog, (otydl.), 4 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 8: Lagg, (otydl.), 1 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Mad vid sjö
4 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Bäck, 5 % av delobjektytan.

Element 2: Golv, 95 % av delobjektytan. Fastmatta.

10E 61 08 (2836) KLASS 2
SVARTFALLSMOSSEN 7,5 KM SSO DALKARLSBERG

24 ha (19 ha våtm), 210 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.

Delobj. 1: Svagt välvad mosse
2 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från militärt skjutfält.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Platåformigt välvad mosse
8 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från militärt skjutfält.

Element 1: Mosseplan, 65 % av delobjektytan, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 2 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 1 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 4: Dråg, 2 % av delobjektytan.

Element 5: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 6: Randskog, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
9 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, militärt skjutfält.

Element 1: Bäck, 2 % av delobjektytan.

Element 2: Golv, 20 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 55 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Golv, 23 % av delobjektytan. Örtdominerad vegetation. Fastmatta.

10E 61 09 (1531) KLASS 2
TOLSTORPSMOSSEN 9 KM SSO DALKARLSBERG

36 ha (32 ha våtm), 190 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Tjörn
1 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Svagt välvad mosse
7 ha, fördelat på 3 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, körspår från traktor/skogsmaskin, militärt skjutfält.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, öppet, blandskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
7 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 65 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan. Fastmatta.

Delobj. 4: Excentrisk mosse
18 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, militärt skjutfält. Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Bäck, 2 % av delobjektytan.

Element 2: Göl, 1 % av delobjektytan.

Element 3: Hölja, 17 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Mosseplan, 40 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 6: Sträng, 15 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 7: Randskog, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

10E 61 10 (0326) KLASS 3
MYR 700 M S TOLSBÖHYTTAN, 11 KM O KARLSKOGA

21 ha (21 ha våtm), 195 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
8 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från militärt skjutfält.

Element 1: Golv, 80 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 3 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 17 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 2: Platåformigt välvad mosse
13 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, militärt skjutfält.

Element 1: Mosseplan, 60 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 4: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

10E 61 11 (0947) KLASS 3
MYR 800 M O TOLSTORP 5,5 KM NV HJULÄSEN

45 ha (40 ha våtm), 200 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr

4 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, militärt skjutfält.

Element 1: Golv, 50 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 48 % av delobjekttytan. Örtominerad vegetation. Fastmatta.

Element 3: Bäck, 2 % av delobjekttytan.

Delobj. 2: Blandmyr av mosalktyp

4 ha, öppet. Svag generell påverkan från militärt skjutfält.

Element 1: Golv. Fastmatta.

Delobj. 3: Excentrisk mosse

32 ha, öppet. Svag generell påverkan från militärt skjutfält. Öregelbundet strukturmönster.

Element 1: Sträng, (otydl.), 20 % av delobjekttytan.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 9 % av delobjekttytan.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Hölja, 10 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 5: Mosseplan, 35 % av delobjekttytan, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 6: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 7: Randskog, 5 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 8: Lagg, (otydl.), 1 % av delobjekttytan. Fastmatta.

**10E 6J 01 (1511) KLASS 3
SÖDRA HÄLLSJÖMOSSAN 5,5 KM NNV HJULÅSEN**

19 ha (19 ha våtm), 220 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Platåformigt välvd mosse

19 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, körspår från traktor/skogsmaskin, svag generell påverkan från militärt skjutfält, svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 65 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 13 % av delobjekttytan.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 4: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 5: Lagg, (otydl.), 2 % av delobjekttytan, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**10E 6J 02 (1103) KLASS 2
MYR 1,5 KM O TOLSTORP, 5,5 KM NV HJULÅSEN**

20 ha (17 ha våtm), 215 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.

Delobj. 1: Topogent kärr

3 ha, öppet. Svag generell påverkan från militärt skjutfält.

Element 1: Golv. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse

2 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 10 % av delobjekttytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Tjärn

1 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 4: Platåformigt välvd mosse

12 ha, öppet. Svag generell påverkan från militärt skjutfält.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Dråg, 10 % av delobjekttytan.

Element 3: Mosseplan, 15 % av delobjekttytan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Randskog, (otydl.), 5 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

**10E 6J 03 (2710) KLASS 3
NORRA HÄLLSJÖMOSSAN 5,5 KM NNV HJULÅSEN**

72 ha (67 ha våtm), 215 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Tjärn

1 ha.

Element 1: Golv, 95 % av delobjekttytan.

Element 2: Golv, 5 % av delobjekttytan. Vattenvegetation.

Delobj. 2: Topogent kärr

18 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, svag generell påverkan från militärt skjutfält.

Element 1: Golv, 65 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 5 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 4: Golv, 5 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 5: Golv, 15 % av delobjekttytan. Örtominerad vegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse

23 ha, fördelat på 9 eller fler ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, svag generell påverkan från militärt skjutfält.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan, öppet, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 4: Platåformigt välvd mosse

7 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, svag generell påverkan från militärt skjutfält.

Element 1: Mosseplan, 80 % av delobjekttytan. Vegetationen

domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 15 % av delobjektytan, glest trädäck, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjektytan.

Delobj. 5: Excentrisk mosse
19 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag generell påverkan från militärt skjutfält. Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Sträng, (otyd.), 20 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 3 % av delobjektytan. Vegetationen

domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 17 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 40 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, skogsbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Element 6: Lagg, (otyd.), 3 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 7: Mosseplan, 7 % av delobjektytan, glest trädäck, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

10E6J04

Ymningshultsmossen, 6,6 km NNV Hjulåsen

Ymningshultsmossen ligger i det skog- och myrrika landskapet i Kilsbergen. Objektet har inte inventerats i fält. Beskrivningen och naturvärdesbedömningen bygger enbart på flygbildstolkning. Myren ligger i ett militärt skyddsområde väster om sjön Stora Ymningen. I berggrunden domineras granit. En smal skogsbilväg tangerar myrens norra del. Objektet är starkt flikat och flera stora fastmarksholmar avbryter våtmarksdominansen. Ingående våtmarkstyper är främst ombrotrofa med inslag av kärr. En liten tjärn och en svagt rinnande bäck representerar de öppna vattenytorna. Kärren finns främst i de centrala delarna. Golvet är en fastmatta där smärre fläckar med mjukmatta förekommer, särskilt i anslutning till de vagt utformade vattendragen. Enligt flygbilden finns antydning till strängar och flarkar i kärren. Platåmossarna är mer eller mindre öppna med randskog. De är torra med smärre inslag av mjukmattehöljor. Kärrdråg avbryter då och då den fattiga miljön. Svagt välvda mossar, vanligen tallbevuxna, finns spridda i objektet. I norr, mellan två fastmarksholmar, ligger en vagt utbildad excentrisk mosse. Även den är torr med ett litet inslag mjukmattehöljor.

Objektets höga naturvärde grundas bl a på att det är komplext uppbyggt med olika myrtyper och det är i det närmaste hydrologiskt påverkat.

10E 6J 04 (3015) KLASS 1 YMNINGSHULTSMOSSEN 6,5 KM NNV HJULÅSEN

66 ha (56 ha våtm), 220 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.

Delobj. 1: Tjärn
1 ha.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan.

Element 2: Golv, 5 % av delobjektytan. Vattenvegetation.

Delobj. 2: Platåformigt välvd mosse
24 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, militärt skjutfält.

Element 1: Dråg, 5 % av delobjektytan.

Element 2: Mosseplan, 65 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Randskog, 10 % av delobjektytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 4: Lagg, 8 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 5: Bäck, 1 % av delobjektytan.

Element 6: Hölja, 10 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 7: Hölja, 1 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 3: Topogent kärr
20 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från

anslutande hyggen, dikning, militärt skjutfält.

Element 1: Sträng, 2 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 2: Flark, 2 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 3: Golv, 90 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Bäck, 1 % av delobjektytan.

Element 5: Golv, 5 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 4: Svagt välvd mosse
6 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, militärt skjutfält.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, glest trädäck, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 5: Excentrisk mosse
6 ha, öppet. Svag lokal påverkan från militärt skjutfält.

Element 1: Sträng, 10 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 65 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 14 % av delobjektytan, glest trädäckat, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 5: Hölja, 1 % av delobjektytan. Lösbotten.

**10E 6J 05 (4017) KLASS 3
MYR 1,5 KM SV BETESHULT, 7,5 KM NNO HJULÅSEN**

10 ha (9 ha våtm), 230 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
2 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från militärt skjutfält.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, glest trädäckat, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 2: Plåtformigt välvd mosse
7 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, militärt skjutfält.

Element 1: Mosseplan, 65 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 4: Randskog, 7 % av delobjektytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 5: Dråg, 5 % av delobjektytan.

Element 6: Tuva, 3 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

**10E 6J 07 (4245) KLASS 2
KROKMOSSEN 6,5 KM SO DALKARLSBERG**

21 ha (21 ha våtm), 240 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
4 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från militärt skjutfält.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
6 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, militärt skjutfält.

Element 1: Golv. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Plåtformigt välvd mosse
12 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, militärt skjutfält.

Element 1: Mosseplan, 65 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, glest trädäckat, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 3 % av delobjektytan.

Element 4: Hölja, 1 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 5: Lagg, (otydl.), 1 % av delobjektytan.

Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**10E 6J 08 (3449) KLASS 3
MYR 1 KM O YMNINGSTORP, 6,5 KM N HJULÅSEN**

12 ha (10 ha våtm), 235 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
10 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, militärt skjutfält.

Element 1: Bäck, 2 % av delobjektytan.

Element 2: Golv, 93 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 5 % av delobjektytan, glest trädäckat, lövskog. Fastmatta.

**10E 6J 09 (2143) KLASS 3
MYR 1 KM S YMNINGSTORP, 5 KM N HJULÅSEN**

19 ha (16 ha våtm), 240 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.

Delobj. 1: Obestämbar myr
5 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, stark generell påverkan från skjutbana, svag lokal påverkan från anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, lövskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Tjärn
2 ha, fördelat på 2 ytor. Svag lokal påverkan från skjutbana.

Element 1: Golv.

Delobj. 3: Plåtformigt välvd mosse
7 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, skjutbana, militärt skjutfält.

Element 1: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, glest trädäckat, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Randskog, 10 % av delobjektytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 4: Lagg, (otydl.), 2 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 5: Hölja, 3 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 6: Hölja, 5 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
4 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, militärt skjutfält.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 5 % av delobjektytan, glest trädäckat, lövskog. Fastmatta.

Element 3: Golv, 35 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**10E 6J 10 (1025) KLASS 3
MYR 2 KM NV DAMMEN, 4 KM NNV HJULÅSEN**

17 ha (15 ha våtm), 235 m ö h. Flygb. -88.

Örebro kn.

Delobj. 1: Tjärn
2 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
5 ha, fördelat på 5 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från militärt skjutfält.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 3: Plåtformigt välvd mosse
10 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, militärt skjutfält.

Element 1: Göl, 1 % av delobjekttytan.

Element 2: Mosseplan, 70 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Dråg, 5 % av delobjekttytan.

Element 4: Hölja, 4 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 5: Randskog, 15 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 6: Lagg, 5 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

10E 6J 11 (0216) KLASS 2
MYR S SÖDRA GÄDDTJÄRN, 3,5 KM NO HJULÅSEN

61 ha (52 ha våtm), 230 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.

Delobj. 1: Tjärn
1 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Topogent kärr
11 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, militärt skjutfält.

Element 1: Gungfly, 1 % av delobjekttytan.

Element 2: Golv, 75 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjekttytan. Örtdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 4: Golv, 2 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 5: Golv, 3 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 6: Golv, 9 % av delobjekttytan, glest trädäckat, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse
7 ha, fördelat på 7 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, militärt skjutfält.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, öppet, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Lagg, (otyd.), 5 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Plåtformigt välvd mosse
34 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från

avverkning, dikning, militärt skjutfält, väg.

Element 1: Golv, 50 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan. Fastmatta med ristuvor.

Element 4: Tuva, 10 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 5: Mosseplan, 17 % av delobjekttytan, glest trädäckat, barrskog. Fastmatta.

Element 6: Lagg, (otyd.), 3 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 7: Dråg, 5 % av delobjekttytan.

10E 7I 01 (0126) KLASS 2
TOLSBODAMOSSEN 6,5 KM SO DALKARLSBERG

74 ha (71 ha våtm), 205 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Omitologiska värden.

Delobj. 1: Topogent kärr
6 ha, öppet. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
22 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, militärt skjutfält.

Element 1: Bäck, 2 % av delobjekttytan.

Element 2: Golv, 90 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 8 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Delobj. 3: Excentrisk mosse
16 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, militärt skjutfält.

Element 1: Sträng, (otyd.), 5 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 3 % av delobjekttytan.

Element 4: Mosseplan, 53 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Bäck, 2 % av delobjekttytan.

Element 6: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 7: Randskog, 8 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 8: Lagg, 2 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 9: Göl, 2 % av delobjekttytan.

Delobj. 4: Plåtformigt välvd mosse
27 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, militärt skjutfält. Spänger.

Element 1: Göl, 5 % av delobjektytan.

Element 2: Mosseplan, 60 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 15 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Hölja, 10 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 5: Randskog, 7 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 6: Dråg, 3 % av delobjektytan.
10E 71 01 (0126) KLASS 2
TOLSBODAMOSSEN 6,5 KM SO DALKARLSBERG

74 ha (71 ha våtm), 205 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Ornitologiska värden.

Delobj. 1: Topogent kärr
6 ha, öppet. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
22 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, militärt skjutfält.

Element 1: Bäck, 2 % av delobjektytan.

Element 2: Golv, 90 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 8 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Delobj. 3: Excentrisk mosse
16 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, militärt skjutfält.

Element 1: Sträng, (otydl.), 5 % av delobjektytan.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 15 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Dråg, 3 % av delobjektytan.

Element 4: Mosseplan, 53 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Bäck, 2 % av delobjektytan.

Element 6: Mosseplan, 10 % av delobjektytan, barrskog.
Fastmatta med ristuvor.

Element 7: Randskog, 8 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 8: Lagg, 2 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 9: Göl, 2 % av delobjektytan.

Delobj. 4: Plåtformigt våldv moss
27 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, militärt skjutfält. Spänger.

Element 1: Göl, 5 % av delobjektytan.

Element 2: Mosseplan, 60 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 15 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 4: Hölja, 10 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 5: Randskog, 7 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 6: Dråg, 3 % av delobjektytan.

10F 0F 01 (2849) KLASS 3
MYR 300 M S VENTORP, 5 KM S ASKER

26 ha (26 ha våtm), 85 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
6 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, lövskog. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 3: Golv, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr
20 ha, skogsbevuxet. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan, blandskog.

Element 2: Golv, 5 % av delobjektytan, öppet. Mjukmatta.

10F 0G 01 (3034) KLASS 3
HÄLLAMOSSEN OCH LEKEBOMOSSEN 5 KM S ASKER

48 ha (48 ha våtm), 80 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.
Torvkoncessionsansökan finns.

Delobj. 1: Svagt våldv mosse
42 ha, skogsbevuxet. Svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 3 % av delobjektytan, glest trädtyckt, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Lagg, 7 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 2: Vassar
2 ha, öppet.

Element 1: Golv. Vassvegetation.

Delobj. 3: Topogent kärr
4 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjektytan, lövskog.

Element 2: Golv, 15 % av delobjektytan, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

10F 0G 02 (0341) KLASS 3
MYR 200 M O KILSTORP, 8,5 KM S ODENSBACKEN

16 ha (16 ha våtm), 75 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
16 ha, skogsbevuxet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv, 95 % av delobjektytan, lövskog.

Element 2: Golv, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog.

Fastmatta.

**10F 0H 01 (2603) KLASS 3
MOSSBROMOSSEN 6 KM S ODENSBACKEN**

47 ha (46 ha våtm), 80 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.
Torvkoncessionsansökan finns.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

27 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande dikning, väg.
Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Platåformigt välvd mosse

19 ha, fördelat på 3 ytor, glest trädtyckt. Svag lokal påverkan från dikning, väg.

Element 1: Mosseplan, 40 % av delobjekttytan, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjekttytan, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 19 % av delobjekttytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Hölja, 1 % av delobjekttytan, öppet. Lösbotten.
**10F 0H 02 (0521) KLASS 3
BRÄNNTORPAMOSSEN 8,5 KM SSO ODENSBACKEN**

44 ha (42 ha våtm), 80 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.
Rullstensås.

Delobj. 1: Topogent kärr

3 ha, skogsbevuxet. Svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse

30 ha, skogsbevuxet. Svag generell påverkan från dikning, stark lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 3: Platåformigt välvd mosse

9 ha, öppet. Svag generell påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjekttytan, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjekttytan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

10F0H03

Himmersmossen och Fågelkärret, 4,5 km SSV Hampetorp

Objektet ligger i den sydöstra länsdelen mellan de mer eller mindre igenvuxna sjöarna Himmersjön och Svarten. Sjöarna sammanbinds av Himmersgraven. Med undantag av några små åkerlappar är myren helt omgiven av skog. Berggrunden domineras av glimmerskiffer och gnejsgranit. De ingående våtmarkstyperna utgörs av mossar och kärr. Flera skogsklädda fastmarksholmar, några relativt stora, avbryter våtmarksdominansen. En liten öppen tjärn ligger i nordväst. Diken löper kors och tvärs genom myren, som är mest skadad i nordost. Objektet inventerades i fält den 19 augusti 1993. I norr, omgiven av mossmark, ligger Skärsjön. Den är igenvuxen sedan en lång tid tillbaka och ett rikkärr har bildats. I en bred bård runt kärret finns mängder av bladvass och dessutom lövsly som långsamt tränger allt närmare in mot mitten. Golvet kan karaktäriseras som en något blöt fastmatta. Där inte vassen tagit överhanden växer bl a trädstarr, pors och blåttåtel. Andra arter att nämna är t ex snip och ärtstarr. Brunmossor, bl a *Scorpidium cossoni*, *Scorpidium scorpioides* och *Campylium stellatum*, bygger upp botten-skiktet. Enstaka små lösbottnar ligger utspridda i fastmattan. Den sluttande mossen söder om rikkärret har en svag lutning. Mosseplanet består huvudsakligen av ristuvor och rissträngar med eller utan tallar. Stundtals smälter ristuvorna samman till ett heltäckande skikt. Där risen viker undan är fastmattan av *Sphagnum magellanicum* typ. Små lösbottenhöjor är spridda över mosseplanet. Tallbevuxna svagt välvda mossar upptar en stor yta centralt i våtmarken. Längs i söder ligger Fågelkärret vars golv i det närmaste är vidöppet. De träd som finns är småvuxna och glest utspridda. Kärrgolvet utgörs av en fastmatta där bl a starr, tuvull och blåttåtel är vanliga, bladvassen är ställvis dominant. Enstaka exemplar av snip och ängsnycklar påträffas. I bottenskiktet är *Sphagnum papillosum* allmän. Fastmattedominansen avbryts av ristuvor och lösbottnar. Objektet är skadat av ett flertal diken och torvtäkter. Skadorna är mest framträdande i nordost. I övrigt är det endast en lokal påverkan. Några av diken är dessutom grunda, s k ägodiken.

Trots skadorna har myren höga naturvärden med olika myrtyper och grad av näringsstatus. Himmersmossen har dessutom ett rikt fågelliv med bl a orrspel. Den har i Fågelmyrar i Örebro län (1982:1) bedömts höra till skyddsklass 2.

**10F 0H 03 (1639) KLASS 1
HIMMERSMOSSEN OCH FÅGELKÄRRET 4,5 KM SSV
HAMPETORP**

310 ha (292 ha våtm), 75 m ö h. Flygb. -86. Fält -93.
Örebro kn.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns, ornitologiska värden, sänkt sjö i anslutning.

Delobj. 1: Tjärn

1 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Topogent kärr

73 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Gungfly, 1 % av delobjekttytan.

Element 2: Golv, 44 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 2, underelem. 1: Golv, 15 % av delobjektytan. Mjukmattekärr, starr-S. fallax variant.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan. Öppet lösbottenkärr. Järnrockrafällning.

Element 4: Golv, 2 % av delobjektytan, glest träd täckt, lövskog. Fastmatta.

Element 5: Golv, 3 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 6: Tuva, 5 % av delobjektytan. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 7: Golv, 35 % av delobjektytan, blandskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåttäl-vitmosstyp.

Delobj. 3: Topogent kärr

8 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning. Kärr är en igenvuxen sjö.

Element 1: Golv, 30 % av delobjektytan. Örtdominerad vegetation. Fastmatta. Rikkärr.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 40 % av delobjektytan. Mjukm. kärr av örtstarr-brunmosstyp. Rikkärr.

Element 3, underelem. 1: Golv, 5 % av delobjektytan. Öppet lösbottenkärr.

Delobj. 4: Topogent kärr

9 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 5: Svagt välvd mosse

139 ha, fördelat på 6 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande dikning, körspår från traktor/skogsmaskin, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 75 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Mosseplan, 20 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Delobj. 6: Sluttande mosse

18 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 9 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 45 % av delobjektytan, glest träd täckt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 5: Lösbotten, 1 % av delobjektytan.

Delobj. 7: Plåtformigt välvd mosse

26 ha, fördelat på 2 ytor, glest träd täckt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, körspår från traktor/skogsmaskin.

Element 1: Mosseplan, 52 % av delobjektytan, barrskog. Tallmosse av ristyp.

Element 2: Mosseplan, 30 % av delobjektytan, öppet, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjektytan, öppet. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Randskog, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 5: Lagg, 3 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 5, underelem. 1: Golv, 1 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning, blandskog. Öppet fastmattekärr.

Delobj. 8: Obestämbar mosse

19 ha, glest träd täckt. Stark generell påverkan från dikning, stark lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, barrskog. Fastmatta.

10F 0H 04 (2321) KLASS 3 HIMMERSJÖN 7,5 KM SSO ODENSBACKEN

17 ha (17 ha våtm), 80 m ö h. Flygb. -86. Örebro kn.

Ingår i naturvårdsplan. Åkermark ansluter, ornitologiska värden, våtmarken är en sänkt sjö.

Delobj. 1: Bevuxen sjö

17 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, kanalisering.

Element 1: Golv, 10 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 62 % av delobjektytan. Vassvegetation.

Element 3: Golv, 25 % av delobjektytan. Vattenvegetation.

Element 4: Vegetation utmed sjöstrand, 3 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

10F 0I 02 (2505) KLASS 3 SVARTEN 4 KM S HAMPETORP

74 ha (74 ha våtm), 75 m ö h. Flygb. -86. Örebro kn.

Åkermark ansluter, området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Bevuxen sjö

74 ha, öppet. Svag generell påverkan från dikning, kanalisering.

Element 1: Golv, lövskog.

10F 0I 03 (2026) KLASS 3 ÖSTANTORPASJÖN 5 KM S HAMPETORP

20 ha (20 ha våtm), 75 m ö h. Flygb. -86. Örebro kn.

Delobj. 1: Topogent kärr

13 ha, skogsbevuxet. Svag generell påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kanalisering. Kärr är en igenvuxen sjö.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Bevuxen sjö

7 ha, öppet. Svag generell påverkan från dikning, kanalisering.

Element 1: Golv, lövskog.

**10F 1B 01 (2915) KLASS 4
KILAMOSSEN 1,5 KM O ÅBYTORP**

43 ha (43 ha våtm), 65 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning, torvtäkt.

**10F 1H 01 (4335) KLASS 2
PRÅSTEBOLSMOSSEN 3,5 KM O ODENSBÄCKEN**

75 ha (75 ha våtm), 20 m ö h. Flygb. -86. Fält -93.
Örebro kn.
Åkermark ansluter, litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Koncentrisk mosse
14 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Tuva, 20 % av delobjekttytan, barrskog.
Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2: Sträng, 30 % av delobjekttytan, barrskog.
Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 2, underelem. 1: Mosseplan, 20 % av delobjekttytan,
4-10 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjekttytan.

Mjukm.mosse, vitag-kallgräs-S.cuspidatumtyp.

Element 3, underelem. 1: Hölja, 2 % av delobjekttytan.
Höljegöl.

Element 4: Hölja, 40 % av delobjekttytan. Fastmattemosse av
tuvull-S. rubellumtyp.

Element 4, underelem. 1: Mosseplan, 5 % av delobjekttytan.
Fastmattemosse av tuvull-S. fuscumtyp.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
61 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

**10F 2C 02 (4948) KLASS 3
HÄRMINGSMOSSEN 1 KM NO MOSÅS**

40 ha (40 ha våtm), 40 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.
Åkermark ansluter, området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
40 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från soptipp,
dikning, stark lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

**10F2E01
10F2F03**

**Västra Kvismaren, 4 km N Sköllersta och
Östra Kvismaren, Fiskinge och Hammarmaden, 2 km S Norrbyås**

De båda objekten beskrivs tillsammans eftersom de uppvisar stora likheter och ligger intill varandra. Kvismaren, som är en mycket förnämlig fågelsjö, har inte inventerats i fält. Beskrivningen och naturvärdesbedömningen grundas på flygbildstolkning samt uppgifter från litteratur. De båda slättsjöarna, Västra Kvismaren - Rysjön, Östra Kvismaren - Fågelsjön, ligger i ett mycket bördigt område där berggrunden huvudsakligen utgörs av granit. Den anslutande åkermarken når vanligen ända fram till sjöarna. Så gott som hela Kvismareområdet ingår i ett naturreservat som avsattes 1978-1981. Området har en hög status och är ett av de trettio objekt som är medtagna på den svenska s k CW- listan, Convention on Wetlands. Sverige undertecknade konventionen 1974. Vid slutet av 1800-talet sänktes sjöarna för att tillgodose behovet av mer åkermark. Sjöarna kontrollerades genom vallar och kanaler och igenväxningen var kraftig. På 1970-talet påbörjades det stora arbetet att restaurera sjöarna. Arbetet fortgår än idag med ett gott resultat. Fågellivet är rikligt med mängder av rastande och häckande arter. I området finns en fågelstation, Kvismare fågelstation, samt flera fågeltorn där intresserad allmänhet kan göra sina egna iakttagelser. Kvismareområdet har inte bara ett rikt fågelliv, både snok och huggorm har här stora livskraftiga stammar. 1993 påbörjade Anders Sjökvist en inventering med avseende på framförallt snokar i Kvismareområdet.

Den höga naturvärdet motiveras främst av det rikliga fågellivet.

**10F 2E 01 (2540) KLASS 1
VÄSTRA KVISMAREN 4 KM N SKÖLLERSTA**

200 ha (200 ha våtm), 25 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.
Ingår i ängs- och hagmarksinventering, ingår i naturvårdsplan, ingår i våtmarkskonventionen (Ramsar). Naturreservat. Området är beteshävdad, tillfredsställ. dokumentation finns, ornitologiska värden, sänkt sjö i anslutning.

Delobj. 1: Bevuxen sjö
60 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv. Vassvegetation.

Delobj. 2: Mad vid sjö

140 ha, fördelat på 6 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjekttytan, lövskog.
Örtdominerad vegetation.

Element 2: Golv, 15 % av delobjekttytan. Vassvegetation.

**10F 2F 01 (4645) KLASS 3
RESTAMOSSEN OCH SLÄTMOSSEN 2,5 KM V STORA
MELLÖSA**

216 ha (210 ha våtm), 20 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.
Ingår i naturvårdsplan. Åkermark ansluter, litteratur om objektet finns, området ornitologiskt inventerat.

Delobj. 1: Platåformigt välvd mosse

210 ha, öppet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande dikning, torvtäkt, väg.

Element 1: Mosseplan, 45 % av delobjekttytan, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 25 % av delobjekttytan, glest trädtyckt, barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 13 % av delobjekttytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 4: Mosseplan, 7 % av delobjekttytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 5: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, glest trädtyckt, lövskog.

10F 2F 02 (1926) KLASS 2 ÅSLAHOLMEN 2 KM SO NORRBYÅS

20 ha (17 ha våtm), 25 m ö h. Flygb. -86. Fält -93. Örebro kn.
Ingår i ängs- och hagmarksinventering, ingår i naturvårdsplan. Naturreservat. Området är beteshävdad, ornitologiska värden, sänkt sjö i anslutning.

Delobj. 1: Strandäng
14 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande kanal.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Limnogen strandsumpskog
3 ha. Svag lokal påverkan från dikning, dikning, anslutande kanal.

Element 1: Golv, 90 % av delobjekttytan, lövskog. Vassvegetation.

Element 2: Små fuktängsytor, 10 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Hölja. Mjukm.mosse, vitag-kallgräs-S.cuspidatumtyp.

Element 3: Hölja. Höljegöl.

Element 5: Mosseplan. Tallmosse av ristyp.

Element 6: Sträng, 1 % av delobjekttytan. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 7: Mosseplan. Ristuvmosse av S. fuscumtyp.

Element 8, underelem. 1: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan. Öppen fastmattemosse.

10F 2F 03 (0818) KLASS 1 ÖSTRA KVISMAREN, FISKINGE OCH HAMMARMADEN 2 KM S NORRBYÅS

401 ha (399 ha våtm), 25 m ö h. Flygb. -86. Örebro kn.
Ingår i ängs- och hagmarksinventering, ingår i naturvårdsplan. Naturreservat. Litteratur om objektet finns, ornitologiska värden, våtmarken är en sänkt sjö.

Delobj. 1: Vassar
285 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, kanalisering. Åkermark ansluter.

Element 1: Golv. Vassvegetation.

Delobj. 2: Strandäng

65 ha, fördelat på 5 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande kanal. Området är beteshävdad.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 3: Limnogen strandsumpskog
49 ha, fördelat på 3 ytor. Svag lokal påverkan från dikning. Åkermark ansluter, området är beteshävdad.

Element 1: Golv, 95 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Små fuktängsytor, 5 % av delobjekttytan, öppet, lövskog.

10F 2H 01 (4541) KLASS 2 VÅTMARK 50 M O HJÄLMARSHOLM, 5 KM NO ODENS- BACKEN

48 ha (45 ha våtm), 25 m ö h. Flygb. -86. Örebro kn.
Åkermark ansluter, våtmarken är en sänkt sjö.

Delobj. 1: Limnogen strandsumpskog
15 ha, fördelat på 9 eller fler ytor.

Element 1: Golv, 95 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Små fuktängsytor, 5 % av delobjekttytan, öppet.

Delobj. 2: Vassar
26 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 95 % av delobjekttytan. Vassvegetation.

Element 2: Små fuktängsytor, 5 % av delobjekttytan.

Delobj. 3: Strandäng
4 ha, öppet.

Element 1: Golv, 90 % av delobjekttytan.

Element 2: Golv, 10 % av delobjekttytan, skogbevuxet, lövskog.

10F 2H 02 (1428) KLASS 2 EGBYVIKEN OCH SEGERSJÖVIKEN 3,5 KM O ODENS- BACKEN

99 ha (97 ha våtm), 25 m ö h. Flygb. -86. Örebro kn.
Ingår i naturvårdsplan. Åkermark ansluter, ornitologiska värden, våtmarken är en sänkt sjö.

Delobj. 1: Limnogen strandsumpskog
20 ha, fördelat på 7 ytor. Svag lokal påverkan från dikning, kanalisering.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Vassar
77 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från brygga, kanalisering. Öppna vattenytor i vassar.

Element 1: Golv. Vassvegetation.

10F 2I 01 (3902) KLASS 2 VÅTMARK VID MESAREN, 6 KM NO ODENSBACKEN

37 ha (37 ha våtm), 25 m ö h. Flygb. -86. Örebro kn.
Våtmarken är en sänkt sjö.

Delobj. 1: Limnogen strandsumpskog
4 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, lövskog.

Element 2: Små fuktlängsytor, 10 % av delobjektytan, öppet.

Delobj. 2: Vassar
33 ha, öppet.

Element 1: Golv. Vassvegetation.

10F 3A 01 (2114) KLASS 3
SPÅNGAKÄRRET 2,5 KM S VINTROSA

84 ha (84 ha våtm), 45 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.
Åkermark ansluter.

Delobj. 1: Koncentrisk mosse
84 ha, öppet. Stark lokal påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande dikning, stark lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 10 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 10 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 5 % av delobjektytan. Fastmatta med ristuvor.

Element: Randskog.

10F 3H 01 (0138) KLASS 4
HJÄLMARSHOLMSMOSEN 5 KM O STORA MELLÖSA

59 ha (59 ha våtm), 25 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.
Åkermark ansluter.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
59 ha, skogsbevuxet. Svag generell påverkan från dikning, svag lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

10F 3H 02 (1942) KLASS 3
VÄTMARK 100 M SO TRÄNÄSET, 5 KM ONO STORA MELLÖSA

30 ha (30 ha våtm), 25 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.
Åkermark ansluter, våtmarken är en sänkt sjö.

Delobj. 1: Limnogen strandsumpskog
11 ha, fördelat på 7 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Vassar

15 ha, öppet.

Element 1: Golv. Vassvegetation.

Delobj. 3: Strandäng
3 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, lövskog.

Element 2: Golv, 10 % av delobjektytan, skogsbevuxet, lövskog.

10F 4A 01 (4013) KLASS 3
ODLINGSMOSEN 1,5 KM NV LATORPSBRUK

37 ha (37 ha våtm), 95 m ö h. Flygb. -87.
Örebro kn.

Delobj. 1: Koncentrisk mosse
37 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande dikning, kraftledning, stark lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Sträng, 45 % av delobjektytan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 20 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 25 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Mosseplan, 3 % av delobjektytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 5: Mosseplan, 7 % av delobjektytan. Fastmatta med ristuvor.

10F 4C 01 (4913) KLASS 3
BARNMOSEN 300 M NV GÄDDESTA

29 ha (28 ha våtm), 55 m ö h. Flygb. -87.
Örebro kn.
Tätortsbebyggelse i anslutning.

Delobj. 1: Tjärn
1 ha.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
28 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, körspar från traktor/skogsmaskin, anslutande annan täkt, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 27 % av delobjektytan, glest träd täckt, lövskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 3: Lagg, 2 % av delobjektytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Gungfly, 1 % av delobjektytan, öppet.

10F4D01
10F4D02

**Hjälmarviken och Södra delen av Oset, 2 km NO Almby och
Rynningeviken och norra delen av Oset, 300 m O Rynninge**

Objekten beskrivs tillsammans därför att de uppvisar stora likheter och ligger intill varandra. De har inte inventerats i fält. Beskrivningen och naturvärdesbedömningen bygger på flygbildstolkning samt uppgifter från litteratur.

Objektet ligger utmed västra kanten av Hemfjärden. Öster om finns Hjälmarviken och väster om breder Örebro tätbebyggelse ut sig. I berggrunden dominerar granit. Våtmarkens högsta värde består i att vara lämplig biotop för fåglar. Fågellivet är rikt med en artsammansättning som är typisk för en mellansvenk slättsjö. Fågeltorn finns i anslutning till Oset för att allmänheten ska kunna njuta av synen av de rastande och häckande fåglarna. Oset avsetts som naturreservat, med de gränser som är idag, 1986. En betydande del av objektet består av bladvass med inslag av fuktiga ängar och strandskogar. Stora delar beteshävdas, bl a i Oset.

Flera inventeringar med avseende på fågellivet har utförts. I Madmarker i Örebro län (1980:2) har Oset bedömts tillhöra klass 1.

Det höga naturvärdet motiveras framförallt av det rikliga fågellivet.

10F 4D 01 (2748) KLASS 1
HJÄLMARVIKEN OCH SÖDRA DELEN AV OSET 2 KM NO
ALMBY

79 ha (76 ha våtm), 25 m ö h. Flygb. -87.
Örebro kn.
Ingår i ängs- och hagmarksinventering, ingår i naturvårdsplan. Naturreservat. Ornitologiska värden, våtmarken är en sänkt sjö.

Delobj. 1: Limnogen strandsumpskog
17 ha, fördelat på 9 eller fler ytor.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Mad vid sjö
43 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande väg. Området är beteshävdad.

Element 1: Golv, 60 % av delobjekttytan, lövskog.
Vassvegetation.

Element 2: Små fuktängsytor, 15 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 3: Golv, 25 % av delobjekttytan, lövskog.

Delobj. 3: Strandäng
13 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, väg. Området är beteshävdad.

Element 1: Golv, lövskog.

10F 4D 02 (4340) KLASS 1
RYNNINGEVIKEN OCH NORRA DELEN AV OSET 300 M O
RYNNINGE

132 ha (130 ha våtm), 25 m ö h. Flygb. -87.
Örebro kn.
Ingår i ängs- och hagmarksinventering, ingår i naturvårdsplan. Naturreservat. Åkermark ansluter, ornitologiska värden, våtmarken är en sänkt sjö.

Delobj. 1: Limnogen strandsumpskog
40 ha, fördelat på 5 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, blandskog.

Delobj. 2: Mad vid sjö
90 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 75 % av delobjekttytan, lövskog.
Vassvegetation.

Element 2: Golv, 20 % av delobjekttytan, lövskog.
Området är beteshävdad.

Element 3: Små fuktängsytor, 5 % av delobjekttytan, lövskog.
Området är beteshävdad.

10F 4E 01 (2230) KLASS 3
VÅTMARK VID FRAMNÄSVIKEN, 1 KM N EKEBY-ALMBY

17 ha (17 ha våtm), 25 m ö h. Flygb. -87.
Örebro kn.
Åkermark ansluter, våtmarken är en sänkt sjö.

Delobj. 1: Limnogen strandsumpskog
7 ha, fördelat på 2 ytor. Svag lokal påverkan från anslutande bebyggelse, dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Vassar
10 ha, öppet.

Element 1: Golv. Vassvegetation.

10F 4E 02 (4426) KLASS 2
VÅTMARK O ORVAR HOLME, 3 KM N EKEBY-ALMBY

42 ha (42 ha våtm), 25 m ö h. Flygb. -87.
Örebro kn.
Ingår i naturvårdsplan. Våtmarken är en sänkt sjö.

Delobj. 1: Limnogen strandsumpskog
14 ha, fördelat på 3 ytor. Svag lokal påverkan från väg.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Vassar
25 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv. Vassvegetation.

Delobj. 3: Strandäng
3 ha, glest träd täckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

10F 4E 03 (1246) KLASS 3
VÅTMARK 250 M O GLASHYTAN,
300 M NO EKEBY-ALMBY

11 ha (11 ha våtm), 25 m ö h. Flygb. -87.
Örebro kn.
Åkermark ansluter, våtmarken är en sänkt sjö.

Delobj. 1: Limnogen strandsumpskog

3 ha. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Vassar
8 ha, öppet.

Element 1: Golv, Vassvegetation.

10F4F01

Strandskog, 200 m O Sundbyvik, 7 km NV Stora Mellösa

Objektet är en av Hjälmarssträndernas strandskogar. Skogarna finns på många håll och den här specifika delen får representera dem. Det är en ung skog, den bildades först vid den stora sänkningen av Hjälmaren under slutet av 1800-talet. Objektet sträcker sig från Sundbyvik i väster till Hjälmarmälen i öster. I berggrunden dominerar sandsten. Det sydöstra hörnet av skogen tangeras av ett sommarstugeområde, längs med hela objektet finns åkermark. Den östra delen rekognoserades i fält den 27 september 1993. I skogen närmast Hjälmarmälen är klubbval vanligast men inslaget av andra träd, t ex gråal, glasbjörk, gran och asp är stort. Fältskiktet är välutbildat och artrikt men det är inte någon art som dominerar tydligt över de andra. Här växer bl a videört, topplösa, kärrsilja, gullris, hallon, hässlebrodd och besöksöta. Väster om diket förändrar skogen karaktär. Klubbvalen är fortfarande vanligast men inslaget av övriga träd är mindre. I fältskiktet dominerar grenrör. Mellan strandskogen och den öppna vattenytan finns ett brett bälte av bladvass. De hydrologiska ingreppen utgörs av ett dike i öster.

Den höga naturvärdesbedömningen grundas framförallt beroende på storleken samt att objektet är relativt orört. Det är dock en ung skog som behöver några år på sig för att bli riktigt värdefull.

10F 4F 01 (1014) KLASS 1
STRANDSKOG 200 M O SUNDBYVIK,
7 KM NV STORA MELLÖSA

39 ha (39 ha våtm), 25 m ö h. Flygb. -87. Fält -93.
Örebro kn.
Åkermark ansluter, våtmarken är en sänkt sjö.

Delobj. 1: Limnogen strandsumpskog
21 ha, fördelat på 2 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 95 % av delobjekttytan, lövskog.
Klubbvalstrandskog.

Element 1, underelem. 1: Golv, 25 % av delobjekttytan.
Klubbvalstrandskog.

Element 2: Små fuktängsytor, 5 % av delobjekttytan, öppet.
Videvegetation.

Delobj. 2: Vassar
18 ha, öppet. Svag lokal påverkan från brygga.

Element 1: Golv. Högvassar av tät bladvasstyp.

10F 4F 02 (2625) KLASS 3
VÅTMARK 50 M O FALLHAGEN, 7 KM NNV STORA MEL-
LÖSA

32 ha (32 ha våtm), 25 m ö h. Flygb. -87.
Örebro kn.
Åkermark ansluter, rullstensås, våtmarken är en sänkt sjö.

Delobj. 1: Limnogen strandsumpskog
5 ha, fördelat på 2 ytor. Stark generell påverkan från kraftledning, svag lokal påverkan från anslutande annan täkt, anslutande väg.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Vassar
24 ha, öppet. Svag lokal påverkan från brygga, stark lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv. Vassvegetation.

Delobj. 3: Strandäng
3 ha, öppet.

Element 1: Golv, 60 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Golv, 40 % av delobjekttytan, skogbevuxet,
lövskog.

10F 4F 03 (2421) KLASS 3
VÅTMARK V ÅSÖN, 7,5 KM NV STORA MELLÖSA

36 ha (36 ha våtm), 25 m ö h. Flygb. -87.
Örebro kn.
Rullstensås, våtmarken är en sänkt sjö.

Delobj. 1: Vassar
30 ha, öppet. Svag lokal påverkan från brygga.

Element 1: Golv.

Delobj. 2: Limnogen strandsumpskog
6 ha, fördelat på 4 ytor. Svag lokal påverkan från anslutande annan täkt.

Element 1: Golv, lövskog.

10F 4G 01 (4912) KLASS 2
VÅTMARK VID SJÖLUNDA, 5 KM NNO HJÄLMARBADEN

37 ha (34 ha våtm), 25 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Åkermark ansluter, våtmarken är en sänkt sjö.

Delobj. 1: Limnogen strandsumpskog
6 ha, fördelat på 4 ytor.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Vassar
23 ha, öppet.

Element 1: Golv. Vassvegetation.

Delobj. 3: Strandäng

5 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 95 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Golv, 5 % av delobjekttytan. Videvegetation.

**10F 4H 01 (0218) KLASS 3
VÅTMARK 500 M S TOMTA, 5 KM NO STORA MELLÖSA**

26 ha (26 ha våtm), 25 m ö h. Flygb. -86.
Örebro kn.
Åkermark ansluter, våtmarken är en sänkt sjö.

Delobj. 1: Limnogen strandsumpskog

12 ha, fördelat på 4 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.
Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Vassar

14 ha, fördelat på 4 ytor, öppet.

Element 1: Golv, 95 % av delobjekttytan. Vassvegetation.

Element 2: Golv, 5 % av delobjekttytan, skogbevuxet, lövskog.

**10F 5A 01 (1815) KLASS 4
MYR 100 M N GARPHYTTAN**

39 ha (39 ha våtm), 100 m ö h. Flygb. -88. Fält -93.
Örebro kn.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning, torvtäkt.

Element 1: Golv. Sumpkärr av högstarr-örttyp. Rikkärr.

10F5A02 Kärr, Limbergskärret, 50 m V Hagalund, 1 km V Garphyttan

Det lilla rikkärret ligger vid Kilsbergskanten, strax väster om Garphyttan. Omgivningarna utanför kärret består främst av skog men vid gården Hagalund finns en fläck öppen mark. Berggrunden domineras av leptit och leptitgnejs. Mellan vägen den utanföriggande vägen och kärret finns en skogsridda. Objektet inventerades i fält den 31 augusti 1993. Kärret ger ett mosaikartat och flikigt intryck där våtmarksytorna varvas med trädklädda fastmarkstungor. Bäckarna som rinner genom området sväller stundtals ut och bildar små öppna vattenspeglar. Spridda träd ger kärret en gles krontäckning. Golvet är i huvudsak en mjukmatta, stundtals är den mycket blöt. Fältskiktet domineras av olika starrarter bl a trådstarr, ärtstarr och ängsstarr. Här växer också enligt uppgift (Å. Lindström 1993) klubbstarr och den hänsynskrävande hartmansstarren. Bottenskiktet är sporadiskt utbildat och domineras av brunmossor, bl a de rikkärrsindikerande mossorna *Cinclidium stygium*, *Scorpidium cossoni* och *Scorpidium scorpioides*.

Naturvärdesbedömningen grundas framförallt på den rika miljön.

**10F 5A 02 (0101) KLASS 1
KÄRR 50 M V HAGALUND, 1 KM SV GARPHYTTAN**

4 ha (4 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården.
Litteratur om objektet finns, rikkärr.

Delobj. 1: Topogent kärr

4 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Golv, 45 % av delobjekttytan, blandskog. Mjukmatta.

Element 2: Golv, 25 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Element 3: Golv, 30 % av delobjekttytan, skogbevuxet, lövskog.

**10F 5A 03 (1722) KLASS 3
MYR 100 M O GARPHYTTAN**

12 ha (12 ha våtm), 110 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.

Delobj. 1: Topogent kärr

2 ha, öppet.

Element 1: Golv, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Svagt våldad mosse

10 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 5 % av delobjekttytan, öppet, blandskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Lagg, 5 % av delobjekttytan, blandskog. Fastmatta.

**10F 5A 04 (2430) KLASS 3
HÄGGKÄRRET 1 KM NO GARPHYTTAN**

11 ha (11 ha våtm), 105 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.

Delobj. 1: Svagt våldad mosse

5 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr

6 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjekttytan, lövskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 5 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 10 % av delobjekttytan, glest träd täckt, lövskog. Fastmatta.

Element 4: Golv, 15 % av delobjekttytan, skogbevuxet, lövskog.

10F 5A 05 (2711) KLASS 3
KÄRR 100 M S FLYHAGEN, 700 M N GARPHYTTAN

1 ha (1 ha våtm), 150 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Topogent kärr

1 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande väg.
Rikkärr.

Element 1: Golv, 75 % av delobjektytan, lövskog.

Element 2: Golv, 25 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

10F 5B 01 (1647) KLASS 3
BREDMOSEN 1 KM NV RUNNABY

74 ha (73 ha våtm), 60 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Ingår i naturvårdsplan. Entomologiska värden, ornitologiska värden.

Delobj. 1: Topogent kärr

9 ha, öppet. Stark generell påverkan från dikning, svag lokal påverkan från anslutande torvtäkt.

Element 1: Golv, 60 % av delobjektytan, lövskog, Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 40 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Delobj. 2: Obestämbart mosse

34 ha, skogsbevuxet. Stark generell påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 3: Koncentrisk mosse

24 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hygien, dikning, anslutande torvtäkt.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjektytan, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 25 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 5 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Tuva, 15 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 5: Mosseplan, 15 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 6: Randskog, 8 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 7: Lagg, (otyd.), 2 % av delobjektytan. Fastmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr

6 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande dikning, anslutande torvtäkt.

Element 1: Golv, 50 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 30 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 20 % av delobjektytan, skogbevuxet, blandskog.

Delobj. 5: Tjärn

1 ha.

Element 1: Golv.

10F5B02 Tysslingen, 4 km O Garphyttan

Objektet har inte inventerats i fält. Naturvärdesbedömningen och beskrivningen grundas på flygbildstolkning samt uppgifter från litteratur. Tysslingen är en avlång slättsjö, helt omgiven av ett odlingslandskap. I berggrunden dominerar granit, leptit och sandsten. Den sänktes som så många andra sjöar vid senare delen av 1800-talet. Breda bårder av bladvass sträcker sig in mot sjöns mitt. Mellan vassbältet och fastmarken finns smala lövstrandskogar och små fuktiga ängar. Några partier hävdas i form av bete. Sitt stora värde har sjön för de fåglar som rastar och häckar i, och i anslutning till, sjön. Fågellivet är rikt och ett par fågeltorn finns uppsatta för intresserad allmänhet. På senare år har mängder av sångsvanar hittat till sjön. Under några korta, men intensiva, dagar rastar de där. Tysslingen bedömdes tillhöra klass 1 i Madmarker i Örebro län (1980:2)

Det höga naturvärdet motiveras främst av det rika fågellivet.

10F 5B 02 (1817) KLASS 1
TYSSLINGEN 4 KM O GARPHYTTAN

403 ha (403 ha våtm), 40 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Ingår i ängs- och hagmarksinventering, ingår i naturvårdsplan. Åkermark ansluter, ornitologiska värden, sänkt sjö i anslutning.

Delobj. 1: Limnogen strandsumpskog

31 ha, fördelat på 9 eller fler ytor. Svag lokal påverkan från dikning. Tidigare hävd genom slåtter och/eller bete.

Element 1: Golv, 87 % av delobjektytan, lövskog.

Element 2: Små fuktängsytor, 3 % av delobjektytan, öppet.

Element 3: Golv, 10 % av delobjektytan, lövskog. Området är beteshävdad.

Delobj. 2: Strandäng

62 ha, fördelat på 7 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning. Tidigare hävd genom slåtter och/eller bete.

Element 1: Golv, 10 % av delobjektytan, lövskog. Området är beteshävdad.

Element 2: Golv, 85 % av delobjektytan, lövskog.

Element 3: Golv, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 3: Vassar

310 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Öppna vattenytor i vassar.

Element 1: Golv. Vassvegetation.

**10F 5C 01 (2808) KLASS 4
AVERSKOGSMOSSEN 1,5 KM NNV RUNNABY**

33 ha (33 ha våtm), 50 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Åkermark ansluter.

Delobj. 1: Obestämbar mosse
24 ha, skogsbevuxet. Stark generell påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Plåtåformigt välvd mosse
4 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande dikning, anslutande torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjekttytan, barrskog.
Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Mosseplan, 50 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse
5 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande dikning, anslutande torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

**10F 5E 01 (2546) KLASS 4
ULLAVISJÖN 1 KM O RINKABY**

18 ha (18 ha våtm), 25 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Kärret är en igenvuxen sjö.

Delobj. 1: Topogent kärr
14 ha, öppet. Stark generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 55 % av delobjekttytan, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 35 % av delobjekttytan. Örtdominerad vegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
4 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

**10F 5F 01 (0112) KLASS 2
VÄTMARK VID HEMFJÄRDEN,
1,5 KM S GLANSHAMMAR**

89 ha (88 ha våtm), 25 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Åkermark ansluter, våtmarken är en sänkt sjö.

Delobj. 1: Limnogen strandsumpskog
32 ha, fördelat på 9 eller fler ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Vassar
51 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från brygga.

Element 1: Golv. Vassvegetation.

Delobj. 3: Strandäng
5 ha, fördelat på 3 ytor, öppet.

Element 1: Golv, lövskog.

**10F 5G 01 (2541) KLASS 4
ÅSTAMOSSEN 6 KM O GLANSHAMMAR**

60 ha (60 ha våtm), 25 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning, torvtäkt, anslutande väg. Ingår i ängs- och hagmarksinventering, ingår i naturvårdsplan. Området är beteshävdad, våtmarken är en sänkt sjö.

**10F 5G 02 (1618) KLASS 3
VÄTMARK 150 M O EKEBERG,
4 KM OSO GLANSHAMMAR**

6 ha (6 ha våtm), 25 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.

Delobj. 1: Vassar
3 ha, öppet.

Delobj. 2: Strandäng
3 ha, öppet.

Element 1: Golv, 80 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Golv, 20 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, lövskog.

**10F 5G 03 (1828) KLASS 3
VÄTMARK 500 M S KÄRSTA, 5 KM OSO GLANSHAMMAR**

18 ha (18 ha våtm), 25 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Våtmarken är en sänkt sjö.

Delobj. 1: Limnogen strandsumpskog
4 ha, fördelat på 2 ytor.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Vassar
14 ha, öppet.

Element 1: Golv. Vassvegetation.

10F5G04

Vätmark öster om Högsjö, 6,5 km OSO Glanshammar

Objektet har inte inventerats i fält. Naturvärdesbedömningen och beskrivningen grundas på flygbildstolkning samt uppgifter från litteratur. Objektet ligger i Norra Björksundet i Hjälmarens, mellan Björkö och fastlandet. Berggrunden domineras av leptit och kalksten. En stor del av det grunda vattenområdet täcks av vassvegetation. Flera små skogsbevuxna öar sticker upp ur vattenytan och bryter av miljön som annars skulle te sig homogen. En smal zon av strandsumpskog har utbildats mellan vassen och fastmarken. Enligt Naturvårdsöversikten (1984) har Björksundet ett rikt fågelliv med häckande och rastande fåglar, bl a Hjälmarens största skrattmåskoloni. Det höga naturvärdet består bl a i det rika fågellivet.

10F 5G 04 (1541) KLASS 1
VÅTMARK O HÖGSJÖ, 6,5 KM OSO GLANSHAMMAR

71 ha (65 ha våtm), 25 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Ingår i naturvårdsplan. Åkermark ansluter, våtmarken är en sänkt sjö.

Delobj. 1: Limnogen strandsumpskog
13 ha, fördelat på 9 eller fler ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 95 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Små fuktängsytor, 5 % av delobjekttytan, öppet, lövskog.

Delobj. 2: Vassar
52 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från brygga.

Element 1: Golv. Vassvegetation.

10F 6C 01 (3724) KLASS 3
BREMOSSEN 3 KM O KIL

14 ha (14 ha våtm), 70 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Åkermark ansluter.

Delobj. 1: Obestämbare mosse
6 ha, skogsbevuxet. Stark generell påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Svagt välvad mosse
4 ha, glest trädäkt. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, 50 % av delobjekttytan, barrskog.

Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 40 % av delobjekttytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

Delobj. 3: Topogent kärr
4 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 90 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Golv, 10 % av delobjekttytan, öppet, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

10F 6C 02 (1642) KLASS 2
S DELEN AV LÅNGEN, 1,5 KM V HOVSTA

82 ha (82 ha våtm), 40 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Åkermark ansluter, ornitologiska värden, sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Limnogen strandsumpskog
16 ha, fördelat på 5 ytor. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 95 % av delobjekttytan, lövskog.
Vassvegetation.

Element 2: Små fuktängsytor, 5 % av delobjekttytan, öppet, lövskog.

Delobj. 2: Vassar
62 ha, öppet. Svag lokal påverkan från brygga.

Element 1: Golv, 90 % av delobjekttytan. Vassvegetation.

Element 2: Golv, 10 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, lövskog.

Delobj. 3: Strandäng
4 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

10F6D01

Brunstorpskärrret, 0,5 km O UGGLEBO, 2,5 km O Axbergs k:a

Objektet har inte inventerats i fält. Naturvärdesbedömningen och beskrivningen grundas på flygbildstolkning samt uppgifter från litteratur. Det lilla rikkärret omgärdas av skog på en berggrund som domineras av kalksten. En smal bilväg, som senare ansluter till riksväg 60, stryker förbi kärrets norra del. Kärret kan grovt indelas i två delar, en sydlig och en nordlig. Den södra är mer eller mindre öppen och golvet i huvudsak en mjukmatta. Den norra är torrare och skogsbevuxen. Kärret är artrikt och hyser mängder av rikkärtsarter, både bland kärlväxterna och bland mossorna. I fältskiktet växer bl a tagelstarr, ängsnycklar och gräsull. Bland mossorna kan *Calliergon giganteum*, *Tomentypum nitens* och *Scorpidium scorpioides* nämnas. Här växer även *Bovista paludosa* (sumpäggsvamp) (Hakeliev 1963).

Den rika miljön är den främsta orsaken till den höga naturvärdesbedömningen. Brunstorpskärrret ingår i Myrskyddsplan för Sverige.

10F 6D 01 (2832) KLASS 1
BRUNSTORPSKÄRRET 0,5 KM O UGGLEBO 2,5 KM O
AXBERGS KA

2 ha (2 ha våtm), 50 m ö h. Flygb. -88. Fält -77.
Örebro kn.

Ingår i SNV:s övers. inv. 1979. Botaniska värden, botaniska värden, större område med triviallövskog ansluter, rikkärr.

Delobj. 1: Topogent kärr
1 ha, öppet.

Element 1: Golv, 10 % av delobjekttytan. Lösboten.

Element 2: Golv, 40 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 50 % av delobjekttytan, glest träd täckt, lövskog. Öppet fastmattekärr.

Delobj. 2: Topogent kärr
1 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Golv, 50 % av delobjekttytan, lövskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 20 % av delobjekttytan, glest träd täckt, lövskog. Fastmatta.

Element 3: Golv, 30 % av delobjekttytan, glest träd täckt, lövskog. Videvegetation. Fastmatta.

10F 6D 02 (0943) KLASS 4
KULLSMOSEN 1,5 KM O HOVSTA

21 ha (21 ha våtm), 50 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning, torvtäkt, väg.

10F 6D 03 (2202) KLASS 4
MYR 100 M V AXBERG, 1,5 KM ONO HOVSTA

10 ha (10 ha våtm), 40 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Mycket starkt generellt påverkat av torvtäkt, väg.

10F6E01 - 03 och 05

Kilbergsmossen med intilliggande kärr, 4 km O Hovsta

Objekten har inte inventerats i fält. Naturvärdesbedömningen och beskrivningen bygger på flygbildstolkning samt uppgifter från litteratur. I ett skogsdominerat område nordväst om Rinkaby ligger Kilbergsmossen med intilliggande kärr. Smala skogsbilvägar leder fram till området från olika håll. Myrfläckarna ligger skilda från varandra, mellan dem finns skogsmark. Kilbergsmossen är den största av dem, de övriga är inte på ett hektar vardera. I berggrunden finns urkalksten och det avspeglas i områdets vegetation. De små objekten är samtliga minerotrofa och trädbevuxna. I Kilbergsmossen finns inslag av små tallmossar. Artsammansättningen i området är rikt och varierat. Det botaniskt mest intressanta är dock fynden av det lilla knottblomstret, en art som är på stark tillbakagång i Sverige. Bland övriga arter i fältskiktet kan bl a gräsull, myggbloster och slåtterblomma nämnas (Nilsson 1982).

Det höga naturvärdet motiveras främst av att området är botaniskt intressant. Kilbergsmossen ingår i Myrskyddsplan för Sverige.

10F 6E 01 (1414) KLASS 1
KILBERGSMOSEN 4 KM O HOVSTA

13 ha (13 ha våtm), 50 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Ingår i myrskyddsplan för Sverige, ingår i naturvårdsplan.
Botaniska värden.

Delobj. 1: Topogent kärr
10 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 95 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Golv, 5 % av delobjekttytan, barrskog.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
3 ha, fördelat på 2 ytor, glest träd täckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, blandskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

10F 6E 02 (1009) KLASS 1
MYR 700 M NV MANTORP, 3,5 KM O HOVSTA

1 ha (1 ha våtm), 45 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Ingår i myrskyddsplan för Sverige, ingår i naturvårdsplan.
Botaniska värden.

Delobj. 1: Topogent kärr
1 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Golv, lövskog.

10F 6E 03 (1020) KLASS 1
KÄRR 600 M NO MANTORP, 4 KM NNV RINKABY

1 ha (1 ha våtm), 55 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Ingår i myrskyddsplan för Sverige, ingår i naturvårdsplan.
Botaniska värden.

Delobj. 1: Topogent kärr
1 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Golv, lövskog.

10F 6E 04 (3019) KLASS 2
STORMOSEN OCH KAVELBROKÄRRET 4 KM NO HOVSTA

56 ha (52 ha våtm), 60 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Ingår i naturvårdsplan.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
36 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 3 % av delobjekttytan, öppet.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Mosseplan, 2 % av delobjekttytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 2: Tjärn
1 ha. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv.

Delobj. 3: Topogent kärr
16 ha, fördelat på 8 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från

dikning.

Element 1: Golv, 25 % av delobjekttytan, skogbevuxet, lövskog.

Element 2: Golv, 43 % av delobjekttytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 3: Golv, 15 % av delobjekttytan. Örtdominerad vegetation. Fastmatta.

Element 4: Golv, 10 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 5: Gungfly, 5 % av delobjekttytan, glest träd täckt, barrskog. Fastmatta.

10F 6E 05 (1219) KLASS 1
KÄRR 800 M VNV SKOGSTORP, 4,5 KM NNV RINKABY

1 ha (1 ha våtm), 50 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Ingår i myrskyddsplan för Sverige, ingår i naturvårdsplan.
Rikkärr.

Delobj. 1: Topogent kärr
1 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Golv, lövskog.

10F6F01

Kärr 500 m SV Skäcklinge, 3,5 km NNO Glanshammar

Objektet har inte inventerats i fält. Naturvärdesbedömningen och beskrivningen grundas på flygbildstolkning och uppgifter från litteratur. Det lilla kärret ligger i ett urkalkområde. Hela området är präglad av kalkstenen som finns i berggrunden och det har fått en intressant flora, både med avseende på svampar och kärlväxter. Anledningen till att kärret särskilt bör uppmärksammas är att den sällsynta orkiden knottblomster har en av sina lokaler här. De biotoper som knottblomstret trivs i är förvinnade och orkiden är på tillbakagång. Enligt flygbilden tycks inte kärret vara hydrologiskt påverkat.

Det höga naturvärdet består framförallt i att området är botaniskt intressant.

10F 6F 01 (0835) KLASS 1
KÄRR 500 M SV SKÄCKLINGE, 3,5 KM NNO
GLANSHAMMAR

1 ha (1 ha våtm), 50 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Ingår i naturvårdsplan. Rikkärr.

Delobj. 1: Topogent kärr
1 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Golv, lövskog.

Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 29 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 1 % av delobjekttytan. Lösbottom.

Delobj. 3: Topogent kärr
4 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv, 90 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Golv, 10 % av delobjekttytan, lövskog.

Delobj. 4: Tjärn
1 ha. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 25 % av delobjekttytan.

Element 2: Gungfly, 75 % av delobjekttytan.

10F 6G 01 (2618) KLASS 4
NORRA BREDMOSEN 6,5 KM NO GLANSHAMMAR

30 ha (30 ha våtm), 60 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Mycket starkt generellt påverkat av dikning, anslutande dikning, torvtäkt.

10F 6G 02 (4147) KLASS 2
VARGMOSEN 7 KM NV GÖTLUNDA

48 ha (43 ha våtm), 55 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse
16 ha, fördelat på 5 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 98 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 2 % av delobjekttytan, öppet.
Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr
23 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, kraftledning.

Element 1: Golv, 70 % av delobjekttytan.

10F 6H 01 (1206) KLASS 3
BREDMOSEN 5,5 KM V GÖTLUNDA

21 ha (20 ha våtm), 45 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.

Delobj. 1: Topogent kärr
6 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 54 % av delobjekttytan, lövskog.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 1 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 45 % av delobjekttytan, skogbevuxet, lövskog.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
14 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, stark lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Element 2: Lagg, 1 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**10F 6H 02 (1040) KLASS 3
FINNMOSSEN 2,5 KM V GÖTLUNDA**

39 ha (38 ha våtm), 35 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr
5 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
33 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning,
stark lokal påverkan från torvtäkt, svag lokal påverkan från
anslutande väg.

Element 1: Mosseplan, 95 % av delobjektytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 5 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**10F 7A 05 (2319) KLASS 2
BOCKSBOMOSSEN 4 KM NV KLOCKHAMMAR**

35 ha (34 ha våtm), 220 m ö h. Flygb. -88. Fält -93.
Örebro kn.
Litteratur om objektet finns, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Koncentrisk mosse
7 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, torvtäkt.
Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Sträng, 15 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 2: Tuva, 5 % av delobjektytan. Risvegetation.
Fastmatta.

Element 3: Hölja, 20 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Mosseplan, 60 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
3 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 3: Koncentrisk mosse
15 ha, öppet. Svag lokal påverkan från torvtäkt.
Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Mosseplan, 40 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Sträng, (otydl.), 5 % av delobjektytan.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 3 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 4: Hölja, 22 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 5: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, glest
träddäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 6: Randskog, (otydl.), 3 % av delobjektytan,
skogbevuxet, barrskog.

Element 7: Lagg, 2 % av delobjektytan.

Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Topogent kärr
9 ha, fördelat på 4 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
väg.

Element 1: Bäck, 5 % av delobjektytan.

Element 1, underelem. 1: Vegetation utmed mindre vattendrag.
Fastm.kärr av tuvsäv-blåttäl-vitmosstyp.

Element 2: Golv, 3 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 3: Sträng, 2 % av delobjektytan. Fastmatta.

Element 4: Golv, 72 % av delobjektytan, lövskog.
Fastm.kärr av tuvsäv-blåttäl-vitmosstyp.

Element 5: Gungfly, 12 % av delobjektytan.

Element 6: Golv, 3 % av delobjektytan, barrskog.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 7: Golv, 3 % av delobjektytan, skogsbevuxet,
barrskog.

**10F 7A 06 (0619) KLASS 2
ÄNGAMOSSEN 3,5 KM V KLOCKHAMMAR**

41 ha (39 ha våtm), 235 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Excentrisk mosse
23 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen,
torvtäkt.

Element 1: Sträng, (otydl.), 15 % av delobjektytan.
Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 3 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 3: Göl, 2 % av delobjektytan.

Element 4: Hölja, 15 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 5: Mosseplan, 40 % av delobjektytan. Vegetationen
domineras av mossor. Fastmatta.

Element 6: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, glest
träddäckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse
2 ha, fördelat på 2 ytor, glest träddäckt.

Element 1: Mosseplan, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr
14 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från
anslutande hyggen.

Element 1: Bäck, 10 % av delobjektytan.

Element 2: Dråg, 3 % av delobjektytan.

Element 3: Golv, 80 % av delobjektytan.
Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Golv, 7 % av delobjektytan, glest träddäckt,
barrskog.

**10F 7B 01 (2519) KLASS 3
LOCKHYTTEMOSSEN 1,5 KM N KLOCKHAMMAR**

21 ha (21 ha våtm), 140 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.

Delobj. 1: Obestämbar mosse

6 ha, glest trädäkt. Stark generell påverkan från dikning, torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Koncentrisk mosse

12 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Sträng, 30 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 20 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 15 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 4: Randskog, 15 % av delobjekttytan, glest trädäkt, blandskog.

Element 5: Mosseplan, 20 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 3: Topogent kärr

3 ha, öppet.

Element 1: Golv, 90 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Element 2: Golv, 10 % av delobjekttytan, skogbevuxet, lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

**10F 7B 03 (4406) KLASS 2
MYR 300 M N HAMMARBODA,
3,5 KM N KLOCKHAMMAR**

18 ha (17 ha våtm), 205 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr

4 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Plåtformigt välvd mosse

5 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 70 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 18 % av delobjekttytan, skogbevuxet, barrskog. Fastmatta.

Element 3: Lagg, 10 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 4: Bäck, 2 % av delobjekttytan.

Delobj. 3: Topogent kärr

2 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen.

Element 1: Golv. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 4: Svagt välvd mosse

6 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Mosseplan, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 5: Tjärn 1 ha.

Element 1: Golv.

**10F 7C 01 (1326) KLASS 3
LÅNGMOSEN 1,5 KM O OLOVSBORG,
5,5 KM NO KLOCKHAMMAR**

12 ha (12 ha våtm), 80 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

9 ha, glest trädäkt. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning, anslutande kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjekttytan, barrskog. Fastmatta.

Delobj. 2: Topogent kärr

3 ha, fördelat på 2 ytor, öppet.

Element 1: Golv, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

10F7D01**10F7D02**

Västra delen av Ervallaängarna och

Östra delen av Ervallaängarna, 2 km S Ervalla

De båda objekten beskrivs tillsammans, de är likartade och ligger intill varandra på en berggrund som domineras av glimmergnejs. Mellan dem finns fastmark på vilken en järnväg och en väg anlagts. Ervallaängarna har inte inventerats i fält. Beskrivningen grundas på flygbildstolkning samt uppgifter från litteratur. Dyltaån, som har ett fint meandrande lopp, passerar området under sin väg mot sjön Väringen. Varje vår svämmar Dyltaån över och stora delar av Ervallaängarnas slåtter- och betesmarker läggs under vatten. Ängarnas vegetationssammansättning domineras av starr och gräs. De har ett stort värde för fågellivet, de besöks under en period på våren av rastande sjöfåglar. Ervallaängarna är dessutom intressanta med avseende på kulturhistoria eftersom starrängarna slåtterhävdas. Det är en mycket ovanlig förekomst i länet. Flera diken har dragits genom ängarna, främst i den östra delen.

Den höga naturvärdesbedömningen motiveras bl a av att ängarna slåtterhävdas samt att de är värdefulla för fågellivet. Ervallaängarna ingår i Myrskyddsplan för Sverige.

**10F 7D 01 (4029) KLASS 1
VÄSTRA DELEN AV ERVALLAÄNGARNA
2 KM S ERVALLA**

38 ha (38 ha våtm), 35 m ö h. Flygb. -88. Storomr T2.
Örebro kn.

Ingår i ängs- och hagmarksinventering,
ingår i myrskyddsplan för Sverige, ingår i naturvårdsplan.
Området är beteshävdad, ornitologiska värden, våtmarken
slåtterhävdas.

Delobj. 1: Strandäng

38 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, anslutande järnväg, anslutande väg.

Element 1: Golv, 90 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Golv, 5 % av delobjekttytan, glest trädäkt, lövskog.

Element 3: Golv, 5 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, lövskog.

**10F 7D 02 (4139) KLASS 1
ÖSTRA DELEN AV ERVALLAÄNGARNA 2 KM S ERVALLA**

21 ha (20 ha våtm), 35 m ö h. Flygb. -88. Storomr T2. Örebro kn.

Ingår i ängs- och hagmarksinventering, ingår i myrskyddsplan för Sverige, ingår i naturvårdsplan. Området är beteshävdad, ornitologiska värden, våtmarken slätterhävdas.

Delobj. 1: Strandäng

20 ha, öppet. Svag generell påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 90 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Golv, 10 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, lövskog.

**10F 7E 01 (2226) KLASS 3
BREDMOSEN 5,5 KM SO ERVALLA**

23 ha (22 ha våtm), 75 m ö h. Flygb. -88. Örebro kn.

Delobj. 1: Topogent kärr

3 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse

5 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 97 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Lagg, 3 % av delobjekttytan, öppet. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 3: Plåtformigt välvd mosse

14 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Mosseplan, 65 % av delobjekttytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Mosseplan, 20 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Hölja, 1 % av delobjekttytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 4: Randskog, 2 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, barrskog.

Element 5: Lagg, 2 % av delobjekttytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 6: Mosseplan, 10 % av delobjekttytan, glest trädäkt, barrskog. Risvegetation. Fastmatta.

**10F 7F 01 (0648) KLASS 3
RINGABYMOSEN 1,5 KM O OPPHAMMAR**

33 ha (30 ha våtm), 90 m ö h. Flygb. -88. Örebro kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

9 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från dikning, stark lokal påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 2: Topogent kärr

13 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Golv, 85 % av delobjekttytan. Fastmatta.

Element 2: Golv, 13 % av delobjekttytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 2 % av delobjekttytan. Lösbotten.

Delobj. 3: Obestämbar myr

8 ha, öppet. Stark generell påverkan från dikning, svag lokal påverkan från kraftledning.

Element 1: Golv. Fastmatta.

**10F 7F 02 (2846) KLASS 2
VÅTMARK 50 M S SUNDBY, 2 KM NO OPPHAMMAR**

17 ha (17 ha våtm), 35 m ö h. Flygb. -88. Örebro kn.

Ingår i ängs- och hagmarksinventering. Åkermark ansluter, sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Limnogen strandsumpskog

5 ha. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Vassar

12 ha, öppet.

Delobj. 3: Strandäng

10 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning. Området är beteshävdad.

Element 1: Golv, 95 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Golv, 5 % av delobjekttytan, skogsbevuxet, lövskog.

**10F 7F 03 (3521) KLASS 2
VÅTMARK 50 M N KÄGLEHOLM, 1,5 KM N OPPHAMMAR**

31 ha (31 ha våtm), 35 m ö h. Flygb. -88. Örebro kn.

Ingår i naturvårdsplan. Sjö ansluter till minst 25%.

Delobj. 1: Limnogen strandsumpskog

4 ha, fördelat på 3 ytor.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 2: Strandäng

9 ha, fördelat på 3 ytor, öppet. Stark lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, lövskog.

Delobj. 3: Vegetationsrikt vatten

18 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från kanalisering.

Element 1: Golv, 50 % av delobjekttytan. Vassvegetation.

Element 2: Golv, 40 % av delobjekttytan. Vattenvegetation.

10F7G02

Porsmossen, 4 km V Opphammar

Objektet ligger mitt i det barrskogsdominerade Käglanområdet. Berggrunden är väsentligen uppbyggd av leptit. En smal skogsbilväg leder fram till den sydligaste spetsen av myren där också en bäck rinner. Objektet inventerades i fält den 9 juli 1993. Det lilla vackert utformade objektet är ett sträng- flarkkärr, en våtmarkstyp som är inte är vanlig söderut. Strängarna är mest framträdande i den södra delen av myren, i nordost flyter de samman till ett enhetligt kärrgolv. Strängarna är av fastmattetyp med pors och blåttåtel som samdominanter. Bland övriga kärlväxter kan jungfrulin och ängsvädd nämnas. *Sphagnum imbricatum* täcker bottenskiktet. Flarkarna är grunda och några av dem har ett heltäckande fältskikt av i huvudsak vitag men även myrtåg och dybläddra är vanliga. Bottenskiktet i flarkarna är outvecklat. I det nordöstra hörnet finns en liten tallmosse av skvattramtyp. Längs med den nordöstra kanten finns ett litet dike som endast har en svag påverkan på objektet.

Den höga naturvärdesbedömningen motiveras av att sträng- flarkkärr är ovanliga i den här regionen.

10F 7G 02 (0321) KLASS 1
PORMOSSEN 4 KM V OPPHAMMAR

7 ha (7 ha våtm), 80 m ö h. Flygb. -88. Fält -93.
Örebro kn.
Ingår i naturvårdsplan. Litteratur om objektet finns.

Delobj. 1: Sträng-flarkkärr

7 ha, öppet. Svag lokal påverkan från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Sträng, 1 % av delobjekttytan, 1-3 %
kröntäckning, barrskog. Fastm.kärr av tuvsäv-blåttåtel-
vitmosstyp.

Element 2: Flark, 50 % av delobjekttytan. Lösbottenkärr av
oligotrof typ.

Element 3: Bäck, 1 % av delobjekttytan.

Element 4: Mosseplan, 4 % av delobjekttytan, skogsbevuxet,
barrskog. Tallmosse av skvattramtyp.

10F 8C 02 (3837) KLASS 4
JÄRLEMOSSEN 7 KM SO NORA

200 ha (200 ha våtm), 50 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Mycket starkt generellt påverkat av torvtäkt. Området
ornitologiskt inventerat.

10F 8D 01 (1003) KLASS 3
TINGSTORPSMOSSEN 2,5 KM V ERVALLA

19 ha (19 ha våtm), 55 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.

Delobj. 1: Topogent kärr

4 ha, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan från anslutande
dikning.

Element 1: Golv, 80 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Golv, 20 % av delobjekttytan, glest träd täckt,
lövskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Delobj. 2: Svagt välvd mosse

5 ha, glest träd täckt. Svag lokal påverkan från anslutande
torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, barrskog. Vegetationen domineras av

mossor. Fastmatta.

Delobj. 3: Obestämbar mosse

10 ha, skogsbevuxet. Stark generell påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

10F 8D 02 (4740) KLASS 3
SLÄTTMOSSEN 3 KM VSV FRÖVIFORS BRUK

11 ha (11 ha våtm), 50 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.

Delobj. 1: Svagt välvd mosse

11 ha, glest träd täckt. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Mosseplan, blandskog. Fastmatta.

10F 9D 02 (2546) KLASS 2
KNATTORPSMOSSEN 2,5 KM NV FRÖVIFORS BRUK

120 ha (97 ha våtm), 60 m ö h. Flygb. -88.
Örebro kn.
Litteratur om objektet finns, området ornitologiskt
inventerat, sjö ansluter till högst 24%.

Delobj. 1: Topogent kärr

6 ha, fördelat på 2 ytor, skogsbevuxet. Svag lokal påverkan
från anslutande hyggen, dikning.

Element 1: Golv, 50 % av delobjekttytan, lövskog.

Element 2: Golv, 50 % av delobjekttytan, barrskog.

Delobj. 2: Blandmyr av mosalktyp

4 ha, skogsbevuxet.

Element 1: Golv, 55 % av delobjekttytan, lövskog. Fastmatta.

Element 2: Golv, 37 % av delobjekttytan, barrskog.
Fastmatta.

Element 3: Gungfly, 8 % av delobjekttytan.

Delobj. 3: Svagt välvd mosse

21 ha, fördelat på 4 ytor, skogsbevuxet.
Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 90 % av delobjekttytan, barrskog.

Element 2: Mosseplan, 7 % av delobjekttytan, öppet,
barrskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 3: Lagg, 3 % av delobjektytan, öppet. Fastmatta.

Delobj. 4: Obestämbar mosse

9 ha, fördelat på 2 ytor, glest träd täckt. Stark generell påverkan från torvtäkt.

Element 1: Mosseplan, barrskog.

Delobj. 5: Topogent kärr

22 ha, fördelat på 2 ytor, öppet. Svag lokal påverkan från dikning.

Element 1: Golv, 90 % av delobjektytan, barrskog. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 2: Golv, 9 % av delobjektytan. Mjukmatta.

Element 3: Golv, 1 % av delobjektytan. Lösbotten.

Delobj. 6: Platåformigt vårlvd mosse

4 ha, öppet. Svag lokal påverkan från dikning, kraftledning.

Element 1: Mosseplan, 85 % av delobjektytan, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 2: Randskog, 5 % av delobjektytan, skogbevuxet, barrskog.

Element 3: Mosseplan, 10 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 7: Excentrisk mosse

31 ha, öppet. Svag lokal påverkan från kraftledning, stark lokal påverkan från torvtäkt. Oregelbundet strukturmönster.

Element 1: Sträng, (otydl.), 25 % av delobjektytan. Risvegetation. Fastmatta.

Element 2: Hölja, 14 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Mjukmatta.

Element 3: Hölja, 1 % av delobjektytan. Lösbotten.

Element 4: Mosseplan, 25 % av delobjektytan, lövskog. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Element 5: Mosseplan, 24 % av delobjektytan, glest träd täckt, barrskog. Fastmatta med ristuvor.

Element 6: Lagg, 1 % av delobjektytan. Gräs/starrvegetation. Fastmatta.

Element 7: Hölja, 10 % av delobjektytan. Vegetationen domineras av mossor. Fastmatta.

Delobj. 8: Tjärn

1 ha.

Element 1: Golv.

KARTBILAGA

Detaljkartor för Klass 1-myrarna


ASKERSUNDS KOMMUN
09E5H01

Nycklamossen
10 km V Askersund (83 ha)

- 1 Tjärn
- 2 Svagt välvd mosse
- 3 Sumpskog
- 4 Topogent kärr
- 5 Platåformigt välvd mosse

--- Sträng

Östra Laxsjön




Örkaggen

ASKERSUNDS KOMMUN
9F4A02

Myr O Verkasjölund
3 km O Hammar (28 ha)

- 1 Sumpskog
- 2 Flytbladsvegetation
- 3 Topogent kärr
- 4 Topogent kärr
- 5 Tjörn




Måsjön

ASKERSUNDS KOMMUN 09F5E01

Kyrkmossen och Bredmossen
med omgivande myrar
7 km O Mariedamm (184 ha)

- 1 Svagt välvd mosse
- 2 Platåformigt välvd mosse
- 3 Topogent kärr
- 4 Topogent kärr
- 5 Tjörn

- Dike
- Fastmarksholme
- Torvtäkt




DEGERFORS KOMMUN

09E8E01

Södra Åsmossen och Högs kogs
Stormosse, 9 km NNV
Finnerödja k:a (251 ha)

- 1 Excentrisk mosse
- 2 Plåtåformigt välvd mosse
- 3 Topogent kärr
- 4 Topogent kärr
- 5 Sumpskog
- 6 Plåtåformigt välvd mosse

- - - Sträng
- Dike
- Fastmarksholme



DEGERFORS KOMMUN


09E9D01

Julösmossen

5 km NNV Finnerödja (387 ha)

- 1 Tjörn
- 2 Plåtåformigt välvd mosse
- 3 Topogent kärr
- 4 Svagt välvd mosse
- 5 Svagt välvd mosse
- 6 Excentrisk mosse
- 7 Topogent kärr
- 8 Sluttande mosse

- Sträng
- Dike
- ▨ Torvtäkt
- Fastmarksholme
- Göl



DEGERFORS KOMMUN 10E0E01

**Stora och Lilla Klingen
4 km OSO Nysund (90 ha)**

- 1 Topogent kärr
- 2 Svagt välvd mosse
- 3 Excentrisk mosse
- 4 Platåformigt välvd mosse

- Sträng
- Dike
- Fastmarksholme




DEGERFORS KOMMUN 10E1C05

Stormossen vid Mickelsrud
3,5 km NV Nysund (409 ha)

- 1 Koncentrisk mosse
- 2 Excentrisk mosse
- 3 Svagt välvd mosse
- 4 Platåformigt välvd mosse
- 5 Sträng-flarkkär
- 6 Topogent kärr

- - - Sträng
- Dike
- Torvtäkt
- Fastmarksholme
- Göl




DEGERFORS KOMMUN 10E1E01

Stora Gåssjömossen
5 km O Nysund (705 ha)

- 1 Svagt välvd mosse
- 2 Topogent kärr
- 3 Sträng-flarkkär
- 4 Koncentrisk mosse
- 5 Excentrisk mosse
- 6 Tjäm
- 7 Svagt välvd mosse
- 8 Excentrisk mosse


- Sträng
- Dike
- ▨ Torvtäkt
- Fastmarksholme
- Göl




DEGERFORS KOMMUN
10E2C05**Östra Sälsjömossen**
4 km SSO Björneborg (101ha)

- 1 Excentrisk mosse
- 2 Koncentrisk mosse
- 3 Svagt välvd mosse
- 4 Topogent kärr
- 5 Topogent kärr

- Sträng
- Fastmarksholme
- Göl





DEGERFORS KOMMUN
10E2F02

**Stormossen, Rödmosse och
Spångkärret**
4 km N Svartå (135 ha)

- 1 Tjörn
- 2 Topogent kärr
- 3 Svagt välvd mosse
- 4 Excentrisk mosse

- Sträng
- Fastmarksholme
- Göl

DEGERFORS KOMMUN
10E4G01

Örgivsmossen
NO Örgiven (76 ha)

- 1 Topogent kärr
- 2 Svagt välvd mosse
- 3 Topogent kärr
- 4 Tjörn
- 5 Topogent kärr
- 6 Excentrisk mosse

- - - Sträng
- Fastmarksholme
- Göl




HALLSBERGS KOMMUN 09E9J01

Våtmarker vid Vibysjön
100 m N Vretstorp (99 ha)

- 1 Strandäng
- 2 Limnogen strandsumpskog
- 3 Vassar

— Dike
● Fastmarksholme




HALLSBERGS KOMMUN
09F5G01

**Tärnmossen, Rönnbärsmossen
och Svinkärret**
3 km SO Hjortkvarn k:a (315 ha)

- 1 Svagt välvd mosse
- 2 Plåtåformigt välvd mosse
- 3 Topogent kärr
- 4 Topogent kärr
- 5 Svagt välvd mosse
- 6 Tjörn

- Dike
- ▨ Torvtäkt
- Fastmarksholme



HALLSBERGS KOMMUN

09F5G02

Spångmossen och Mårtena
2,5 km S Hjortkvarn (180 ha)

- 1 Sumpskog
- 2 Mad vid vattendrag
- 3 Svagt välvd mosse
- 4 Topogent kärr

— Dike
● Fastmarksholme




HALLSBERGS KOMMUN 09F6F01

Glottrakärret och Venerna
500 m V Hjortkvarn (140 ha)

- 1 Mad vid vattendrag
- 2 Svagt välvd mosse
- 3 Topogent kärr
- 4 Fuktäng

— Dike
● Fastmarksholme



HALLSBERGS KOMMUN

09F7F01

Kamperhultkärret

7,5 km SSO Svennevads k:a (80 ha)

- 1 Mad vid Sjö
- 2 Svagt välvd mosse
- 3 Topogent kärr
- 4 Topogent kärr

— Dike
● Fastmarksholme




HALLSBERGS KOMMUN 09F8C05

Tornmossen och
Tränemossen
1,5 km NO Tisarstrand (42 ha)

- 1 Mad vid vattendrag
- 2 Svagt välvd mosse
- 3 Topogent kärr

● Fastmarksholme




HALLSBERGS KOMMUN

09F8D01

Hamra tärn och Lövsjökärret
10,5 km SV Pålsboda station (18 ha)

- 1 Topogent kärr
- 2 Topogent kärr
- 3 Tjörn



● Fastmarksholme



HALLSBERGS KOMMUN
09F9D01

Kärr, Matstorpskärret
1,5 km N Sarsebo , 5 km SV
Pålsboda (4 ha)


1 Topogent kärr



HALLSBERGS KOMMUN
09F9F02

Bockmossen
5 km NO Svennevad (14 ha)

1 Sumpskog
2 Mad vid sjö





KARLSKOGA KOMMUN 10E6G03

Fågelsjömossen med
flera myrar
2 km O Karlskoga (337 ha)

- 1 Svagt välvd mosse
- 2 Obestämbar mosse
- 3 Topogent kärr
- 4 Excentrisk mosse
- 5 Platåformigt välvd mosse
- 6 Tjörn

- Sträng
- Dike
- ▨ Torvtäkt
- Fastmarksholme







KARLSKOGA KOMMUN 10E6H05

Fallmossen och Råmossen
6 km O Karlskoga (191 ha)

- 1 Svagt välvd mosse
- 2 Topogent kärr
- 3 Tjärn
- 4 Topogent kärr
- 5 Excentrisk mosse

- Sträng
- Dike
- Blötmark
- Fastmarksholme




KARLSKOGA KOMMUN
10E6I01


Trangärdet

12 km ONO Bofors stn (270 ha)

- 1 Plåtåformigt välvd mosse
- 2 Sluttande mosse
- 3 Topogent kärr
- 4 Svagt välvd mosse
- 5 Tjärn

- Sträng
- Dike
- Fastmarksholme
- Göl






LAXÅ KOMMUN

09E2F04

**Myrar kring Vringelirövarna
och Röven**

5,5 km SO Tiveds k:a (11ha)

- 1 Topogent kärr
- 2 Sumpskog
- 3 Svagt välvd mosse
- 4 Tjärn



Stora Trehörningen

LAXÅ KOMMUN
09E2G01

Tolvtingsmossen med flera myrar
6 km SO Tiveds kyrka (38 ha)

1 Svagt välvd mosse

2 Topogent kärr


3 Sumpskog

4 Svagt välvd mosse

5 Tjörn




Fastmarksholme




LAXÅ KOMMUN
09E2G02

Myr vid Trollkyrkesjön
7 km SO Tiveds kyrka (10 ha)

- 1 Svagt välvd mosse
- 2 Topogent kärr
- 3 Tjörn
- 4 Svagt välvd mosse
-  Fastmarksholme
-  Dike





Kråksjön

LAXÅ KOMMUN

09E5F02

Kojemossen,
Rotamossen,
Källängsmossen
7,5 km SSV Röfors (265 ha)

1 Svagt välvd mosse

2 Topogent kärr


3 Sluttande mosse

Fastmarksholme

Torvtäkt

Dike

Sträng




LAXÅ KOMMUN
09E5G01

**Myr 100 m SO Skomakare-
torp och Store mosse**
9,5 km S Röfors (128 ha)

- 1 Sluttande mosse
- 2 Topogent kärr
- 3 Svagt välvd mosse
- 4 Tjärn

- Dike
- - - Sträng
- Fastmarksholme
- ▨ Torvtäkt
- Göl



LAXÅ KOMMUN
09E6F03

Långsmomossen
(86 ha)

- 1 Topogent kärr
- 2 Mad vid vattendrag
- 3 Svagt välvd mosse

 **Fastmarksholme**




LAXÅ KOMMUN
09E6G02

Karamossen
3,5 km S Laxå (408 ha)

- 1 Topogent kärr
- 2 Svagt våld mosse
- 3 Excentrisk mosse
- 4 Topogent kärr

--- Sträng
● Fastmarksholme



LAXÅ KOMMUN
09E6H01

**Flera mindre myrar i
Gropsjöområdet,
Rockebrokarret,
6 km OSO Röfors (12 ha)**

- 1 Topogent kärr
- 2 Plåtåformigt välvd mosse
- 3 Tjörn



LAXÅ KOMMUN
09E6H05

**Gäddsjömossen och
Långmossen**
8,5 km O Röfors (59 ha)

- 1 Svagt välvd mosse
- 2 Topogent kärr
- 3 Tjörn

 Fastmarksholme




LAXÅ KOMMUN
09E7F03

**Björnbäcksmossen och
Kolösmossen**
1 km V Laxå (144 ha)

- 1 Svagt välvd mosse
- 2 Excentrisk mosse
- 3 Vegetationsrikt vatten
- 4 Topogent kärr

- Sträng
- Dike
- Fastmarksholme



LAXÅ KOMMUN
09E8E07

Boramossen
5 km O Lämås (56 ha)

- 1 Svagt välvd mosse
- 2 Topogent kärr
- 3 Platåformigt välvd mosse
- 4 Sumpskog
- 5 Mad vid vattendrag

- Dike
- Fastmarksholme
- Torvtäkt




LAXÅ KOMMUN
9E9F01

Stora och Lilla Rankemossen
7 km NV Laxå (232 ha)

- 1 Svagt välvd mosse
- 2 Platåformigt välvd mosse
- 3 Sluttande mosse
- 4 Topogent kärr

-  Fastmarksholme
-  Sträng
-  Dike




LAXÅ KOMMUN
10E0G01

Stensmossen
1,5 km V Skagershult (146 ha)

- 1 Svagt välvd mosse
- 2 Platåformigt välvd mosse
- 3 Sluttande mosse
- 4 Topogent kärr

- Sträng
- Dike
- Fastmarksholme
- Torvtäkt




ÖREBRO KOMMUN
09F7G09

Ålsjö mossen
3,5 km SO Brevens bruk
(53 ha)

- 1 Svagt välvd mosse
- 2 Topogent kärr
- 3 Blandmyr av mosaiktyp
- 4 Tjörn

 Fastmarksholme




Sottern

ÖREBRO KOMMUN
09F8G01

Stormossen 500 m O Bisbotärn
4 km SV Brevens bruk (34 ha)

- 1 Topogent kärr
- 2 Svagt välvd mosse
- 3 Platåformigt välvd mosse

 Fastmarksholme



ÖREBRO KOMMUN
10E1G02

Stora Stenmossen
2 km NV Skagershult (92 ha)

- 1 Excentrisk mosse
2 Svagt välvd mosse
3 Topogent kärr

- Dike
- - - Sträng
● Fastmarksholme




ÖREBRO KOMMUN
10E1H01

Skagershultamossen och
Stenhultsmossen

3,5 km O Skagershult (1 964 ha)

- 1 Obestämbar mosse
- 2 Plåtåformigt välvd mosse
- 3 Svagt välvd mosse
- 4 Topogent kärr
- 5 Topogent kärr
- 6 Excentrisk mosse
- 7 Koncentrisk mosse
- 8 Mad vid vattendrag


- Sträng
- Dike
- ▨ Torvtäkt
- Fastmarksholme



ÖREBRO KOMMUN
10E3G04

Myr 200 m O Holmsjötorp
5,5 km NNV Mullhyttan (18 ha)

- 1 Tjörn
- 2 Svagt välvd mosse
- 3 Mad vid sjö
- 4 Topogent kärr
- 5 Mad vid vattendrag



ÖREBRO KOMMUN
10E4I02

Dammsjömossen
6 km NNV Hidinge (59 ha)

- 1 Tjörn
- 2 Topogent kärr
- 3 Svagt välvd mosse
- 4 Plåtåformigt välvd mosse
- 5 Sluttande mosse

- Sträng
- Dike
- Fastmarksholme



ÖREBRO KOMMUN


10E6J04

Ymningshultsmossen

6,6 km NNV Hjulåsen (66 ha)

- 1 Tjärn
- 2 Platåformigt välvd mosse
- 3 Topogent kärr
- 4 Svagt välvd mosse
- 5 Excentrisk mosse

- Sträng
- Dike
- Fastmarksholme




ÖREBRO KOMMUN
10F0H03

**Himmersmossen och
Fågelkärret**
4,5 SSV Hampetorp (310 ha)

- 1 Tjärn
- 2 Topogent kärr
- 3 Topogent kärr
- 4 Topogent kärr
- 5 Svagt välvd mosse
- 6 Sluttande mosse
- 7 Platåformigt välvd mosse
- 8 Obestämbar mosse

- Sträng
- Dike
- ▨ Torvtäkt
- Fastmarksholme



ÖREBRO KOMMUN

10F2E01


Västra Kvismaren

4 km N Sköllersta (200 ha)

1 Bevuxen sjö

2 Mad vid sjö

— Dike




ÖREBRO KOMMUN
10F2F03

**Östra Kvismaren, Fiskinge
och Hammarmaden**
2 km S Norrbyås (401 ha)

1 Vassar
2 Strandäng
3 Limnogen strandsumpskog

— Dike
● Fastmarksholme




**ÖREBRO KOMMUN
10F4D01**

**Hjälmarviken och södra
delen av Oset
2 km NO Almby (79 ha)**

- 1 Limnogen strandsumpskog
- 2 Mad vid sjö
- 3 Strandäng

— Dike
● Fastmarksholme



ÖREBRO KOMMUN
10F4D02


**Rynningeviken och norra
delen av Oset**
300 m O Rynninge (132 ha)

1 Limnogen strandsumpskog

2 Mad vid sjö

— Dike

● Fastmarksholme




ÖREBRO KOMMUN
10F4F01

Strandskog, 200 m O Sundbyvik
7 km NV Stora Mellösa (39 ha)

1 Limnogen strandsumpskog
2 Vassar

— Dike
● Fastmarksholme




ÖREBRO KOMMUN
10F5A02

Limbergskärret, 50 m V Hagalund
1 km V Garphyttan (4 ha)

1 Topogent kärr

— Dike
● Fastmarksholme




ÖREBRO KOMMUN
10F5B02

Tysslingen
4 km O Garphyttan (403 ha)

- 1 Limnogen strandsumpskog
2 Strandäng
3 Vassar

- Dike
● Fastmarksholme




ÖREBRO KOMMUN
10F5G04

Våtmark öster om Högsjö
6,5 km OSO Glanshammar (71 ha)

1 Limnogen strandsumpskog
2 Vassar

— Dike
● Fastmarksholme





ÖREBRO KOMMUN
10F6D01

Brunstorpskärret 0,5 km O Ugglebo
2,5 km O Axbergs k:a (2 ha)

1 Topogent kärr
2 Topogent kärr

— Dike






ÖREBRO KOMMUN
10F6E01 - 03, 05

**Kilbergsmossen med
intilliggande kärr
4 km O Hovsta (13 ha)**

1 Topogent kärr
2 Svagt välvd mosse

— Dike



ÖREBRO KOMMUN

10F6F01

Kärr 500 m SV Skäcklinge

3,5 km NNO Glanshammar (1 ha)

1 Topogent kärr

Tjugestasjon

1



ÖREBRO KOMMUN

10F7D01

**Västra delen av Ervallaängarna
2 km S Ervalla (38 ha)**

1 Strandäng

— Dike



ÖREBRO KOMMUN
10F7D02

Östra delen av Ervallaängarna
2 km S Ervalla (21 ha)

1 Strandäng

— Dike
● Fastmarksholme




ÖREBRO KOMMUN
10F7G02

Porsmossen
4 km V Opphammar (7 ha)

1 Sträng-flarkkärr

- - - Sträng
— Dike



Denna rapport utgör Örebro läns del av den riksomfattande våtmarksinventering som drivits och bekostats av Naturvårdsverket.

Våtmarkerna har naturligt en rik biologisk mångfald som det är angeläget att bevara för kommande generationer. Samtidigt är anspråken på myrarna från olika exploaterande intressen stora. Det är därför angeläget att förekommande våtmarker bedöms och klassificeras från naturvårdssynpunkt vilket sen kan läggas till grund för ställningstaganden i exploateringsärenden och säkerställandefrågor.

Rapporten är publicerad i två delar, södra och norra delen av Örebro län.

Länsstyrelsen i Örebro län